

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十五

詳校官太醫院員稷臣表天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣吳裕德

謄錄監生臣沈瑞錦

欽定四庫全書

本草綱目卷十五目錄

草之四

隰草類上五十三種

菊 本經

野菊 拾遺

菴藷 本經  
對廬附

蓍 本經

艾 別錄  
夏臺附

千年艾

綱目

茵陳蒿

本經

青蒿

本經

黃花蒿

綱目

白蒿

本經

角蒿

唐本

蘼蒿

拾遺

馬先蒿

本經



陰地厥 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

菟蔚 本經 即  
益母草

鑿草 拾遺

薇薔 本經 無  
心草附

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草

圖經  
六月霜  
即

麗春草

圖經

旋覆花

本經

青葙子

本經  
陶朱術鴈來  
紅天靈草思莫子附

雞冠花

嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花

綱目

燕脂

綱目

大薊小薊 別錄

續斷 本經

苦苣 別錄

漏蘆 本經

飛廉 本經

苧麻 別錄

苧麻 唐本  
即白麻

大青 別錄

小青圖經

胡盧巴嘉祐

蠡實本經即馬蘭子必似勒附

惡實別錄即牛蒡

藁耳本經即蒼耳

天名精本經即地菰鶴蟲

豨薺唐本

箬綱目

蘆 別錄

甘蕉 別錄

蘘荷 別錄

麻黃 本經 附 雲

木賊 嘉祐 附 問 荆

石龍芻 本經 附 龍 須 草 即

龍常草 別錄 即 搜 心 草

燈心草 開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

本草綱目卷十五目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷十五

明 李時珍 撰

草之四

隰草類上  
五十三種

菊

本經  
上品

釋名節華

本經

女節

別錄

女華

別錄

女莖

別錄

日精

別錄

更生

別錄

傳延年

別錄

治牆

爾雅

金蕊

綱目

陰成

別錄

周盈

別錄

陸佃

珍曰

雅

云菊本作鞠從鞠鞠窮也月今九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦取其應節候也

崔寔月令云女節女華菊華之名也治蔕日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頌曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼為田峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿

集解

別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實皆陰

乾弘景曰菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者為真菊一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦蕒非真菊也葉正相似惟以甘苦別之南陽鄆縣最多今近道處處有之取種便得又有白菊莖葉都相似惟花白五月取之仙經以菊為妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種類頗多惟紫莖氣香葉厚



至柔者嫩時可食花微大味甚甘者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾花小味苦者名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似茼蒿花莖都黃今服餌家多用白者又有一種開小小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳宗輿曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而白者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為野菊時珍曰菊之品凡百種宿根自生莖葉花色品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟以單葉味甘者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始

生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高蓋如蜂窠中有細子亦可捺種嫩葉及花皆可焯食白菊之壯菊燒灰撒地中能死鼃龜說出周禮

花實並同氣味苦平無毒別錄曰甘損之曰甘者入

寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者為苦蕒惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕒者爾故景煥牧豎閑談云真菊延齒野菊泄人正如黃精益壽鈎吻殺人

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕

痺久服利血氣輕身耐老延年

本經

療腰痛去來陶陶

除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢

別錄陶縱緩貌

治頭

目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散

利血脉並無所忌

甄權

作枕明目葉亦明目生熟並可

食

大明

養目血去翳膜

元素

主肝氣不足

好古

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白

弘景

染髭髮令黑和巨勝茯苓

密丸服之去風眩變白不老益顏色

藏器

發明

震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬實脩受四

氣飽經露霜葉枯不落花稿不零味兼甘苦性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士米入酒竿騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記言胡廣久病風羸飲菊蕀水多壽菊之貴重如此是豈羣芳可伍哉鍾會菊有五美贊

云圓花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚  
發君子德也胃霜吐穎象貞質也盃中體輕神仙食  
也西京雜記言采菊花莖葉雜  
秫米釀酒至次年九月始熟用之

### 附方

舊六新十六

### 服食甘菊

玉函方云王子喬變白增年  
方用甘菊三月上寅日采苗

名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日  
采花名曰金精十二月上寅日采根莖名曰長生四  
味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵為末每酒  
服一錢匕或以蜜丸梧子大酒服七九一日三服百  
日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八  
十歲老翁變為兒童也孟詵云正月采葉五月五日  
采莖九月服食白菊  
太清靈寶方引九月九日白菊  
花二斤茯苓一斤並搗羅為末  
每服二錢溫酒調下日三服或以煉過松脂和九雞  
子大每服一九主頭眩久服令人好顏色不老藏器

曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁拷汁和丹蒸服也白菊花酒天寶單方治大

夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中疾壅每發即頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二

七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰乾搗末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再

服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯三

大斗酒中經七日服之日三次常風熱頭痛菊膏川芎

各三錢為末每服一錢蘇頌圖經膝風疼痛菊膏陳艾葉作護

半茶調下簡便方吳是扶癰疽入目生翳障用白菊花穀精草綠豆皮

壽方等分為末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食柿日食三枚病後生

淺者五七日遠者半月見効仁齋直指方

腎

白菊花蟬脫等分為散每用二三錢入密少  
許水煎服大人小兒皆宜屢驗  
救急方  
疔腫

垂死

菊花一握搗汁一升入口即活此  
神驗方也冬月采根  
肘后方  
女人陰腫  
甘菊

苗搗爛煎湯先熏後  
洗危氏得効方  
酒醉不醒  
九月九日真菊花為  
末飲服方寸匕外

臺秘  
要  
眼目昏花  
雙美丸用甘菊花一斤紅椒去目六  
兩為末用新地黃汁和丸梧子大每

服五十九臨臥茶  
清下  
瑞竹堂方

花上水主治益色壯陽治一切風大  
明

野菊

拾遺

釋名苦薏

時珍曰薏乃蓮子之心此  
物味苦似之故與之同名

集解

藏器曰苦薏生澤畔莖如馬蘭花如菊菊甘而薏苦語曰苦如薏是也時珍曰苦薏處處原野

極多與菊無異但葉薄小而多尖花小而莖多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

震亨曰野菊花服之大傷胃氣

主治調中止洩破血婦人腹內宿血宜之

藏器治癰腫

疔毒瘰癧眼癰

時珍

附方新癰疽丁腫

一切無名腫毒孫氏集効方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以

渣傳之即愈

衛生易簡方用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一椀絞汁服以渣傳之取汗即愈

或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每酒服三錢亦可

天泡濕瘡

野菊花根棗木



煎湯洗之  
醫學集成

瘰癧未破  
野菊花根搗爛煎酒服以渣  
傳之自消不消亦自破也

瑞竹堂  
經驗方

菴蔞

音淹  
本經上品

釋名覆閭

時珍曰菴草屋也閭里門也此草乃蒿屬  
老莖可以蓋覆菴閭故以名之貞元廣利

方謂之菴蔞蒿云又史注云菴  
廬軍行宿室也則閭似當作廬

集解

別錄曰菴蔞子生雍州川谷亦生上黨及道邊  
十月采實陰乾弘景曰狀如蒿艾之類近道處

處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也頌曰今江  
淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八  
月結實九月采實時珍曰菴蔞葉不似艾似菊葉而  
薄多細丫面背皆青高者四五尺其莖白色如艾莖

而粗八九月開細花淡黃色結細實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊

子氣味苦微寒無毒

別錄曰微溫普曰神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒李當之溫

權曰辛苦時珍曰降也陰中微陽入足厥陰經血分之才曰荆實薏苡為之使

主治五臟癰血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痺身體

諸痛久服輕身延年不老

本經

療心下堅隔中寒熱周

痺婦人月水不通消食明目驅驢食之神仙

別錄

益氣

主男子陰痿不起治心腹脹滿

甄權

腰脚重痛膀胱痛

及骨節煩痛不下食

大明

搗酒飲治閃挫腰痛及婦人

產後血氣痛時珍

發明

頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治治驚邪狸骨丸之

類大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主腕折瘀血並單用菴藺煮汁服亦可末服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳普本草及名醫別錄並言駝驢食菴藺神仙此亦謂其多壽爾駝驢乃獸名似驪而小前足長後足短不能自食每負麀鼠為之齧食

附方

舊一痰血不散變成癰腫生菴藺蒿搗汁一升服之廣利方月水不

通

婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴藺子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸

封五日後每飲三合日三服聖惠方

產後血痛

菴藺子一兩水一升童子小便二盃煎飲

頻湖  
集簡方

附錄對廬  
別錄有名未用曰味苦寒無毒主疥瘡久  
不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似菴藺八

月

著

音尸  
經上品 本

釋名

時珍曰按班固白虎通載孔子云著之為言耆  
也老人歷年多更事久事能盡知也陸佃埤雅

云草之多壽者故字從耆博物志言耆  
千歲而三百莖其本已老故知吉凶

集解

別錄曰著實生少室山谷八月九月采實日乾  
恭曰此草所在有之其莖可為筮陶氏誤以楮

實為之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡州上蔡  
縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一本一二十

莖至多者五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出于枝端紅紫色形如菊花結實如艾實史記龜策傳云龜千歲乃遊于蓮葉之上著百莖共一根所生之處獸無虎狼蟲無毒螫徐廣註云劉向言龜千歲而靈著百年而一本生百莖也褚先生云著滿百莖其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今取著者八十莖已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰著乃蒿屬神草也故易曰著之德圓而神天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺張華博物志言以末大於本者為主次蒿次荆皆以月望浴之然則無著標卦亦可以荆蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒

主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老輕

身本經

葉主治痞疾

時珍

附方

新

腹中痞塊

著葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩炷香

為度其痞化為膿血從大便出  
劉松石保壽堂方

艾

別錄中品

釋名冰臺

爾雅

醫草

別錄

黃草

埤雅

艾蒿

時珍

曰王安石

字

久

疾

而彌善故字從艾陸佃埤雅云博物志言削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火則艾名冰臺其以此

手醫家用灸百病故曰灸草一  
灼謂之一壯以壯人為法也

集解

別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾頌曰處  
處有之以復道及四明者為佳云此種灸百病

尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短者為良  
三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可用時珍曰  
艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰複道  
者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之北艾四明  
者謂之海艾自成化以來則以蘄州者為勝用充方  
物天下重之謂之蘄艾相傳他處艾灸酒壘不能透  
蘄艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月宿  
根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀  
如蒿分為五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔  
厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝  
中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾  
收葉先君月池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云

產于山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗慄荆楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸于戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代著策及作燭心

葉修治

宗奭曰艾葉乾搗去青滓取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少許可

搗為末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人肌脉故孟子云七年之病求三年之艾揀取淨葉揚去塵屑入石臼內木杵搗熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則火得力入掃人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難着力若入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異



也

氣味苦微溫無毒

恭曰生寒熟熱元素曰苦溫陰中之陽時珍曰苦而辛生溫熟熱可

升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部匿瘡婦人漏

血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令見風

別錄搗汁服止傷血殺虵蟲

弘景

主衄血下血膿血痢水

煮及丸散任用

蘇恭

止崩血腸痔血搗金瘡止腹痛安

胎苦酒作煎治癰甚良搗汁飲治心腹一切冷氣鬼

氣甄權治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱明大治帶脉為病

腹脹滿腰溶溶如坐水中好溫中逐冷除濕時珍

發明

說曰春月采嫩艾作菜食或和麪作餛飩如彈子吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣長服止

冷痢又以嫩艾作乾餅子用生薑煎服止瀉痢及產後瀉血甚妙頌曰近世有單服艾者或用蒸木瓜和九或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

震亨曰婦人無子多由血少不能攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知艾性至熱入火灸則氣下行入藥服則氣上行本草止言其溫不言其熱世人喜溫率多服之久久毒發何嘗歸咎于艾哉予考蘇頌圖經而因默有感焉時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦生溫熟熱純陽也可以取太陽

真火可以回垂絕元陽服之則走二陰而逐一切寒濕轉肅殺之氣為融和灸之則透諸經而治百種病邪起沉疴之人為康泰其功亦大矣蘇恭言其生寒蘇頌言其有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則血散熱因久服致火上衝之故爾夫藥以治病中病則止若素有虛寒痼冷婦人濕鬱帶漏之人以艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣服艾不輟助以辛熱藥性久偏致使火躁是誰之咎歟於艾何尤艾附丸治心腹少腹諸痛調女人諸病頗有深功膠艾湯治虛痢及妊娠產後下血尤著奇效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒濕腳氣亦宜以此夾入襪內

附方

舊二十四  
新二十七

傷寒時氣

溫疫頭痛壯熱脉盛以乾艾葉三升水一斗煮一升

頰服取汗 姓娠傷寒 壯熱赤斑變為黑斑 溺血用艾  
肘后方

分為二服 姓娠風寒 卒中不省人事 狀如中風 用  
傷寒類要 熟艾三兩 米醋炒極熟 以絹

包熨臍下良久即 中風口喎 以葦筒長五寸一頭刺  
甕 婦人良方 入耳內四面以麪密封

不透風 一頭以艾灸之 七壯患 中風口噤 熟艾灸承  
右灸左患 左灸右 勝金方 漿一穴 頰

車二穴 各五 中風掣痛 不仁不隨 並以乾艾斛許 揉  
壯 千金方 團納瓦甕中 並下塞諸孔 獨

留一目以痛處著甕目而燒艾 舌縮口噤 以生艾搗  
熏之一時即知矣 肘后方 傳之乾艾

浸濕亦可 咽喉腫痛 醫方大成用嫩艾搗汁細嚥之  
聖濟錄 經驗方用青艾和莖葉一握

同醋搗爛 傳于喉上 冬月取 癰癩諸風 熟艾于陰囊  
乾艾亦得 李臣所傳方也 下穀道正門

當中間隨年歲鬼擊中惡卒然着人如刀刺狀胸脇  
灸之 斗門方 腹內疔刺切痛不可按或

即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如小兒臍  
雞子大三枚水五升煎二升頓服 肘后方

風撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛定効或隔狐惑蟲  
蒜炙之候口中有艾氣立愈 簡便方

鹽病入齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢  
宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生蟲食

其肛爛見五臟便死也燒艾于管中熏下部令烟  
入或少加雄黃更妙罌中燒烟亦可 肘后方 頭

風久痛新艾揉為九時時嗅之以頭風面瘡痒出黃  
黃水出為度 青囊雜纂 水艾二

兩醋一升砂鍋煎取汁每薄紙上心腹惡氣艾葉搗  
貼之一日二三上 御藥院方 汁飲之

性論脾胃冷痛白艾末沸湯服二錢 衛生易簡方 蛇蟲心痛吐清水

白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出肘后方

口吐清水

之乾蘄艾煎湯吸霍亂吐下不止以艾一把水三升煮一升

頓服

外

老小白痢

艾薑丸用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊九梧子

大每服七十九

空心米飲

諸痢久下

艾葉陳皮等分煎湯服之亦可

為末酒煮爛飯和丸每鹽湯下二三十丸

聖濟總錄

暴泄不止

陳艾一把生薑一塊水煎

熱服

生編

糞後下血

艾葉生薑煎濃汁服三合

千金方

野雞痔病

槐柳

湯洗過以艾灸上七壯取效郎中王及乘驟入西川數日病痔大作如胡瓜貫於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵者云須灸即瘥乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉血穢併出瀉後遂

失胡瓜所在矣 姙娠下血 張仲景曰婦人有漏下者 經驗良方

姙娠下血者並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩 芍藥甘草各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五

升清酒五升煮取三升乃納膠令消 姙娠胎動或 盡每溫酒一升日三服 金匱要略 姙娠胎動或

搶心或下血不止或倒產子死腹中艾葉一 胎動迫 雞子大酒四升煮二升分二服 肘后方

心作痛艾葉雞子大以頸醋四升 婦人崩中 連日不 煎二升分溫服 子母秘錄

雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢水五盞先煮艾 薑至二盞半傾出入膠烱化分三服一日服盡 初

虞世古產後瀉血 不止乾艾葉半兩炙熟老生薑半 今錄驗產後瀉血 兩濃煎湯一服立妙 孟詵食療

本產後腹痛 欲死因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗 鋪臍上以絹覆住熨半熨之待口中艾

氣出則痛自止矣  
楊誠經驗方

忽然吐血

一二口或心忪或內崩  
熟艾三團水五升煮二

升服一方燒灰水

鼻血不止

艾灰吹之亦可以艾  
葉煎服 聖惠方 盜

汗不止

熟艾二錢白茯苓三錢  
鍾煎八分臨卧溫服

通妙真人方

火眼

腫痛

以艾燒烟起用盥覆之候烟盡盥上刮煤下以  
溫水調化洗眼即瘥更入黃連尤佳 斗門方

面上肝黯

以五色布納于中同煎令可丸時每以少  
艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍

許傳之自爛脫甚  
妙外臺秘要

婦人面瘡

名粉花瘡以定粉五錢  
菜子油調泥盥內用艾

一二團燒烟熏之候烟盡覆  
調搽永無癰痕亦易生肉

談堊翁試驗方

身面疣

目除艾火灸三壯即  
聖惠方

鵞掌風病

斬艾真者四五兩水四  
五碗煮五六滾入大口



瓶內盛之用麻布二層縛之將手心放瓶上熏之如冷再熱如神 陸氏積德堂方 瘡疥熏法

熟蘄艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一錢為末揉入艾中分作四條每以一條安陰陽瓦中置被裏

烘熏後服通聖小兒疳瘡 艾葉一兩水一升煮散 醫方摘要 取四合服 備急方 小兒

爛瘡 艾葉燒灰傳之 臙瘡口冷 不合熟艾燒烟 白癩 良 子母秘錄

風瘡 乾艾隨多少以浸麴釀酒如常 法日飲之覺痺即瘥 肘后方 疔瘡腫毒 艾蒿

燒灰于竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針刺瘡至痛乃點藥三遍其根自拔 玉山韓光以此

治人神驗 貞觀初衢州徐使君訪得此方 癸背初起 予用治三十餘人得效 孫真人千金方

未成及諸熱腫以濕紙揭上先乾處是頭著艾灸之 不論壯數痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃止其毒

即散不散亦免內攻神癰疽不合瘡口冷滯以北艾  
方也李絳兵部手集煎湯洗後白膠熏

之直咽喉骨哽用生蒿艾數升水酒共一斗煮四  
指方升細細飲之當下外臺秘要

誤吞銅錢

艾蒿一把水五升煎一升頓服便下錢相公篋中方諸蟲蛇傷艾

數壯甚良

風蟲牙痛成筒燒烟隨左右熏鼻及烟令

滿口呵氣即疼止腫消新李謙  
病此月餘一試即愈普濟方

實氣味苦辛暖無毒主治明目療一切鬼氣甄壯陽

助水臟腰膝及暖子宮明大

發明

說曰艾子和乾薑等分為末蜜丸梧子大空心  
每服三九以飯三五匙壓之日再服治百惡氣

其鬼神連走出田野  
之人與此甚相宜也

附錄夏臺

別錄有名未用曰味甘主百疾濟絕氣弘  
景曰此藥神奇乃爾不復識用可恨也時

珍曰艾名冰臺此名夏臺艾矣百病能回絕氣此  
主百病濟絕氣恐是一物重出也故附于艾後

千年艾

綱目

集解

時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺許  
其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖極面青背白秋

開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀三伏日  
采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉  
成茸也羽流  
以充方物

葉氣味辛微苦溫無毒主治男子虛寒婦人血氣諸

痛水煎服之時珍

茵陳蒿

本經上品

釋名

藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字耳時珍曰按張揖廣雅及吳

普本草並作因塵不知何義

集解

別錄曰茵陳生太山及邱陵坡岸上五月及立秋米陰乾弘景曰今處處有之似蓬蒿而葉緊

細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰葉似青蒿而背白大明曰茵陳出和州及南山嶺上一名石

茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五月七月采莖葉

陰乾今謂之山茵陳江寧府一種茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種白蒿一似青蒿而背白

本土皆以為茵陳入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種或者其說云山茵陳汴京及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之但有茵陳蒿無山茵陳註云葉似蓬蒿而緊細今汴京北地所用山茵陳是大體世方用山茵陳療體痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃胆利小便與世方都不應今試取汴京所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少效江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下隔去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿當別是一物主療自異不得為山茵陳也此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出

醫方所用更當考論爾穀曰凡使須用葉有八角者陰乾去根細剉勿令犯火時珍曰茵陳昔人多蒔為蔬故入藥用山茵陳所以別家茵陳也洪舜俞老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醢青陳之絲是也今淮揚人二月二日猶采野茵陳苗和粉麩作茵陳餅食之後人各據方土所傳遂致淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉紋緊細而扁慤九月開細花黃色結實大如父子花實並與蒼閭花實相似亦有無花實者

莖葉氣味苦平微寒無毒

普曰神農岐伯雷公苦無毒黃帝辛無毒權曰苦辛

有小毒大明曰石茵陳苦涼無毒伏硃砂張元素曰苦甘陰中微陽入足太陽經

主治風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐老

面白悅長年白兔食之仙本經治通身發黃小便不利

除頭熱去伏瘕別錄通關節去滯熱傷寒用之藏器石茵

陳治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘡女人瘕

瘕并閃損之絕明大

發明

弘景曰仙經曰白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤耳宗奭曰張仲景治傷寒熱甚發

黃身面悉黃者用之極效一僧因傷寒後發汗不徹有留熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳山梔子各三分秦艸升麻各四錢為散每用三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以山茵陳為本故書之

王好古曰張仲景茵陳梔子大黃湯治濕熱也梔子藥皮湯治燥熱也如茵瀉則濕黃茵苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃用茵陳附子湯大抵以茵陳為君主而佐以大黃附子各隨其寒熱也

附方

新舊二

茵陳羹

除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘡瘡利小便以茵陳細切煮羹食之生

食亦宜  
食醫心鏡

遍身風痒

生瘡疥用茵陳煮濃汁洗之立瘥

癰瘍風

病茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日一洗不然恐痛也

功纂要  
崔行

風疾攣急

茵陳蒿一斤秫米一石麴三斤和勻如常法釀酒服之聖濟總錄

瀉黃如金

好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水遍身黃二鍾煎服日二服三十六黃方



疸茵陳蒿一把同生薑一塊搗爛于胸前四肢日日擦之男子酒疸用茵陳蒿四根庖子

七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之秘方也眼熱赤腫山茵陳車前子

等分煎湯細茶調散服數服直指方

# 青蒿

本經下品

釋名草蒿

本經

方漬

本經

藪

音牽去聲

犴蒿

本經

香蒿

衍義保昇曰草蒿江

東人呼為犴蒿為其氣息似犴也北人呼為青蒿爾雅云蒿藪也孫炎注云荆楚之間謂蒿為藪郭璞注

云今人呼青蒿香中炙啖者為藪是也時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨藪得單稱為蒿豈

以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異于諸蒿故耶

集解

別錄曰青蒿生華陰川澤弘景曰處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之保昇曰嫩時醋淹

為菹自然香葉似茵陳蒿而背不白蒿四尺許四月五月采日乾入藥詩云呦呦鹿鳴食野之蒿即此蒿也頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作飲香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人別以為蔬根赤葉香沈括夢溪筆談云青蒿一類自有二種一種黃色一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝西銀綏之間蒿叢中時有一兩窠迥然青色者土人謂之香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白硬七八月間開細黃花頗香結實大

如麻子中  
有細子

修治

數曰凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾

采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出晒乾

葉莖根子氣味苦寒無毒

時珍曰  
伏硫黃

主治疥癬癰痒惡瘡殺蟲治留熱在骨節間明目

本經

鬼氣尸症伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬

用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便入酒和

服藏器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老

魚去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服并貼之明治

瘡疾寒熱

時珍

生擣傅金瘡止血止疼良

蘇恭

燒灰隔紙

淋汁和石灰煎治惡瘡癰肉廔癰

孟詵

發明

頌曰青蒿治骨蒸勞為最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之證皆

少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏內庚日采青蒿懸于門庭內可辟邪氣陰乾為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼症伏尸蓋亦有所伏也

附方

舊四新十三

男婦勞瘦

青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入

器中煎成膏丸如梧子大每空心及臥時溫酒吞下二十九

斗門方 虛勞寒熱肢體

不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏梅一箇煎湯服

**靈骨蒸鬼氣** 童子小便五大斗澄清青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大

釜中以猛火煎取三大斗去滓澆釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷

以瓷器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟為末以煎和搗十杵為丸空腹粥飲下二十九漸加至三十

九止 **崔元骨蒸煩熱** 青蒿一握猪膽汁一枚杏仁亮海上方 四十箇去皮尖炒以童子小

便一大盞煎五分空 **虛勞盜汗** 煩熱口乾用青蒿一心溫服 十便良方 斤取汁熬膏入人參

末麥門冬末各一兩熬至可丸九如梧子大每食後未飲服二十九名青蒿煎 聖方總錄 **瘡疾**

**寒熱** 肘後方用青蒿一握水二升搗汁服之存仁方用五月五日天未明時采青蒿陰乾四兩桂

心一兩為末發前酒服二錢 經驗方用端午日  
采青蒿葉陰乾桂心等分為末每服一錢先寒用熱

酒先熱用冷酒發日 溫瘧疾甚 但熱不寒用青蒿二  
五更服之切忌發物 兩童子小便浸焙黃

丹半兩為末每服二錢 赤白痢下 五月五日采青蒿  
白湯調下 存仁方 艾葉等分同豆豉

搗作餅日乾名蒿豉丹每用一餅 鼻中衄血 青蒿搗  
以水一盞半煎服 聖濟總錄 青蒿汁服之

并塞鼻中極驗 酒痔使血 青蒿用葉不用莖用莖不  
衛生易簡方 用葉為末糞前冷水煮後

水酒調服 金瘡撲損 肘后方用青蒿搗封之血止  
永類鈴方 則愈 一方用青蒿麻葉石

灰等分五月五日搗和 牙齒腫痛 青蒿一握煎水  
曬乾臨時為末搽之 漱之 濟急方 毒

蜂螫人 嚼青蒿封之 耳出濃汁 青蒿末綿裹納  
即安 肘後方 耳中 聖惠方 鼻中

息肉青蒿灰石灰等分淋汁熬膏點之聖濟總錄

子氣味甘冷無毒主治明目開胃炒用治勞瘦壯健  
人小便浸用之治惡瘡疥癬風癰煎水洗之大治鬼

氣為末酒服方寸匕孟詵功同葉珍

附方新積熱眼澀三月三日或五月五日采青蒿花  
或子陰乾為末每井華水空心服

二錢久服明目可夜看書  
名青金散十便良方節間蟲見蟲部

黃花蒿綱目

釋名臭蒿

集解

大明曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶淡黃

氣辛臭不可食人家采以釀醬黃酒麴者是也

葉氣味辛苦涼無毒主治小兒風寒驚熱時珍

子氣味辛涼無毒主治治勞下氣開胃止盜汗及邪

氣鬼毒大明

白蒿

本經上品

釋名繁爾雅

由胡爾雅萋蒿食療蒿音商時珍曰白蒿有水陸二種爾雅通謂之繁

以其易繁衍也曰繁皤蒿即今陸生艾蒿也辛薰不美曰繁由胡即今水生萋蒿也辛香而美曰繁之醜



秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名  
至秋老則皆呼為蒿矣曰蕭曰蕭曰荻皆老蒿之通  
名象秋氣  
蕭賴之氣

集解

別錄曰白蒿生中山川澤二月采弘景曰蒿類  
甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆

無復識之恭曰爾雅藹蒿即白蒿也所在有之葉頗  
似細艾上有白毛錯澀粗于青蒿從初生至秋白于  
衆蒿禹錫曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦藹藹  
也陸機詩疏云凡艾白色為藹今白蒿先諸草發生  
香美可食生蒸皆宜頌曰此草古人以為藹今人但  
食藹蒿不復食此或疑白蒿即藹蒿而孟詵食療又  
別著藹蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之  
異也又今階州以白蒿為茵陳其苗葉亦相似然以  
入藥恐不可用也時珍曰白蒿處處有之有水陸二  
種本草所用蓋取水生者故曰生中山川澤不曰山

谷平地也二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者  
香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹苹即陸生嗜蒿俗  
呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云  
予以采芣于沼于汙左傳云蘋繁蘊藻之菜可以薦  
于鬼神羞于王公並指水生白蒿而言則本草白蒿  
之為蒿蒿無疑矣鄭樵通志謂苹為蒿蒿非矣鹿乃山  
獸蒿乃水蒿陸機詩疏謂苹為牛尾蒿亦非矣牛尾  
蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也蒿蒿生陂澤中  
二月發苗葉似嫩艾而歧細面青背白其莖或赤或  
白其根白脆采其根莖生熟蘊曝皆可食蓋嘉疏也  
景差大招云吳酸蒿蒿不沾薄謂吳人善調酸淪  
蒿蒿為羹不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根氣味甘平無毒

思邈曰辛平時珍曰發瘡疥

主治五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療

心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老

本經

生接醋

淹為菹食甚益人搗汁服去熱黃及心痛曝為末米

飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎治淋瀝

疾孟詵利膈開胃殺河豚魚毒

時珍

發明弘景曰服食家七禽散云白兔食白蒿仙與菴

毒而古今方家不知用

豈不得服之之訣與

附方舊惡瘡癩疾但是惡疾遍體面目有瘡者皆可

汁以麴及米一如釀酒法

候熟稍服之

梅師方

子氣味缺 主治鬼氣為末酒服之良

孟詵

角蒿

唐本草

集解

恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月采保昇曰葉似蛇

牀青蒿子角似蔓菁青黑而細秋熟所在皆有之宗輿曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花罷結角長二寸許微彎數曰凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采得于槐砧上細剉用之

氣味辛苦有小毒主治乾濕蘘諸惡瘡有蟲者

唐本治

口齒瘡絕勝

宗奭

附方

舊二新

齒齲宣露

多是疳也角蒿燒灰夜塗上切忌油膩沙糖乾棗外臺秘方

口瘡不瘥

入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿效千金方

蝕耳瘡

用蒿灰摻之良集簡方

蘼蒿

拾遺

釋名

義蒿爾雅蘿蒿上抱娘蒿時珍曰陸農師云蘼之為言蒿也義亦義也義

科蒿也可以覆蠶故謂之蘿抱根叢生故曰抱娘

集解

時珍曰蘼蒿生高崗似小薊宿根先于百草爾雅云義蘿是也詩小雅云菁菁者義陸璣注云

即義蒿也生澤國漸如處葉似斜蒿而細科二月生莖葉可食又可蒸香美頗似萹蒿但味帶麻不似萹

蒿香  
甘

氣味辛溫無毒主治破血下氣煮食之  
藏器

馬先蒿  
本經中品

釋名馬新蒿  
唐本馬矢蒿  
本經練石草  
別錄爛石草  
上虎麻

時珍曰蒿氣如馬矢故名馬先乃馬矢字訛也馬新又馬先之訛也弘景曰練石草一名爛石草即馬矢蒿今方藥不復用之

集解  
別錄曰馬先蒿練石草並生南陽川澤恭曰葉大如茺蔚花紅白色二月八月采莖葉陰乾用  
八月九月實熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小其子夏中熟二物初生極相似也

禹錫曰按爾雅云蔚牡葢註云即蒿之無子者詩云匪我伊蔚陸璣云牡蒿也二月始生七月開花似胡麻花而紫赤八月生角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也頌曰郭璞以牡葢為無子而陸璣云有子二說小異今當用有子者為正時珍曰別錄牡蒿馬先蒿原是二條陸璣所謂有子者乃馬先蒿而復引無子之牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見本條

氣味苦平無毒

別錄曰練石草寒

主治寒熱鬼疰中風濕痺

女子帶下病無子

本經練石草

治五癰破石淋膀胱中

結氣利水道小便

別錄惡瘡景弘

附方

舊

大瘋癩疾

骨肉疽敗眉鬚墮落身體痒痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛石草

炒持末每服方寸匕食前溫酒下  
一日三服一年都瘥肘后方

陰地厥

宋圖經

集解

頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根用時

珍曰江浙亦有之外  
家未制丹砂硫黃

根苗氣味甘苦微寒無毒主治腫毒風熱

蘇頌

附方一新男婦吐血

後胸膈虛熱陰地厥紫荷車貫衆甘草各半兩每服三錢水煎服

聖濟總錄

牡蒿

別錄下品



釋名齊頭蒿

時珍曰爾雅蔚牡蒿之無子者則牡蒿名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉獨參

而禿故有齊頭之名

集解

別錄曰牡蒿生田野五月八月采弘景曰方藥不復用恭曰齊頭蒿也所在有之葉似防風細

薄而無光澤時珍曰齊頭蒿三四月生苗其葉扁而本狹末參有禿岐嫩時可茹鹿食九草此其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見故人以為無子也

苗氣味苦微甘溫無毒主治充肌膚益氣令人暴肥

不可久服血脉滿盛

別錄搗汁服治陰腫

時珍

附方新瘡疾寒熱

齊頭蒿根滴滴金根各一把搗生酒一鍾未發前服以滓傳寸口男

左女右二日使  
止海上名方

九牛草  
宋圖經

集解

頌曰生筠州山岡上二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月采苗用時

珍曰陳嘉謨本草蒙  
筌以此為蘄艾謬矣

苗氣味微苦有小毒主治解風勞治身體痛與甘草

同煎服不入衆藥用  
蘇頌

芫蔚  
本經上品

釋名益母  
本經益明  
本經貞蔚  
別錄推  
爾雅野天麻  
會編猪麻

綱目火杓

經本

鬱臭草

圖經

苦低草

圖經

夏枯草

外臺

土質汗

綱目

時珍曰此草及子皆荒威密蔚故名荒蔚其功宜于婦人及明目益精故有益母之稱其莖方類麻故謂之野天麻俗呼為猪麻猪喜食之也夏至後即枯故亦有夏枯之名近効方謂之土質汗林億云質汗出西番乃熱血合諸藥煎成治金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名為土質汗也禹錫曰爾雅萑萑注云今荒蔚也又名益母劉歆云萑臭穢也臭穢即荒蔚也陸璣云萑益母也故曾子見之感恩

集解

別錄曰荒蔚生海濱地澤五月采弘景曰今處處有之葉如荏方莖子形細長有三稜方用亦

稀頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云葉似荏方莖白華華生節間節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月采又云九月采實醫方稀有用實者宗奭曰荒蔚初春生時亦可浸洗陶去苦水煮作菜

食凌冬不凋悴也時珍曰菰薊近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節生穗叢簇抱莖四五月間穗內開小花紅紫色亦有微白色者每莖內有細子四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根白色蘇頌圖經謂其葉似荏其子黑色似雞冠子九月采實寇宗奭衍義謂其凌冬不凋者皆誤傳也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣但白者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閨閣事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草云菰薊生田野間人呼為臭草天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花其中有子如青荊子孫思邈千金方云天麻草莖如火麻冬生苗夏着赤花如鼠尾花此皆似以菰薊天麻為二物蓋不知其是一物二種

凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類是矣又按郭璞爾雅註云薤音推即茺蔚又名益母葉似茱白華華生節間又云薤音推方莖葉長而銳有穗穗間有花紫縹色可以為飲江東呼為牛薤據此則是薤薤名本相同但以花色分別之具為一物無疑矣宋人重修本草以天麻草誤註天麻尤為謬失陳藏器本草又有鑿菜云生江南陰地似益母方莖對節白花主產後血病此即茺蔚之白花者故其功主血病亦相同

子修治

時珍曰凡用微炒者亦或蒸熟烈日曝燥春簸去殼取仁用

氣味辛甘微溫無毒

別錄曰甘辛溫反制硫黃

主治明目益精除水氣久服輕身

本經療血逆大熱頭

痛心煩

別錄

產後血脹

大明

春仁生食補中益氣通血脉

填精髓止渴潤肺

吳瑞

治風解熱順氣活血養肝益心

安魂定魄調女人經脉崩中帶下產後胎前諸病久

服令人有子

時珍

發明

震亨曰菟薊子治血行氣有補陰之功故名蓋母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯產後

無虛以其行中有補也時珍曰菟薊子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花

者入血分治婦女經脉不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同四物香附諸藥

治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言

瞳子散大者禁用茺蔚子為其辛溫主散能助火也  
當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂月得  
血而能視茺蔚行血甚捷瞳子散大血不足也  
故禁之非助火也血滯病目則宜之故曰明目

莖大明曰苗氣味藏器曰寒時珍曰莖葉味辛微苦  
花味微苦甘根味甘並無毒鏡源

雌黃硫黃石主治癰瘰可作浴湯  
本經搗汁服主浮腫下

水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒併傳之又服汁主子

死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾耳擣傳蛇

虺毒蘇恭入面藥令人光澤治粉刺藏器活血破血調經

解毒治胎漏產難胎衣不下血運血風血痛崩中漏

下尿血瀉血疳痢痔疾打撲內損瘀血大便小便不

通時珍

發明

時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調女人

經脉則單用茺蔚子為良若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用為良蓋其根莖花葉專于行而子則行中有補故也

附方

舊十四新七

濟陰返魂丹

晉殷產室曰此方乃吉安文江高師禹備禮求于名

醫所得者其效神妙活人甚多能治婦人胎前產後諸疾危證用野天麻又名益母又名火枝又名負擔即茺蔚子也葉似艾葉莖類火麻方梗四面四五六月節節開花紅紫色如蓼花南北隨處皆有白花者



不是于端午小暑或六月六日花正開時連根收米  
陰乾用葉及花子忌鐵器以石器碾為細末煉蜜丸  
如彈子大隨證嚼服用湯使其根燒存性為末酒服  
功與黑神散不相上下其藥不限丸數以病愈為度  
或丸如梧子大每服五七十九又可搗汁濾淨熬膏  
服之胎前臍腹痛或作聲者米飲下胎前產後  
臍腹刺痛胎動不安下血不止當歸湯下產後以  
童子小便化下一丸能安魂定魄血氣自然調順諸  
病不生又能破血痛養脉息調經絡並溫酒下胎  
衣不下及橫生不順死胎不下經日脹滿心悶心痛  
並用炒鹽湯下產後血運眼黑血熱口渴煩悶如  
見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下產  
後結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏  
赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁下  
產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小  
便酒下產後瀉血水以棗湯下產後痢疾米湯

下產後血崩漏下糯米湯下 產後赤白帶下煎  
膠艾湯下 月水不調溫酒下 產後中風牙關緊

急半身不遂失音不語童便酒下 產後氣喘欬嗽  
胸隔不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失

力溫酒下 產後月內欬嗽自汗發熱久則變為骨  
蒸童便酒下 產後鼻衄古黑口乾童便酒下 產

後兩太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風  
身熱手足頑麻百節疼痛並米飲化下 產後大小

便不通煩躁口苦者薄荷湯益母膏 近效方治產婦  
下婦人久無子息溫酒下 諸疾及折傷內

損有瘀血每天陰則痛神方也三月米益母草一名  
負擔一名夏枯草連根葉莖花洗擇令淨于箔上攤

暴水乾以竹刀切長五寸勿用鐵刀置于大鍋中以  
水浸過二三寸煎煮候草爛水減三之二瀉去草取

汁約五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁  
入釜中慢火煎取一斗如稀飴狀瓷瓶封收每取梨

大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行即更煉至可丸收之服至七日則疼漸平復也產婦惡露不

盡及血運一二服便瘥其藥無忌又能力外臺秘要女人難產益母草

大合煎減半頓服立止無新者以乾者胎死腹中益母

草搗熟以暖水少許和絞取產後血運心氣欲絕益母草研汁服

一盞絕妙子母秘錄產後血閉不下者益母草汁一小盞聖惠方帶下

赤白二錢益母草花開時采搗為末每服小便尿血益母草

汁服一升立瘥此蘇赤白雜痢困重者益母草日乾澄方也外臺秘要赤白雜痢陳鹽梅燒存性等分

為末每服三錢白痢乾薑湯赤痢甘小兒疳痢者益草湯下名二靈散衛生家寶方

母草嫩葉同米煮粥食之取足以痔疾下血益母草葉搗汁

瘡為度甚佳飲汁亦可廣利方 飲之 食 一切癰瘡婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸

醫心鏡 麻草切五升以水一斗半煮一急慢疔瘡聖惠方用

斗分數次洗之以殺痒 千金 封之仍絞五合服即消 醫方大成用益母草四月

連花采之燒存性先以小尖刀十字劃開疔根今血

出次遠根開破捻出血拭乾以稻草心蘸藥入瘡

口今到底良久當有紫血出捻令血淨再搥藥入見

紅血乃止一日夜搥藥三五度重者二日根爛出輕

者一日出有瘡根脹起即是根出以針挑之出後仍

傳藥生肌易愈忌風寒 癰毒已破益母草搗傳甚

房室酒肉一切毒物 乳成癰益母為末水調塗乳上一宿

自瘥生瘡亦得 聖惠方 喉閉腫痛益母草搗

爛新汲水一盃絞濃汁頓飲隨  
吐愈冬月用根衛生易簡方  
聒耳出汁荒蔚莖葉汁滴之

聖惠粉刺黑斑閨閣事宜云五月五日收帶根天麻紫花者晒乾燒灰以商陸根搗自然

汁加酸醋和搜灰作餅炭大煨過收之半年方用入而藥甚能潤肌蘇頌曰唐天后鍊益母草澤面法五

月五日采根苗具者勿令著土暴乾搗羅以麪水和成團如難子大再暴乾仍作一爐四旁開竅上下置

火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿令火絕經一伏時出之楚器中研治篩再研三日

收用如深豆法日用一方每馬咬成瘡苦低草切細和醋炒塗之

孫真方 新生小兒益母草五兩煎水浴之  
不生瘡疥簡要濟衆

鑿菜

音慙拾遺

集解

藏器曰：薺菜生江南陰地，似益母，方薺對節白花，時珍曰：此即益母之白花者，乃爾雅所謂薺。

是也。其紫花者，爾雅所謂薺，是也。薺薺皆同一音，乃一物二種，故此條亦主血病與益母功同。郭璞獨指白花者為益母，皆殷謂白花者非益母，皆欠詳審。薺苗可食，故謂之菜。寇宗奭言：薺薺嫩苗可煮食，正合此也。

苗氣味辛平，無毒，主治破血產後腹痛，煮汁服。

藏器

薺街

薺音眉  
本經上品

釋名：麋街

本經  
鹿街  
本唐

吳風草

本唐  
無心  
普吳

無顛

普吳  
承膏

別錄：承麋

吳普恭曰：南人謂之吳風草，一名鹿街草，言鹿有疾，街此草即瘥也。時珍曰：據蘇說，則薺

街麋街當作鹿街也鹿麋一類也按鄺道元水經注云魏興錫山多生薇街草有風不偃無風獨搖則吳風亦當作無風乃通藏器曰一名無心草非草之無心者方藥少用

集解

別錄曰薇街生漢中川澤及寬句邯鄲七月采

葉有毛赤莖又有大小二種楚人謂大者為大吳風草小者為小吳風草保昇曰葉似茺蔚叢生有毛其根赤黑色其

莖葉氣味苦平無毒

別錄曰微寒之才曰得秦皮良

主治風濕痺歷

節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫

本經

暴瘵逐水療

痿臂久服輕身明目

別錄

婦人服之絕產無子

藏器

煎水

洗漂疽甲疽惡瘡

時珍出外  
科精義

發明

時珍曰廩街乃素問所用治風病自汗藥而後世不知用之誠缺略也素問黃帝曰有病身熱

懈情汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風治之以澤瀉朮各三五分廩街五分合以三指撮為後飯後飯者先服藥也

附方新年深惡瘡

無心草根根釣苓根狼毒白丁香各五錢麝香一字為末搽之又方

無心草根乾薑各二錢釣苓根小兒破傷風病拘急三錢為末搽之並外科精義

草半兩白附子炮二錢半為末每服一字薄荷酒灌下聖濟錄

附錄無心草

宋圖經頌曰生泰州及高州鳳翔各縣皆出之三月開花五月結實六七月采



根苗陰乾用性溫無毒主積血逐氣塊蓋筋節補虛損潤顏色療疥洩腹痛時珍曰麋銜一名無心草此草功用與之相近其圖形亦相近恐即一物也故附之俟訪攷焉鼠耳草亦名無心與此不同

夏枯草

本經下品

釋名夕句

本經

乃東

本經

燕面

別錄

鐵色草

震亨曰

此草夏

至後即枯

蓋稟

純陽之氣得陰氣則枯故有是名

集解

別錄曰夏枯草生蜀郡川谷四月采恭曰處處有之生平澤冬至後生葉似旋復三月四月開

花作穗紫色白色似丹參花結子亦作穗五月便枯四月采之時珍曰原野間甚多苗高一二尺許其莖微方葉對節生似旋復葉而長大有細齒背白多故莖端作穗長一二寸穗中開淡紫小花一穗有細子四

粒丹溪云無子亦欠察矣嫩苗  
淪過浸去苦味油鹽拌之可食

正誤

宗奭曰今謂之臭鬱自秋便生經冬不悴春開  
白花夏結子震亨曰臭鬱草有臭味即芫蔚是

也夏枯草無臭味明是兩物俱生于春  
夏枯先枯而無子鬱臭後枯而結子

莖葉氣味苦辛寒無毒

之才曰土瓜為  
使伏汞砂

主治寒熱瘰

癰鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身

本經

發明

震亨曰本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有補  
養厥陰血脈之功而不言及觀其退寒熱虛者

可使若實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取效  
時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疼用沙糖水浸  
一夜用取其能解內熱緩肝火也樓全善云夏枯草  
治目珠疼至夜則甚者神效或用苦寒藥點之反甚

者亦神效蓋目珠連目本即係也屬厥陰之經夜甚  
及點苦寒藥反甚者夜與寒亦陰故也夏枯稟純陽  
之氣補厥陰血脉故治此如神以陽治陰也一男子  
至夜目珠疼連眉稜骨及頭半邊腫痛用黃連膏點  
之反甚諸藥不效灸厥陰少陽疼隨止半日又作月  
餘以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢為末每服一  
錢半清茶調服下咽則疼  
減半至四五服良愈矣

附方

新舊

六明

目補肝

肝虛目睛痛冷淚不止血脉痛  
羞明怕日夏枯草半兩香附子

一兩為末每服一錢

茶湯調下簡要濟眾

赤白帶下

夏枯草花開時采  
陰乾為末每服二

錢米飲下食前

徐氏家傳方血崩不止

夏枯草為末每服方寸  
匕米飲調下聖惠方產

後血運

心氣欲絕者夏枯草搗絞汁撲傷金瘡  
服一錢大妙徐氏家傳方夏枯草口

嚼爛罾上即愈

衛生易簡

汗斑白點

夏枯草煎濃汁日日洗之

乾坤生意

瘰癧馬

刀

不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎汁熬膏服并塗

患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治療瘰之聖藥也其草易得其功甚多薛

已外科  
經驗方

劉寄奴草

唐本

釋名金寄奴大烏藤菜

綱目時珍曰按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄奴微

時代荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣于榛林中搗藥問其故答曰我主為劉寄奴所射今合藥傳之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆散乃收藥而反

每遇金瘡傳之即愈人因稱此草為劉寄奴草鄭樵通志云江南人因漢時謂劉為卵金刀乃呼劉為金是以又有金寄奴之名江東人謂之烏藤菜云

集解

恭曰劉寄奴草生江南莖似艾蒿長三四尺葉似山蘭草而尖長一莖直上有穗葉互生其子

似稗而細保昇曰今出越州蒿之類也高四五尺葉似菊其花白色其實黃白色作穗夏月收苗乾之頃曰今河中府孟州漢中滁州亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高二三尺以來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似蒿莖六月七月采苗及花子通用時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蒼术尖長糙澀而深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十朵小花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦買花之絮其子細長亦如苦買子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

子同修治

穀曰凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從已至中暴乾用時珍曰

莖葉花子

皆可用

氣味苦溫無毒主治破血下脹多服令人下痢蘇恭下

血止痛治產後餘疾止金瘡血極效別錄心腹痛下氣

水脹血氣通婦人經脉癥結止霍亂水瀉大明小兒尿

血新者研末服

時珍

附方

舊一

大小便血

劉寄奴為末茶調空心服二錢即止

集簡方

折傷瘀

血

在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓溫服之

金血氣脹滿劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不

方生易霍亂成痢劉寄奴草煎汁湯火傷灼劉寄奴搗

簡方未漿雞翎掃上後乃摻末並不痛亦無痕大驗之方

凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞後乃摻藥為妙

事方本風入瘡口腫痛劉寄奴為末摻小兒夜啼劉寄

兩地龍炒一分甘草一寸聖濟總錄赤白下痢陰陽交帶不問

水煎灌少許聖濟總錄赤白劉寄奴烏

梅白薑等分水煎服赤加梅

白加薑艾元英如宜方

曲節草宋圖

釋名六月凌

音今六月霜綱目綠豆青圖經蛇藍時珍曰

寒故有凌霜  
綠豆之名

集解

頌曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月著花似薄荷結子

無用五月六月

采莖葉陰乾

莖葉氣味甘平無毒主治發背瘡消癰腫拔毒同甘

草作末米汁調服

蘇頌

麗春草

宋圖經

釋名仙女蒿

圖經

定參草

頌曰麗春草生檀嵎山在高密界河南淮陽

郡穎川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡並名叢蘭艾上黨紫園山亦有名定參草



又名仙女蒿令所在有之甚療癰黃人莫能知時珍  
曰此草有殊功而不著其形狀今罌粟亦名麗春草  
九仙子亦名仙女嬌與此同  
名恐非一物也當俟博訪

花及根氣味缺主治癰黃黃疸蘇

發明

頌曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有  
效其方云麗春草療因時患傷熱變成癰黃遍

身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶  
心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有  
驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹取  
三方寸匕和生麻油一盞頓服日一服隔五日再進  
以知為度其根療黃疸搗汁一盞空腹頓服須臾即  
利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑  
永瘥忌酒麪猪  
魚蒜粉酪等

旋覆花

本經下品

釋名金沸草

本經

金錢花

綱目

滴滴金

綱目

盜庚

爾雅

夏菊

綱目

戴堪

別錄宗奭曰花緣繁茂圓而覆下故曰旋覆時珍曰諸名皆因花狀而命也爾雅云覆盜庚也

蓋庚者金也謂其夏開黃花盜竊金氣也酉陽雜俎云金錢花一名毘尸沙自梁武帝時始進入中國

集解

別錄曰旋覆生平澤川谷五月采花日乾二十日成弘景曰出近道下濕地似菊花而大別有

旋葛根出河南北國亦有形似芎藭惟合旋葛膏用之餘無所用非此旋覆花根也保昇曰葉似水蘇黃

花如菊六月至九月采花頌曰今所在皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺長一二尺以來

葉似柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七八月采花今近道人家園

圃所蒔金錢花花葉並同極易繁盛恐即旋覆也宗  
藥曰旋覆葉如大菊又如艾蒿秋開花大如梧桐子  
花淡黃色其香過于菊別有旋花乃鼓子花非此花  
也見本條時珍曰花狀如金錢菊水澤邊生者花小  
辦單人家栽者花大藍簇蓋壤瘠使然其根  
細白俗傳露水滴下即生故易繁蓋亦不然

花修治

數曰采得花去蕊并殼皮及  
蒂子蒸之從已至午曬乾用

氣味鹹溫有小毒

別錄曰甘微溫冷利權曰甘無  
毒大明曰無毒宗藥曰苦甘平

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下

氣

本經

消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留飲風

氣濕痺皮間死肉目中眇矐利大腸通血脉益色澤

別主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食甄權行痰水去

頭目風宗與消堅軟痞治噫氣好古

發明

頌曰張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物旋復

湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸用之尤多成無已曰鞭則氣堅旋覆之鹹以軟痞堅也震

亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒之時珍曰旋覆

乃手太陰肺手陽明大腸藥也所治諸病其功只在行水下氣通血脉爾李衛公言嗅其花能損目唐慎

微本草誤以旋花根方收附此下今改正之

附方

舊一新三

中風壅滯

旋覆花洗淨焙研煉密丸梧子大夜卧以茶湯下五丸至七丸

十九 經驗方 半產漏下 虛寒相搏其脉弦芤旋覆花湯用

水三升煮一升頓服 金匱要畧 月蝕耳瘡 旋覆花燒研羊脂小兒

眉癬 小兒眉毛眼睫因癬退不生用野油化即旋覆花赤箭即天麻苗防風等分為末洗淨以油調

塗之 總微論

葉主治傳金瘡止血 大治疔瘡腫毒 時珍

根主治風濕 別錄

青箱 本經下品

釋名草蒿 本經 萎蒿 本經 崑崙草 唐本 野雞冠 綱目 雞冠莧 綱目

子名草決明

本經時珍曰青箱名義未詳胡麻葉亦名青襄此草又多生于胡麻地中與之

同名豈以其相似而然耶青蒿亦名草蒿其功相似而名亦相同何哉其子明目與決明子同功故有草決明之名其花葉似雞冠嫩苗似莧故謂之雞冠莧鄭樵通志言俗名牛尾蒿者誤

集解

別錄曰青箱生平谷道旁三月采莖葉陰乾五月六月采子弘景曰處處有之似麥柵花其子

甚細別有草蒿或作草蒿主療殊相類形名又相似可疑而實兩種也恭曰此草苗高尺餘葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月荆襄人名為崑崙草頌曰今江淮州郡近道亦有之二月生青苗長三四尺葉濶似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁似葇荑根亦似蒿根而白直下獨莖生根六月八月采子時珍曰青箱生田野間嫩苗似莧可食長則高

三四尺苗葉花實與雞冠花一樣無別但雞冠花穗  
或有大而扁或圓者此則稍間出花穗尖長四五寸  
狀如兔尾水紅色亦有黃白色者在穗中與雞冠  
子及莧子一樣難辨蘇恭言其結角誤矣蕭炳言黃  
花者名陶珠術與陳藏器所說不同  
又有天靈草亦此類也並附于下

附錄桃朱術

炳曰青箱一種花黃者名陶朱術苗相  
似藏器曰桃朱術生園中細如芹花紫

子作角以鏡向旁敲之則子自發五月  
五日乃收子帶之令婦人為夫所愛 鴈來紅時珍  
曰莖

葉穗子並與雞冠同其葉九月鮮紅望之如花故天  
名吳人呼為老少年一種六月葉紅者名十樣錦

靈草

時珍曰按土宿真君本草云狀如雞冠花葉亦  
如之折之有液如乳生江湖荆南陂池間五月

取汁可制雄  
疏煮雌煉砂

思莢子

數曰思莢子鼠細子二件真似  
青箱子只是味不同思莢子味

苦煎之  
有涎

莖葉修治

數曰凡用先燒鐵杵臼乃搗用之

氣味苦微寒無毒主治

邪氣皮膚中熱風癢身癢殺三蟲

本經

惡瘡疥蠹痔蝕

下部蠹瘡

別錄

搗汁服大療溫癰

蘇恭

止金瘡血

大明

子氣味苦微寒無毒

權曰苦平

主治唇口青

本經

治五臟邪

氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒濕痺

大明

治肝

臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡

甄權

發明

炳曰理眼有青翳子丸宗奭曰青翳子經中不言治眼惟藥性論日華子始言治肝明目今人



多用治眼殊與經意不相當時珍曰青箱子治眼與  
決明子實同功本經雖不言治眼而云一名草決  
明主唇口青則其明目之功可知矣目者肝之竅唇  
口青者足厥陰經之證古方除熱亦多用之青箱子  
之為厥陰藥又可知矣況用之治目往往有驗尤可  
徵據魏畧云初平中有青牛先生常服青箱子九年  
百餘歲如  
五六十者

附方舊鼻衄不止眩冒欲死青箱子汁三合  
灌入鼻中貞元廣利方

雞冠

宋嘉祐

釋名時珍曰以  
花狀命名

集解時珍曰雞冠處處有之三月生苗入夏高者五  
六尺矮者纔數寸其葉青柔頗似白莧菜而窄

艸有赤脉其莖赤色或圓或扁有筋起六七月稍間  
開花有紅白黃三色其穗圓長而尖者儼如青荳之  
穗扁卷而平者儼如雄雞之冠花大有圍一二尺者  
層層卷出可愛子在穗中黑細光滑與萵實一樣其  
穗如秬麥狀花最耐久霜後始焦

苗氣味甘涼無毒主治瘡痔及血病

時珍

子氣味甘涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢

藏器

崩中

帶下入藥炒用

大明

花氣味

同上

主治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下

分赤白用

時珍

附方

新吐血不止 白雞冠花醋浸煮七次為末結陰

便血

雞冠花椿根白皮等分為末煉蜜九梧子大 每服三十九黃芪湯下日二服 聖濟總錄 糞

後下血

白雞冠花并子 五痔肛腫 久不愈變成瘻瘡 炒煎服聖惠方 用雞冠花鳳眼草

各一兩

水二盞煎湯 下血脫肛 白雞冠花防風等分 衛生寶鑑 為末糊丸梧子大空

心米飲

每服七十九一方 白雞冠花炒搜攪灰 羌活一兩為末每服二錢米飲下 永類鈴方 經水

不止

紅雞冠花一味晒乾為末 每服二錢空 心酒調下忌魚腥猪肉 孫氏集效方 產後血

痛之

白雞冠花酒煎服 婦人白帶 白雞冠花晒乾為末 李樓奇方 每旦空心酒服三錢

赤帶用紅者 孫氏集效方

白帶沙淋

白雞冠花苦壺蘆等分燒 存性空心火酒服之摘玄

赤白下痢

雞冠花煎酒服赤用紅白用白 集簡方

紅藍花

宋開寶

釋名紅花

開寶黃藍

頌曰其花紅色葉頗似藍故有藍名

集解

志曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域博物志云張騫得種于西域今魏地亦種之頌曰今處

處有之人家塲圃所種冬月布子于熟地至春生苗夏乃有花花下作棗彙多刺花出棗上圃人乘露采之采已復出至盡而罷棗中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅又作胭脂時珍曰紅花二月八月十二月皆可以下種雨後布子如種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五月開花如大薊花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿晒乾

或捏成薄餅陰乾收之入藥搗碎用其子五月收米  
淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及  
燭

花氣味辛溫無毒

元素曰入心養血謂其苦溫陰中  
之陽故入心佐當歸生新血好古

曰辛而甘苦溫肝經  
血分藥也入酒良

主治產後血運口噤腹內惡血

不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒開寶多用破

留血少用養血

震亨

活血潤燥止痛散腫通經

時珍

發明

時珍曰血生于心包藏于肝属于衝任紅花汁  
與之同類故能行男子血脉通女子經水多則

行血少則養血按養痾慢筆云新昌徐氏婦病產運  
已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數

十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶于窻格之下昇婦寢其上熏之湯冷再加有頃指動半日乃蘇按此亦得唐許胤宗以黃芪湯熏柳太后風病之法也

附方

新舊

三六十二種風

張仲景治六十二種風兼腹

為四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服

國經本草

一切腫疾

紅花熟搗取汁服不

過三服使瘥喉痺壅塞

不通者紅藍花搗絞取汁一

外臺秘要

無生花以乾者浸濕絞汁煎服極驗

胎衣不下

方同上

楊氏產乳

產後血運心悶氣絕紅花一兩

蓋煎一蓋連服如口噤

或入小便尤妙

子母錄

寧耳出水紅藍花三

五錢為末以綿杖繳淨吹之無花  
則用枝葉一方去砮聖惠方  
噎膈拒食端午采頭次紅

花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分為末無灰酒  
一盞隔湯頓熱徐嚥初服二分次日四分三日五分

簡便方楊起

子主治天行瘡痘水吞數顆開寶功與花同  
蘇頌

附方舊三血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一  
新一大升拌子暴乾重搗篩審九梧

子大空心酒下四瘡疽不出紅花子紫草茸各半兩  
十丸張仲景方蟬蛻二錢半水酒鍾半

煎減半量大小加減血熱煩渴以紅藍子  
服龐安常傷寒論女子中風五合熬搗旦日取半

大匙以水一升煎取七合去  
渣細細嚥之貞元廣利方

苗主治生搗塗遊腫

開寶

番紅花

綱目

釋名洎夫藍

綱目

撒法卽

集解

時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國卽彼地紅藍花也元時以入食饌用按張華博物

志言張騫得紅藍花種于西域則此卽一種或方域地氣稍有異耳

氣味甘平無毒主治心憂鬱積氣悶不散活血久服

令人心喜又治驚悸

時珍

附方

新傷寒發狂驚怖恍惚用撒法卽二分水一盞一宿服之天方國人所傳玉璽



醫林  
集要

燕脂

綱目

釋名

紂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自

燕地故名燕脂或作煙赦匈奴人名妻為閼氏音同  
燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作臙肢胭支者並  
也謬

集解

時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉  
而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似薊花似蒲出

西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種  
以山燕脂花汁染粉而成乃段公路比戶錄所謂端  
州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人采含  
苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴

花汁作成者鄭虔胡本草中載之一種以紫釰染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫釰燕脂俗呼紫梗是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見菜部

氣味甘平無毒主治小兒聾耳浸汁滴之開寶活血解

痘毒

時珍

附方新乳頭裂破

燕脂蛤粉為末傳嬰孩鵝口白厚

用坏子燕脂以乳汁調塗之一宿漏瘡腫痛猪膽七

效男用女乳女用男乳集簡方脂十箇洗水和勻搽防痘入目臘脂嚼汁點痘瘡倒

七次即可救急方

陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用  
胡荽煎酒服一錢再服取效 救急方

大薊小薊

別錄中品

釋名虎薊

弘景

馬薊

范汪

貓薊

弘景

刺薊

日華

山牛蒡

日華

雞項

草圖經千針草

圖經

野紅花

綱目

弘景

曰大薊

是虎薊

小

野甚多方藥少用時珍曰薊猶髻也其花如髻也曰

虎曰貓因其苗狀猙獰也曰馬者大也牛蒡因其根

似牛蒡根也雞項因其莖似雞之項也千針紅花皆

其花狀也鄭樵通志謂爾雅之藥曰狗毒者即此未

知是否藏器曰薊門以多薊

得名當以北方者為勝也

集解

別錄

曰大小薊五月采恭曰大小薊葉雖相似

功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤

不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草四月采苗九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾宗奭曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此為異作菜雖有微芒不害人

大薊根葉同氣味甘溫無毒

弘景曰有毒權曰苦平大明曰葉涼

主治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健

別錄搗

根絞汁服半升主崩中血下立瘥

甄權

葉治腸癰腹臃

瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡疥癬同

鹽研罾之

大明

小薊根

苗同

氣味甘溫無毒

大明曰涼

主治養精保血

別錄

破宿血生新血暴下血血崩金瘡

出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛

蛇蠍毒服之亦佳

藏器

治熱毒風并胸膈煩悶開胃下

食退熱補虛損

苗去煩熱生研汁服

並大明

作菜食

除風熱夏月熱煩不止搗汁半升服立瘥

孟詵

發明

大明曰小薊力微只可退熱不似大薊能健養下氣也恭曰大小薊皆能破血但大薊兼療癰

腫而小薊專主  
血不能消腫也

附方舊五心熱吐血口乾用刺薊葉及搗根絞取  
新九汁每頓服二小蓋聖惠方舌

硬出血不止刺薊搗汁和酒服乾九竅出血方同上  
者為末冷水服普濟丸簡要濟

衆卒瀉鮮血小薊葉搗汁溫服崩中下血大小薊根  
一升梅師方一升酒一

斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服又方  
小薊莖葉洗切研汁一蓋入生地黃汁一蓋白朮半

兩煎減半溫墮胎下血小薊根葉益母草五兩水二  
服千金方大益煮汁一盞再煎至一盞

分二服一日服金瘡出血不止小薊苗搗爛塗小便  
盡聖濟總錄之孟詵食療本草小

熱淋馬薊根搗汁鼻塞不通小薊一把水二升煮取  
服聖惠方一升分服外臺秘要

方小兒浸淫

瘡痛不可忍發寒熱者刺薊葉新水  
調傳瘡上乾即易之簡要濟衆方

瘡作痒

刺薊葉搗汁服之千金方

婦人陰痒

小薊煮湯日洗三次廣濟方諸

瘰不合

虎薊根貓薊根酸棗根枳根杜衡各一把斑蝥三分炒為末蜜丸棗大日一服并以小九

納瘡中肘后方

丁瘡惡腫

錢針草四兩乳香一兩明礬五錢為末酒服二錢出汗為度

普濟方

續斷

本經上品

釋名属折

本接骨別錄龍豆別錄南草

時珍曰續斷屬折接骨皆以功命名

也

集解

別錄曰續斷生常山山谷七月八月采陰乾普

續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月采根令皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生時人又有接骨樹高丈餘許葉似胡蘆皮主金瘡廣州又有續斷藤一名諸藤斷其莖以器承取汁飲療虛損絕傷用沐頭長髮折枝揀地即生恐皆非真李當之云是虎薊與此大乖但虎薊亦療血恭曰所在山谷皆有今俗用者葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶說非也頌曰今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之三月以後生苗幹四稜似苧麻葉兩兩相對而生四月開花紅白色似苧母花根如大薊赤黃色謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大于小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州所圖者相類而市之貨者亦有數種少能辨其粗良醫人但以節節斷皮黃



繳者為真繳曰凡使勿用草茅根緣真相似若誤服  
令人筋軟時珍曰續斷之說不一桐君言是蔓生葉  
似荏李當之范汪並言是虎薊日華子言是大薊一  
名山牛蒡蘇恭蘇頌皆言葉似苧麻根似大薊而名  
醫別錄復出大小薊條頗難依據但自漢以來皆以  
大薊為續斷相承久矣究其實則二蘇所云似與桐  
君相符當以為正今人所用以州中來色赤而瘦折  
之有烟塵起者為良馬鄭樵通志謂范汪所說者乃  
南續斷不知何據  
蓋以別川續斷耳

根修治

斲曰凡采得根橫切剉之又去向裏  
硬筋以酒浸一伏時焙乾入藥用

氣味苦微溫無毒

別錄曰辛平普曰神農雷公黃帝李  
當之苦無毒扁鵲辛無毒之才曰

地黃為之  
使惡雷丸  
主治傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨

婦人乳難久服益氣力

本經

婦人崩中漏血金瘡血內

漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急

別錄

去諸

溫毒通宣血脉

甄權

助氣補五勞七傷破癥結瘀血消

腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前後一切病胎漏

子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精尿血

大明

發明

時珍曰宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病血

服二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行痢疾

叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢服之效

附方

新舊二

小便淋瀝

生續根也

斷搗絞汁服即馬薊

驗妊娠

胎動

兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各二兩為末棗肉煮爛杵和九梧子大每

服三十九

產後諸疾

血運心悶煩熱厭厭氣欲絕心

米飲下

三升煎二升分三服如人行一里再服

無所忌此藥救產後垂死子母秘錄打撲傷損

骨接用節

骨草葉搗爛卷之立效

衛生易簡方

苦芙

音襖錄下品

別

釋名鈎芙

爾雅

苦板

時珍曰凡物穉曰芙此物嫩時可食故以名之

集解

弘景曰苦芙處處有之僮人取莖生食之保昇曰所在下濕地有之莖圓無刺可生噉子若貓

薊五月五日采苗暴乾恭曰今人以為漏蘆非也時珍曰爾雅鈎芙即此苦芙也芙大如拇指中空莖頭

有臺似薊

初生可食

許慎說文言江南人食之下氣

今浙東人清明節米其嫩苗食之云一年不生瘡疥

亦搗汁和米為食其色青久留不敗造化指南云苦

笑大者名苦藉葉如地黃味苦初生有白毛入夏抽

莖有毛開白花甚繁結細實其無花實者名地膽

草汁苦如膽也處處濕地有之入爐火家用

苗氣味苦微寒無毒主治面目通身漆瘡燒灰傳之

亦可生食

別錄燒灰療金瘡極驗弘景治丹毒大煎湯洗

痔甚驗

汪頴下氣解熱時珍

漏蘆

本經上品

釋名野蘭

本經英蒿蘇恭鬼油麻日華時珍曰屋之西北

黑處謂之漏凡物黑色

謂之盧此草秋後即黑異于衆草故有漏盧之稱唐韻作篇其莢如麻故俗呼為鬼油麻云

集解

別錄曰漏盧生喬山谷八月米根陰乾弘景曰喬山應是黃帝所塋處乃在上郡及出近道

市人取苗用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩以療瘡疥恭曰此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻之莢大如筋許有四五瓣七八月後皆黑異于衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木黎蘆有毒非漏盧也今人以馬薊似苦笑者為漏盧亦非也志曰別本言漏盧莖大如筋高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝于根江寧及上黨者佳陶云鹿驪蘇云木黎蘆亦非也漏盧自別藏器曰南人用苗北土用根乃樹生如茱萸樹高二三尺有毒殺蠱山人以洗瘡疥保昇曰葉似角蒿今曹冤州下濕處最多六月七月米莖日乾黑于衆草大明曰花苗並可用形并氣味似乾牛蒡

頭上有白法子頌曰今汴東州郡及奉海州皆有之  
舊說莖葉似白蒿花黃白莢莖若箭大房類油麻而  
小今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗  
似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹  
海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸  
裹之根如蔓青而細又類葱本黑色淮南人呼為老  
翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉  
更作鉅齒狀一物而殊類如此醫家何所適從當依  
舊說似單州出者為勝又本草飛廉一名漏蘆云與  
苦艾相類其根生則肉白皮黑乾則黑如玄參七八  
月采花陰乾用所說與秦州海州所圖漏蘆花葉及  
根頗相近然彼人但名漏蘆不曰飛廉也穀曰一種  
真似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止時珍曰按  
沈存中筆談云今方家所用漏蘆乃飛廉也飛廉一  
名漏蘆苗似苦艾根如牛蒡綿頭者是也采時用根  
今閩中所謂漏蘆莖如油麻高六七尺秋深枯黑如

漆米時用苗乃真漏  
盧也餘見飛盧下

根苗修治

斲曰凡米得漏盧細剉以生甘草相對拌蒸之從已至申揀出晒乾用

氣味鹹寒無毒

別錄曰大寒藏器曰有毒果曰無毒足陽明本經藥也之才曰連翹為之

使

主治皮膚熱毒惡瘡疽痔濕痺下乳汁久服輕身益

氣耳目聰明不老延年

本經

止遺溺熱氣瘡痒如麻豆

可作浴湯

別錄

通小腸泄精尿血腸風風赤眼小兒壯

熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補血長肉

通經脉大明

發明

弘景曰此藥久服甚益人而服食方罕見用之近道出者惟療癰疥耳市人皆取苗用時珍曰

漏蘆下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺蟲故東垣以為手足陽明藥而古方治癰疽發背以漏蘆湯為首稱也龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏蘆葉云無則以山梔子代之亦取其寒能解熱蓋陽明之故也

附方

舊二新六腹中蛟蟲漏蘆為末以餅臠和方寸匕服之外臺秘要小兒無

辜

疳病肚脹或時泄痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服一錢以猪肝一兩入鹽少許白煮熟空心

頓食之聖惠方

冷勞泄痢

漏蘆一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一半同熬成膏



入後末和九梧子大每溫產後帶下方同乳汁不下

水三十九聖濟總錄又治經絡凝滯乳內脹痛邪毒成癰

乃氣脉壅塞也服之自然內消漏盧二兩半蛇退十條炙焦瓜蒌十

个燒存性為末每服二錢溫酒調下良歷節風痛脉

久以熱羹湯投之以通為度和劑方拘攣古聖散用漏盧麩炒半兩地龍去土炒半兩為

末生薑二兩取汁入蜜三兩同煎三五沸入好酒五

合盛之每以二盃調水一切癰疽有熱證便宜服漏

一錢溫服聖濟總錄盧湯退毒下膿乃是宣熱拔毒之劑熱退即住服漏

盧用有白茸者連翹生黃芪沉香各一兩生粉草半

兩大黃微炒一兩為細末每服二白禿頭瘡五月收

錢姜棗湯調下李迅癰疽集驗方

燒灰猪膏和塗聖濟總錄

飛蘆

本品

釋名漏蘆

別錄

木禾

別錄

飛雉

同

飛輕

同

伏兔

同

伏豬

同

天薺

同時珍曰飛蘆神禽之名也其狀鹿身豹文雀頭蛇尾有角能致風氣此草附莖有皮如箭羽

復療風邪故有飛蘆飛雉飛輕諸名

集解

別錄曰飛蘆生河內川澤正月采根七月八月采花陰乾弘景曰處處有之極似苦艾惟葉多

刻缺葉下附莖輕有皮起似箭羽其花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既

別有漏蘆則此漏蘆乃別名爾恭曰此有兩種一種生平澤中是陶氏所說者一種生山岡上者葉頗相

似而無刻缺且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用莖

葉及根療疳蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦艾者為漏蘆並非是也保昇曰葉似苦艾莖似軟羽花紫色子毛白所在平澤皆有五月六月采日乾數日凡使勿用赤脂蔓與飛蘆形狀相似只赤脂蔓見酒則色便如血以此可表識之頌曰今秦州所圖漏蘆花似單葉寒薊紫色五七枝同一幹海州所圖漏蘆花紫色碧色如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱本與陶蘇所說飛蘆相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用飛蘆者不能的識時珍曰飛蘆亦蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆是飛蘆沈存中筆談亦言飛蘆根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛蘆無疑矣今考二物氣味功用俱不相遠似可通用豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎

根及花修治

數曰凡用根先刮去粗皮杵細以苦酒拌一夜漉出日乾細杵用

氣味苦平無毒

權曰苦鹹有毒之才曰得烏頭良忌麻黃

主治骨節熱脰重酸疼久服令人身輕

木經

頭眩頂重

皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺

止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可煮可乾

用

別錄

主留血療疳蝕殺蟲

蘇恭

小兒疳痢為散水漿服

大效

蕭炳

治頭風旋運

時珍

發明

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可遠涉疾行力數倍于常木

經別錄所列亦是良藥而後人不知用何哉

附方

舊

疳蠹蝕口

及下部用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢七著痛處其痛則忍之若不痛

非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日瘥二十日平復千金翼方

苧麻

別錄下品

釋名

時珍曰苧麻作紵可以績紵故謂之紵凡麻絲之細者為經粗者為紵陶弘景云苧即今績苧

麻是也麻字從广從林音派象屋下林麻之形广音掩

集解

頌曰苧麻舊不著所出州土今閩蜀江浙多有之剝其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉而

無义面青背白有短毛夏秋間着細穗青花其根黃白而輕虛二月八月采按陸璣草木疏云苧一抖數

十莖宿根在土中至春自生不須栽種荆揚間歲三  
刈諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處  
自脫得裏如筋者煮之用緝布令江浙間中尚復如  
此宗奭曰芋如蓴麻花如白楊而長成穗每一朵凡  
數十穗青白色時珍曰芋家芋也又有山芋野芋也  
有紫芋葉面紫白芋葉面青其背皆白可刮洗煮食  
救荒味甘美其子茶褐色九月  
收之二月可種宿根亦自生

根氣味甘寒無毒

權曰甘平大明  
曰甘滑冷無毒

主治安胎貼熱丹毒

別錄

治心膈熱漏胎下血產前後

心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱署毒箭

蛇蟲咬明溫芋汁止消渴

別錄

發明

震亨曰芎根大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也藏器曰芎性破血將芎麻與產

婦枕之止血運產後腹痛以芎安腹上即止也又蠶咬人毒入肉取芎汁飲之令人以子近蠶種則蠶不

生是矣

附方

舊四新七痰哮喘嗽芎根煨存性為末生豆腐蘸三錢食即效未全可以肥猪肉

二三片蘸食甚妙

醫學正傳小便不通

聖惠方用麻根蛤粉半兩為末每服二錢空心新汲

水下

摘玄方用芎根洗研攤

小便血淋

芎根煎湯頻服大妙

亦治諸淋聖惠方

五種淋疾

芎麻根兩莖打碎用水一盞半煎半盞頓服即通大妙

方妊娠胎動

忽下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍者芎根去黑皮切二升銀一斤水九

升煮四升每服以水一升入酒半升煎  
一升分作二服一方不用銀梅師方肛門腫痛

根搗爛生之良脫肛不收芋根搗爛煎湯  
瀕湖集簡方

初起未成者芋根熟搗傳上日  
夜數易腫消則瘥圖經本草五色丹毒芋根煮濃

之臺秘要外雞魚骨哽談野翁試驗方用芋麻根搗汁以  
匙挑灌之立效醫方大成用野

芋麻根搗碎九如龍眼大  
魚骨魚湯下雞骨雞湯下

葉氣味同主治金瘡傷折血出瘀血時  
根珍

發明時珍曰芋麻葉甚散血五月五日收取和石灰  
搗作團曬乾收貯遇有金瘡折損者研末傳之

即時血止且易痂也按李仲南永類方云凡諸傷瘀  
血不散者五六月收野芋葉蘇葉搗爛傳金瘡上如



瘀血在腹內順流水絞汁服即通血皆化水  
以生豬血試之可驗也秋冬用乾葉亦可

附方

新

驟然水瀉

日夜不止欲死不拘男婦用五月  
五日采麻葉陰乾為末每服二錢

冷水調下勿喫熱物今人問倒只喫  
冷物小兒半錢楊子建護命方

冷痢白凍

上方同

蛇虺咬傷

青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以渣傳  
之毒從竅中出以渣棄水中即不發看傷

處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以  
針挑破傷處成竅傳藥摘玄方

苧麻

苧音項  
唐本草

釋名白麻

時珍曰苧一作苧又作榮  
種必連項故謂之苧也

集解

恭曰苧即苧麻也今人取皮作布及索者實似  
大麻子九月十月米陰乾頌曰處處有之北人

種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似芋而薄花黃實殼如蜀葵其中子黑色時珍曰蔞麻今之白麻也多生卑濕處人亦種之葉大似桐葉團而有尖六七月開黃花結實如半磨形有齒嫩青老黑中子扁黑狀如黃葵子其莖輕虛潔白北人取皮作麻以莖蘘硫黃作燂燈引火甚速其嫩子小兒亦食之

實氣味苦平無毒主治赤白冷熱痢炒研為末每蜜湯服一錢癰腫無頭者吞一枚蘇恭生眼翳瘀肉起倒

睫拳毛

時珍

根主治亦治痢古方用之

蘇頌

附方一新一切眼疾苧麻子一升為末以豬猪肝批片

每服一字陳米飲下目生翳膜久不愈者用穀實以

日三服

聖濟總錄

尾篩取黃肉去焦殼每十兩可得四兩非此法不能

去殼也用猪肝薄切滾藥慢炙熟為末醋和九梧子

大每服三十九白湯下一方以穀實內袋中蒸熟暴為末蜜丸溫水下聖濟總錄

大青

別錄中品

釋名

時珍曰其莖葉皆深青故名

集解

別錄曰大青三四月采莖陰乾弘景曰今出東

州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之春生青紫莖似石

竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月

采莖葉陰乾用時珍曰處處有之高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大如椒顆九月色赤

莖葉氣味苦大寒無毒

權曰甘時珍曰甘微鹹不苦

主治時氣頭痛大熱口瘡

別錄

除時行熱毒甚良

弘景

治

溫疫寒熱

甄權

治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱

疾風癰及金石藥毒塗罽腫毒

大明

主熱毒痢黃疸喉

痺丹毒

時珍

發明

頌曰

古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯內亦用大青大抵

時疾多用之時珍曰大青氣寒味微苦鹹能解心胃  
熱毒不特治傷寒也朱肱活人書治傷寒發赤斑煩  
痛有犀角大青湯大青四物湯故李象先指掌  
賦云陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可回困篤

附方

新

喉風喉痺

大青葉搗汁灌之取效止  
衛生易簡方

小兒口瘡

大

十八銖黃連十二銖水三升煮一升  
服一日二服以瘥為度千金方

熱病下痢

因篤者大

青湯用大青四兩甘草赤石脂三兩膠二兩豉八  
合水一斗煮三升分三服不過二劑瘥肘后方熱

病發斑

赤色煩痛大青四物湯用大青一兩阿膠甘  
草各二錢半豉二合分三服每用水一盞半

煎一盞

入膠烱化服

又犀角大青湯用大青七錢

半犀角

二錢半梔子十枚豉二撮分二服每服水一

盞半煎

八分溫服

吐皮青黑

小兒卒然吐皮青黑乃  
血氣失養風寒乘之危

南陽活人書

惡之候也大青為末納口中  
以酒送下保幼大千方

小青

宋圖經

集解

頌曰小青生福州三月生  
花彼土人當月采葉用之

葉氣味

缺

主治生擣傳癰腫瘡癤甚效

蘇頌

治血痢腹

痛研汁服解蛇毒

時珍

附方

新二

蛇虺螫傷

衛生易簡方用小青一握細研入  
香白芷半兩酒調服手按患處候

黃水出為效

摘玄方用小青大青  
牛膝葉同搗汁和酒服以渣傳之

中暑發昏

小青葉井

水浸去泥控乾入沙糖  
槽汁急灌之壽域方

胡盧巴

宋嘉祐

釋名苦豆

集解

禹錫曰胡盧巴出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采今人多用嶺南者或云是番

蘿蔔子未審的否頌曰今出廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔于嶺外亦生然不及番中來者真好今醫家治元臟虛冷為要藥而唐已前方不見用本草不著蓋是近出

修治

時珍曰凡入藥淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用

氣味苦大溫無毒

果曰純陽

主治元臟虛冷氣得附子硫

黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得懷香子桃仁治

膀胱氣甚效

祐嘉

治冷氣疝瘕寒濕脚氣益右腎暖丹

田時珍

發明

宗奭曰膀胱氣用此合桃仁麩炒等分為末半為散半以酒糊和丸梧子大每服五七十九空

心鹽酒下其散以熱米飲下與九子相間空日  
各一二服時珍曰胡盧巴右腎命門藥也元陽不足  
冷氣潛伏不能歸元者宜之宋惠民和劑局方有胡  
盧巴丸治大人小兒小腸奔豚偏墜及小腹有形如  
卵上下走痛不可忍者用胡盧巴八錢茴香六錢巴  
戟去心川烏頭炮去皮各二錢揀實去核四錢吳茱  
萸五錢並炒為末酒糊丸梧子大每服十五九小兒  
五九鹽酒下太醫薛已云一人病寒疝陰囊腫痛服  
五苓諸藥不效與此而平也又張子和儒門事親云  
有人病目不覩思食苦豆即胡盧巴頻頻不缺不周



歲而目中微痛如蟲行入背漸明而愈按此亦因其益命門之功所謂益火之原以消陰翳是也

附方

新

小腸氣痛

胡蘆巴炒研末每服二錢

腎臟虛冷

腹脹滿胡蘆巴炒二兩熟附子硫黃各七錢五分為末酒煮麴糊丸梧桐子大每鹽湯下三四十丸

聖濟

冷氣疝瘕

胡蘆巴酒浸晒乾蕎麥炒研麴各四兩小茴香一兩為末酒糊丸梧子大

每服五十九丸空心鹽湯或鹽酒下服至兩陰癰腫痛月大後出白膿則除根方廣心法附餘

偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈者沉香內消丸主之沉香木香各半兩胡蘆巴酒浸炒小茴香炒各

二兩為末酒糊丸梧子大氣攻頭痛胡蘆巴炒三棱每服五七十九丸鹽酒下酒浸焙各半兩

乾薑炮二錢半為末薑湯或寒濕脚氣腿膝疼痛行溫酒每服二錢濟生方

巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩為末以木瓜切頂去瓢安藥在內令滿用頂合住簽定爛蒸搗丸梧子大每服七十九空心溫酒下 楊氏家藏方

蚤實

本經中品

釋名荔實

別錄

馬蘭子

唐本

馬棟子

圖經

馬薤

禮記注

馬帚

爾雅

鐵掃帚

救荒

劇草

本經

旱蒲

禮記

豕首

本經

三堅

弘景曰方藥不用俗無識

者惟天名精亦名豕首恭曰此即馬蘭子也月令仲冬荔挺出鄭玄注云荔馬薤也通俗文云一名馬蘭本草謂之荔實頌曰馬蘭子北人訛為馬棟子廣雅云馬薤荔也高誘云荔挺出荔草挺出也講禮者不識呼為荔挺又作馬莧並誤矣馬莧亦名豚耳即馬齒也時珍曰爾雅云并音瓶馬帚也此即荔草謂其

可為馬刷故名今河南  
北人呼為鐵掃帚是矣

集解

別錄曰蠡實生河東川谷五月采實陰乾頌曰  
今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近汴尤多葉似

薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大  
而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷三月開花  
五月采實並陰乾用許慎說文云荔似蒲而小根可  
為刷高誘云河北平澤率生之江東頗多種于階庭  
但呼為旱蒲不知即馬薤也時珍曰蠡草生荒野中  
就地叢生一本三二十莖苗高三四尺葉中抽莖開  
花結實

正誤

宗奭曰蠡實陶隱居言方藥不用俗無識者本  
草諸家所注不相應若果是馬薤則日華子本

草不當更言可為蔬菜蓋馬薤葉出土已硬又無味  
馬牛皆不食豈堪人食今不敢以蠡實為馬薤更俟

博識時珍曰別錄蠡實亦名荔實則蠡乃荔字之訛也張揖廣雅云荔又名馬蘭其說已明又按周憲王救荒本草言其嫩苗味苦燥熟換水浸去苦味油鹽調食則馬蘭亦可作菜矣寇氏但據陶說疑之欠考矣陶氏不識之藥多矣今正其誤

實修治

時珍曰凡入藥炒過用治疝則以醋拌炒之

氣味甘平無毒

保昇曰寒頌曰山人服之云大溫甚有奇效

主治皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜

食久服輕身

本經

止心煩滿利大小便長肌膚肥大

別錄

療金瘡血內流癰腫有效

蘇恭婦人血氣煩悶產後血

運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癰止鼻衄吐血

通小腸消酒毒治黃病殺革毒傳蛇蟲咬明大治小腹

疝痛腹內冷積水痢諸病珍時

附方舊一諸冷極病醫所不治者馬蘭子九升洗淨

金方寒疝諸疾寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌馬蘭子一升每日取一把以麴拌煮

吞之服盡愈姚僧坦集驗方喉痺腫痛衛生易簡方用蠶實一合升麻五分水一升煎三合

入少蜜攪勻細呷大驗聖惠方用馬蘭子二升升麻一兩為末蜜丸水服一錢又方馬蘭子八錢牛

蒡子六錢為末空水痢百病張文仲備急方用馬蘭心溫水服方寸匕子以六月六日麴熬各

等分爲末空心米飲服方寸匕如無六月六日麴常麴亦可牛骨灰亦可又方馬蘭子乾薑黃連各等

分爲散熱湯服二方寸匕入腹即斷也冷腸風下血熱皆治常用神效不得輕之忌豬肉冷水腸風下血有疔瘡瘡破者不治馬蘭子一斤研破酒浸夏三冬七日曬乾何首烏半斤雄黃雌黃各四兩爲末以浸藥酒打糊九梧子大每服三十丸溫酒下日三服見效普濟方

花實及根葉主治去白蟲經本療喉痺多服令人溲洩

別錄主癰疽惡瘡時珍

發明

頌曰蟲草花實皆入藥列仙傳云寇先生宋人好種荔食其葩實是矣時珍曰按葉水東日記

云北方田野人患胸腹飽脹者取馬棘花搗涼水服即泄數行而愈按此則多服令人泄之說有驗而蟲

實之為馬蘭  
更無疑矣

附方

舊三

睡死

不寤

蠡實根一握

杵爛

以水絞

外臺秘要

喉痺

口噤

馬蘭花二兩蔓荊子一錢

喉痺腫痛

喘息欲死者

馬蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲之立瘥  
惠方用根搗汁三合蜜一合慢火熬成徐徐點之

五七度一方單汁飲之口噤

沙石熱淋

馬蘭花七枚

七枚燒粟米一合炒為末每服

小便不通

馬蘭花炒

二錢酒下日二服名通神散

小便秘不通

乾地

面上癰

取鐵掃帚地上自落葉并子煎

面皯

鼻鼓

馬蘭子花杆傳  
之佳肘后方

附錄必似勒

拾遺藏器曰辛溫無毒主冷氣胸閉  
不消心腹脹滿生崑崙狀似馬蘭子

惡實

別錄  
中品

釋名鼠粘

別錄

牛蒡

別錄

大力子

綱目

蒡翁菜

綱目

便牽牛

綱目

蝙蝠刺

時珍曰其實狀惡而多刺鉤故名其根葉皆可食人呼為牛蒡術人隱之呼為大力也俚

人謂之便牽牛河南人呼為夜叉頭頌曰實殼多刺  
鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來

之比

集解

別錄曰惡實生魯山平澤恭曰魯山在鄧州東北  
此草葉大如芋子殼似栗狀實細長如羌蔚



子頌曰惡實即牛蒡子也處處有之葉大如芋葉而長實似葡萄核而褐色外殼似栗樣而小如指頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥時珍曰牛蒡古人種子以肥壤栽之剪苗洵淘為蔬取根煮暴為脯云甚益人今人亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色結實如楓樣而小萼上細刺百十攢簇之一株有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色灰黯七月采子十月采根

子修治

數曰凡用揀淨以酒拌蒸待有白霜重出以布拭去焙乾搗粉用

氣味辛平無毒

藏器曰苦元素曰辛溫陽中之陰升也杲曰辛平陽也降也

主治明目補中除風傷

別錄風毒腫諸癰

藏器

研末浸酒

每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚又食前熟

按三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒甄權吞一枚出癰

疽頭

蘇恭

炒研煎飲通利小便孟詵潤肺散氣利咽膈去

皮膚風通十二經

元素

消斑癰毒時

發明

果曰鼠粘子其用有四治風濕癰疹咽喉風熱散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也

附方

舊五新十一

風水身腫

欲裂鼠粘子二兩炒研為末每溫水服二錢日三服 聖

患風熱浮腫

咽喉閉塞牛蒡子一合半生半熟為末熱酒服一寸七 經驗方

痰厥

頭痛

牛蒡子炒旋覆花等分為末臘茶清服一錢日二服 聖惠方

頭痛連睛

鼠粘子石

膏等分為末茶清咽膈不利

疏風壅涎唾牛蒡子微炒荆芥穗一兩炙甘草

調服

醫方摘要

半兩為末食後湯服二錢當懸癰喉痛風熱上搏也

緩緩取效

寇氏本草衍義

惡實炒甘草

生等分水煎含嚙名喉痺腫痛牛蒡子六分馬蘭子

啟關散

普濟方

六分為散每空心溫

水服方寸匕日再服仍以牛蒡子三兩咽喉痘疹牛蒡

鹽二兩研勻炒熟包熨喉外

廣濟方

咽喉痘疹

子二錢桔梗一錢半粉甘草風熱癰疹牛蒡子炒浮

節七分水煎服

痘疹要訣

風熱癰疹

牛蒡子炒浮

荷湯服二錢日二服風齧牙痛鼠粘子炒煎水含小

初虞世古今錄驗

風齧牙痛

鼠粘子炒煎水含小

嗽吐之

延年方

兒痘瘡時出不快壯熱狂躁咽喉壅塞大便祕澀小

兒咽喉腫不利若大便秘者勿服牛蒡子炒

一錢二分荊芥穗二分甘草節四分水一盞同煎婦

至七分溫服已出亦可服名必勝散

和劑局方

人吹乳鼠粘一錢麝香少許溫酒天行時疾生牛蒡

服一小盞效

聖惠方

天行時疾

生牛蒡

五合空腹分為二服服訖取桑葉一把炙黃以水一升煮取五合頓服取汁無葉用枝孫真人食忌

熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為二服傷寒搗搗後

覆蓋不密致腰背手足搐搦者牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南星各六錢剉于盆內研細好

酒一升同研以新布絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令黑色取出于乳鉢

內細研每服一錢溫酒下一切風疾牛蒡根一升生

日三服朱肱活人書

地黃枸杞子牛膝各三升用袋盛藥浸無外臺秘要方老人中風

口目掣動煩悶不安牛蒡根切一升去皮晒乾杵為麴白米四合淘淨和作饅飩豉汁中煮加葱椒五味

效空心食之恒服極老人風濕久痺筋攣骨痛服此壯

壽親養老書

老人風濕

腎潤皮毛益氣力牛蒡

根一升切生地黃一升切大豆二升炒以絹袋盛浸一斗酒中五六日任性空心溫服二三盞日二服集

驗頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸着痛者牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨研爛酒

煎成膏絹攤貼腫處仍以熱酒頭風掣痛不可禁者服一二匙腫消痛減斗門方唐膏主之

取牛蒡莖葉搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙頭糠大煎稠成膏以摩痛處風毒自散摩時須極力

令熱乃效冬月用根篋中方頭風白屑牛蒡葉搗汁熬稠塗之至明皂笑水洗去聖惠方

喉中熱腫鼠粘根一升分三服延年方小兒咽腫牛蒡根搗汁細

燕之普濟方熱毒牙痛熱毒風攻頭面齒齲腫痛不可忍牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀

器中熬成膏每用塗齒齲上項下癭疾鼠粘子根一重者不過三度瘡聖惠方升水三升煮

取一升半分三服或為末  
蜜丸常服之救急方  
耳卒腫痛牛蒡根切絞汁

膏塗之

聖濟總錄小便不通  
臍腹急痛牛蒡葉汁生地黄汁  
二合和勻入蜜二合每服一合

入水半盞煎三五沸調滑  
石末一錢服聖濟總錄  
癰子腫毒鼠和子葉貼石

瘻出膿

聖實寒熱鼠和子葉為末和  
雞子白封之外臺秘要  
諸瘡腫毒牛蒡

莖洗煮爛搗汁入米煮

粥食一椀甚良  
積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥  
者牛蒡根搗和臘

月猪脂日日封  
千金方月水不通  
結成癥塊腹肋脹大欲死  
牛蒡根二斤剉蒸三遍以

生絹袋盛之以酒二斗浸五日  
每食前溫服一盞  
普濟方

葉耳

本經  
中品

釋名胡菜

本經

常思

弘景

蒼耳

爾雅

卷耳

詩經

爵耳

詩疏

猪耳

綱目

耳璫

詩疏

地葵

本經

施

音施

羊負來

弘景

道人頭

圖經

進賢菜

事記

珠

喝起草

綱目

野茄

綱目

縑絲草

頌曰

詩人謂之

蒼耳

廣雅謂之

卷耳

爾雅謂之

卷耳

爾雅

菜耳皆以實得名也陸璣詩疏云其實正如婦人耳瑞今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡菜幽州人呼

為爵耳博物志云洛中有人驅羊入蜀胡菜子多刺粘綴羊毛遂至中國故名羊負來俗呼為道人頭弘

景曰儉人皆食之謂之常思菜以葉覆麥作黃衣者方用甚稀時珍曰其葉形如菜麻又如茄故有菜耳

及野茄諸名其味滑如葵故名地葵與地膚同名詩人思夫賦卷耳之章故名常思菜張揖廣雅作常菜

亦通

集解

別錄曰菜耳生安陸川谷及大安田野實熟時  
米頌曰今處處有之陸氏詩疏云其葉青白似

胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生  
子正如婦人耳瑤郭璞云形如鼠耳叢生如盤令之  
所有皆類此但不作蔓生時珍曰嘗按周憲王救荒  
本草云蒼耳葉青白類粘糊菜葉秋間結實比桑椹  
短小而多刺嫩苗燻熟水浸淘拌食可救飢其  
子炒去皮研為麪可作燒餅食亦可熬油點燈

實修治

大明曰入藥炒熟搗去  
刺用或酒拌蒸過用

氣味甘溫有小毒

別錄曰苦權曰甘無毒恭  
曰忌猪肉馬肉米甘害人

主治風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝

痛久服益氣藏治肝熱明目

甄權治一切風氣填髓暖



腰脚治療癰瘡疥及瘙瘡明大炒香浸酒服去風補益

時珍

附方

舊三新四

久瘡不瘥

蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊九梧子大每酒服三十九日

二服生者搗汁服亦可朱氏集驗方

大腹水腫

小便不利蒼耳子灰葶藶末等分每服二

錢水下日二千金方

風濕攣痺

一切風氣蒼耳子三兩炒為末以水一升半煎取七合去

滓呷之

牙齒痛腫

蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷即吐去吐後復含不

過一劑瘥莖葉亦可或入鼻淵流涕

蒼耳子

即縑絲草子炒研為末

每白湯點服一二錢證治要訣

眼目昏暗

葉耳實一升為末白米半升作粥日食之

濟嗜酒不已

毡中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之即不嗜 陳藏器本草

莖葉修治

數曰凡米得去心取黃精以竹刀細切拌之蒸從已至亥時出去黃精陰乾用

氣味苦辛微寒有小毒

恭曰忌猪肉馬肉米泔伏硝砂

主治溪毒

別錄

中風傷寒頭痛

孟詵

大風癰癩頭風濕痺

毒在骨髓腰膝風毒夏月采曝為末水服一二七冬

月酒服或為丸每服二三十九日三服滿百日病出

如癰疥成汁出或斑駁駁甲錯皮起皮落則飢如凝

脂令人省睡除諸毒螫殺蟲疔濕蠹久服益耳目聰

明輕身強志

蘇恭

按葉安舌下出涎去目黃好睡燒灰

和臘猪脂封丁腫出根煮酒服主狂犬咬毒

藏器

發明

時珍曰蒼耳藥久服去風熱有效最忌猪肉及風邪犯之則遍身發出赤丹也按蘇沈良方云

蒼耳根苗葉實皆洗濯陰乾燒灰湯淋取濃汁泥連兩竈煉之灰汁耗即旋取傍釜中熟灰湯益之一日夜不絕火乃旋得霜乾甕瓶收之每日早晚酒服二錢補暖去風駐顏尤治皮膚風令入膚革清淨每澡沐入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力也斗門方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋即

蒼耳也

附方

舊十二  
新十六

萬應膏

治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔瘡一切風痒癰瘡杖瘡牙

疼喉痺五月五日采蒼耳根葉數擔洗淨晒萎細剉以大鍋五口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再濾復入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新罐貯封每以敷貼即愈牙疼即敷牙上喉痺敷舌上或噤化二三次即效每日用酒服一匙極有效

集簡方一切風毒并殺三蟲腸痔能進食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五日午時附地刈取葉耳葉洗暴搗下篩每服方寸匕酒或漿水下日夜三若覺吐逆則以蜜九服準計方寸匕數也風輕者日二服若身體作粟或麻豆出此為風毒出也可以針刺清去黃汁乃止七月一切風氣蒼耳嫩葉一石切七九月九亦可采用

一切風氣和麥蘖五升作塊于蒿艾中罾二十日成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升釀之封二七日成熟每空心暖服神驗封

此酒可兩重布不得令密密則溢諸風頭運蒼耳葉  
晒干為

出忌馬肉猪肉 孟詵食療方草 未每服一錢酒調下日三服若吐則以蜜丸梧子大每服二十九十日全好矣 楊氏經驗方 血風

腦運方見發 毒攻手足腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并  
以滓傳之立效春用心冬用

子金翼 卒中水毒初覺頭目微痛惡寒骨節強急日  
醒暮刺手足逆冷三日則蟲蝕下

部六七日膿潰食至五臟殺人也 搗常思草絞 毒蛇  
汁服一二升并以綿染導其下部 肘后方

溪毒沙虱射工等所傷口噤眼黑手足強直毒攻腹  
內成塊逡巡不救蒼耳嫩苗一握取汁和酒溫

灌之以滓厚傳 疫病不染五月五日午時多采蒼耳  
嫩葉陰乾收之臨時為末

冷水服二錢或水煎舉家 風瘙癢疹身痒不止用蒼  
耳莖葉子等分

為末每服二錢豆淋  
酒調下 聖惠方 面上黑斑 蒼耳葉焙為末食後  
米飲調服一錢一月

愈方 摘 赤白汗斑 蒼耳嫩葉火和青鹽搗爛五六  
月間擦之五七次效 摘玄方 大

風癘疾 袖珍方用嫩蒼耳荷葉等分為末每服二錢  
溫酒下日二服 乾坤生意用蒼耳葉為末

以大楓子油和九梧子大每服三四九以茶湯下  
日二服 又方五月五日或六月六日五更帶露采

蒼耳草搗取汁熬作錠子取半斤鱧魚一尾剖開不  
去肚腸入藥一錠線縫以酒二盞慢火煮熟令喫不

過三五箇魚即愈 卒得惡瘡 蒼耳挑皮作 反花惡瘡  
也忌鹽一百日 屑納瘡中

有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉 一切丁  
搗汁服三合并塗之日二上 聖濟總錄

腫 說曰危困者用蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服  
一升日三服拔根甚驗 養生方用蒼耳根苗燒

灰和醋塗之乾再上不止十次即拔根出邵真人方蒼耳根三兩半烏梅肉五箇連鬚葱三根酒二鍾

煎一鍾熱齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入纒喉風服取汗

病蒼耳根一把老薑一塊研赤目生瘡作痛道人頭汁入酒服聖濟總錄末二兩乳香

一錢每用一錢燒烟鼻衄不止蒼耳莖葉搗汁一五

痔下血五月五日采蒼耳莖葉為末赤白下痢蒼耳水服方寸匕甚效千金翼赤白下痢草不

拘多少洗淨用水煮爛去滓入蜜用武火熬成膏每服一二匙白湯下醫方摘玄產後諸痢

蒼耳葉搗絞汁溫服半中誤吞銅錢蒼耳頭一把以蓋日三四服聖惠方

十餘度飲水花蜘蛛毒咬人與毒蛇無異用野繚絲愈肘后方即道人頭搗汁一盞服仍以

渣傳之  
摘玄方

花主治白癩頑瘡

時珍

天名精

本經上品

校正

時珍曰據蘇沈二說併入唐本  
鶴虱開寶地菰別錄有名未用

松莖

釋名天蔓菁

別錄

天門精

別錄

地菰

唐本

松莖

別錄

玉門

精別錄麥句薑

本經

蟾蜍蘭

別錄

蜚蠊藍

本經

蚶蚶草

綱目

豕首

本經菟頤

別錄

活鹿草

異苑

劉愷草

愷音胡

鰕面草

綱目

母豬

芥綱目實名鶴虱根名杜牛膝

恭曰

天名精即活鹿草也別錄一名天蔓菁南



人名為地菰葉與蔓菁菰菜相類故有此名其味甘  
辛故有薑稱狀如薑而豎蔓好居其下故名豎蔓藍  
香氣似蘭故又名蟾蜍蘭時珍曰天名精乃天蔓菁  
之訛也其氣如豕氣故有豕首能顛之名昔人謂之  
活鹿草俗人因其氣臊訛為狐狸臊者是也爾雅云  
莢甄豕首也郭璞注云江東呼為豨首可以燭蠹蝨  
食藏器曰郭璞注爾雅蓬麥云即麥句薑者非也陶  
公注釣樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菰人  
呼為劉慳草主金瘡按異苑云宋元嘉中青州劉慳  
射一麋剖五臟以此草塞之蹶然而起慳怪而拔草  
便倒如此三度慳因密錄此草種之主折傷愈多人  
因以名之既有活鹿之名雅與麋字相合陶蘇俱說  
是地菰定  
非二物

正誤

弘景曰天名精即今之豨薺亦名豨首夏月杵  
汁服之除熱病味至苦而云甘或非是也恭曰

狶首苦而臭名精辛而香全不相類也禹錫曰蘇恭云天名精南人名地菰陳藏器本草解紛亦言天名精為地菰開寶本草不當重出地菰條例宜刊削時珍曰按沈括筆談云世人既不識天名精又妄認地菰為火秋本草又出鶴虱一條都成紛亂不知地菰即天名精其葉似菰又似蔓菁故有二名鶴虱即其實也又別錄有名未用莖菰即此地菰亦係誤出今並正之合而為一

集解

別錄曰天名精生平原川澤五月采保昇曰地菰也小品方名天蔓菁又名天蕪精葉似山南

菰菜夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而香志曰地菰所在皆有生人家及路旁陰處高二三寸葉似菰葉而小又曰鶴虱出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄于波斯者恭曰鶴虱生西戎子似蓬蒿子而細合莖葉用之頌曰天名精江湖間皆有之狀如韓保昇所說又曰鶴虱江淮衡湘皆有之春生苗葉皺似

紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似  
菊八月結實子極尖細乾即黃黑色南人呼其葉為  
火欬按火欬即稀簽雖花實相類而別是一物不可  
雜用時珍曰天名精嫩苗綠色似鰕葉菰芥微有狐  
氣淘淨焯之亦可食長則起莖開小黃花如小野菊  
花結實如同蒿子亦相似最黏人衣狐氣尤甚炒熟  
則香故諸家皆云辛而香亦巴人食負釐南人食山  
禁之意爾其根白色如短牛膝此物最賤而唐本草  
言鶴虱出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋當時人  
不知用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾  
亦首菰云出西域而不知中國  
飼馬者即是也詳見稀簽下

葉根氣味甘寒無毒

別錄曰莖菰辛無毒時珍曰微  
辛甘有小毒生汁吐人之才曰

垣衣地黃  
為之使

主治瘀血血瘕欲死下血止血利小便久

服輕身耐老

本經

除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴逐

水大吐下

別錄

破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫丁

瘡癰痔金瘡內射身瘡癰癰不止者指之立已

唐本

菰主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之開吐痰止

瘡治牙痛口緊喉痺

時珍

松主眩痺

別錄有  
名未用

發明

時珍曰天名精併根苗而言也地菰松皆言其苗葉也鶴虱言其子也其功大抵只是吐痰

止血殺蟲解毒故搗汁服之能止痰瘧救之止牙疼

接之傅蛇咬亦治豬瘟病也按孫天仁集效方云凡男婦乳蛾喉腫痛及小兒急慢驚風牙關緊急不省人事者以鶴虱草一名鰕面草一名母猪芥一名

杜牛膝取根洗淨搗爛入好酒絞汁灌之良久即甦  
仍以渣傳項下或醋調搽亦妙朱端章集驗方云余  
被檄任淮西幕府時牙疼大作一刀鐮人以草藥一  
捻湯泡少時以手蘸湯挹痛處即定因求其方用之  
治人多效乃皺面地菰草也俗人訛為地葱沈存中  
筆談專辯地菰其子名鶴虱正此物也錢季誠方用  
鶴虱一枚擢置齒中高監方以鶴虱煎米醋漱口或  
用防風鶴虱煎水噙漱仍研草塞痛處皆有效也

附方

新舊二

男女吐血

一皺面草即地菰晒乾為末每服  
一二錢以茅花沱湯調服日二

次

衛生

咽喉腫塞

傷寒蘊要治疾涎壅滯喉腫水不  
可下者地菰一名鶴虱草連根葉

搗汁

鷺鴒

銅掃

入去

痰最妙

聖濟總錄

用杜牛膝

鼓

起草

同搗汁

灌之

不得下者

灌鼻得吐為妙

又方

土牛膝

春夏用莖

秋冬用根

一把青礬

經喉

風腫

蚘

半兩同研

點患處

令吐膿血

痰沫即愈

經喉

風腫

蚘

草即皺面草細研以生蜜和九彈子大每噙一二九即愈乾者為末蜜丸亦可名救生丸經效濟世丸

諸骨哽咽

地菰馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白礬一錢搗作彈丸綿裹含嚥其骨自軟而

下也

普濟方

風毒瘰癧

赤腫地菰搗傳乾

聖惠方

疔瘡腫毒

鶴虱草葉

浮酒糟

同搗傳之立

發背初起

地菰杵汁一升日再

服瘡乃止傷寒類

要

惡瘡腫毒

地菰搗汁

日服三

惡蛇咬傷

地菰搗傳

方

鶴虱

唐本草

氣味苦辛有小毒

大明曰

主治虻螭蟲為

散以肥肉臠汁服方寸匕亦入丸散用

唐本

蟲心痛以

淡醋和半匕服立瘥開殺五臟蟲止瘡傳惡瘡大明

發明

頌曰鶴虱殺蟲方中為最要藥初虞世古今錄驗方療蛇咬心痛取鶴虱十兩搗篩蜜丸梧子

大以蜜湯空腹吞四五十丸忌酒肉韋雲惠心痛十年不瘥于雜方內合服之便愈李絳兵部手集方治小兒蛇虫噉心腹痛亦單用鶴虱研末以肥猪肉汁下之五歲一服二分虫出即止也

附方

新大腸蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調半兩服自愈怪疾奇方

稀莧

音喜秋唐本

校正

併入唐本猪膏母

釋名希仙

綱目

火杵草

唐本

猪膏母

唐本

虎膏

唐本

狗膏

唐本

粘

糊菜

救荒時珍曰韻書楚人呼猪為狶呼草之氣味辛毒為莧此草氣臭如猪而味莧整故謂之狶

發猪膏虎膏狗膏皆因其氣似及治虎狗傷也火杓當作虎發俗音訛爾近人復訛稀發為希仙矣救荒本草言其嫩苗焯熟浸去苦味

油鹽調食故俗謂之粘糊菜

集解

恭曰稀發田野皆食之一名火杓葉似酸漿而狹長花黃白色三月四月采苗葉暴乾又曰猪

膏母生平澤下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏葉似蒼耳莖圓有毛頌曰稀發處處有之春生苗葉似芥葉而狹長文粗莖高二三尺秋初有花如菊結實頗似鶴虱夏采葉暴乾用藏器曰猪膏草葉似荏有毛條昇曰猪膏葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月采苗日乾時珍曰按蘇恭唐本草謂稀發似酸漿猪膏母似蒼耳列為二種而成納進稀發丸表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠稀發丸表言此草金枝銀線素莖紫莖對節而生蜀號火杓莖葉頗同蒼耳又按沈



括筆談云世人妄認地菘為火杓有單服火杓法者  
乃是地菘不當用火杓火杓乃本草名豬膏母者後  
人不識重複出條也按此數說各異而今人風痺多  
用豬簽九將何適從耶時珍常聚諸草訂視則豬膏  
草素莖有直稜兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘  
而稍薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數  
十八九月開小花深黃色中有長子如同蒿子外萼  
有細刺粘人地菘則青莖圓而無稜無斑無毛葉皺  
似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所說相合  
今河南陳州采豬簽充方物其狀亦是豬膏草則沈  
氏謂豬簽即豬膏母者其說無疑矣蘇恭所謂似酸  
漿者乃龍葵非豬簽蓋誤認爾但沈氏言世間單服  
火杓乃是地菘不當用豬膏母似與成張之說相反  
今按豬簽豬膏母除並無治風之說惟本經地菘條  
有去痺除熱久服輕身耐老之語則治風似當用地  
菘然成張進御之方必無虛謬之理或者二草皆有

治風之功乎而今服豬膏母之豨薺者復往往有效其地菰不見有服之者則豨薺之為豬膏尤不必疑矣

豨薺氣味苦寒有小毒又曰豬膏母辛苦平無毒

藏器

曰有小毒蘇恭曰豬膏無毒誤矣

主治豨薺治熱蠱煩滿不能食生搗汁三合服多則令人吐又曰豬膏母主金瘡止痛斷血生肉除諸惡

瘡消浮腫搗封之湯漬散傳並良

蘇恭

主久瘡痰癰搗

汁服取吐搗傳虎傷狗咬蜘蛛咬蠱咬蠍蝮瘡

藏器

治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕諸瘡

時珍

發明

頌曰蜀人單服豨薟法五月五日六月六日九月九日采葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層

層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極香美熬搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝腎風氣四肢麻痺骨間冷腰痛無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與唐本同惟文州及高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼主風濕瘡飢肉頑痺婦人久冷尤宜用須去粗莖留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉則寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而然歟時珍曰生搗汁服則令人吐故云有小毒九蒸九暴則補人去痺故云無毒生則性寒熟則性溫云熱者非也慎微曰按江陵府節度使成訥進豨薟丸方表略云臣有弟訢年二十一中風伏枕五年百醫不瘥有道人鍾針因覩此

患曰可餌稀發丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水洗去泥土摘葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但以取足為度仍熬搗為末煉蜜丸如梧子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患愈如不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復至五千丸當復丁壯臣依法修合令訐服之果如其言服後須喫飯三五匙壓之五月五日采者佳奉勅宣付醫院詳錄又知益州張詠進稀發丸表畧云切以餐石飲水可作充腸之饌餌松含柏亦成救病之功是以療飢者不在于羞珍愈病者何煩於異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不恥管窺輒干天聽臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問采覓其草頗有異金稜銀線素莖紫莖對節而生蜀號火杓莖葉頗同蒼耳不貴登高歷險每常求少獲多急采非難廣收甚易倘勤久服旋見神功誰知

至賤之中乃有殊常之效臣自服至百服眼目清明  
即至千服髭鬚烏黑筋力輕健效驗多端臣本州有  
都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服  
其病立瘥又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎斜  
時時吐涎臣與十服亦便得痊  
今合一百劑差職貢史元奏進

附方

新風寒

泄瀉

火枚九

治風氣

行于腸胃

泄瀉火

枚草為末

醋糊丸梧子大每服三

十九白湯下

癰疽腫毒

一切惡瘡

稀莨草端

午采者

一兩乳香一兩白礬

燒半兩

兩

為末每服二錢

熱酒調下

毒重者

發背

丁瘡

稀莨草

連進三服得汗妙

五葉草

即五爪龍野紅花

即小薊大蒜

等分

搗爛入

酒一盞絞汁服得汗立效

乾坤生意

丁瘡腫

毒

端午采

稀莨草

日乾為末

每服半兩

熱酒調下

汗出即愈極有效驗

集簡方

反胃吐食

大炊草焙為末蜜九梧子大每沸湯下五十丸百一選方

附錄類鼻

別錄有名未用曰味酸溫無毒主痿痺生田中高地葉如天名精莢根五月采時珍

曰此似豬膏草也古今羊屎柴時珍曰按乾坤生意名謂或不同故附于此云一名牛屎柴生山

野中葉類鶴虱四月開白花其葉主癰疽發背搗傳之冬月用根可以毒魚

箸

綱目

釋名弱

與箸同 蔡葉 時珍曰若若竹而弱故名其生疎遼故又謂之遼

集解

時珍曰箸生南方平澤其根與莖皆似小竹其節與葉皆似蘆荻而葉之面青背淡柔而勒

新舊相代四時常青南人取葉作笠及裹茶鹽包米糲女人以襯襪底

葉氣味甘寒無毒主治男女吐血衄血嘔血咯血下

血並燒存性溫湯服一錢七又通小便利肺氣喉痺

消癰腫

時珍

附方

新十二

一切眼疾

龍翳燒灰淋

汁洗之

經驗方

咽喉閉痛

蒼葉燈心草燒灰等分

吹之甚妙

耳忽作痛

或紅腫內脹將經霜青葉露在外將

朽者燒存性為末

傳入耳中

肺壅鼻衄

若葉燒灰白麩三錢研勻

井花水服二錢

經血不止

箬葉灰蠶紙灰等分為末每服二錢米飲下

總錄腸風便血

茶萸肉箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下或入麝香少許王璆百一選

方男婦血淋

亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳每用七箇燒存性入麝

香少許陳米飲下日三服有人患此二尿白如注小腹愈福建煮過夏月酒多有之百一選

氣痛茶籠內箬葉燒存性入小便澀滯不通乾箬葉麝香少許米飲下經驗方小便澀滯一兩燒灰滑

石半兩為末每米飲男婦轉脬上方同吹奶乳癰五月服三錢普濟方

稜筭燒灰酒服二錢即痘瘡倒靨箬葉灰一錢麝香散累效濟急仙方少許酒服張德

恭痘疹便覽方

蘆

別錄下品

校正

併入拾遺江中采出蘆

釋名葦

音葦葦音加花名蓬農木筍名蘆音葦時珍曰按



之初生曰葭未秀曰蘆長成曰葦葦者偉大也蘆者色蘆黑也葭者嘉美也

集解

恭曰蘆根生下濕地莖葉似竹花若荻花名蓬蘆二月八月采根日乾用頌曰今在處有之生

下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎其根取水底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用按郭璞注爾雅云葭即蘆也葦即蘆之成者莢薹似葦而小中實江東呼為烏蘆音或謂之藁即荻也至秋堅成即謂之萑音桓兼似萑而細長高數尺江東謂之蒹其花皆名芳音調其萌皆名葑堪食如竹笋若然則蘆葦通為一物也所謂蒹乃今作蘆者是也所謂莢者今以當薪者是也而人罕能別蒹莢與蘆葦也又北人以葦與蘆為二物水旁下濕所生者皆名葦其細不及指大人家池園所植者皆名蘆其幹差大深碧色者亦難得然則蘆葦皆可通用矣時珍曰蘆有數種其

長丈許中空皮薄色白者葭也蘆也葦也短小者葦而中空皮厚色青蒼者蒹也藋也藋也藋也其最短小而中實者兼也蘆也皆以初生已成得名其身皆如竹其葉皆長如箬葉其根入藥性味皆同其未解葉者古謂之紫箬數曰蘆根須要逆水生并黃泡肥厚者去鬚節并赤黃皮用

根氣味甘寒無毒主治消渴客熱止小便利別錄療反

胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內熱彌良蘇恭解大熱開

胃治噎噦不止甄權寒熱時疾煩悶瀉痢人渴孕婦心

熱大明

筍氣味小苦冷無毒寧宗曰主治膈間客熱止渴利

小便解河豚及諸魚蟹毒

甯原

解諸肉毒

時珍

發明

時珍曰按雷公炮炙論序云益食加觴須煎蘆朴注云用逆水蘆根并厚朴二味等分煎湯服

益蘆根甘能益胃

寒能降火故也

附方

舊六新六

骨蒸肺痿

不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩

橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升去滓分五服取汗乃瘥

外臺秘要

勞復食復

欲死並以

蘆根煮濃汁

飲肘后方嘔噦不止

厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升必效若以童子

小便煮服不過三升愈

肘后方五噎吐逆

心膈氣滯煩悶不下食蘆根五兩剉以水三大

盞煮取二盞去滓溫服

金匱玉函方反胃上氣

蘆根茅根各二兩水四升煮二升分服

千金霍亂煩悶蘆根三錢麥門冬一錢水煎服千金方霍亂脹痛蘆根一升

生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分服太平聖惠方食狗肉毒心下堅或腹脹口乾忽發

熱妄語蘆根煮汁服梅師方中馬肉毒方同上鯀鯀魚毒方同上千金

食蟹中毒方同上千金中藥箭毒方同上千金

莖葉氣味甘寒無毒主治霍亂嘔逆肺癰煩熱癰疽

燒灰淋汁煎膏蝕惡肉去黑子時珍治金瘡生肉滅

癰徐之才江中采出蘆令夫婦和同用之有法藏器

發明時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水不強火不盛也蘆中空虛故能入心肺治上焦

熱虛

附方

新

霍亂煩渴

腹脹蘆葉一握水煎服

又方蘆

煎入薑汁蜜各半合煎兩

吐血不止

蘆荻外皮燒灰

沸時時呷之

聖惠方

肺癰欬嗽

煩滿微熱

二錢三服可救一人

葦莖湯用葦莖切二升水二斗煮汁五升入桃仁五

十枚薏苡仁瓜瓣各半升煮取二升服當吐出膿血

而愈

張仲景

發背潰爛

陳蘆葉為末以葱椒湯洗

金匱玉函方

淨傳之神效

乾坤秘韞

癰疽惡肉

白炭灰白荻灰等分煎膏塗之蝕盡惡肉

日久則不效

葛洪肘后方

小兒禿瘡

以鹽湯洗淨蒲葦灰

蓬蘽氣味甘寒無毒主治霍亂水煮濃汁服大驗

蘇恭

煮汁服解中魚蟹毒

蘇頌

燒灰吹鼻止衄血亦入崩中

藥

時珍

附方

新

乾霍亂病

心腹脹痛蘆蓬葦一升

水煮

諸般

血病

水蘆花紅花槐花白雞冠花茅花等分水二鍾煎一鍾服萬表積善堂方

甘蕉

別錄下品

釋名芭蕉

衍義

天苴

史記注

芭苴

時珍曰

按陸佃埤雅云

蕉不落葉一葉舒則一

葉焦故謂之蕉俗謂乾物為巴巴亦蕉意也稽聖賦云竹布實而根苦蕉舒花而株稿芭苴乃蕉之音轉

也蜀人謂之天苴曹叔雅異物志云芭蕉結實其皮  
赤如火其肉甜如蜜四五枚可飽人而滋味常在牙  
齒間故名甘蔗

集解

弘景曰甘蔗本出廣州今江東並有根葉無異  
惟子不堪食耳恭曰甘蔗出嶺南者子大味甘

北間者但有花無實頌曰今二廣閩中川蜀皆有而  
閩廣者實極甘美可啖他處雖多而作花者亦少近  
時中州種之甚盛皆芭蕉也其類亦多有子者名甘  
蕉卷心中抽幹作花初生大莖似倒垂莖莖有十數  
層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬  
謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故  
謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多最甘美曝  
乾可寄遠北土得之以為珍果其莖解散如絲閩人  
以灰湯練治紡績為布謂之蕉葛宗奭曰芭蕉三年  
已上即有花自心中抽出一莖止一花全如蓮花瓣

亦相似但色微黃綠中心無蕊悉是花葉也花頭常  
下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開  
則三葉脫落也時珍曰按萬震南州異物志云甘蕉  
即芭蕉乃草類也望之如樹株大者一圍餘葉長丈  
許廣尺餘至一尺其莖虛軟如芋皆重皮相裹根如  
芋魁青色大者如車轂花着莖末大如酒盃形色如  
蓮花子各為房實隨花長每花一闔各有六子先後  
相次子不俱生花不俱落也蕉子凡三種未熟時皆  
苦澀熟時皆甜而脆味如葡萄可以療飢一種子大  
如拇指長六七寸銳似羊角兩兩相抱者名羊角蕉  
剝其皮黃白色味最甘美一種子大如雞卵有類牛  
乳者名牛乳蕉味微減一種子大如蓮子長四五寸  
形正方者味最弱也並可蜜藏為果又顧玠海槎錄  
云海南芭蕉常年開花結實有二種板蕉大而味淡  
佛手蕉小而味甜通呼為蕉子不似江南者花而不  
實又范成大虞衡志云南中芭蕉有數種極大者凌



冬不凋中抽一條長數尺節節有花花褪葉根有實  
去皮取肉軟爛如綠柿味極甘冷四季恒實土人以  
餉小兒云去客熱謂之蕉子又名牛蕉子以梅汁漬  
曝壓扁味甘酸有微霜名芭蕉乾一種雞子蕉小于  
牛蕉亦四季實一種紅蕉葉瘦類蘆荻花色正紅如榴  
花日折一兩葉其中有一點鮮綠可愛春開至秋盡  
猶芳俗名美人蕉一種膽瓶蕉根出土時肥飽狀如  
膽瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀  
惟種芭蕉椰子取實代糧也

氣味甘大寒無毒

恭曰性冷不益人多食動冷氣

主治生食止渴潤

肺蒸熟晒裂舂取仁食通血脉填骨髓

孟詵

生食破血

合金瘡解酒毒乾者解肌熱煩渴

吳瑞

除小兒客熱壓

丹石毒

時珍

根氣味甘大寒無毒

恭曰寒頌曰甘蕉芭蕉性相同也

主治癰腫結

熱

別錄

搗爛傳腫去熱毒搗汁服治產後血脹悶

蘇恭

黃疸

孟詵

治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發動

躁熱口乾並絞汁服之又治頭風遊風

大明

附方

舊四新六

發背欲死

芭蕉根搗爛塗之肘后方

一切腫毒

方同上

赤遊風癰

方同上

風熱頭痛

方同上

風蟲牙痛

芭蕉自然汁一椀煎

熱含嗽普濟方

天行熱狂

芭蕉根搗汁飲之日華子本草

消渴飲水

骨節

煩熱用生芭蕉根搗汁血淋澀痛芭蕉根旱蓮草各時飲一二合聖惠方

聖惠方產後血脹搗芭蕉根絞汁溫服二三合瘡口不合芭蕉根取汁抹之良

指方直

蕉油以竹筒挿入皮中取出瓶盛之氣味甘冷無毒主治頭風熱止

煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明暗風

癰病涎作運悶欲倒者飲之取吐有奇效蘇頌

附方新小兒截驚以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顙門塗四肢留手足心勿塗甚效

峰雜興

葉主治腫毒初發研末和生薑汁塗之

時珍聖惠方

附方

新

岐毒初起

芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日二上或消或破皆無

痕也

仁

齋直指方

花主治心痺痛燒存性研鹽湯點服二錢

日華

藁荷

別錄中品

校正

自菜部移入此併入有名未用藁草為一

釋名覆莖

別錄

藁草

別錄

獐苴

音博

苴

說文

嘉草

弘景曰本

草白藁荷

而今人呼赤者為藁荷白者為覆苴蓋食以赤者為勝入藥以白者為良葉同一種爾時珍曰覆苴許氏說文作藁苴司馬相如上林賦作獐苴與芭蕉音相近離騷大招云醯豚若狗膾苴蓴王逸注云苴蓴音

博囊荷也見本草而今之本草無之則脫漏亦多矣

集解

別錄曰囊草生淮南山谷頌曰囊荷荆襄江湖間多種之北地亦有春初生葉似甘蕉根似薑

牙而肥其葉冬枯根堪為殖其性好陰在木下生者尤美潘岳閑居賦云囊荷依陰時藿向陽是也宗慄荆楚歲時記云仲冬以鹽藏囊荷用備冬儲又以防蟲吏游急就篇云囊荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪噉及作梅果多用之宗奭曰囊荷八九月間淹貯以脩冬月作蔬果治病止用白者時珍曰蘇頌圖經言荆襄江湖多種今訪之無復識者惟楊慎丹鉛錄云急就章註囊荷即今甘露考之本草形性相同甘露即芭蕉也崔豹古今註云囊荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云囊荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤

耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根為蘗亦可蓄藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

修治

數曰凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥澀凡位白蘘荷以銅刀刮去粗皮一重細切入砂

盆中研

如膏取自然汁鍊作煎新器攤冷如乾膠狀刮取用之

根氣味辛溫有小毒

思邈曰辛微溫瀉無毒

主治中蠱及瘡痔

汁服

別錄

溪毒沙蟲蛇毒弘景諸惡瘡根心主稻麥芒入

目中不出以汁注目即出

蘇恭

赤眼澀痛搗汁點之

時珍

蘘草氣味苦甘寒無毒

大明

主治溫瘡寒熱酸嘶邪

氣辟不祥

別錄

發明

弘景曰中蠱者服蘘荷汁并臥其葉即呼蠱主姓名多食損藥力又不利脚人家種之亦云辟

蛇頌曰按于寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家客以蘘荷置于席下忽大笑曰蠱我者張小小也乃收小小小小亡走自此解蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗慄謂嘉草即蘘荷是也陳藏器云蘘荷苗根為主蠱之最謂此時珍曰別錄菜部蘘荷謂根也草部蘘草謂葉也其主治亦頗相近今併為一云

附方

舊八

新一中蠱毒

下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以蘘荷葉密置病人

席下勿令知之必自呼喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦主姓名也梅師方喉中似物瘦取白蘘荷根搗

汁服鹽立出喉舌瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其吐也梅師方

血痔血

向東蘘荷根一把搗汁三升服之肘后方婦人腰痛上方同月信

澀滯

蘘荷根細切水煎取二升風冷失聲咽喉不利空入酒和服經驗方

兩搗絞汁入酒一大盞和傷寒時氣溫病初得頭痛

生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升肘后方雜物入目白蘘荷根取心搗絞汁服三四升肘后方

濟方普

麻黃

本經中品

釋名龍沙

本經卑相別錄卑鹽別錄時珍曰諸名殊不可解或云其味麻其色黃未



審然否張揖廣雅云龍沙麻黃也狗  
骨麻黃根也不知何以分別如此

集解

別錄曰麻黃生晉地及河東立秋采莖陰乾今  
青弘景曰今出青州彭城滎陽中牟者為勝色

青而多沫蜀中亦有不好恭曰鄭州鹿臺及閩中沙  
苑河旁沙洲上最多同州沙苑亦多其青徐者亦不  
復用禹錫曰按段成式酉陽雜俎云麻黃莖頭開花花  
小而黃叢生子如覆盆子可食頌曰今近汴京多有  
之以滎陽中牟者為勝春生苗至夏五月則長及一  
尺以來稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢  
子味甜微有麻黃氣外皮紅裏仁子黑根紫赤色俗  
說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月結子  
雄者無花不結子至立秋後收莖陰  
乾時珍曰其根皮色黃赤長者近尺

附錄雲花子

時珍曰按葛洪肘后方治馬疥有  
雲花草云狀如麻黃而中堅實也

莖修治

弘景曰用之折去節根水煮十餘沸以竹片掠去上沫沫令人煩根節能止汗故也

氣味苦溫無毒

別錄曰微溫普曰神農雷公苦無毒扁鵲酸李當之平權曰甘平元素曰

性溫味苦而甘辛氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明時珍曰麻黃微苦而辛性熱而輕揚僧繼洪云中牟有麻黃之地冬不積雪為泄內陽也故過用則洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黃藥須避風一日不爾病復作也凡用須佐以黃芩則無赤眼之患之才曰厚朴白微為之使惡辛夷石韋

主治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬

逆上氣除寒熱破癥堅積聚

經本

五臟邪氣緩急風脅

痛字乳餘疾止好唾通腠理解肌洩邪惡氣消赤黑

斑毒不可多服令人虛

別錄

治身上毒風癰痺皮肉不

仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣

甄權

通九竅調血脉開毛孔

皮膚

大明

去榮中寒邪洩衛中風熱

元素

散赤目腫痛水

腫風腫產後血滯

時珍

發明

弘景曰麻黃療傷寒解肌第一藥頌曰張仲景治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青龍湯皆用

麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也  
杲曰輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之邪客于陽分皮毛之間腠理閉拒榮衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之麻黃微苦其形

中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣不可不禁好古曰麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥二物雖為太陽證藥其實榮衛藥也心主榮為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃桂枝即湯液之源也時珍曰麻黃乃肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解釋皆隨文傳會未有究其精微者時珍常釋思之似有一得與昔人所解不同云津液為汗汗即血也在榮則為血在衛則為汗夫寒傷榮榮血內濇不能外通于衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒夫風傷衛衛氣外泄不能內護于榮榮氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主

衛氣包羅一身天之象也是證雖屬乎太陽而肺實受邪氣其證時兼面赤悒鬱欬嗽有痰喘而胸滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻而肺氣膈鬱故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱肱活人書夏至後加石膏知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾泄東所以補西也使以薑棗行脾之津液而和營衛也下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加人參以益肺氣也朱肱加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實為理脾救脾之藥也比千古未發之秘旨愚因表而出之又少陰病發熱脉沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯

少陰與太陽為表裏乃趙嗣其所謂熟附配麻黃補中有發也一錦衣夏月飲酒達旦病水泄數日不止水穀直出服分利消導升提諸藥則反劇時珍診之脉浮而緩大腸下弩復發痔血此因肉食生冷茶水過雜抑遏陽氣在下木盛土衰素問所謂久風成殭泄也法當升之揚之遂以小續命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後脉沉遲手足厥逆咽喉不利唾膿血泄利不止者用麻黃湯平其肝肺兼升發之即斯理也神而明之此類是也

附方

舊五  
新七

天行熱病

初起一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去

滓着米一匙及豉為稀粥先以湯浴後傷寒雪煎黃乃食粥厚覆取汗即愈孟詵必用方  
十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十二兩先以雪水五石四斗漬麻黃于東向鼃釜中三宿後納大

黃攪勻桑新煮至二石去滓納杏仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成九如彈子大有病者以沸白湯五合研一九服之立汗出不愈再服一九封藥勿令洩氣 千金

### 方傷寒黃疸

表熱者麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹美酒五升煮取半升頓服取小

汗春月用水煮 千金方

裏水黃腫

張仲景云一身面目黃腫其脈沉小便利甘草麻黃湯

主之麻黃四兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不汗再服慎風寒 千金云

有患氣急久不瘥變成水病從腰以上腫者宜以此發汗水腫脈沉

屬少陰其脈浮者為氣虛

脹者為氣皆非水也麻黃附子湯汗之麻黃三兩水七升煮去沫入甘草二兩附子炮一枚煮取二升半

每服八分日三服取汗 張仲景金匱要略

風痺冷痛

麻黃去根五兩桂心二兩為末酒二

升慢火熬如飴每服一匙熱酒調小兒慢脾風因吐下至汗出為度避風聖惠方泄後而

成麻黃長五寸十箇去節白朮指面大二塊全燉二箇生薄荷葉包煨為末二歲以下一字三歲以上半

錢薄荷湯下尸咽痛痺語聲不出麻黃以青布裹聖惠方產

後腹痛及血下不盡麻黃去節為末酒服方寸匕心一日二三服血下盡即止子母秘錄

下悸病半夏麻黃九用半夏麻黃等分末之煉蜜九小豆大每飲服三九日三服金匱要略

痘瘡倒靨寇宗奭曰鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎數沸去沫再煎去

三分之一去滓乘熱服之避風其瘡復出也一法用無灰酒煎其效更速仙源縣筆工李用之子病斑瘡

風寒倒靨已困用中風諸病麻黃一秤去根以王桐此一服便出如神日乙卯日取東流水三



石三斗以淨鐺盛五七斗先煮五沸掠去沫逐旋添水盡至三五斗漉去麻黃澄定漉去滓取清再熬至一斗再澄再漉取汁再熬至升半為度密封收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熱時要勤攪勿令着底恐焦了仍忌雞犬陰人見之此劉守真秘方也 宣明方

根節氣味甘平無毒主治止汗夏月雜粉撲之

景弘

發明

權曰麻黃根節止汗以故竹扇杆末同撲之又牡蠣粉粟粉并麻黃根等分為末生絹袋盛貯

盜汗出即撲手摩之時珍曰麻黃發汗之氣駛不能禦而根節止汗效如影響物理之妙不可測度如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痙諸證皆可隨證加而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其性能行周身肌表故能引諸藥外至衛分而固膜理也本草但知撲之

之法而不知服餌之功尤良也

附方

新

盜汗陰汗

麻黃根牡蠣粉為末撲之

盜汗不止

麻黃根椒目等分為

末每服一錢無灰酒下外以麻黃根故蒲扇為末撲之

奇效良方

小兒盜汗

麻黃根三分故

蒲扇灰一分為末以乳服三分日服三仍以乾薑三分同為末三分撲之

古今錄驗

諸虛自

汗

夜卧即甚久則枯瘦黃芪麻黃根各一兩牡蠣米泔浸洗煨過為散每服五錢水二盞小麥百粒煎

服局方

和虛汗無度

麻黃根黃芪等分為末飛麴糊作丸梧子大每用浮麥湯下百丸以

止為度

談

產後虛汗

黃芪當歸各一兩麻黃根二兩每服一兩煎湯下

陰

囊濕瘡

腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩內外障翳黃西米粉一合為末傅之千金方

根一兩當歸身一錢同炒黑色入麝香少許為末  
嚙鼻頻用此南京相國寺東黑狹兒方也 晉濟

木賊

宋嘉祐

釋名

時珍曰此草有節而撻澀治木骨者  
用之磋擦則光淨猶云木之賊也

集解

禹錫曰木賊出秦隴華成諸郡近水地苗長尺  
許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青凌冬

不凋四月采之頌曰所在近水地有之采無時今用  
甚多時珍曰叢叢直上長者二三尺狀似鳬茈苗及

惊心草而中空有節又似

麻黃莖而稍粗無枝葉

莖氣味甘微苦無毒

時珍曰溫

主治目疾退翳膜消積塊

益肝膽療腸風止痢及婦人月水不斷崩中赤白

嘉祐

解肌止淚止血去風濕疰痛大腸脫肛

時珍

發明

禹錫曰木賊得牛角腮麝香治休息久痢得禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白得槐蛾桑耳治腸

風下血得槐子枳實治痔疾出血震亨曰木賊去節烘過發汗至易本草不曾言及時珍曰木賊氣溫味微甘苦中空而輕陽中之陰升也浮也與麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散火鬱風濕治眼目諸血疾也

附方

舊三新九

目昏多淚

木賊去節蒼朮甘浸各一兩為末每服二錢茶調下或蜜丸亦

可急喉痺塞

木賊以牛糞火燒存性每冷水服一錢血出即安也

聖惠方古硬出

血

木賊煎水漱之即止

聖惠方血痢不止

木賊五錢水煎溫服一日一服

聖惠方瀉

血不止

方同上

日二

腸痔下血

多年不止用木賊枳殼各二兩乾薑一兩

大黃二錢半並于銚內炒黑存性為末每粟米飲服二錢甚效也蘇頌圖經本草大腸脫肛

木賊燒存性為末摻之按入婦人血崩忍遠年近日即止一加龍骨三因方

不瘥者雷氏木賊散主之木賊一兩香附子一兩朴硝半兩為末每服三錢色黑者酒一盞煎紅赤者水

一盞煎和滓服日二服臍下痛者加乳香沒藥當歸各一錢同煎忌生冷硬物猪魚油膩酒麪醫壘元

戒月水不斷

木賊炒三錢水一盞煎七分溫服日一服聖惠方胎動不安木賊

去節川芎等分為末每服三錢水一小腸疝氣木賊

益入金銀一錢煎服聖濟總錄微炒為末沸湯點服二錢緩服取效誤吞銅錢木賊

一方用熱酒下寇氏本草衍義為末

難子白調服一  
錢聖惠方

附錄問荊藏器曰味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮汁服之生伊沒洲渚間苗如木賊節

節相接一  
名接續草

石龍芻

本經上品

釋名龍鬚

本經龍修山海經

龍華別錄龍珠

本經懸莞別錄草續

斷經縉雲草

綱目方賓別錄西王母簪

時珍曰川草色束日芻此草生水石

之處可以刈束養馬故謂之龍芻述異記周穆王東海島中養八駿處有草名龍芻是矣故古語云一束龍芻化為龍駒亦孟子芻豢之義龍鬚王母簪因形也縉雲縣名屬今處州仙都山產此草因以名之崔

豹古今注云世言黃帝乘龍上天羣臣攀龍鬚墜地生草名曰龍鬚者謬也江東以草織席名西王母席亦豈西王母騎虎而墮其鬚乎

集解

別錄曰石龍芻生梁州山谷濕地五月七月采

莖暴乾以九節多珠者良弘景莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾藏器曰今出汾州沁州石州亦處處有之保昇曰叢生莖如綫所在有之俗名龍鬚草可為席八月九月采根暴乾時珍曰龍鬚叢生狀如棕心草及鳧茈苗直上夏月莖端開小穗花結細實並無枝葉今吳人多栽時織席他處自生者不多也本經明言龍芻一名龍鬚而陶弘景言龍芻似龍鬚但多節似以為二物者非矣

莖氣味苦微寒無毒

別錄曰微溫

主治心腹邪氣小便不

利淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明

延年

本經

補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱

痛療虻蟲腫不消食

別錄

敗席主治淋及小便卒不通彌敗有垢者方尺煮汁

服之

藏器

龍常草

別錄有名未用

釋名粽心草

時珍曰俚俗五月采繫角黍之心呼為粽心草是也

集解

別錄曰生河水旁狀如龍芻冬夏生時珍曰按爾雅云萍鼠茺也鄭樵解為龍芻郭璞云纖細



似龍鬚可為席蜀中出者好恐即此龍常也  
蓋是龍鬚之小者爾故其功用亦相近云

莖氣味鹹溫無毒主治輕身益陰氣療痺寒濕別錄

燈心草

宋開寶

釋名虎鬚草

綱目

碧玉草

綱目

集解

志曰燈心草生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席宗奭曰陝西亦有之蒸熟待乾折取

中心白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者但生乾剝取為生草入藥宜用生草時珍曰此即龍鬚之類但

龍鬚緊小而瓢實此草稍粗而瓢虛白吳人栽蒔之取瓢為燈炷以草織席及蓑他處野生者不多外丹

家以之伏硫砂雷公炮炙論序云硃遇赤鬚永留金鼎注云赤鬚亦呼虎鬚草煮硃能住火不知即此虎

鬚否也

莖及根修治

時珍曰燈心難研以粳米粉漿染過晒乾研末入水澄之浮者是燈心也晒乾

用

氣味甘寒無毒

元素曰辛甘陽也吳綬曰淡平

主治五淋生煮服之

敗席煮服更良

開寶

瀉肺治陰竅瀯不利行水除水腫

癰閉

元素

治急喉痺燒灰吹之甚捷燒灰塗乳上飼小

兒止夜啼

震亨

降心火止血通氣散腫止渴燒灰入輕

粉麝香治陰疳

時珍

附方舊一破傷出血燈心草嚼爛傳之立止勝金方衄血不止燈

一兩為末入丹砂一錢米喉風痺塞瑞竹堂方用燈

飲每服二錢聖濟總錄吹一捻數次立愈一方燈心若葉燒

燒存性又炒鹽一匙每吹一捻數次立愈一方燈心若葉燒

燈心灰二錢蓬砂末一錢吹之一方燈心若葉燒

灰等分吹之惠濟方用燈心痘瘡煩喘小便不利

草紅花燒灰酒服一錢即消

把鼈甲二兩水一升半煎六夜不合眼難睡燈草煎

合分二服龐安常傷寒論夜不合眼湯代茶飲即

得睡集簡方通利水道白飛霞自制天一丸用燈心十斤

取浮者晒乾二兩五錢赤白茯苓去皮共五兩滑石

水飛五兩猪苓二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏

和藥九如龍眼大硃砂為衣每用一丸任病換引大

段小兒生理向上木天一生水之妙諸病以水道通

利為捷徑也  
韓氏醫通

濕熱黃疸


燈草根四兩酒水各半入瓶內煮半日露一夜溫服

集

方玄

燈花燼

見火部



本草綱目卷十五