

傷寒瘟疫條辯

傷寒瘟疫條辨

卷五

醫方目錄

吳茱萸湯

小建中湯

附黃耆建中湯

當歸四逆湯

附加吳茱萸黃生薑湯

乾薑附子湯

桂枝新加湯

黃連阿膠湯

桂枝去芍藥加

蜀漆龍骨牡蠣

救逆湯

附桂枝甘草龍骨牡蠣湯

加味溫膽湯

竹葉石膏湯

附人參竹葉湯

疎表湯

桂枝附子湯

附去杜加木湯

人參固本湯

當歸六黃湯

黃耆湯

柴胡桂枝乾薑湯

厚樸生薑甘草半夏人參湯

大陷胸湯

附大陷胸丸

小陷胸湯

小半夏加茯苓湯

附小半夏生薑湯

枳實理中丸

海蛤散

枳殼桔梗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

桂枝人參湯

旋覆花代赭石湯

桂枝加芍藥湯附桂枝加黃連湯

柴胡加桂枝湯

柴胡養榮湯附柴胡清燥湯

五福飲附七福飲

四君子湯附香砂六君子湯

四物湯附八珍湯十全大補湯

二陳湯

犀角大青湯

大建中湯

麻黃芍藥人參湯

四逆湯

桂苓甘朮湯

甘草桔梗湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

麻黃杏仁甘草石膏湯
葛根黃連黃芩湯

五昧子湯

蘇陳九寶湯

十棗湯 附 控涎丹

茯苓甘草湯

橘皮竹茹湯

橘皮乾薑湯

丁香柿蒂散

滌痰湯

理中安虬散

烏梅丸

麻黃升麻湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝去桂加茯苓白木湯

玉泉散

六一散

桂枝甘草湯

桂枝加附桂湯

附湯且除且湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

附芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

生地黄連湯

茯苓四逆湯

附六味回陽飲

導赤散

導赤瀉心各半湯

知母麻黃湯

黃連犀角湯

雄黃銳丸

百合地黄湯

三甲散

桂枝加附子紅花湯

黑龍丹

麻仁丸

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

大營煎

五苓散

猪苓湯

解毒承氣湯

附附胸
承氣湯

桂枝加厚樛杏仁湯

梔子柏皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

金沸草散

地榆散

桃花湯

桂枝加桂湯

麻黃附子甘草湯

白通加人尿猪膽汁湯

去人尿猪膽
汁卽白通湯

桂枝二越婢一湯

八正散

太平圓酒

升麻鼈甲湯

玉樞丹

撥正散

半夏散及湯

苦酒湯

猪膚湯

當歸導滯湯

芳香飲

三合湯

滾痰丸

文蛤散

白散

加味茵陳蒿湯

正方一百零十
附方二十

吳茱萸湯 厥陰頭痛嘔而吐沫少陰犯真寒吐利
手足厥煩燥欲死及寒邪入陽明食穀欲嘔者
並此方主之

吳茱萸

揀淨

三錢

生薑

三錢

大棗

三錢

人參

一錢

水煎溫服

厥陰肝也寒邪內格故嘔而吐沫厥陰與督脈會於
巔故頭痛少陰腎也腎藏中寒則上格乎陽而爲嘔
吐經云腎主二便腎寒則大便不禁而爲利下手足
得陽氣而溫內有真寒故令手足厥冷煩燥者陰盛
格陽故令陽煩陰燥其證多危故曰欲死吳茱萸辛

熱而氣厚。專司開豁胸中逆氣。經曰：氣爲陽。氣厚爲陽中之陽。故能走下焦而溫厥陰少陰也。臣以生薑散其寒也。佐以參棗補中虛也。

小建中湯 傷寒三四日，心悸而煩，及少陰惡寒，腹

中急痛，此方主之。加黃耆蜜炙三錢名黃耆建中湯。

白芍酒炒四錢桂 甘草炙各二錢生薑二錢大棗二枚飴糖三錢

水煎去渣，入飴糖烱化服。

醫方考曰：小建中湯宜用肉桂，枝則味薄，故用之以解肌，桂則味厚，故用之以建中也。思按：開後人補中益氣無窮之法門。

此方是也。

續論曰。桂枝湯中。白芍桂枝等分。用白芍佐桂枝以治衛氣。小建中湯中。白芍四錢。桂枝二錢。用桂枝佐白芍以治榮氣。更加飴糖以緩其脾。故名之曰建中。則其功用大有不同耳。

當歸四逆湯 手足厥寒。陽邪陷內。四肢逆冷。脈細欲絕。陰盛陽衰。

此方主之。

當歸

白芍

桂枝

各二錢

細辛

通草

甘草

各一錢

錢四分

大棗二枚

水煎溫服

加吳茱萸

二錢生薑二錢

酒煎名當歸四逆加吳茱萸生薑湯治前證內
有久寒者。

手足厥寒。脈細欲絕。似乎陰證之極。蓋緣陽邪傳入厥陰。榮分以本虛不能作熱。故厥而脈細欲絕也。此爲陰。陰是指厥陰經也。鬱陽邪。故用桂枝細辛以解表。白芍甘草以瀉熱。當歸以和厥陰之榮血。通草以通太陽之本府。使陽邪得從外解。原非治陰寒四逆之藥也。故藥宜歸芍以濟陰。不宜薑附以劫其陰也。是證也。自表入裏。雖曰傳至厥陰。始終只是陽證與陰寒直

中三陰不同。故不用四逆湯。而用桂枝湯。加當歸細辛通草耳。明者自知之。

按昔人云。人有陰血虧於陽分。不能勝辛熱者。更宜此湯主之。殊不知此。唯有陽邪者宜之。若無陽邪而見此證。則是陰血大虧矣。投之禍不旋踵。蓋細辛爲少陰中表藥。隨桂枝湯以解肌。加當歸以和榮血。至於通草甘淡微寒。能瀉丙丁。能通水道。爲虛寒者禁用。此湯治法。本是和榮血以緩脈。使陽邪得從肌表而散。或從膀胱而泄也。若循其名以治陰虧寒中之

四逆則謬甚矣。觀於傷寒論曰：若其人素有久寒者，宜當歸四逆湯，加茱萸、生薑主之。正如四逆散本以散傳經之熱邪，腹中痛者方加附子，則當歸四逆湯非治陰寒四逆之藥也。明矣。更有一等固守王道之醫，辯證不明，遇有厥逆脈細之證，不敢用四逆湯，但曰用當歸四逆湯極爲穩當。不知此湯乃桂枝湯加當歸、細辛、通草耳。細辛隨桂枝湯止能解表，通草又爲疏通，最有力之藥。當歸一味果足以治陰寒四逆耶？藥不對證，果可謂之穩當耶？甚矣其不明於製方。

之理。而以舛錯誤病也。予前所云用方貴明其所以然者。正謂此也。

乾薑附子湯 少陰誤下復發汗。晝日煩。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。此方主之。又陰盛格陽。目赤面赤。煩渴引飲。脈來七八至。按之則散。爲無根之脈。以此方加人參主之。

乾薑二錢附子三錢
水煎溫服。或云冷服。

此卽四逆減去甘草。爲回陽重劑。若加增藥。

身... 三
味反牽制其雄旱之力。必致迂緩無功矣。乾薑辛以潤燥散煩。和表裏之誤傷。附子熱以溫中固表。調陰陽於既濟。陽回即可用平補之藥。蓋陽既安堵。卽宜休養其陰。切勿過用辛熱。轉生他患也。審之慎之。

桂枝新加湯 汗後身痛。脈沉遲者。此方主之。以桂

枝湯解汗後之風邪。加參芍益不足之血脈。亦兩解表裏安內攘外之一法。曰新加者。因發汗新虛。明非桂枝湯中之舊法也。

桂枝 三錢

白芍 四錢

甘草 二錢

人參 一錢

生薑 三錢

大棗 二枚

二枚

水煎溫服

黃連阿膠湯

少陰病二三日以上，心中煩不得卧

此方主之

少陰本欲寐，今反煩不得寐者，以風邪客於裏，裏熱甚而不和也。此扶陰

散熱之良方也

並治邪火內攻迫血下行者，亦取扶陰

散熱之義

黃連

清腸消

阿膠

祛風養腎

黃芩

疏風

白芍

利脾

各二錢

生雞子黃

逐風

膽一枚

水煎成，去渣入阿膠烱

盡少冷入雞子黃攪勻服

桂枝

同陽

去白芍

恐其損陽

加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

太陽傷寒脈浮

此風寒兩傷也

醫以火迫劫之亡陽

此大

汗不驚狂

神乃陽之靈陽衰則亂矣

起卧不安者

煩燥不寧此皆停飲

上逆凌心也飲去則心神定矣

此方主之

桂枝

三錢

蜀漆

去脚三錢

龍骨

四錢

牡蠣粉

五錢

薑

三錢

大棗

二枚

水煎蜀漆三沸

取其逐飲

次入羣藥煎

服去蜀漆名桂枝甘草龍骨牡蠣湯治火逆

下之復煩燥者

按桂枝解風邪以回表養心甘草和中氣以益陽瀉火牡蠣鹹走腎而寧心龍骨瀉收神而宅心生薑利

氣和胃。大棗通經健脾。蜀漆辛以逐停飲。飲去心
安。故驚狂不安者。乃水凌心火也。此仲景不傳之秘
也。

竹葉石膏湯 陽明汗多而渴。衄血渴欲飲水。水入

即吐。及傷寒瘥後虛羸少氣。氣逆欲吐。並此方

主之。

竹葉二錢石膏四錢麥冬二錢半夏二錢人參一錢甘草一錢

生薑二錢粳米二錢水煎溫服 本方去石膏半

夏薑米加柴胡黃芩。名人參竹葉湯。治汗下後

煩熱口渴、虛羸少氣之證。

竹葉石膏之辛寒以止喘促。散餘熱。參草梗麥之甘平以益肺胃生津液。生薑半夏之辛溫以豁痰飲。去嘔逆。此虛羸熱逆之良方也。

加味溫膽湯 治汗下後不解嘔而痞悶或虛煩不眠、肉瞶筋惕者。

人參

甘草

炙

茯苓

遠志

去心

酸棗仁

炒

熟地

枳實

炒

陳皮

半夏

薑汁炒

五味子

五分

生薑

一錢

水煎溫服

疏表湯 治四時感冒風寒鼻塞聲重或流涕不已

發熱惡寒頭痛身痛者

淡豆豉

三錢

羌活

二錢

防風

各一錢半

桔梗

蘇葉

川芎

各八分

細辛

甘草

各五分

生薑

二錢

葱白

二莖

水煎溫服微汗口渴加花粉麥冬

各一錢

滿悶加枳殼

錢半

熱甚加知母

一錢

桂枝附子湯

傷寒七八日

即傳裏之時也

風濕相搏

搏聚而爲

痺也身體煩痛

風勝則煩濕勝則痛

不能自轉側

濕土重溼

不隴

邪在不渴

裏無熱也

脈浮虛而濡

浮虛爲風濡爲濕也

此方主

之、浮虛而滿、知風濕、但在經也、與桂枝以解表風、加附子以散寒濕、若其人大

便難、小便自利者、去桂枝加白朮湯、主之、去桂惡其走表而不知裏、加朮喜其益土而燥濕也。

桂枝

三錢 附子

炮二錢

甘草

炙一錢半

生薑

三錢

大棗

二枝

水煎溫服

去桂枝加白朮

三錢

人參固本湯

治溫病虛極熱極、循衣作空、不下必

死者、下後神思稍甦、續得肢體振寒、怔忡驚悸、

如人將捕之狀、四肢厥逆、眩運鬱冒、項背強直、

此大虛之兆、將危之候也、此方救之。

人參

二錢

熟地

三錢

生地

二錢

當歸

二錢

杭芍

一分

天冬

去心

麥冬

去心

五味

陳皮

知母

甘草

炙各

一錢

水煎

溫冷服之

服後

虛回止後服

蓋濕病乃火

邪燥證人參固爲補元氣之神丹。但恐偏於益。陽恣意投之。有助火。因邪之。樊不可不知也。

按溫病乃天地雜氣之一也。有邪不除。淹纏日久。必至虛羸。庸工望之。不問虛實。久暫可否。輒用人參。殊不知無邪不病。邪去而正氣自通。何慮虛之不復也。今妄投補劑。邪氣益固。正氣益鬱。轉鬱轉熱。轉熱轉

瘦轉瘦轉補轉鬱。循環不已。乃至骨立而斃。猶言服參幾許。補之不及奈何。余於乾隆甲戌乙亥丙子三年中。眼見親友患溫病。服參受害者。不可枚舉。病家止誤一人。醫家終身不悟。不知殺人無算。特書之以爲濫用人參之戒。非禁之使不用也。果如前證。虛危之極。非人參烏能回元氣於無何有之鄉哉。

當歸六黃湯 治陰虛盜汗。又方用蓮子七枚黑棗七枚

浮麥

七錢

馬料豆

七錢

水煎治同

當歸

二錢

熟地

二錢

生地

黃連

黃芩

黃栢

各一錢

黃耆

生三錢

防風

一錢

麻黃根

一錢

浮麥

一錢

水煎溫服

黃耆湯

治陽虛自汗

黃耆

五味子

各三錢

槌碎

當歸

白朮

土少

甘草

各一錢

水煎溫服

汗多不止

加麻黃根

一錢

防風

一錢

或

加麻黃根

一錢

牡蠣粉

一錢

浮麥

一錢

經疏曰凡服固表藥而汗不止者當用酸棗仁炒黑三錢白芍各二錢生地各二錢麥冬各二錢五味子各二錢元肉各二錢竹葉二十片煎服多効以汗爲心液故也

柴胡桂枝乾薑湯

傷寒五六日已發汗而復下之

胸脇滿微結、小便不利、渴而不嘔、但頭汗出、三陽
脈起於頭、陽邪甚於上、
陰精衰於下、故汗出也、
往來寒熱、心煩者、表未
解也、此方主之、

柴胡

四錢 花粉

二錢

黃芩

桂枝

牡蠣粉

各一錢半

乾薑

甘草

炙各一錢

水煎、初服微煩、後服汗出、愈、

按柴胡除少陽之寒熱、桂枝解太陽之餘邪、花粉徹
陽明之渴熱、乾薑去胸脇之煩滿、甘草調汗下之誤
傷、此少陽陽明兩解之治法也、

厚樸生薑半夏甘草人參湯 陽明病、中寒不能食、

小便不利，手足澀然，汗出者，此欲作痼瘕，大便必初硬後溏，此胃中虛冷，水穀不別故也。痼瘕者，寒氣結而爲積也。此方主之。並治汗解後腹脹滿，此非裏實，蓋脾胃爲津液之主，汗多則津液不足，氣虛不能敷布，諸氣壅滯，停飲而爲脹滿。與此湯以和脾胃而降氣也。一云，痼，泄也。蓋大便初硬後溏，因成痼泄。痼泄卽澼泄，久而不止，則曰痼瘕也。亦通。

厚樸薑汁炒 生薑 半夏薑汁炒 甘草二錢 人參一錢

水煎溫服

脹非苦不泄。氣非溫不行。飲非辛不散。胃非甘不和。虛非補不復。五味之功用大矣。

大陷胸湯

大黃

三錢

芒硝

二錢

甘遂末

五分

水煎大黃五六沸去

渣，再入芒硝煎一二沸，調甘遂末服。

加葶藶子、杏仁

去皮炒黑

與大黃芒硝四味等分爲

末，鍊蜜丸如彈子大，取一丸入甘遂末三五分

蜜三匙，水煎並渣服之，此名

大陷胸丸

結胸者，項亦強，如柔痙狀，下之則和。

矣此方主之

小半夏加茯苓湯 心下滿頭汗出水結胸或心悸

目眩此方主之 去茯苓卽小半夏生薑湯

半夏

薑炒五錢

茯苓

五錢

生薑

五錢

水煎溫服

健脾滲濕

火因水下

而悸眩止

則痞渴消

而悸眩止

小陷胸湯 小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑

者此方主之 邪氣深入尙在半表半裏爲熱爲痰爲飲病有淺深方有大小除熱

下痰

黃連

薑汁微炒

半夏

薑炒

栝蒌

搗爛

水煎溫服

一錢五分

三錢

一個

水煎溫服

黃連苦以瀉熱。用代大黃。半夏辛以逐痰。用代甘遂。枯萋潤以行滯。用代芒硝。不比大陷胸湯之峻厲也。

枳實理中丸

枳實

麩炒

枯萋

牡蠣粉

白朮

土炒

甘草

各一兩

乾薑

錢炒八

人參

黃連

黃芩

各三錢

爲末。鍊蜜丸。如

雞子黃大。以熱湯化服。一丸。覺腹中熱。則胸中豁然矣。未熱。則加丸再服。

海蛤散

治血結胸。揉而痛。不可撫近者。

海蛤粉

滑石

甘草

各等分

芒硝

減半。元明粉更妙。

爲末用蜜水入雞子清調服二錢

桔梗枳殼湯 治痞氣胸膈不痛噯氣吐酸或欬者

桔梗

枳殼

麩炒各二錢

水煎溫服

此二味苦下氣而散痞滿寒消熱而除咳飲也

大黃黃連瀉心湯

心下痞按之濡

按之不其脈關痛而軟

上浮者

開候心下浮主虛熱

此方主之

大黃

二錢

黃連

一錢

黃芩

一錢

搗碎麻沸湯漬之去渣

服

活人書曰湯液論有黃芩一錢今無者恐傳寫之訛也

李時珍曰仲景治心下痞按之濡者用大黃黃連瀉心湯此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發於陰而下之太早則作痞滿乃寒傷榮血邪氣乘虛結於上焦胃之上脘在於心下故曰瀉心。

附子瀉心湯 心下痞而復惡寒汗出者此方主之。

附子炮 大黃各二錢 黃連 黃芩各一錢

附子一味另煎取汁大黃芩連三味以麻沸湯漬之去渣入附子汁溫服。

心下痞故用三黃以瀉痞惡寒汗出故用附子以回

陽無三黃則不能瀉痞熱。無附子恐三黃益損其陽。氣熱有三黃。寒有附子。寒熱互用。斯爲有制之兵矣。仲景誠醫家之善將將者也。俗醫用寒則不敢用熱。用熱則不敢用寒。何異於膠柱鼓瑟乎。

續論曰。瀉心湯諸方。皆治汗下後表解裏未和之證。其半夏生薑甘草三瀉心湯。是治痰飲濕熱結聚之痞。方中用半夏生薑以滌痰飲。黃連黃芩以除濕熱。人參甘草以助胃氣。乾薑炮黑以滲水濕。若但用苦寒治熱。則格拒不入。必得辛熱爲之嚮導。是以半夏

乾薑在所必需。如痞極硬滿。暫去人參。氣壅上升。勿用生薑。此一方出人而有三用也。其大黃黃連與附子二瀉心湯。乃治陰陽偏勝之痞。一以大黃芩連瀉胸中素有之濕熱。一加附子兼溫經中驟脫之虛寒也。三黃用沸湯漬服者。取寒藥之性不經火而力峻也。附子煮汁者。取性熱行經以復其陽耳。仲景寒熱並用。補瀉兼施。立方之妙。無出乎此。以三黃滌胸中之邪熱。以附子散凝結之陰寒。一舉而寒熱交聚之邪盡解。詐知後人目覩其方而心眩也。

按半夏生薑甘草三瀉心湯。人尤易曉。其大黃黃連與附子二瀉心湯。具有妙用。不可不透悟也。夫大黃黃連瀉心湯。孰不以爲治心下之痞熱也。竊詳傷寒論曰。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。成氏註曰。心下痞。按之痛。關脈沉者。實熱也。按之濡。關脈浮者。虛熱也。故大黃芩連不用煎煮。而但以麻沸湯漬服者。取其味薄而瀉心下之虛熱。不欲其味厚而傷中氣也。附子瀉心湯。人亦知爲寒熱之互用也。竊詳傷寒論曰。心下痞。復惡寒汗出者。附

子瀉心湯主之。成氏註曰：心下痞者，虛熱內伏也。惡寒汗出者，陽氣外虛也。與大黃黃連瀉心湯以導痞熱。加附子以回陽氣。夫痞熱固須導除，而陽虛更爲可慮。附子煮汁者，回陽之重劑也。三黃沸漬者，導熱之輕劑也。續論謂取寒藥之性，不經火而力峻，豈其然乎。今人以大黃熱煎，則無力。實續論之說誤之也。內經曰：味屬陰，味厚屬陰中之陰。熱煎味厚，安得無力。須辨之。

半夏瀉心湯

柴胡證具，而誤下之，但心下滿而不

痛此爲痞此方主之

半夏

薑製四錢

人參

錢一

乾薑

炮黑

甘草

炙

黃芩

各二錢

黃連

錢一

大棗

二枚

水煎

溫服

少陽誤下

變證

有三等

治法、嘔而發熱、柴胡證猶在者、復與小柴胡湯、必蒸蒸振汗而解、若心下滿而硬痛、此爲結胸、柴胡陷胸湯、大陷胸湯、量輕重用之、但滿而不痛、此爲痞、宜此湯、

否而不泰爲痞、瀉心者必以苦、故用黃連、黃芩散痞者必以辛、故用半夏、乾薑、交陰陽通上下者必和其

中故用人參甘草大棗也。諸瀉心湯寒熱並用妙不可傳。

生薑瀉心湯

傷寒汗解之後

火邪乍退

胃中不和

正氣未復

心下痞硬

胃虛不運停飲致痞

乾噎

爲水所過則噎

食臭

脾虛不運則臭

脇下有水氣

土弱不能制水

腹內雷鳴

水氣奔激

下利者

濕勝

濡瀉此方主之

生薑

半夏

薑製各三錢

黃芩

甘草

炙各二錢

乾薑

炮

人參

黃連

各一錢

大棗

二枚

水煎溫服

甘草瀉心湯

傷寒中風反誤下之，下利日數十行

穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿嘔煩不安醫見心下痞硬復誤下之其證益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使滿硬此方主之

甘草

炙

半夏

薑製各三錢

乾薑

炮

黃芩

各二錢

黃連

一錢

大棗

二枚

水煎

溫服

桂枝人參湯

卽理中湯加桂枝也

太陽病表未除而下之早

熱邪乘虛入裏挾熱下利不止心下痞硬表裏不解者此方主之

桂枝

甘草

炙各三錢

乾薑

二錢

白朮

土炒二錢

人參

一錢

水煎溫服

此湯以表未除，故用桂枝以解之。以裏證虛，故以理中以和之。蓋取兩解表裏之義也。

旋覆花代赭石湯 傷寒汗吐下解後，胃氣弱也心下痞

硬，伏飲停隔噎氣未除者，氣逆也此方主之。噎音周

揚俊用治噎隔反胃，氣逆不降者，累效。

旋覆花三錢代赭石二錢半夏薑製六錢人參一錢甘草炙二錢

生薑五錢棗三枚水五盅煎取二盅去渣再煎取一

盅溫服，濃煎則不助飲

旋覆之鹹以軟堅。楮石之重以振逆。薑夏之辛以散痞。參草大棗之甘以補脾。此輔正匡邪。調飲下氣之良方也。

桂枝加芍藥湯 本太陽病反下之因腹滿時痛者

此方主之

桂枝

錢三

白芍

錢六

甘草

錢二

生薑

錢三

大棗

錢二

枚

水煎溫服

加大黃

酒浸

三錢

名桂枝加大黃湯治

前證大實痛者

黃連湯 胸中有熱欲嘔吐胃中有寒腹痛此方

主之。

黃連

三錢

半夏

四錢

桂枝

乾薑

炒

甘草

炙各二錢

人參

一錢

大棗

二枚

水煎

溫服

或冷服

日三夜一

治開格氣不能

上下者與桂附八味丸相間服之

即腎氣丸

此傷寒邪氣傳裏而爲下寒上熱也。胃中有邪熱使陰陽不交，陰不得升而獨滯於下，爲下寒；腹脹痛，陽不得降而獨鬱於上，爲上熱。欲嘔吐，故用黃連之苦以瀉上熱而降陽。薑桂半夏之辛以散中寒而升陰。參草大棗之甘以緩中急而益胃。寒熱並用，猶奇正。

之相倚耳。此分理陰陽和解上下之正治也。或丹田有熱，胸中有寒者，仲景亦用此湯治之。藏結之證，更宜以此湯調其陰陽。

柴胡桂枝湯 傷寒六七日，發熱微惡寒，支節煩痛，微嘔，心下支結，此外證未除，不可攻裏，以此方和解之，並治發汗後亡陽譫語，以此方和其榮衛，以通津液，後自愈。

柴胡

四錢

桂枝

黃芩

白芍

半夏

薑

甘草

炙各二錢

人參

一錢

生薑

二錢

大棗

二枚

水煎

溫服

此太陽少陰

台病治方也

柴胡養榮湯 治溫病陰枯血燥邪熱不退

柴胡

三錢

黃芩

二錢

陳皮

一錢

甘草

一錢

當歸

二錢

白芍

一錢五分

生地

三錢

知母

二錢

花粉

二錢

蟬蛻

全十個

白殭蠶

酒炒三錢

大

棗

棗

二枚

水煎溫服

去當歸白芍生地名柴胡清

燥湯數下後餘熱未盡邪與衛搏故熱不能頓除宜此湯和解之

五福飲 凡五藏氣血虧損者此方能兼治之足稱

王道之最

人參

補心隨宜用

熟地

補腎三錢至一兩

當歸

補肝二錢至七錢

白朮

補肺甘浸
土炒二錢

甘草補脾蜜炙一錢

水煎溫服或加生薑

凡治氣血兩虛等證以此爲主或宜散者加
柴荆防宜溫者加薑桂附子宜清者加梔子青
蒿地骨皮之類左右逢原無不可也

七福飲卽五福飲加酸棗仁炒研遠志甘草湯浸去心微炒一錢

治氣血兩虛而心脾爲甚者

四君子湯一方去人參加蜜炙黃耆亦名四君子湯

白朮土炒二錢白茯苓二錢人參二錢甘草炙各一錢水煎溫

服加半夏一錢陳皮一錢木香三分砂仁一錢

香砂六君子湯補脾養胃之要藥也

四物湯

當歸

酒蒸三錢

熟地

三錢

白芍

酒炒一錢五分

川芎

一錢

水煎溫

服合四君子湯名八珍湯再加黃耆肉桂名十全大補湯補氣養血之要藥也

二陳湯

半夏

薑汁製二錢

陳皮

一錢

白茯苓

半錢

甘草

一錢

生薑

一錢

水煎溫服

順氣化痰之總方也

犀角大青湯

治斑出心煩大熱錯語呻吟不眠或

咽喉不利者

犀角鎊

二錢爲末或磨汁對湯服

大青

或以青黛代之

元參

各三錢

升麻

黃連

黃芩、黃栢

梔子

各一錢

甘草

五分

水煎

去渣入犀角汁童便冷服

一方加白殭蠶酒炒

三錢蟬蛻十個

更妙

大便秘加大黃

大建中湯

中氣不足手足厥冷小腹掣急或腹滿

不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤

四肢酸痛嘔吐下利及無根失守之火出於肌

表而爲斑點並此方治之

人參

甘草

各五分

黃耆

各一分

當歸

白芍

酒炒

桂心

各一分

錢附子

炮半夏

各一分

薑汁製

各一分

錢五分

水煎

溫服

按此乃汗吐下後中氣虛乏則餘邪無所歸附。隱隱見於肌表。其色淡紅而不甚顯爲辯也。參耆所以補中。夏草所以調中。此皆脾胃藥也。復有歸芍之和血。則外溢之斑流而不滯。又有桂附之溫中。則失守之火引而歸元。此中營之幟一端而失位之師各就其列也。是方也以參耆桂附而治斑。猶兵法之變者也。語云治病如殺賊。孫臏減竈滅龐涓。虞詡增竈平朝。

歌臨機應敵豈有一定之法哉。

麻黃芍藥八參湯 李東垣曰。予治一寒士。病脾胃弱。與補劑愈。繼而居曠室。卧熱炕。咳而吐血。予謂此久虛弱。外有寒形。內有火熱。上氣不足。陽氣外虛。當補表之陽氣。瀉裏之虛熱。蓋冬居曠室。衣服單薄。是重虛其陽。表有大寒。壅遏裏熱。火邪不得舒伸。故血出於口。因思仲景治傷寒。脉浮緊。當以麻黃湯發汗。而不與之。遂成衄血。却與麻黃湯立愈。與此甚同。因處此方。

本方去麻黃桂枝名麥冬飲子

麻黃

去外寒

白芍

安太陰

甘草

炙補三焦

元氣而去外寒

黃耆

生各一錢

實表益衛

桂枝

補表

當歸

酒蒸各五分

和血養血

人參

益元氣而實表

麥冬

蒸去心各三分

保肺清心

五味子

十五粒

蜜蒸

棗核

收肺氣而安五臟

水二盅半先煎麻黃去沫入羣藥同煎一盅去

渣乘熱臨卧一服愈觀此方足爲萬世模範也

蓋取仲景麻黃湯與補劑麥冬飲子各半服之

但凡虛人合用仲景方者皆當以此爲則也

四逆散

少陰病

四逆

陽邪傳入少陰

手足逆冷

或咳

少陰脈絡肺

或

悸少陰脈絡心

或小便不利

少陰脈絡膀胱

或腹中痛

少陰脈入

小或瀉利下重者此方加減主之

柴胡

白芍

枳實

甘草

炙各等分

爲末

白飲調

下三錢

日三服

咳者加五味子乾薑並主下利

與

大腸相表裏上咳下利治則相同

悸者加桂枝小便不利者加

白茯苓腹中痛者加熟附子泄利下重者先以

水煎薤白取汁二鍾入此散一兩煎服

此陽邪傳至少陰裏有結熱則陽氣不能交接於四肢故逆而不溫柴胡所以升內陷之陽邪枳實所以

破內滯之結熱。白芍收失位之陰。甘草和不調之氣。是證也。雖曰陽邪在裏。慎不可下。蓋傷寒以陽為主。四逆有陰進之象。若復用苦寒之藥下之。則陽亦虧矣。是在所忌。傷寒論曰。諸四逆不可下。此之謂也。然此原爲冬月正傷寒言之。若溫病四逆不在此例。按此散本爲邪熱自陽經傳入陰經而發厥傷寒論曰。腹中痛者加附子。清滌中又加溫補。人未有不致疑者。竊詳四逆散。腹痛加附子。與附子瀉心湯義同。蓋傷寒以陽爲主。熱證固常用蕩滌之法。而熱證但

兼虛寒又不可不急作救療如附子瀉心湯心下痞滿自宜大黃黃連瀉心湯以導除其熱若惡寒汗出則加附子以回陽又何可緩也故四逆散邪熱傳至陰經而四逆自宜柴胡枳實以清解其熱若兼虛寒遇邪而腹脹則加附子之溫經益陽又何可緩也寒熱各行其性此仲景製方之妙况傷寒始病熱中未傳寒中者極多四逆雖屬陽證已有陰進之象兼以腹痛則其加附子也不亦宜乎若溫病陽邪亢閉隔陰於外以致四逆非急下之不爲功若執治傷寒之

法則誤人矣。

桂苓甘朮湯 傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝

胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者此飲中留結外邪之證也此方主之。

白茯苓四錢桂枝三錢白朮生炒甘草炙各二錢水煎溫服。

按人身經脈賴津液以滋養吐下津液傷更汗津

液再傷坐令經脈失養身為振搖此湯飲散邪補

中益氣則津液四布而經脈得以滋榮矣至久而成

痲較此更甚仲景於此湯豈非早已用力乎。

甘草桔梗湯 主治少陰病二三日咽痛此陰陽湯

用之藥也若風痰挾邪上壅咽痛半夏散及湯若咽中傷生瘡不能言聲不出者苦酒湯若下

利咽痛胸滿心煩者猪膚湯

三湯補後

甘草

三錢 桔梗

三錢

水煎溫服

此二味一借土氣以逐水一借金母以瀉水而少陰之邪自散矣

黃芩加半夏生薑湯 太陽少陰合病下利而嘔及

膽府發咳嘔苦水如膽汁

胃氣逆則嘔苦膽液溢則口苦此方

主之

黃芩

三錢

白芍

半夏

甘草

炙各二錢

生薑

二錢

大棗

二枚

水煎溫服

乾薑黃連黃芩人參湯

傷寒論曰傷寒本自寒

下

醫復吐下之寒格更逆吐下若食入即吐此方

主之

乾薑

人參

黃連

黃芩

原文各三兩

水六升煎三升去渣分溫連服

按傷寒論並無寒下之病亦並無寒下之文玩下文

寒格更逆吐下句可知上文本自寒下句之下字當是格字文義始屬註家皆釋胃寒下利不但文義不屬亦與芩連之藥不合當改之成氏曰仲景之意以本自寒下醫復吐下之治之爲逆故用乾薑以溫裏人參以補正氣芩連反佐以通寒格與四逆湯白通湯加人尿豬膽汁義同原文四味各三兩恐傳寫之訛也此成氏之遵經註解也姑存以俟高明

麻黃杏仁甘草石膏湯 太陽病汗後喘表邪未解也此方主之

麻黃四錢杏仁去皮甘草炙各二錢石膏八錢

水煎麻黃去沫次入羣藥煎服

按太陽寒邪雖從汗解然肺邪未盡所以喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘草緩肺急石膏清肺熱卽以治足太陽之藥通治手太陰也倘誤行桂枝湯以致壅塞肺氣而吐癰膿則桔梗杏仁煎可用也太陽傷寒誤下作喘亦用此方

葛根黃連黃芩湯 太陽病誤下利遂不止脈促者

表未解也脈數而止曰促用葛根者專主陽明之表喘而汗出者此

方主之

葛根

四錢黃連三錢

黃芩

甘草

炙各二錢

水煎溫服

喘而汗出者，因喘而汗出也。卽裏熱氣逆所致。與此湯以葛根散表邪，以芩連清裏熱，則喘息汗停而利亦止矣。

五味子湯

治喘而脈伏，及寒熱而厥，昏瞶無脈者。

五味子

十五粒
搥碎核

麥冬

去心

陳皮

各二錢

人參

杏仁

去皮

尖各一錢

生薑

三錢

大棗

二枚

水煎溫服。

蘇

元寶湯

治暴感風寒，脈浮無汗而喘，並老幼。

有喘急遇寒眩不節發則連綿不已咳嗽哮喘

夜不能卧者

桑白皮

蜜炙

大腹皮

淨製

陳皮

蘇葉

薄荷

麻黃

杏仁

泡去皮尖

桂枝

去粗皮

甘草

生各一錢

烏梅

生薑二錢

枝

水煎溫服

十棗湯

太陽中風

有頭痛發熱等證

下利大便不利也

皆不利也

嘔逆

水飲停蓄於內

表解者乃可攻之

先用桂枝

後攻裏

其人漿

漿汗出邪從汗出

發熱有時

此邪熱頭痛上逆

表解一驗

發熱有時

外溢也

頭痛上逆

胃氣

此裏未和者

心下痞硬滿引脇下痛

留飲在脇溢於

兩腋此裏未和

和者

心下痞硬滿引脇下痛

留飲在脇溢於

兩腋此裏未和

和者

者乾嘔短氣。伏飲上逆射於肺中此裏未和者三汗出不惡寒者。
 表解此表解裏未和也。此方主之。此表邪已散而種種裏證
 未平。彰明較著如此。然後
 用此湯以逐飲攻水也。

按雖有發熱頭痛。心下痞硬。滿引脇痛。乾嘔短氣。諸
 證。乃內邪所結之本證。裏未和也。不得以表證名之。
 傷寒中亦有有表證無表邪者。何況濕病。

甘遂

麵包煨去心

紫大戟

出洪山者佳醋炒

芫花

醋炒三味等分

為末聽用

大棗

十枚

水二盅煎取湯一盅調

上三味藥末強人一錢弱人五分溫服如未下

明日加五分再調服利後糜粥自養

按下列嘔逆句之下字當是不字若是下字豈有上嘔下利而用十棗湯峻劑攻之之理乎惟大便不利痞硬滿痛始屬裏病小便不利嘔逆短氣始屬飲病乃可峻攻發作有時句之作字當是熱字始與太陽陽邪熱飲相合若無熱汗出乃少陰陰邪寒飲真武湯證也皆當改之此湯與大陷胸湯相倣傷寒種種下法咸爲胃實而設今證在胸脇而不在胃則蕩滌腸胃之藥無所取矣故用芫花之辛以逐飲甘遂大

戟之苦以泄水並賴大棗之甘以運脾而助諸藥
水飲於膈脇之間乃下劑中之變法也。愚按開後人
濕熱生痰無
窮之法門
此方是也。

去芫花加白芥子等分爲末薑汁煮棗肉爲丸
名控涎丹。

李時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到入心
則迷成癲癩入肺則塞竅爲咳喘背冷入肝則
脇痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋
骨則牽引隱痛入皮肉則瘰癧癰腫陳無擇並

以控涎丹主之。殊有奇效。此乃治痰之本。痰之本水也。濕也得火與氣則結爲痰。甘遂能泄經絡水濕。大戟能泄藏府水濕。白芥子能散皮裏膜外痰飲。生薑大棗利氣通經。健運脾土。以固本。惟善用者乃能收奇功也。

茯苓甘草湯 水氣乘心振寒厥而心下悸者。火畏水故

心下動也先治其水却治其厥。及太陽傷寒表虛汗出而不渴者。並此方主之。此乃利水解表而兼和中之藥也。如太陽傷寒汗出而渴者。又宜五

苓散

白茯苓

三錢

桂枝

三錢

甘草

炙錢半

生薑

三錢

水煎

溫服

橘皮竹茹湯

治傷寒胃虛有熱哕逆

或因吐利之故

並治

久病虛熱或吐利後胃虛嘔呃不止

橘皮

二錢

竹茹

二錢

人參

各一錢

甘草

炙各一錢

生薑

二錢

大棗

二枚

水煎溫服一方有半夏赤茯苓麥冬枇杷葉

胃火上衝肝膽之火助之肺金之氣不得下降故呃逆嘔噦竹茹麥冬枇杷葉皆能清金和胃肺金清則肝木亦平矣二陳降痰逆赤苓降心火生薑嘔家聖

藥久病虛羸故以參草大棗扶其胃氣而諸證自退也。一方用硫黃乳香等分酒煎嗅之。不論虛實寒熱皆效。

汪詒菴曰。此證有因胃熱失下者。有因火鬱者。有因血瘀者。有因氣滯者。有因痰阻者。皆屬實。有因下後胃虛者。有因中氣不足者。有因下元虛損。陰火上衝者。皆屬虛。寒熱虛實要在臨證活法耳。不可造次。○呃在中焦。穀氣不通。其聲短小。得食則發。呃在下焦。真氣不足。其聲長大。不食亦然。此爲辯也。

橘皮乾薑湯

治胃寒呃逆脉微細者

橘皮 乾薑

肉桂

去粗通草

甘草

炙各一分 人參七分

水煎温服

丁香柿蒂散

治久病呃逆因下寒者

古方以此湯治呃逆雖病

本於寒然亦有火也

丁香

柿蒂

各二錢

人參

一錢

生薑

三錢

水煎温服

一方去人參加竹茹、橘紅

一方去人參合二

陳湯加良薑俱治同

此足陽明少陰藥也。丁香泄肺温胃而暖腎。生薑去

痰開鬱而散寒柿蒂苦瀹降氣人參補助真元使得
展布也。

滌痰湯 治膈間痰閉呃逆者

栝蒌

搗爛
五錢

膽星

半夏

各二錢

橘紅

一錢五分

茯苓

枳

實

炒
黃芩

黃連

石菖蒲

竹茹

各一錢

甘草

炙
五

分

生薑

三錢

水煎溫服如痰閉呃甚者用白礬

兩

水二盅煎一盅入蜜三匙少煎溫服卽吐如不

吐飲熱水一小盞未有不吐者吐後呃卽止

理中安虬散 治胃寒虬厥

人參錢一 白朮土炒 茯苓 乾薑炒各一錢五分 川椒十粒 烏

梅三枚 水煎溫服

烏梅丸 蚘厥者當吐蚘，今病者靜而復時煩，非爲

藏寒，時靜時煩，非比藏寒無暫時安。蚘上入膈故煩，須臾即止。

得食而嘔又煩者，臭出，當自吐蚘，此方主之。

按此爲藏寒句之此字，應是非字，若此字便是藏厥與辨蚘厥之義不屬當改之。

烏梅三十枚 黃連一兩 乾薑一兩 附子炮 桂枝 細辛

黃栢鹽水 人參各六錢 當歸 川椒炒去汗 爲末

醋浸烏梅去核，飯上熏熟，合藥末加鍊蜜杵丸。

每服二錢，白飲送下。

程郊倩曰：名曰安虵，實是安胃。故仲景云：並主久痢。痢本濕熱，得苦則堅，得酸則斂，故亦通治。若陽厥吐虵，入口即斃，又何論溫病乎？

麻黃升麻湯 傷寒六七日，大下後，邪傳厥陰，手足厥

逆，內陽氣寸脈沉遲，遲爲寒也尺脈不至，尺伏誤咽喉

不利，吐膿血，肝脈循喉，餘邪上壅○又注肺金泄，何不止

者爲難治，陰氣欲脫而不此方主之，散表寒清

解之變方也。

麻黃

去節三錢

升麻

一錢五分

當歸

一錢五分

石膏

二錢

知母

一錢黃

芩

一錢

白朮

五分

茯苓

五分

白芍

五分

天冬

五分

乾薑

五分

甘草

五分

水煎麻黃沸去上沫再入羣藥煎服連進二三

劑覆取汗出則邪氣散而咽清利止矣

赤石脂禹餘糧湯

論曰自利不止下脫此利在下

焦此方主之

赤石脂

禹餘糧

各一兩

水煎溫服如服後利仍

不止當利其小便與猪苓湯是乃膀胱不滲一

利小水而利自止矣。

傷寒論曰。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。以理中湯與之。利益甚。蓋理中者。理中焦。此利在下焦也。赤石脂禹餘糧湯主之。長沙製方。審於上下。如此。取效。自易易耳。薛氏曰。一人以命門火衰而下利。令服桂附五味吳茱萸肉蔻。故紙之類。不信。服補中益氣湯。而斃。此正利在下焦。止補中焦。而致敗也。噫。後人之千方萬論。孰有不出長沙者哉。

桂枝去

芍

加茯苓白朮湯

太陽風寒服桂枝湯

治蜀

風而寒，而或下之，表未除而仍頭頂強痛，表邪未去。

翕翕發熱，風寒勝，無汗，寒勝心下滿微痛，邪氣取虛。

入裏狹涎，小便不利者，水不行，北方主之，按去種。

飲作滿痛，芍藥若去桂加苓朮，並無辛甘走榮衛之藥，何以治仍頭痛發熱，心下滿痛之表證乎？當改之。

桂枝 白茯苓 白朮 甘草 生薑

大棗 二枚 白芍

長流水煎，連服則裏氣實，小水利，外邪解矣。

玉泉散 治陽明內熱煩渴，頭痛牙痛，二便閉結，斑

疹發黃，熱痰喘嗽等證。

生石膏

六兩粉甘草一兩

爲末新汲水或熱湯或人

參湯調下三錢加朱砂三錢亦妙

六一散

治溫病及中暑身熱煩渴小便不利者

桂府滑石

研末水飛曬乾六兩

粉甘草

爲末一兩

合研勻每服

三錢新汲水或冷飲調下

三錢

加朱砂三錢取其

清心加青黛三錢取其涼肝加薄荷三錢取其

散肺也

直格曰此散是寒涼解散鬱熱設病不解多服無損但有益耳又曰傷寒當汗則不可下當下則不可汗

且如誤服此散，則汗自不出，而裏熱亦自有効，亦有裏熱便得宣通而愈者，或邪在半表半裏，可和解而不可汗下者，若服此散多愈，卽不愈亦減。按河間云六一散有益無損，大抵是溫病耳，其鬱熱自內而達於外，故宜寒涼蕩滌其熱，至於正傷寒，還須參之脈證，不可輕投。

桂枝甘草湯

太陽病發汗過多

汗爲心液，多則心虛。

又手自

冒心

動惕不寧，怔忡無主。

心下悸，欲得按者

心虛故欲按也。

此方

主之，並治太陽病小便自利，飲水多必心下悸。

如小便少者必苦裏急裏急者膀胱不行水故也宜五苓散

桂枝三錢甘草炙一錢五分甘爛水水揚萬遍而煎溫服

桂枝加附桂湯 太陽傷寒寸口脈浮而大右手關前一分

爲寸口主候五藏之氣浮則爲風大爲陰虛風則生微熱

虛則兩脛掣其證自汗出小便數心煩微惡寒

腳掣急此方主之

桂枝三錢白芍三錢甘草炙二錢附子生肉桂去粗各一錢生

薑三錢大棗二枚水煎溫服覆取微汗

喻嘉言曰。仲景之圓機活法。卽陽旦陰旦二湯已妙。不可言陽旦者。天日清明。春夏溫煖之稱也。陰旦者。風雨晦冥。秋冬寒涼之稱也。桂枝湯加黃芩。名曰陽旦。加肉桂。名曰陰旦。後人不識此義耳。卽如此證。傷寒論一曰。與桂枝湯。此誤也。又曰。證象陽旦。按法治之。而增劇。卽是拔用桂枝湯加黃芩之法也。所以病人得之便厥。蓋寒邪在裏。用桂枝湯以治其表。則陽愈虛。加黃芩以助其陰。則陰愈無制。故仲景卽行陰旦湯之法。以救其失。觀增桂令汗出一語。豈不昭昭。

耶恐陰曰不足。更加附子以溫經。卽咽中乾。陽明內結。謔語煩亂。渾不爲意。且重飲甘草乾薑湯。以俟夜半。陽回足熱。後果如其言。豈非先有所試乎。惟陽曰湯入口而便厥。未幾卽以桂附乾薑尾。其後固知厥必不久。所以可斷云。夜半兩足當熱。况咽乾謔語。則津液亦爲辛熱所耗。故少與承氣以和胃而止其謔。多則爲下而非和矣。若不知此證之不爲汗而重發之。復加燒鍼。則陽之虛者必至於亡。陰之無制者必至於犯上。四逆湯以回其陽而恐不足。况可兼陰以

爲治乎蓋傷寒以陽爲主陰進則陽虧矣若溫病陽邪亢閉陰先受傷治法又當滋陰以瀉陽也豈可與傷寒並論哉

甘草乾薑湯 少陰病小便色白吐逆而渴動氣下

之反劇身雖有熱反欲踰卧此方主之

甘草炙四錢 乾薑炮二錢 水煎溫服

此卽四逆湯去附子也辛甘合用專復胸中之陽氣其夾食夾飲而赤足厥發熱喘咳腹痛便滑內外合邪難於發散或寒冷傷胃不便參朮者並宜服之真

胃虛挾寒之聖藥也。

芍藥甘草湯 婦人傷寒汗解表除熱入血室經水過多無實滿者與雜病木尅脾土陰陽血氣不和而痛並此方主之。

白芍

酒炒

甘草

炙四錢或二錢

水煎溫服

虞天民曰白芍不惟治血虛大能行氣腹痛者榮氣不和逆於肉裏得白芍之酸苦行其榮氣又以甘草之甘緩和其逆氣此不治之治正所以深治之也。

本方加炮附子

一錢五分

名芍藥甘草附子湯治發汗病

不解皮惡寒者。虛故也。白芍斂陰於內。附子復陽於外。甘草和其陰陽。而諸病自解矣。發汗後不惡寒。但惡熱者。實也。與調胃承氣湯和之。按發汗病不解句。之。不字。衍文也。發汗病不解。則當惡寒。何謂反惟病解惡寒。始可謂虛。當刪之。

茯苓桂枝甘草大棗湯。太陽病發汗過多。臍下悸

者。欲發奔豚。此方主之。汗多。心液耗散。腎乘心虛。上凌而尅之。故動揚

於臍間。

白茯苓六錢 桂枝三錢 甘草炙一分 大棗三枚

甘爛水煎服

茯苓淡滲伐腎以散水蓄甘草益氣和中以補陽虛桂枝走陰降腎禦奔豚之未至大棗益脾助土制奔豚之上衝。

生地黃連湯 治男婦血風證此去血過多因而燥

澗循衣撮空錯語失神脉弦浮而虛者加人參

二錢更妙陽生陰長之意也

生地酒浸當歸酒蒸白芍酒炒川芎各一錢五分黃連酒炒梔子

薑汁黃芩酒炒各一錢防風酒潤二錢五分水煎溫服

脉實加大黃酒浸

陶氏曰。大承氣湯。氣藥也。自外而之內者用之。生地黃連湯。血藥也。自內而之外者用之。氣血合病。循衣抹牀。證同。自氣之血。血而復之。氣者。大承氣湯主之。自血之氣。氣而復之。血者。生地黃連湯主之。二者俱不大便。此是承氣湯對子。又與三黃石膏湯相表裏。皆三焦包絡虛火之病也。病既危急。只得以此降血中之伏火耳。綱目曰。四物湯與桂枝麻黃葛根柴胡青龍白虎涼膈承氣理中四逆吳茱萸附子等湯。皆可作各半湯服之。此易老用藥大略也。

茯苓四逆湯 汗下後煩燥不得眠此方主之

白茯苓

錢

人參

乾薑

附子

生

甘草

炙各一錢

水煎溫服

去茯苓名四味同陽氣治元陽虛脫再加熟地當歸名六味同陽飲治陰

陽虛

脫

按煩出於心。用茯苓以養心。燥發於腎。用乾薑以潤腎。固表生津。用人參以益虛。溫裏散寒。用附子以回陽。和中緩急。用甘草以安胃也。

導赤散

生地黃

木通

各三錢

淡竹葉

甘草稍

各一錢

水煎溫服

導赤瀉心各半湯

治越經謬脈浮沉俱有力者

黃連

酒洗

黃芩

酒洗

梔子

薑汁炒

知母

鹽酒拌炒

犀角

磨汁

另入

分

人參

麥冬

茯神

去木

甘草

生各二錢

滑石

二錢

燈心

三分

生薑

二錢

大棗

二枚

水煎溫服

知母麻黃湯

治傷寒汗出不徹後證

前論中已辯明

知母

二錢

黃芩

酒洗

麻黃

去節

桂枝

白芍

甘草

各一錢

水煎溫服

詳證加酒炒黃連一尤妙

黃連犀角湯

狐惑病咽乾聲啞此方主之

黃連

酒炒二錢

犀角鎊

二錢磨汁另入

烏梅

三枚

木香

三分磨汁

水煎黃連烏梅去渣入犀角汁木香汁和服。

雄黃銳丸

治狐惑蟲蝕藏。

雄黃

黃連

苦參

桃仁

青箱子

各等分

爲末以艾汁丸如棗核樣棉裹入穀道中。

百合地黃湯

治百合病不經汗吐下病形如初者。

百合

七個

劈破以泉水浸洗去沫另用泉水

五盞煎

取一盞

半

生地黃

二兩

洗淨用泉水

五盞

煎取

一盞

二汁合一處分二服大便下惡物如漆中病卽止。

不中再作服

三甲散

主客交渾病

詳論中

鼈甲

酥炙龜甲

酥炙如無酥二味並用醋炙各一錢

穿山甲

上炒黃五分

白殭蠶

一錢生用切斷蟬蛻

五分全

牡蠣粉

五分晒燥不用

當歸

白芍

酒炒七分甘草

五分盛蟲

三個搗爛入酒取汁聽用其渣與諸藥同煎

水煎去渣入盛蟲汁和服

若素有老瘧或癰

瘧者加何首烏

一錢懷牛膝

一錢胃弱欲作瀉宜九

蒸九曠

若素有鬱痰者加川貝母

去心一錢

若

素有老痰者加栝蘘

搗爛二錢

嘔則勿用

若咽乾

作癢者加知母

五分

天花粉

五分

若素有內傷瘵

血者倍糜

俗謂土
蠶是也

無此物用桃仁泥

錢一

乾漆炒

盡研

代之服後病減七八漸進調理法可也

桂枝加附子紅花湯

治婦女傷寒表虛自汗身涼

四肢拘急經水適斷脈沉而遲者

桂枝

錢二

白芍

錢二

甘草

錢一

附子

炮八分

紅花

七分

生薑

錢二

水煎溫服

黑龍丹

治瘀血沁入心脾經病百出危急惡疾諸

藥不效者並治難產胞衣不下及一切瘀血不

行之證

全當歸

生地黄

川芎

五靈脂

去砂

良薑

各二兩

右五味爲粗末，入砂罐內，紙筋鹽泥封固，炭火煨紅，候冷取出，研爲細末，再入後五味。

百草霜

鄉外人家者佳

乳香

花蕊石

火煨醋淬七次

生硫黃

琥珀

另研各二錢

右五味各爲細末，同前五味合研

勻，用米醋煮麵糊爲丸，如彈子大，每服一九，以炭火煨藥丸通紅，投生薑自然汁中淬之，或豆淋酒，或童便化下。

準繩曰。金華君產七日不食。始言頭痛。痛已心痛。又作。既而目睛又痛。更作更止。如刺如割。相去無瞬息間。每頭痛作。欲取大石壓之。良久漸定。心痛作。則以十指抓壁。血流滿掌。稍定。目睛痛又作。則以兩手指刺之。如是十日不已。衆醫無計。偶進黑龍丹半丸。痛苦稍間。中夜再服半丸。寢如平時。至晨下一行。約二升許。如蝗子狀。三疾減大半。已刻又下。如前則頓愈矣。

麻仁丸

跌陽脉

在足趺之上

浮而濡

浮爲陽盛。濡爲陰虛。

浮則胃

氣強、陽盛多熱、瀉則小便難、或數、陰虛則便難、

矣、浮瀉相搏、相合、大便則難、熱傷津、故其脾為約、

胃強則脾弱、不能為胃所約束者、此方主之、

大麻仁去皮杏仁泡去皮炒大黃厚樸薑汁炒枳實炒

白芍各五錢為末、鍊蜜丸、白飲下二錢、連服漸加、

以和為度、

枳實梔子豉湯、病差勞復者、因勞煩熱、此方主之、若有

宿食、加大黃、本方去豉、加厚樸三錢名梔子厚

樸湯、加神麴六錢治食復、效腹脹疼、量加大黃、

枳實

炒

梔子

生各三錢

豆豉

五錢

清漿水

二盅

入梔實

先煎，後入豆豉煎服，微汗愈。

勞熱以汗解。

牡蠣澤瀉散

大病差後，從腰以下有水氣者，此方

主之。

腰以上屬陽，腰以下屬陰，水陰物也。上浸陽界，則危矣。

牡蠣粉

煑堅行水

澤瀉

煑堅利水

葶藶子

炒研通水道消浮腫

蜀漆

散結

行海藻

煑腎下二水腫

商陸根

疏通宿水

栝蒌根

各等分

徹

胃熱而滋

水

以利

爲末

白飲調下

二錢

日三進

小便利

漸

愈不可過。

金匱曰：腰以下腫，當利小便。此定法矣。乃大病後脾

土告困。不能攝水。以致水氣泛溢。用此散峻攻。何反
不顧其虛耶。抑知正因水勢未犯。半身以上。急驅其
水。所全甚大。設用輕劑。則陰水必襲入陽界。驅之無
及。可見活人之事。迂疎輩必不能動中機。宜庸工遇
大病後。悉行溫補。脾土自以爲善。孰知其爲鹵莽滅
裂哉。

大營煎 治男子真陰精血虧損及婦人經遲血少
或腰膝筋骨疼痛或虛寒心腹疼痛者

熟地三五錢 當歸二錢 枸杞二錢 杜仲一錢 牛膝一錢 肉

桂

錢一 甘草 錢二

水煎溫服 如寒滯在經氣血

不能流通筋骨疼痛之甚必加製附子一二錢

方妙 中氣虛寒嘔惡者加乾薑炒一錢 營虛

於上而爲驚恐怔忡不眠多汗者加酸棗仁炒

茯神各二錢 帶濁腹痛者加故紙盛炒一錢 氣

虛有痛者加香附米二錢 以行之 陽衰氣虛者

加人參二錢 以補之

五苓散 太陽膀胱本熱小便不利發熱口渴脈浮

者此方主之 脈浮爲表證仍在便秘熱渴爲府證已急用此兩解表裏

澤瀉

二錢五分

猪苓

茯苓

白朮

土炒各一錢半

桂枝

一錢

水煎溫服

合小柴胡湯名柴苓湯

汪詠菴曰猪苓湯瀉熱勝。故用滑石五苓散瀉濕勝。故用桂朮。但傷寒太陽宜五苓。陽明宜猪苓。

傷寒論曰太陽病發汗後若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之。又曰多飲暖水汗出愈。成氏註曰桂枝之辛甘以和肌表。脈浮者表未解也。微熱消渴者熱未成實上焦燥也。與五苓散生津液和表裏乃兩解之藥也。今之知用桂枝者少矣。殊不知兼治表

邪必用桂枝。專用利水。則宜肉桂。以肉桂辛熱。能引諸藥直達熱邪畜結之處。故澤瀉味鹹。所以瀉腎止渴也。二苓味淡。所以滲水滌飲也。白朮味甘。所以補脾逐濕也。兼以肉桂有化氣之功。內經曰。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。濁陰既出下竅。則清陽自出上竅。又熱隨溺而洩。發熱口渴之證。不治自愈。

解毒承氣湯

溫病三焦太熱。痞滿燥實。譫語狂亂。

不識人。熱結傍流。循衣抹床。舌捲囊縮。及瓜瓢。

老瘠温上爲癰膿下血如豚肝等證厥逆脉沉

伏者此方主之

加栝蒌一個半夏二錢名陷胸承氣湯治胸滿兼有上證者

白僵蠶

酒炒

三錢 蟬蛻

全十個

黃連

一錢

黃芩

一錢 黃柏

子

一錢 枳實

麩炒二錢五分

厚樸

薑汁炒

大黃

酒洗

芒硝

另入

甚至痞滿燥實堅結非常犬黃加至兩餘芒硝加至五七錢始動者又當知之

按此乃温病要藥也。然非厥逆脉伏大熱大實及熱結傍流舌捲囊縮循衣抹牀等證見之真而守之定不可輕投。予用此方救壞證危證大證而愈者甚衆。虛極加入參二錢五分。如無參用熟地黃一兩歸身

七錢。山藥五錢。煎湯入前藥煎服。亦累有奇驗。內經曰。熱淫於內。治以鹹寒。佐之以苦。此方是也。加人參取陽生陰長。所謂無陽則陰無以生。加熟地等取血旺氣亦不陷。所謂無陰則陽無以化。其理一也。

猪苓湯

陽明病發熱渴欲飲水小便不利少陰病

下利咳而嘔渴心煩不眠並此方主之

通治濕熱黃疸

口渴便赤

猪苓

滲下焦蓄水

茯苓

引肺氣而右降

澤瀉

鹹以助腎行水

滑石

滑以利竅

通淋阿膠

滋腎水乾枯各三錢

水煎上四味去渣，入阿膠烱化溫服。

桂枝加厚樸杏仁湯 太陽病下之微喘者，表未解

也。此方主之。

桂枝三錢 白芍三錢 甘草二錢 厚樸二錢 杏仁一錢 生薑三錢 大

棗二個 水煎溫服。

此太陽中風誤下作喘之治法也。其太陽傷寒誤下作喘，用麻黃杏仁甘草石膏湯，乃天造地設兩不易之良方。凡下後利不止，而加上氣喘急者，乃上爭下奪之象。但驟病之人，中氣足供上下之用，邪盡而喘

利自止。若中氣素餒，加以上下交征，立盡之數矣。此證不云下利，但云微喘，表不解，則是表邪因誤下上逆與虛證不同，故仍用桂枝湯以解表，加厚樸杏仁以利氣，亦微裏之意也。

梔子柏皮湯

傷寒身熱

濕熱鬱於肌表

發黃者，此方主之。

梔子

三錢

黃柏

三錢

水煎溫服

按此方之甘草

三錢無著應是茵陳蒿必傳寫之訛也當改之

麻黃連軛赤小豆湯

傷寒瘀熱在裏

裏表

身必發黃，此

方主之。

按瘀熱在裏之裏字應是表字，若是裏字，豈熱在裏而藥反治其表哉，當改之。

麻黃

三錢

連軀

三錢

赤小豆

五錢

生梓白皮

五錢

杏仁

一錢

甘草

炙一錢

生薑

二錢

大棗

二枚

連軀乃連翹根也

水煎麻黃去沫入羣藥煎服

金沸草散

治感冒風寒咳嗽多痰頭目昏痛身熱

鼻塞聲重

風熱上壅故生痰作嗽荆芥解肌散

草發散緩中細辛溫經茯苓利濕赤則入血分而瀉丙丁也

金沸草

去蒂二錢

荆芥穗

三錢

前胡

二錢

半夏

一錢

赤茯苓

一錢

半

細辛

一錢

甘草

炙七分

生薑

二錢

大棗

二枚

水煎溫服

局方無細辛茯苓有麻黃赤芍

熱加

柴胡黃芩痞

悶加枳殼頭痛加川芎
血芷

準繩曰人止知此散治風寒咳嗽及加杏仁五味子
治諸咳嗽皆效獨未知用之治舌腫牙痛辛未有人
舌腫滿塞粥藥不入危甚煎此散乘熱以紙籠熏之
遂愈况服之乎三因亦云一婦人舌腫牙痛口頰皆
腫以此散大劑煎湯熏漱而愈

地榆散 治傷寒溫病熱毒不解日晡壯熱腹痛便
利膿血甚如爛瓜肉屋漏水者

地榆 錢二 當歸 錢四 白芍 錢四 黃芩 黃連 梔子 炒

犀角鎊

磨汁各二錢

薤白

四錢

水煎去渣入犀汁冷服

桃花湯

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利

下利不止便膿血者及少陰下利便膿血腹不痛者並此方主之

赤石脂

煨二兩

乾薑

二錢四分

粳米

五錢

水煎米熟去渣

再調赤石脂末二錢溫服

桂枝加桂湯

即陰旦湯

主太陽中風燒鍼令出其汗鍼處

被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂

本方去桂加黃芩卽陽旦湯

桂枝

二錢

白芍

二錢

桂

四錢

去粗甘草

二錢

生薑

二錢

大棗

二錢

二枚

水煎溫服

喻氏曰奔豚者腎邪也腎邪一動勢必自少腹上逆而衝心狀若豕突以北方亥位屬猪故也腎邪惟桂能伐之所以加桂一倍於桂枝湯中外解風邪內泄陰氣也嘗卽此例推之凡傷寒發表誤入寒藥服後反加壯熱膚起赤塊畏寒腹痛氣逆而喘或出汗時覆蓋未周被風寒復侵紅腫喘逆其證同者用此方

良驗。一婦病風寒外感。服表藥後。忽面若裝赤。散髮
叫喘。雙手上揚。予知其少腹作奔豚也。服此方。頃之
卽定。

麻黃附子甘草湯 少陰病得之二三日。但欲寐無
裏證者。此方主之。

麻黃二錢 附子一錢 甘草二錢

二味煎服。微發汗則愈。

水煎麻黃去沫。再入

此少陰病無裏證者。知表邪未患併陰也。故以附子
溫少陰之藏寒。甘草和表裏之陰陽。麻黃發未盡之

傳邪而病斯痊矣。不然大汗淋漓則陽氣愈虛而陰邪愈盛。故戒之曰微發汗。

白通加人尿猪膽汁湯

少陰病下利

藏寒不禁則下利水性趨

下故也脈微者

陽虛也

與白通湯利不止

用方切當若猶不止

厥冷無脈

脈微而至於絕

乾嘔煩者

陽爲陰拒而不能入也

此方

主之

反佐以和之也

服湯後脈暴出者死

陽欲燼而忽煩勢必成灰

微續者生

氣漸回而微續機有更生

去人尿膽汁名白通湯

葱白

二莖乾薑

三錢附子

生三錢

人尿

一杯

猪膽汁

三茶匙

水煎去渣入人尿膽汁和勻溫服如無膽汁亦

可用。

葱白通陽接陰。有升發之能。乾薑健脾暖胃。有化穀之長。附子溫中散寒。有回陽之善。人尿膽汁性寒而續真陰。引薑附而為肝腎之向導。起死回生之方。造化神工之妙也。

桂枝二越婢一湯

太陽病發熱惡寒熱多寒少風

寒少也脈微弱者微為陽虛弱為陰虛也此無陽也不可發

汗此方主之

風多用桂枝二以解之寒少用越婢一以發之

桂枝

白芍

甘草

麻黃

各二錢五分

石膏

三錢三分

生薑

四錢三分

大棗

二枚

水煎麻黃去沫入羣藥煎服

卽此一方知仲景酌量脈證毫釐不差因風多寒少故用桂枝二以解之越婢一以發之也後世醫家那得窺其萬一

八正散 治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急

滿者

木通

車前子

炒

瞿麥

苧子

大黃

滑石

扁蓄

甘草梢

各等分

燈心

一

水煎溫服

一方有木香

通麥燈心降心火入小腸車前清肝火入膀胱梔子

瀉三焦鬱火。大黃滑石。又瀉火和水之捷藥。扁蓄利
便通淋。草稍入莖止痛。雖治下焦而不專於治下。必
三焦通利。水乃下行也。

太平圓酒 溫病愈後。元神未復。腰脚無力。渾身酸

軟者。此方主之。

糯米酒糟

曬乾炒黃色爲末二兩四錢

主溫中消食。除冷氣。殺

腥去草菜毒。潤皮膚。調藏府。和血。行氣。止痛。

紅麴

陳久者佳。炒黃黑爲末二兩四錢

主健脾消食。養陰滋血。

六神麴

陳久者佳。炒黃黑爲末四兩八錢

主健脾養胃。化穀消食。

小麥麩

陳麥麩佳去淨麵筋曬乾炒黑色爲末四兩八錢

主天行溫毒熱

極發狂發斑疹太渴者又主調中養氣健人生力助五藏除煩悶利小腸麥乃養心之穀屬火而麩則能退心熱與胸膈之熱蓋取同氣相求亦從治之意也

白殭蠶

白而直者黃酒炒黃褐色爲末八錢

全蟬蛻

去土爲末四錢

二味前

已註明

加枳殼木通治食滯飽悶服散亦妙

右六味合研勻水丸每服一兩以冷黃酒三兩調蜜一兩送下隔五日如法再服如是三次開胃進食健

人生力只十餘日，仍如無病一般，因名其方爲太平圓酒。

升麻鼈甲湯

升麻

甘草

各一兩

鼈甲

酥炙

當歸

蜀椒

炒去汗

各五錢

雄黃

研二錢五分

水六盅，煎二盅，分二次連服之，老

小再服，取汗愈。

玉樞丹

一名紫金錠

專治暴中雜氣病，昏暈欲倒，如霍亂

吐瀉攪腸沙，青筋脹，心腹痛脹，諸般危證，並一

切山嵐瘴氣，水土不服，解諸毒，療諸瘡，利關竅。

通百病奇效不可殫述

山茨菇 洪山者洗去毛皮焙二兩 川文蛤 一名五倍子製淨槌破焙二兩紅

芽大戟 去淨骨焙一兩五錢 千金子 一名續隨子用鮮者去殼去油一兩 朱砂

有神氣者 明雄黃 鮮紅大塊者 麝 揀淨皮毛乾研末三錢 研末三錢

右七味稱準合研勻於細石臼內漸加糯米濃

飲調和燥濕得宜杵千餘以光潤為度每錠重

一錢每服一錠病重者連服二錠取通利後以

溫粥補之

治一切飲食藥毒蠱毒及喫自死牛馬猪羊等肉

菌中毒，並山嵐瘴氣，烟霧惡毒等證，昏亂猝倒，或生異形之狀，悉用凉水磨服。

一治陰陽二毒，瘟疫痧脹，或狂言亂語，或胸腹腫痛，並喉痺咽腫，俱用薄荷湯，待冷磨服。

一治癰疽發背，對口天泡，無名腫毒，蛙節紅絲等疔，諸惡等瘡，諸風癩疹，久痔紅腫，及湯梅結毒，俱用無灰酒磨服，外用凉水磨塗，日夜數次，覺癢即消，潰爛者亦可少減。

一治男婦急病，癡邪奔走，叫號失心，狂亂羊兒猪癩。

等風俱用石菖蒲煎湯磨服。

一治心胃痛及諸般氣痛及諸般血痛並赤白痢泄瀉急痛霍亂絞腸之類俱用薑湯磨服。

一治中氣中風中痰口眼歪邪牙關緊急語言蹇澀筋脈攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱難等證用酒磨頓熱服之。

一治風犬毒蛇澗溪諸蟲傷人及注漏身毒氣入裏命在旦夕俱用酒磨服外以水磨塗之再服葱湯汗出愈。

一治年深日久，頭脹，頭痛，偏正頭風，及溫病後，毒氣
攻注腦門，作脹者，俱用葱酒磨服，仍磨塗太陽穴
上。

一治小兒急驚風，五疳，五痢，黃疸，俱用薄荷湯磨，加
蜜調服。

一治小兒遺毒，生下百日內，皮塌肉爛，穀道眼腫，損
者，凉水磨服，並磨塗。

撥正散 專治雜氣爲病，陰陽毒，痧脹，及一切無名
惡證，並食厥，痰厥，氣厥，皆驗。

葶撥 雄黃精爲火硝各二錢 冰片 麝各五釐

右爲細末，男左女右，以筒吹入鼻中，卽甦。

半夏散及湯

半夏 桂枝 甘草各一分 爲末，白飲調服一錢

五分，日三如不能服散，以水二盅，煮五六沸，入

散一兩，再煮四五沸，冷徐嚥之。

苦酒湯

半夏爲末一錢 苦酒 以雞子一箇，去黃，入半夏苦酒

於殼內，置鐵環中，安火上，令三沸，去渣，少少嚥。

下、不瘥、再作三劑服之。

豬膚湯

豬毛下附皮薄黑肉一斤以水四碗煮取二碗去渣

入白蜜二兩白粉一兩熬香和相得溫分三服

當歸導滯湯

當歸

一兩

白芍

一兩

萊菔子

四錢

車前子

炒研

枳殼

炒

檳榔

甘草

炙各二錢

水煎入蜜溫服

看後加味最妙

紅痢加桃仁

此方之奇妙全在當歸白芍蓋泄瀉最忌當歸之滑而痢疾最喜其滑也白芍味酸入肝以和木使

木不侵脾土。枳殼、檳榔消逐濕熱之邪。車前分利其水濕。而又不耗真陰之氣。萊菔辛辣除熱去濕。又能上下通達。消食利氣。使氣行於血分之中。助歸芍以生新血。而蕩滌其瘀血也。加甘草蜂蜜以和中。則又無過烈之患。奏功之神奇。實有妙理耳。

熱加黃連

二錢

黃芩

二錢

日夜無度。或裏急後重之甚

者。再加大黃、木香。溫病後痢疾。加白殭蠶、蟬蛻。

芳香飲

溫病多頭痛、身痛、心痛、脇痛、嘔吐黃痰、口

流濁水、涎如紅汁、腹如圓箕、手足搐搦、身發斑

疹、頭腫、舌爛、咽喉痺塞等證，此雖怪怪奇奇，不可名狀，皆因肺胃火毒，不宜鬱而成之耳。治法急宜大清大瀉之，但有氣血損傷之人，遽用大寒大苦之劑，恐火轉閉塞而不達，是害之也。此方主之，其名芳香者，以古人元旦汲清泉以飲，芳香之藥，重滌穢也。

元參

一兩 白茯苓

五錢 石膏

五錢 蟬蛻

全十箇 白殭蠶

須炒三錢

荆芥

三錢 天花粉

三錢 神麴

炒三錢 苦參

三錢 黃芩

二錢 陳皮

一錢 甘草

一錢 水煎去渣，入蜜酒冷服。

三合湯 加減生化小柴胡小清涼三方而一之

治產後溫病大熱神昏四肢厥逆譫語或不語等證若發狂燥結量加大黃芒硝內經曰熱淫於內治以鹹寒佐之以苦又曰有病則病當之是也

當歸八錢酒洗川芎三錢桃仁不去皮尖炒研一錢紅花一錢酒洗益母

草去老梗五錢軟柴胡四錢黃芩三錢梔子三錢粉丹皮三錢白

殭蠶酒炒三錢蟬蛻全十錢金銀花三錢澤蘭葉三錢生甘草

一錢水煎去渣入蜜酒童便和勻服

滾痰丸 老痰積飲怪病百出此方主之準繩備言之

川大黃

八兩酒蒸一次

黃芩

酒洗八兩

青礞石

火硝煨如金色一兩

沉香

五錢

爲末水丸薑湯送下量虛實服

準繩加百藥尖五錢尤妙

礞石性慄悍能攻陳積伏匿之痰爲君大黃蕩熱實以開下行之路爲臣黃芩涼心肺以平僭上之火爲佐沉香能升降諸氣以導諸藥爲使也

文蛤散

文蛤

鹹寒走腎專於行水二兩

爲末沸湯調服二錢

白散

桔梗

開膈下氣三錢

川貝母

寬鬱利痰三錢

芭豆

散寒逐結炒黑去油爲霜一錢

二味爲末入芭豆霜再研勻白飲和服強人五六分弱人減半在上吐在下利不利進熱粥一杯過利不止進冷粥一杯

加味茵陳蒿湯 通治黃疸

茵陳 梔子

大黃

各三錢

山藥

二錢

甘草

白朮

豬苓 茯苓

木通

黃芩

黃柏

生薑

各一錢

水煎溫服

跋

世嘗謂傷寒家如戴復菴偏於溫補劉河間偏於寒瀉是殆循跡以求而未深嘗其味者蓋復菴以傷寒汗下失宜寒涼太過始爲熱中末傳寒中誠得治傷寒壞病之要訣而非偏於溫補也河間以傷寒爲雜病溫病爲大病特製雙解涼膈三黃石膏表裏兩解誠得治溫病鬱熱之要訣而非偏於寒瀉也各擅其勝易地則皆然矣不得要領而動相非議又何怪人異其旨家異其學耶余才淺學疎未入閫奧惟是博

考先哲議論零星輻輳詳於溫病脈證與傷寒大異
病分常氣雜氣治分氣分血分與夫陰陽寒熱表裏
虛實條分縷晰而理歸一貫其論證處方於先哲之
隱深者明顯之詰屈者流利之以就淺近非故點金
成鐵也將使因證檢書而求治方者寒溫補瀉各適
其宜不至多岐而惑則幸甚戊子春栗山瘡書