

吳鞠通先生醫案

吳氏醫案序

醫之有案猶國之有史也治國者鑑於古代治亂興衰之故而後知所以爲政
理民之道爲醫者察於昔人起疴拯危之神而後知所以治病用藥之方蓋皆
積所經驗以傳諸後世而資其師法者也其爲書顧不重哉淮陰吳鞠通先生
醫聲震海內蓋不特葉氏之高弟抑亦仲聖之功臣也生平著述有溫病條辨
醫醫病書及吳氏醫案諸書而醫案尤先生畢生精力之所蓄萃今條辨旣傳
布全國爲世寶貴而醫醫病書亦已由本社刊於去冬獨醫案一書向鮮傳本
偶有鈔錄藏者亦秘不示人遂使先生數十年經驗之良模不獲見知於世寧
不惜哉三十年前余曾向丁灶胡氏處假錄一通常置案頭用資師法友人見
者均嘆爲良書轉相傳鈔幾於日不暇給同社友吉生裘君有刊行醫藥叢書
之舉欲將此籍收入之以廣其傳因詳加校讎而付之天傳播古籍以嘉惠後
學吾人之責也若謂表章先賢則吾豈敢至案中有用量過重處僉謂刊時可

刪去此余期期以謂不可蓋刊行古書須存古書眞面俾後學得窺遺澤凡書
內之或是或非應在讀者各自加其主見倘妄行編次隨意割截不若自行著
作何必借古人之名而滅古人之實逞一己之私而貽後人之憾耶

丙辰二月後學高德僧汝賢謹序

吳鞠通先生醫案 卷一

目錄

暑伏溼中瘧
溫暑燥傷寒

吳鞠通先生醫案卷一

稿學 高德曾汝
校刊 裴吉生慶元

暑溫

壬戌六月廿四日甘暑溫邪傳心包譯語神昏右脈洪大數實而模糊勢甚危險
連翹六錢 生石膏一兩 麥冬六錢 銀花八錢 細生地六錢 知母五錢 元參
六錢 生甘草三錢 竹葉三錢 煮成三碗分三次服牛黃丸一丸 紫雪丹三
錢另服

七月初溫邪入心包絡神昏瘧厥極重之症
一日

連翹三錢 生石膏六錢 麥冬連心五錢 銀花五錢 細生地五錢 知母二錢
丹皮三錢 生甘艸一錢五分 竹葉二錢
今晚一帖明早一帖再服紫雪丹四錢

壬戌七月十五日二歲世人悉以羌防柴葛治四時雜感竟謂天地有冬而無夏不
十四日亦免哉以致暑邪不解深入血分成厥衄血不止夜間煩躁勢已膠錮難
解焉得速功

飛滑石三錢犀角三錢冬桑葉三錢羚羊角三錢元參五錢鮮蘆根一兩
細生地五錢丹皮五錢鮮荷葉邊一張杏仁泥三錢今晚一帖明早一帖
十五厥與熱似乎稍緩據云夜間煩躁亦減是其佳處但脈弦細沉數非虛厥
所宜急育陰而戀陽復鹹以制厥法

生地六錢生鱉甲六錢犀角三錢元參六錢羚羊角三錢丹皮三錢麥冬
連心八錢生白芍四錢桑葉三錢日服二帖

十六脈之弦剛者大覺和緩沈者已起是爲起色但熱病本屬傷陰況醫者誤
以傷寒溫燥藥五六帖之多無怪乎舌苔燥如草也讓啟腎液法

元參一兩天冬三錢丹皮五錢沙參三錢麥冬五錢銀花三錢犀角三錢

甲八錢秦葉二錢日服三帖

日十十卽於前方內加細生地六錢連翹一錢五分鮮荷葉邊三錢再按暑熱之邪深入下焦血分身半以下地氣主之熱來甚於上焦豈非熱邪深入之明徵乎必借芳香以爲搜邪之用不然恐日久膠錮之邪一時難解也一日熱邪不解則真陰正氣日虧一日矣此紫雪丹之必不可少也

紫雪丹一錢五分分三次服

日十八厥已回面赤舌苔乾黑芒刺脈沈數有力十餘日不大便皆下症也人雖虛然亦可以調胃承氣湯小和之

大黃生五錢元明粉沖三錢甘草生三錢

先用一半煎一茶盃緩緩服俟夜間不便再服下半劑服前方半劑卽解黑大便許多
便後用此方

麥冬一兩 大生地一兩 鱉甲一兩 白芍六錢

十九日 大下宿糞若許苦苔化而未滋潤脈仍洪數微有潮熱除存陰無二法

沙參三錢 大生地一兩 鱉甲五錢 麥冬六錢 生白芍六錢 牡蠣五錢 天冬

三錢 火甘草三錢 丹皮四錢 曰服二帖

廿一小便短而赤甚微咳面微赤尺脈仍有動數之象議甘潤益下以治虛熱

少復苦味以治不盡之實邪且甘苦合化陰氣而利小便也按甘苦合化
陰氣利小便法舉世不知在溫熱門中誠爲利小便之上上妙法蓋熱傷
陰液小便無由而生故以甘潤益水之源小腸火腑非苦不通爲邪熱所
阻故以苦藥瀉小腸而退邪熱甘得苦則不呆滯苦得甘則不剛燥合而
成功也

生鱉甲八錢 元參五錢 麥冬連心六錢 生白芍六錢 沙參三錢 麻仁三錢
古勇連一錢 阿膠三錢 丹皮三錢 火甘草四錢 曰二帖

廿二日已得效仍服前方二帖

廿三日復脈複苦法清下焦血分之陰熱

元參五錢 賴甲生五錢 阿膠化冲三錢 白芍生六錢 天冬二錢 丹皮三錢
麻仁五錢 麥冬連心五錢 甘草炙五錢 日服二帖

癸亥六月王二十一日暑溫舌苔滿佈色微黃脈洪弦而剛甚左反大於右不渴初
起卽現此等脈症恐下焦精血之熱遠甚於上焦氣分之熱也且舊有血
溢故手心熱又甚於手背究竟初起且清上焦然不可不心知其所以然
連翹二錢 細生地一錢五分 粉丹皮二錢 銀花二錢 苦桔梗一錢 白茅根
二錢 麥冬一錢 牛蒡子一錢五分 香豆鼓一錢五分 元參一錢五分 霍香
梗一錢 生甘草一錢 薄荷三分 日三帖

廿六日初熱退大半胸痞腹中自覺不和按暑必夾溼熱退淨存之故先清氣分

藿香梗三錢 飛滑石一錢五分 白扁豆二錢 杏仁泥二錢 連翹二錢 廣鬱

金二錢 生苡仁三錢 銀花一錢五分 白通草八分 香豆鼓一錢 日二帖

初七 痘後六腑不和

霍香梗三錢 飛滑石三錢 香豆鼓二錢 生苡仁二錢 半夏一錢 廣皮灰一

錢 廣鬱金一錢 厚朴一錢 日服一帖

初十 向有失血又屆暑病之後五心發熱法當補陰以配陽但脈雙弦而細不

惟陰不充足卽真陽亦未見其旺也議二甲復脈湯仍用舊有之桂枝葛

棗

白芍炒四錢 大生地四錢 沙參三錢 桂枝二錢 生鱉甲五錢 麥冬四錢 麻

仁二錢 生牡蠣五錢 生薑二片 阿膠化沖二錢 炙甘草五錢 大棗去核二

枚 煮三杯分三次服

又尤方八仙丸加麻仁白芍

麥冬連心六兩 直熟地八兩 山藥三兩 茯苓四兩 五味子三兩 麻仁二兩

澤瀉三兩 山萸肉酒炒三兩 白芍酒炒六兩 丹皮四兩 蜜丸如梧子大 每服三錢 日三服

癸亥六月三十日馬八歲暑熱本易傷陰誤用消導攻伐重傷陰氣致令頭中耳中鳴初八日

無止時此係肝風內動若不急救肝腎之陰癥瘕熱厥立至矣

大生地六錢 麥冬五錢 生牡蠣五錢 炒白芍六錢 丹皮三錢 菊花炭一錢
生鱉甲五錢 桑葉一錢 五分 炙甘草三錢 大便太火麻仁二錢 煮三盃分稀去此

三次服

十一外邪雖退無奈平素勞傷太過虛不肯復六脈無神非參不可

沙參三錢 大生地六錢 阿膠三錢 元參六錢 生鱉甲六錢 丹皮三錢 麥冬

六錢 火麻仁三錢 甘草炙四錢 白芍生六錢 煮三杯分三次服

得大便後去元參加牡蠣六錢 人參三錢 桂枝一錢 大棗去核一枚 生薑一片

七月 初 痘後飲食不調又兼暑溼着裏腹中絞痛痛極便溏脈微數欲作滯下

議芩芍法奪其滯下之源

焦白芍一錢五分厚朴二錢廣木香一錢黃芩炭一錢枳實一錢小

回炭八分南查炭一錢五分廣皮炒一錢五分雲連炭八分神曲炭二錢

一二帖後腹痛除仍服復脈湯

乙丑六月 柴女十五 暑溫夾痰飲怒鬱故脈芤身熱而脇痛誤用足六經表藥

煩躁不甯六日不解至危之症

生石膏四錢杏仁三錢生香附三錢旋覆花包三錢連翹三錢藿香梗三

錢廣鬱金二錢薄荷一錢煮兩盃分二次服三時一帖服一日大見效再

商

十三日 於前方內加青橘皮二錢
魚蘆根五錢鮮荷葉邊一枚

乙丑六月 富氏廿二 暑傷足太陽發爲頭脹渴不欲飲飲則嘔身微熱舌白滑

十三日 富氏廿二 暑傷足太陽發爲頭脹渴不欲飲飲則嘔身微熱舌白滑

肢逆 便閉塞病在中焦居多以香閒腑瀉爲主

杏仁泥三錢半夏五錢小枳實三錢旋覆花包三錢厚朴四錢廣鬱金二

錢生苡仁三錢香附三錢白蔻仁一錢瞿麥杏梗三錢廣皮一錢煮兩盃分

二次服今日一帖明日服二帖

乙丑閏六月初六日孫四十歲頭痛左關獨高責之少陽內風掀動最有損一日之弊若以爲外感寒則遠甚矣議清少陽膽絡法再此症除左關獨高餘脈皆緩所謂通體皆寒一隅偏熱故先清一隅之熱金匱爲先治新病病當後治也
羚羊角一錢丹皮一錢五分茶菊花一錢五分苦桔梗一錢生甘草一錢
薄荷六分刺蒺藜一錢桑葉一錢五分鮮荷葉去蒂半張鈎藤鈎一錢煮

兩盃服今日一帖明日兩帖

初入日 前日左關獨浮而弦係少陽頭痛因暑而發用清膽絡法茲左關已平其半但緩甚舌苔白厚而滑胸中痞悶暑中之熱已解而溼尚存也議先宣

上焦氣分之溼

生苡仁五錢 飛滑石六錢 藿香梗二錢 杏仁泥五錢 半夏五錢 廣鬱金三
錢 旋覆花包三錢 廣皮三錢 白通草一錢 茶芩皮三錢 白蔻仁連皮二錢

煮兩盃今日服渣再煮一盃明早服

日初九 諸症俱減舌白未除中溼尙多議進法於前方內

加生蒼朮三錢 草果炒一錢

乙丑閏六月廿八日 煙傷兩太陰手太陰之症爲多一以化肺氣爲主

月初三日王歲 飛滑石八錢 連翹三錢 白通草一錢 杏仁泥五錢 金銀花三錢 白扁豆花一枝 生苡仁五錢 厚朴三錢 鮮荷葉去蒂一張 藿香葉一錢 白蔻仁連皮二錢 煮兩盃分兩次服早晚明早各一帖

日初四日 兩太陰之暑症昨用冷百合辛涼暑中之熱已退其半但裏溼與熱未克即除故大便紅水胸中病悶

飛滑石六錢 猪苓五錢 薤香梗二錢 杏仁泥二錢 澤瀉五錢 廣藥金二錢
茯苓皮三錢 生苡仁五錢 白通草一錢 白蔻仁一錢 五分 厚朴三錢 煮三

益服今晚明日各一帖

初五舌苔白厚腹甚不和腸鳴泄瀉聚溼尙多急宜分泄以免延拖

飛滑石六錢 半夏五錢 薤香梗三錢 茯苓皮六錢 澤瀉五錢 南蒼朮三錢
生苡仁六錢 椒目五錢 白蔻仁三錢 老厚朴三錢 廣皮三錢 水八碗 煮取
三碗分三次服酒再煮一碗服

廿二日廣成四
六脈洪大之極左手更甚目邪視怒氣可畏兩臂兩手捲曲而癇癓舌邪向不語三四日面赤身熱舌苔中黃邊白暑入心包膽絡以清心膽之邪爲要先與紫雪丹

連翹連心五錢 純羊角三錢 竹茹三錢 金銀花五錢 邇羅犀角三錢 丹皮
三錢 蘿蔥五錢 細生地五錢 藜葉三錢 天冬三錢 鮮荷葉去蒂一張 煮四

益分四次服又碧雪丹一兩每服三錢涼開水調服以神清熱退爲度現在熱厥

日廿三肝熱之極加天冬涼肝於前方內

加天冬三錢其碧雪丹仍照前常服

日廿四暑入心膽兩經與清心絡之伏熱已見小效仍用前法而進之

烏犀角五錢連翹速心四錢粉丹皮五錢羚羊角三錢銀花二錢茶菊花三錢細生地五錢麥冬連心五錢冬桑葉三錢煮四盃分四次服

日廿五加黃芩三錢白扁豆花一枝山連一錢五分鮮荷葉邊一枚

日廿六暑入心膽兩經屬清兩經之邪業已見效今日飲水過多水入微嘔蓋暑必挾溼議於前方內去柔藥加淡滲

茯苓皮五錢銀花三錢黃柏炭一錢生苡仁五錢連翹連心三錢真川連一錢羚羊角三錢犀角一錢冬桑葉二錢黑山梔三錢茵陳三錢荷葉邊

二枚煮三盃分三次服

廿七暑熱退後咽水身微黃熱退溼存

雲苓塊連皮五錢銀花三錢白蔻皮一錢生苡仁五錢連翹三錢黃柏炭二錢杏仁泥三錢茵陳三錢白通草一錢黑山梔三錢煮三盃分三次服

廿九熱未盡退舌起新白苔胸痞暑兼溼熱不能純治一邊

飛滑石六錢銀花三錢藿香梗三錢雲苓皮五錢連翹不去心三錢黑山連一錢五分杏仁泥五錢白蔻打碎一錢五分白通草一錢生苡仁五錢

煮三盃分三次服

八月初暑熱已退七八惟十餘日不大便微有譫語脈沈可與輕通陽明與增

液承氣法

細生地六錢元參八錢麥冬不去心六錢生大黃四錢煮成三盃先服一
盃約二時不大便再服第二盃明早得大便止後服否則服第三盃

日初三溫病下後宜養陰暑溫下後宜兼和胃蓋暑必夾溼而舌苔白滑故也脈緩與外臺茯苓飲意

雲苓塊五錢麥冬不去心五錢廣蠻金一錢生苡仁五錢半夏三錢白蔻皮一錢五分藿香梗三錢厚朴二錢煮三盃分三次服

日初五暑溫熱退溼存故嘔腹不和而舌有白苔與三仁湯宜剛法

杏仁五錢益智仁一錢苡仁五錢半夏五錢藿香梗三錢黃芩三錢厚朴二錢白蔻仁一錢五分生薑三片煮三盃分三次服

丁卯六月王三十日十五日王八歲暑溫誤表汗如暴雨直流有不可猝遏之勢脈洪芤氣短與

白虎人參湯

生石膏八兩知母二兩粳米一合炙甘草一兩洋參八兩煮四碗一時許服一碗以汗止爲度不止再作服

日十六汗勢減照前方服半劑

十七 日 脈靜身涼汗止與三才湯三帖全愈

丁丑六月 吳四十歲 先暑後風大汗如雨惡寒不可解先服桂枝湯一帖爲君之

十三日 桂枝用二兩 盡劑毫無效驗次日用桂枝八兩服半帖而愈鞠通自醫

丁亥閏五月廿二日某暑溫誤表致有譖語邪侵心包熱重而赤脈洪數手太陰症爲多

宜辛涼芳香以清肺熱開心包陽有汗陰無汗及頸而還極大症也

生石膏一兩 連翹連心三錢丹皮三錢 飛滑石六錢 銀花三錢 桑葉三錢

細生地五錢 知母炒三錢 甘草一錢 苦桔梗三錢 煮三大盃分三次服外

服紫雪丹五分

廿三 脈之洪數者少減熱亦少退舌心黑滑大便頻溏暑必夾溼況體厚本身
溼痰過重者乎議兩清溼熱

雲苓皮五錢 連翹連心三錢 薤香梗三錢 生苡仁五錢 銀花四錢 六一散

三錢 薤半夏三錢 黃芩一錢 白蔻仁一錢 煮三盃分三次服外服紫雪丹

五分

廿四 脈洪大又減但沈數有力伏邪未淨舌中黑滑耳聾大便仍頻溏

雲苓皮六錢 苡仁五錢 黃芩三錢 薑半夏五錢 連翹三錢 銀花三錢 雅連

薑汁炒一錢 六一散六錢 竹葉三錢 煮三盃分三次服外服紫雪丹五分

廿五 日 即於前方內連翹銀花加至五錢 苡仁加至八錢 紫雪丹仍服五分

廿六 日 热漸退而未盡脈漸小而仍數面赤減大便頻數亦少餘邪未盡

連翹四錢 飛滑石六錢 黃芩三錢 銀花四錢 雲苓皮六錢 雅連一錢 苡仁

五錢 薑半夏五錢 甘草一錢 白蔻連皮一錢 煮四盃分四次服

廿七 照前方仍服一帖

廿八 日 即於前方內加桑葉三錢 目白睛赤縷故也

廿九 大熱雖退餘焰尚存耳聾與苦淡法

銀花五錢 飛滑石六錢 丹皮三錢 連翹連心三錢 雲苓皮六錢 苡仁六錢

雅連炒一錢苦丁茶二錢桑葉三錢牡蠣五錢龍膽草一錢五分煎四盃分四次服

六月初脈靜身涼熱已退矣舌有新白滑苔溼猶有存者與三仁湯宣化三焦通調水道

雲苓塊連皮六錢苡仁五錢晚靈砂三錢杏仁泥三錢澤瀉一錢益智仁一錢五分薑半夏三錢白蔻一錢五分黃芩炭一錢五分藿香梗三錢通草一錢煮三盃分三次服

庚寅六月廿一日吳歲二十暑兼溼熱暑溫不比春溫之但熱無溼可用酸甘化陰鹹以補腎等法且無形無質之熱邪每借有形有質之溼邪以爲依附此症一月有餘僉用大劑純柔補陰退熱法熱總未減而中宮痞塞得食則痛脹非抹不可顯係暑中之溼邪蟠踞不解再得柔膩膠固之陰藥與邪相搏業已喘滿勢甚重大勉與通宣三焦法仍以肺氣爲主蓋肺主化氣氣化

則溼熱俱化六脈弦細而沈洪

苡仁五錢 生石膏二兩 厚朴三錢 杏仁四錢 雲苓皮五錢 青蒿一錢 連翹三錢 藿香梗三錢 白蔻一錢 五分 銀花三錢 鮮荷葉邊一片 煮一盃 分四次服兩帖

廿三暑溼誤用陰柔藥致月餘熱不退胸膈痞悶前與通宣二焦今日熱減脈亦減但痞滿如故喘仍未定舌有白苔猶爲棘手

生石膏一兩 厚朴三錢 藝香梗三錢 飛滑石四錢 連翹二錢 小枳實一錢 雲苓皮三錢 廣皮三錢 白蔻仁二錢 生苡仁五錢 煮三盃 分三次服一帖廿五熱退喘減脈亦稍平惟仍痞且泄瀉皆陰柔之累姑行溼止瀉

滑石五錢 薑半夏三錢 黃芩炒二錢 猪苓三錢 雲苓皮五錢 廣鬱金一錢 淬瀉二錢 藝香梗三錢 通草一錢 苡仁五錢 煮三盃 分三次服一帖

廿七喘止胸痞亦開熱雖減而未退瀉未止

生石膏一兩澤瀉三錢薑半夏五錢飛滑石六錢黃芩三錢藿香梗二錢
雲苓皮六錢煮三盃分三次服二帖

廿九 諸症俱減惟微熱大便溏調理飲食爲要

雲苓塊連皮五錢猪苓三錢藿香梗三錢生苡仁五錢澤瀉三錢炒黃芩
三錢薑半夏二錢蘇梗一錢白蔻仁一錢杏仁泥一錢煮三盃分三次服

四帖

伏暑

壬戌八月十四日周歲十六日 伏暑內發新涼外加脈右大左弦身熱如焰無汗吐膠淡舌苔滿黃不宜再見泄瀉不渴腹脹少腹痛是謂陰陽並病兩太陰互爭難治之症議先清上焦溼熱蓋氣化溼熱亦化也

飛滑石三錢連翹一錢象貝母一錢杏仁泥三錢銀花一錢白通草一錢
老厚朴一錢蘆根一錢鮮梨皮一錢生苡仁一錢五分竹葉一錢今晚一

吳氏醫案

伏暑

十

帖明早一帖

十七案仍前

飛滑石三錢連翹二錢鮮梨皮一錢五分杏仁泥一錢五分冬桑葉一錢
銀花二錢老厚朴一錢五分薄荷八分扁豆皮二錢苦桔梗一錢五分蘆
根二錢荷葉邊一錢五分炒知母一錢五分午一帖晚一帖明早一帖

十八兩與清上焦熱已減其半手心熱甚於手背謂之裏熱舌苔紅黃而厚爲
實熱宜宣之用苦辛寒法再按暑必夾溼腹中案之痛脹故不得不暫用
苦燥法

杏仁泥三錢木通一錢真山連薑汁炒黃一錢五分廣木香一錢黃芩炭
一錢厚朴一錢五分小茴香炒黑一錢五分括婁連皮仁八分炒知母一
錢五分小枳實打碎一錢五分枳榔八分廣皮炭一錢煮二盃分二次服
十九腹之痛脹俱減舌苔乾燥黃黑肉色絳喰咳痰粘幼童陰氣未堅當與存
叶

陰退熱

麥冬不去心六錢 煙石膏四錢 丹皮五錢 沙參三錢 細生地四錢 杏仁二錢
元參五錢 炒知母一錢 蛤粉三錢 扁角二錢 生甘草一錢 煮三盃分三次服

日二十

津液稍回潮熱因宿糞未除夜間透汗因邪氣還表有脈仍然浮大未可
下宜保津液護火克肺金之嗽

細生地六錢 元參六錢 薑石斛三錢 焦白芍四錢 麥冬六錢 柏子霜三錢
煅石膏三錢 沙參三錢 牡蠣粉一錢五分 杏仁泥一錢 扁角一錢 煎三盃
陸續服

廿一

諸症悉解小有潮熱舌絳苔黑深入血分之熱未盡除也用育陰法

沙參三錢 大生地五錢 牡蠣三錢 麥冬不去心六錢 焦白芍四錢 丹皮三錢
天冬一錢五分 柏子霜三錢 甘草炙二錢 頭煎二盃二煎一盃分三次服

服

日廿一

津液消亡舌黑乾刺用復脈法

大生地六錢 麥冬不去心六錢 柏子霜四錢 炒白芍六錢 丹皮四錢 火麻仁三錢 生鱉甲六錢 阿膠沖三錢 炙甘草三錢 生牡蠣四錢 頭煎二盃 分

日服二煎二盃明早服

日廿二

右脈仍數餘邪陷入肺中咳甚痰難議甘潤兼宣涼肺氣

麥冬不去心一兩 細生地五錢 象貝三錢 沙參三錢 杏仁泥二錢 冬桑葉三錢 玉竹三錢 苦桔梗三錢 甘草三錢 丹皮二錢 茶菊花三錢 梨皮三錢

一帖藥分二次煎每煎兩茶盃共分四次服

日廿四

舌黑苔退脈仍數仍咳腹中微脹

細生地五錢 麥冬不去心五錢 羅香梗一錢 茯苓塊二錢 沙參三錢 廣陳金一錢五分 杏仁粉三錢 丹皮三錢 生扁豆三錢 苦桔梗三錢 象貝二錢

煮三盃渣再煎一盃分四次服

甘五 咳氣得黑宿者若許潮熱退脣舌仍絳熱之所過其陰必傷與復脈汎復其陰

大生地八錢麥冬不去心一兩火麻仁二錢炒白芍六錢沙參二錢真阿膠沖二錢生蠶甲五錢元參三錢炙甘草三錢生牡蠣粉五錢丹皮二錢水入碗煮成三碗分三次服渣再煮一碗明早服

甘六 又得宿糞若許邪氣已退八九但正陰虛耳故不欲食晚間乾咳無痰

大生地八錢麥冬不去心六錢火麻仁三錢生白芍五錢天冬二錢牡蠣粉三錢北沙參三錢阿膠沖三錢炙甘草三錢煮三盃分三次服外用梨汁荸薺汁藕汁各一黃酒盃重湯燉溫頻服

甘七 熱傷津液大便燥微有潮熱乾咳舌赤用甘潤法

細生地五錢元參六錢知母炒黑二錢火麻仁三錢麥冬不去心六錢阿

膠二錢 郁李仁一錢 沙參三錢 梨汁一盃沖 莢薺汁一盃沖 煮三盃分三次服

廿八日 伏暑內潰續出白痧若許脈較前恰稍和第二次舌苔未化不大便

麥冬不去心六錢 大生地五錢 元參三錢 沙參三錢 牛蒡子炒研細三錢
阿膠一錢五分 連翹連心二錢 生甘草一錢 麻仁三錢 銀花炒一錢 煎三

盃分三次服服此晚間大便

九月初四日 潮熱復作四日不大便燥糞復聚與增液承氣湯微和之

元參五錢 細生地五錢 大黃生二錢 麥冬不去心五錢 炙甘草一錢 煎二

盃分二次服服此得黑燥糞若許而潮熱退脈靜以後與養陰收功

癸亥十二月十一日 陳廿八歲 左脈洪大數實右脈陽微陰陽逆亂伏暑似瘧最難卽愈議
領邪外出法

生鱉甲二兩 麥冬不去心八錢 粉丹皮二錢 桂枝尖三錢 沙參三錢 炒知

母三錢焦白芍三錢青蒿四錢炙甘草一錢五分煮三碗分三次服

日十四 伏暑寒熱往來已愈不食不飢不便胸中痞悶九竅不和皆屬胃病

半夏五錢茯苓塊五錢桂枝一錢五分黨參三錢生苡仁五錢廣皮一錢
五分青皮一錢五分廣櫻金一錢煮三盃分三次服

日十七 久病真陽虛則膺痛餘邪化然則口苦正氣不復則肢倦

生洋參二錢桂枝三錢廣皮炭一錢五分茯苓塊三錢半夏二錢炙甘草
一錢五分焦白芍三錢生薑二片大膠棗一枚黃芩炭一錢五分煮三盃
分三次服

乙丑八月新十九 不兼溼之伏暑誤治津液消亡以致熱不肯退暑製舌燥四十餘日不解咳嗽痰譫語口渴可先服牛黃清心丸清包絡而搜伏邪湯藥與存陰退熱法

細生地三錢麥冬不去心五錢生扁豆三錢生鱉甲五錢沙參三錢生甘

草一錢 生牡蠣五錢 炒白芍三錢 煮三盃分三次服

廿四日暑之偏於熱者誤以傷寒足經藥治之以致津液消亡昨用存陰法兼芳香開絡中閉伏之邪已見大效茲因小便赤甚而短熱雖減而未除議甘苦合化陰氣法

二甲復脈湯加黃芩三錢如有讚語牛黃丸仍服

廿六日昨用甘苦合化陰氣法服後大見涼汗茲熱已除脈減舌苔盡退但六脈重按全無舌仍乾燥議熟之所過其陰必傷例用二甲復脈湯重加鳖甲甘草

廿七日與四歲夏傷於溼冬必咳嗽況六脈俱弦木旺克土脾土受克則泄瀉胃土受克則不食而欲嘔前曾腹脹現在胸痞舌白滑此寒溼病也而脈反數息涼思酸物極必反之象豈淺鮮哉急宜戒惱怒小心一切爲要姜半夏二錢飛滑石三錢生苡仁五錢杏仁泥四錢旋覆花包二錢廣藥

金一錢 茶芩皮五錢 白蔻皮一錢 白通草一錢 水五盃煮取兩盃渣再煮

一盃分三次服

十八脈數甚思涼溼中生熱之故

飛滑石六錢 杏仁一錢 白蔻仁一錢 五分 茶芩皮六錢 半夏四錢 廣慳金
二錢 杏仁泥六錢 黃芩一錢 白通草二錢 蕤香梗三錢 枳實一錢 五分 水

八碗煮取八分三茶碗渣再煮一碗 日三夜一分四次服

二十伏暑必夾火與溼不能單顧一邊至服藥後反覺不快乃久病體虛不任
開泄之故渴思涼者火也得水則停者溼也

生石膏六錢 半夏三錢 炒知母一錢 五分 杏仁泥六錢 黃芩一錢 白蔻仁
一錢 煎三盃分三次服

廿一於前方內去蔻仁加

生石膏四錢 蕤香梗三錢 炒知母五分 飛滑石四錢 白通草一錢 五分 加

入前方內煮四盃分四次服

廿七 飲居右脇不得卧格拒心火不得下通於腎反來欒喉故嗌乾

姜半夏五錢 杏仁三錢 小枳實三錢 茶芩皮三錢 香附三錢 薑香梗二錢
旋覆花包三錢 廣皮一錢 蘇子霜三錢 煮三盃分三次服

二月初 小便不通於前方內加

飛滑石三錢 生苡仁三錢 白通草一錢 五分 前後共八帖

二月初 小便已通於前方內去滑石通草生苡仁服五帖而全愈

巴歲廿八 面色青黃其爲溼鬱無疑右脈單弦其爲伏飲無疑嘔氣胸痛合之左脈弦其爲肝鬱無疑上年夏日曾得淋症誤服六味湯丸酸甘化陰致令暑溼隱伏久踞故症現龐雜無倫治法以宣化三焦使邪有出路兼和肝胃能令食爲要

生石膏八錢 半夏五錢 生苡仁五錢 飛滑石一兩 草薢四錢 茶芩皮五錢

旋覆花包三錢 香附三錢 廣鬱金三錢 杏仁泥三錢 通草一錢 晚鴉砂三錢
煮成四碗分早晚中晚夜四次服

此症方案失收姑不全錄自四月至八月一日不斷服藥諸症從而目青黃逐漸退轉而愈其面青由額往下由耳往中約十日褪一暈及褪至鼻柱約月餘方亮皆誤服柔藥之弊所用不出此方故

方不全而案可以載欲爲隔年暑溼之症開一門路

丙寅六月

初六日 某其人本有飲咳又加內暑外涼在經之邪似瘧而未成在腑之邪

泄瀉未止恐成滯下急以提邪外出爲要按六脈俱弦之泄瀉古謂之木泄卽以小柴胡湯爲主方況加之寒熱往來乎六脈俱弦故謂脈雙弦者寒也指中焦虛寒而言豈補水之生熟地所可用哉現在寒水客氣燥金司天而又大暑節氣與柴胡二桂枝一法

柴胡六錢 焦白芍二錢 青蒿二錢 桂枝三錢 霍香梗三錢 生薑三錢 半夏六錢 廣橘皮三錢 大棗去核一枚 黃芩一錢 火甘草一錢 煮三盃分三次

服

初八 寒暑兼受成瘧則輕成痢則重前與柴胡二桂枝一湯現在面色青熱退寒重瘧多而稀舌之赤者亦淡脈之弦勁者微細不渴陽虛可知與桂枝柴胡各半湯減黃芩加乾薑

桂枝三錢 炒白芍一錢五分 乾姜二錢 柴胡三錢 炒黃芩一錢 生姜五錢
半夏六錢 無甘草一錢 大棗去核三枚 煮三盃分三次服

初九 內暑外寒相搏旣欲成瘧大便溏泄恐致成痢口乾不渴經謂自利不渴者屬太陰也合之腹痛則更可知矣仲景爲表急急當救表裏急急當救裏茲表裏無偏急之象議兩救之救表仍用柴胡桂枝各半湯法以太少兩經俱有邪也救裏與理中湯

桂枝四錢 焦白芍二錢 良姜一錢 柴胡四錢 黃芩炭一錢 半夏六錢 無甘草一錢 五分 川椒炭三錢 生姜五錢 茴仁五錢 白蔻仁一錢五分 大棗去核二枚 乾姜三錢 煮三盃分三次服

初十 昨用兩救表裏已見小效今日仍宗前法而退之以脈中陽氣已有生動
之機故也不可性急反致僨事

桂枝三錢 炒白芍二錢 炒厚朴二錢 柴胡三錢 炒黃芩一錢五分 炙甘草
一錢五分 半夏六錢 川椒炭二錢 生姜五錢 乾姜一錢 煙草果一錢 大棗
去核二枚 煮三盃 分三次服

十一 內而燒飲蟠踞中焦外而寒暑擾亂胃陽連日已奪去成痢之路一以和
中蠲飲爲要蓋無形之邪每借有形質者以爲依附也

桂枝三錢 焦白芍一錢 枳實三錢 柴胡三錢 黃芩炭一錢五分 青蒿三錢
杏仁三錢 茶荳皮五錢 廣皮一錢 半夏一兩 白蔻仁一錢五分 生姜三片
苡仁五錢 煮三盃 分三次服

十二 雜受寒暑再三分析方成瘧疾以伏暑成瘧則輕寒多熱少脈沈弦乃邪
氣深入與兩陰陽之中偏於溫法

青蒿三錢 蓬香梗三錢 枳實一錢 柴胡三錢 姜半夏八錢 良姜二錢 厚朴三錢 瓜皮一錢 生姜五片 桔榔一錢 黃芩炭一錢五分 大棗去核二枚 煮三盃分三次服

十四日 寒熱少減胸痞甚去甘加辛去大棗加生姜

十六日 脈弦細指尖冷陽微不及四末之故兼之腹痛便溏痰飲咳嗽更可知矣以和胃陽溫中陽逐痰飲立法

半夏六錢 生苡仁五錢 乾姜二錢 杏仁五錢 川椒炭三錢 炒廣皮三錢 桂枝三錢 白蔻仁二錢 生姜三片 煮三盃分三次服

十七日 月張 伏暑酒毒遇寒涼而發九日不愈脈緩而輕滯下身熱譫語濶

熱發黃先清溼熱開心包絡

飛滑石五錢 苦陳五錢 黃柏炭三錢 茯苓皮五錢 黃芩三錢 真山連二錢 生苡仁三錢 通草一錢 桔子炭一錢 煮三盃分三次服先服牛黃清心丸

一丸戌時再服一丸

十八熱退滯下已愈黃未解

飛滑石五錢 茵陳三錢 檀子炭三錢 茯苓皮五錢 莖薢三錢 真雅連八分

黃柏炭三錢 杏仁三錢 煙心草一錢 白通草一錢 煮三盃分三次服

十九黃亦少退脈之軟者亦鼓指惟舌赤小便赤而濁餘溼餘熱未盡尚須清

之

飛滑石五錢 茵陳四錢 黑山梔三錢 茶芩皮五錢 半夏三錢 凱雅連八分

生苡仁三錢 杏仁三錢 廣皮炭二錢 黃柏炭一錢 莖薢三錢 煮三盃分三

次服

二十黃退小便赤濁舌赤脈洪溼熱未盡

飛滑石五錢 半夏三錢 海金沙三錢 炒梔皮一錢 莖薢三錢 真雅連一錢

煮三盃分三次服

乙酉三月

王氏廿八歲

上年初秋伏暑

午後身熱汗出醫者誤以爲陰虛勞損不

食胸痞咳嗽舌苔白滑四肢倦怠不能起牀至今年三月不解已經八月之久深痼難救勉與宣化三焦兼從少陽提邪外出法

飛滑石六錢

桂枝三錢

白蔻仁一錢

茯苓皮五錢

青蒿三錢

炒黃芩一錢

姜半夏五錢

苡仁五錢

白通草一錢

杏仁泥四錢

廣皮三錢

煮三盃分三次服

此方服二帖能進食服四帖飲食大進卽起能行立後八日復診

以調理脾胃而愈

乙酉三月

王氏廿六歲

伏暑咳嗽寒熱將近一年不解難望回生旣咳且嘔而泄

渴與通宣三焦俾邪得有出路或者得有生機何以知其爲伏暑而非

癆瘵勞之咳重在丑寅卯木旺之時溼家之咳在戌亥子水旺之時勞之

寒然後無汗伏暑寒熱如瘧狀丑寅卯陽升乃有汗而止勞之陰虛身熱

脈必芤大伏暑之脈弦細而弱故知其爲伏暑而非癆瘵也再左邊卧不

着席水在肝也

桂枝三錢 雲苓皮五錢 蕤金一錢 半夏五錢 生苡仁五錢 廣皮二錢 青蒿八分 旋覆花包三錢 生姜三錢 香附三錢 白蔻仁二錢 大棗去核二枚 煮三盃 分三次服 此方服四帖 寒熱減去青蒿服之十帖全愈 後以調理脾胃收功

乙酉四月廿五日 金氏歲三十 上年伏暑寒熱時發如瘧狀以通宣三焦立法補陰補陽皆妄也

半夏四錢 雲苓皮五錢 黃芩二錢 杏仁三錢 蕤香梗三錢 生姜三片 青蒿八分 白蔻仁一錢 五分 大棗去核二枚 厥仁五錢 煮三盃 分三次服

五月 初伏 暑愈後以平補中焦爲要 仍須宣通勿得粘滯

半夏三錢 雲苓塊五錢 蓼子五錢 菟仁五錢 益智仁一錢 生姜三片 廣皮二錢 煮三盃 分三次服

乙酉八月 裴四十酒客中虛溼重面色暗滯業已多日現在又感伏暑新涼頭初五日 滯中虛寒不能戒酒病斷不除蓋客近易除久病伏脹便溏舌白滑脈弦細溼可知不能戒酒病斷不除蓋客近易除久病伏溼虛寒難療也

雲苓皮一兩 杏仁三錢 薤香梗三錢 美半夏六錢 青蒿二錢 白蔻仁三錢 生苡仁一兩 廣皮五錢 黃芩炭一錢 煮三盃分三次服頭脹除去青蒿七帖全愈

乙酉九月 陶八十歲伏暑遇新涼而發舌苔曉白上加灰黑六脈不浮不沈而散誤與發表胸痞不食此危症也何以云危蓋四氣雜感又加一層腎虛又加一層肝鬱又加一層誤治又加一層酒客中虛何以克當勉與河間之苦辛寒法一以通宣三焦而以肺氣爲主望其氣化而溼熱俱化也

飛滑石五錢 杏仁四錢 薤香葉三錢 姜半夏五錢 芍仁五錢 廣鬱金三錢 雲苓皮五錢 黃芩三錢 真雅連一錢 白蔻仁三錢 廣皮三錢 白通草一錢

五分煮三碗分三次服

日二舌之灰苔化黃滑而不燥昏赤顫赤脈之弦者化爲滑數是溼與熱俱重
也

滑石一兩雲苓皮六錢杏仁五錢苡仁六錢黃柏炭四錢雅連一錢半夏
五錢白蔻仁三錢木通三錢茵陳五錢煮三碗分三次服

日一伏暑舌之灰苔化黃茲黃雖退而白滑未除當退苦藥加辛藥脈滑甚重
加化瘀小心復感爲要

滑石一兩雲苓皮五錢鬱金三錢杏仁五錢小枳實三錢慈仁三錢半夏
一兩黃柏炭三錢廣皮三錢苡仁五錢懷香梗三錢煮三碗分三次服

十月初二日 伏暑雖退舌之白滑未化是暑中之伏溼尚存也小心飲食要緊脈之
滑大者已減是暑中之熱去也無柰太小而不甚流利是陽氣未充不能
化溼重與辛溫助陽氣化溼氣以舌苔黃爲度

半夏六錢白蔻仁研沖三錢木通一錢杏仁五錢益智仁二錢廣皮五錢

苡仁五錢川椒炭三錢乾姜三錢煮三碗分三次服

日初六伏暑之外感者因大汗而退舌白滑苔究未化黃前方大用剛燥苔未盡

除務要小心飲食毋使脾困

否仁泥四錢艷草果八分川椒炭三錢姜半夏五錢蒼朮炭二錢益智仁
三錢茯苓皮五錢老厚朴二錢白蔻仁三錢生苡仁五錢廣皮炭五錢神
麴炭三錢煮三碗分三次服

乙酉九月薛氏歲初因肝鬱繼而內飲招外風爲病現在寒熱如瘧狀又有

日四日初因肝鬱繼而內飲招外風爲病現在寒熱如瘧狀又有
伏暑內發新涼外加之象六脈弦細而緊兩關獨大而浮厥陰克陽明陽
者全然不知病從何來亦不究脈象之是陰是陽一概以地黃等陰柔補
陰以陰藥助陰病人命其何堪哉勢已沈重欲成噎食反胃勉與兩利肝

門垂提少陽之邪外出法

桂枝三錢 姜半夏六錢 芫仁三錢 杏仁二錢 旋覆花包三錢 青蒿一錢 白蔻仁一錢 香附三錢 生姜四錢 廣皮三錢 川椒炭一錢 煮三盃分三次服

日甘八

寒熱減半嘔止舌苔滿黃但仍滑耳卽於前方內加

炒黃芩一錢 再服四帖如二三帖寒熱止去青蒿如腹痛止舌不滑不乾燥去川椒炭加茯苓皮五錢

十六日 初伏暑已解七八入涼飲肝鬱未除下焦且有溼鬱

杏仁泥四錢 芫仁五錢 川草薢五錢 旋覆花包三錢 香附三錢 通草一錢
白蔻仁三錢 雲苓皮五錢 晚鹽沙三錢 姜半夏五錢 廣皮一錢 煮三盃分

三次服數帖而愈

乙酉十二月十八日 伏暑如瘧狀脈弦數寒熱往來熱多於寒解後有汗與青蒿
月初九日 李歲初七日 圖成北

薦印湯五帖全愈

丁亥九月九日 舟胡桂枝各

初七日

圖成北 伏暑內發新涼外加腹脹身熱身痛胸脇痛與柴胡桂枝各

吳氏醫案

伏暑

二十一

半湯

雲苓皮五錢桂枝三錢蠻金二錢姜半夏三錢柴胡三錢黃芩一錢防己三錢杏仁泥三錢廣皮三錢藿香梗三錢煮三盃分三次服

初八伏暑新涼昨用各半湯一帖腹脹胸脇痛身痛已愈今日頭痛泄瀉身熱寒多按自利而渴者屬太陰也與五苓散雙解表裏

桂枝四錢雲苓皮五錢苡仁五錢豬苓三錢益智仁二錢木香一錢澤瀉三錢蒼朮炭二錢廣皮三錢煮三盃分三次服

初九伏暑新涼以頭痛身熱而又泄瀉之故用五苓散雙解表裏今日頭痛身熱雖減而泄瀉未止咳嗽痰多與開太陽闔陽明法

桂枝五錢姜半夏五錢苡仁五錢猪苓四錢雲苓皮五錢廣皮三錢澤瀉四錢益智仁二錢生姜五片蒼朮三錢煮四盃益日三夜一分四次服

初十泄瀉已止熱退未淨咳嗽噦噫未平頭偏右痛兼有肝鬱

姜半夏

五錢
苡仁 五錢

炒炭黃芩 一錢

五分 旋覆花包三錢

雲苓皮 五錢

炒炭黃芩 一錢

五錢

香附

三錢

桑葉 三錢 蘇梗 三錢 廣皮 三錢

茱菊花 三錢 煮三盃 分三次服

時十一

伏暑身熱咳嗽嘔惡大便稀溏兼有肝鬱偏頭痛舌絳口渴腹微脹溼中

生熟與苦辛淡法

雲苓皮

六錢

滑石 六錢 通草 一錢

姜半夏 五錢
苡仁 五錢

廣皮 一錢

五分

蔻香梗

三錢

蔻仁 一錢五分 生姜 三片

黃芩炭 三錢 煮二盃 分三次服

時十二

伏暑未解痰飲咳嗽太甚胃不和不寐先與和胃令寐治咳即愈

雲苓皮

六錢

苡仁 六錢 蘇梗 四錢

姜半夏 二兩 桑米 一合 煮三盃 分三次

服

時十三

伏暑飲渴不寐昨與半夏湯法已寐惟大便仍溏咳未止口渴甚議渴者

與猪苓湯加和胃止渴去阿膠以其滑膩也

飛滑石

六錢 猪苓 四錢

苡仁 五錢

雲苓皮 六錢 淬瀉 四錢

蘇梗 三錢

姜半夏

吳氏醫案

伏暑

主

夏六錢煮三盃分三次服兩帖

十五 伏暑已愈大半惟咳未盡除渴未全止暑中伏溼難清溼中生熱溼家之

渴猪苓湯最合拍宗前法而進之

飛滑石六錢 猪苓五錢 蘆梗三錢 雲苓皮六錢 潭鴻五錢 廣皮二錢 茯仁

五錢 姜半夏五錢

甘草一錢 炒黃芩一錢 五分 煮三盃分三次服兩帖

庚寅九月 潛三十溼熱發黃已愈六七繼感勁金涼氣頭暉而痛身熱而噦伏初八日

暑漫延三焦與苦辛淡滲法化氣氣化則溼熱俱化

飛滑石五錢 猪苓三錢 薄荷八分 姜半夏三錢 杏仁三錢 桑葉三錢 苦桔

梗三錢 茵陳五錢 竹茹一錢 荆芥穗二錢 連翹一錢 橘皮二錢 白蔻仁一

錢 煮三盃分三次服

廿一 伏暑中之溼熱瀰漫三焦舌苔滿佈重潤脈弦一以化氣爲要溼熱相搏

徒治一邊無益也

猪苓五錢雲苓皮五錢茵陳五錢澤泻三錢杏仁泥四錢木通一錢滑石六錢姜半夏三錢蔻仁一錢苡仁五錢黃柏炭二錢廣皮一錢五分煮四

小茶盃日三夜一分四次服

廿四 濕熱瀰漫三焦前與化氣昨日汗大出今日大便通快舌苔已化惟小便未暢餘熱未除仍以化氣爲要

滑石六錢雲苓皮五錢苡仁五錢猪苓三錢藿香梗三錢木通二錢半夏三錢生姜汁每盃沖三茶匙蔻仁一錢杏仁三錢煮三盂分三次服兩帖

廿七 伏暑已解七八餘熱未除且有痰飲

雲苓塊連皮六錢猪苓四錢小枳實二錢姜半夏六錢杏仁四錢藿香梗二錢生苡仁五錢廣皮三錢白蔻仁一錢煮三盂分三次服五帖

廿八 伏暑諸症俱解惟餘痰飲少腹不爽

雲苓塊五錢炒小茴香三錢廣皮三錢姜半夏五錢生苡仁五錢杏仁泥

三錢生姜三片小枳實一錢甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

辛卯七月
廿八日
齊氏六十歲居南太陰身熱泄瀉腹微脹痛舌苔不甚黃口不甚渴

煩燥不安晝夜不寐脈洪數業已十日以外爲難治

連翹不去心五錢雲苓皮五錢杏仁三錢生苡仁五錢金銀花二錢瞿連

一錢五分猪苓三錢藿香葉一錢蔻仁一錢半夏三錢煮三盃分三次服

廿九日
即於前方內減去連翹二錢加半夏一錢又加小枳實一錢再服一帖

八月初
一日初脈小則病退諸症漸減惟心下痞悶與瀉心法

半夏五錢雲苓塊連皮五錢乾姜三錢炒黃芩三錢生苡仁五錢生姜汁

每盃沖三小匙少黃連一錢五分小枳實一錢五分煮三盃分三次服

初二日
一病略減仍不寐微煩

連翹三錢雲苓皮五錢藿香半梗半葉二錢銀花三錢姜半夏五錢蔻仁

一錢猪苓三錢小枳實三錢橘皮三錢杏仁三錢炒黃芩三錢煮三盃分

三次服

日初二陽亢於上不寐脈洪數口渴惡人與火與鬪陽明法

生石膏一兩 茯苓一錢炒知母二錢 茯苓塊三錢 杏仁三錢炒黃芩三錢
姜半夏二錢 桃仁一錢 生甘草一錢 煎三盃分三次服

日初四氣上阻胸不寐

雲苓塊五錢 生苡仁五錢 白蔻一錢 旋覆花包三錢 杏仁泥三錢 姜半夏
五錢 香附三錢 炒黃芩三錢 橘皮三錢 小枳實三錢 炒黃連一錢五分 生
姜汁每盃沖三小匙 煎三盃分三次服

日初五卽於前方內去旋覆花減小枳實一錢

日初六伏暑夾肝鬱不寐煩躁雖減而未除

雲苓皮五錢 滑石六錢 炒黃芩四錢 姜半夏五錢 茯苓仁五錢 炒黃連一錢
杏仁泥四錢 鬱金一錢 白豆蔻一錢 旋覆花包三錢 香附二錢 生甘草一

錢
煮三盃分三次服

初七日
嘔甚卽於前方內加代赭石六錢再服四帖

初九日
伏暑已愈六七惟胸膈不舒腹微痛小便赤餘邪未淨

茯苓五錢炒黃芩三錢鬱金二錢苡仁五錢白蔻仁一錢五分香附三錢半夏五錢炒黃連八分橘皮三錢杏仁三錢淡吳萸炒八分煮三盃分三次服

初十日
伏暑小愈後又感燥金秋氣胸膈痛舌起新苔六脈弦緊與溫法

茯苓連皮五錢姜半夏五錢淡吳萸一錢桂枝三錢生苡仁三錢藿香梗三錢良姜三錢川連與茱萸同炒八分姜汁每盃沖三茶匙川椒炭三錢

廣皮三錢煮三盃分三次服

十一日
新感又減惟夜間頭痛

桂枝三錢焦白芍一錢廣皮三錢茯苓連皮五錢川椒炭三錢吳萸一錢

半夏五錢炒小茴香三錢黃連與茱萸同炒八分苡仁五錢煮三盃分三

次服

十一頭痛已止舊有之癥瘕上攻胃口有妨於食脈弦緊多汗

桂枝五錢公丁香一錢吳萸三錢雲苓五錢川椒炭三錢半夏五錢黃連
茱萸同炒八分炒小茴香二錢橘皮三錢良姜一錢煮三盃分三次服外

服化癥回生丹一錢

十四胃中之痛與煩躁係新受之燥氣腹中痞塊上攻係舊有之燥氣十數年之久新舊並病猝難速愈

茯苓塊五錢吳萸三錢川椒炭三錢姜半夏五錢括婁皮二錢黃連茱萸
同炒一錢高良姜一錢廣皮三錢歸橫鬚一錢公丁香一錢煮三盃分三
次服二帖外間化癥回生丹一錢

十六大用陽剛胃痛稍減未申後陰氣旺猶不爽脹陰邪未盡退也

半夏五錢 茯苓塊五錢 厚朴二錢 吳萸一錢 川椒炭四錢 廣皮三錢 黃連
製熟同炒一錢 小枳實三錢 生姜三片 良姜一錢 公丁香一錢 煮三盃分
三次服二帖仍間服化癥回生丹一錢

日十八 燥氣之胸痞痛與純剛大燥七日方解議病減者減其製

茯苓塊四錢 猪苓三錢 麝香梗三錢 姜半夏四錢 厚朴二錢 生苡仁二錢
川椒炭三錢 橘皮一錢 炒黃芩一錢 五分 煮三盃分三次服三帖仍間服
化癥回生丹一錢

日廿一 諸症向安惟病後氣弱舊有之癥瘕未除法宜通補陽氣兼之調和營衛
茯苓三錢 焦白芍二錢 廣皮三錢 桂枝三錢 柏子霜三錢 生姜三片 半夏
三錢 白蔻仁一錢 膠棗去核一枚 茯仁三錢 川焦炭一錢 煮三盃分三次
服四帖

日廿五 諸症皆愈惟欲便先痛便後痛減當責之積重且便後不爽或成滯下俗

名癥疾少用溫下法

生大黃黃酒炒半黑一錢五分厚朴一錢川椒炭一錢熟附子製一錢廣皮炭三錢良姜二錢南薑炭三錢炒神麯三錢煮一盃分二次服服一帖如仍痛又服一帖

廿九陰邪愈後兼有癥瘕無補陰之理卽陽藥中之守補者亦不可用

茯苓五錢
姜半夏五錢
橘皮三錢
桂枝三錢
焦白芍三錢
生姜三片
苡仁五錢
炒小茴香三錢
煮三盃分三次服○服二帖後凡五錢改作三錢凡三錢改作一錢再服三五帖俟大能飲食早晚各服化癥回生丹一錢以腹中癥瘕化盡爲度

癸巳九月十九日
初五日
前歲伏暑誤表十數劑之多又誤下十數劑之多從古無此治法
以致正虛邪實泄濺不止熱仍未退舌苔白滑脈弦細數急咳嗽喘急勉
與言通肺氣蓋肺主氣氣化則溼熱俱化萬一邪退再議補正

生石膏八錢 猪苓五錢 姜半夏五錢 茯苓皮五錢 杏仁二錢 炒黃芩三錢
生苡仁五錢 橘皮三錢 白蔻仁一錢 煮三盃分三次服外間服紫雪丹一
錢 分三次涼開水調

初七 伏暑誤治前與宣通三焦仍以肺氣爲主今日諸多見效熱亦退微見汗

惟咳嗽未除

茯苓皮五錢 猪苓五錢 炒於芷三錢 姜半夏五錢 杏仁三錢 白蔻仁一錢
生苡仁五錢 橘皮三錢 生姜汁每盃冲三小匙 煮三盃分三次服二帖收功

溼溫

王成四月王三十歲證似溫熱但心下兩脇俱脹舌白渴不多飲嘔惡噯氣則非
廿二日 三歲例矣用生姜瀉心湯之苦辛通降法
溫熱而從溼溫例矣用生姜瀉心湯之苦辛通降法

茯苓塊六錢 生姜一兩 古勇連三錢 生苡仁五錢 半夏八錢 炒黃芩三錢
生香附五錢 乾姜五錢 頭煎水八盃煮三盞分三次服約一時一盃二

煎用三盃水煮一茶盃明早服

廿二心下陰邪已退溼已轉陽應清氣分之溼熱

煅石膏五錢連翹五錢廣藥金三錢飛滑石五錢銀花五錢藿香梗三錢杏仁泥三錢蘆根五寸黃芩炭三錢古刃連一錢水八碗煮成三碗分三次服渣再煮一碗服

廿四班疹已現氣血兩燔用玉女煎合犀角地黃湯法

生石膏一兩五錢細生地六錢犀角三錢連翹一兩苦桔梗四錢牛蒡子六錢知母四錢銀花一兩炒黃芩四錢元參八錢人中黃一錢薄荷三錢

水八大碗煮成四碗早中晩夜分四次服

廿五面赤舌黃大渴脈沈肢厥十日不大便轉矢氣譫語下症也議小承氣湯
生大黃八錢小枳實五錢厚朴四錢水八碗煮成三碗先服一碗約三時
得大便止後服不便再服第二碗

又

大便後宜瀉津液議增液法

麥冬不去心一兩 細生地一兩 連翹三錢 元參四錢 炒甘草一錢 金銀花三錢 煮三碗分三次服能寐不必服

日陷下之餘邪不清仍思涼飲舌黃微以調胃承氣湯小和之

生大黃一錢 元明粉八分 生甘草一錢 頭煎一杯 一煎一杯分兩次服

甘七 昨日雖大解而不爽脈猶沈而有力身熱不退而微厥渴甚面赤猶宜微和之但恐犯數下之戒議增液承氣合玉女煎法

生石膏八錢 知母四錢 黃芩三錢 生大黃三錢 另煎分三分每次沖一分

煮成三盃分三次服若大便稀而不紅黑後服止大黃

甘八 大便雖不甚爽今日脈浮不可下渴思涼飲氣分熱也口中味甘脾熱甚也議用氣血兩燔例之玉女煎加苦藥以清肺煙

生石膏三兩 元參六錢 知母六錢 細生地一兩 麥冬不去心一兩 百草連

三錢黃芩三錢者四碗分四次服得涼汗止後服不渴亦止服

廿九日大用辛涼微甘合苦寒班疹續出若許身熱退其大半不得再用辛涼重

劑議甘寒合化陰氣加辛涼以清班疹

連翹

三錢細生地五錢犀角三錢銀花三錢天花粉三錢黃芩三錢麥冬

五錢

古勇連一錢薄荷一錢元參四錢煮三碗分三次服渣再煮一碗服

五月初大熱雖減餘焰尙存口甘弄舌面光赤色未除猶宜甘寒苦寒合法

連翹

三錢細生地六錢元參三錢銀花三錢炒黃芩三錢丹皮四錢麥冬

一兩

古勇連一錢水八碗煮三碗分三次服

初二日即於前方內加暹羅犀角一錢知母一錢五分

煮法服法如前

初三日邪少虛多宜用復脈去大棗桂枝以其人本係酒客再去甘草之重甘加

二甲丹皮黃芩

麥冬一兩大生地五錢阿膠三錢丹皮五錢炒白芍六錢炒黃芩三錢冰

吳氏醫案

淫溫

卷之三

鱉甲四錢牡蠣五錢麻仁三錢頭煎三碗二煎一碗日三夜一分四次服此甘潤化液複微苦化陰又苦甘鹹寒去

初四 尚有餘邪未盡以甘苦合化入陰按邪法

元參二兩細生地六錢知母二錢麥冬不去心八錢生鱉甲八錢粉丹皮五錢黃芩二錢連翹三錢青蒿一錢銀花三錢頭煎三碗二煎一碗分四次服

初九 邪少虛多仍用復脈法

大生地六錢元參四錢生白芍六錢生阿膠四錢麥冬八錢生鱉甲六錢火麻仁四錢丹皮四錢炙甘草三錢頭煎三茶盃二煎一茶盃分四次服
乙丑四月
初七日 謂三十而赤目赤舌苔滿佈如積粉至重之溫病也最忌發表且用辛涼

苦桔梗六錢銀花八錢香豆豉五錢連翹八錢藿香葉五錢麝香金四錢

荆芥穗五錢 杏仁五錢 生甘草三錢 牛蒡子五錢 薄荷四錢 壬六爲桂末分八包一時許服一包蘆根湯煎去渣服

初九 面赤目赤舌苔滿佈至重之溫熱病脈反緩而弦外熱反不盛口反不渴肢微厥所謂陽症陰脈乃本身陽氣不能十分充滿不肯化解耳茲與化邪法

廣藿金二錢 杏仁二錢 麝香一錢 苦桔梗一錢 五分 荆芥穗二錢 連翹心一錢 五分 銀花一錢 青蒿一錢 香豆豉一錢 五分 煮兩盃今晚一帖明早一帖

日十 一 溫病未有不渴而燥者今舌苔滿佈而不渴雖黃而滑脈緩甚無不壯盞夾溼之故也議從溼溫例治用苦辛寒法

生茅朮三錢 杏仁泥三錢 麝香一錢 銀花二錢 炒黃芩一錢 白蔻仁一錢 雅連一錢 連翹三錢 廣皮二錢 蕙金三錢 煮兩盃今晚一帖明早一帖一

丙寅四月
初八日
張三歲六脈弦細而勁陰寒證脈也咳嗽稀痰陰溼咳也舌苔刮自而滑陰舌苔也嘔吐泄瀉陰溼症也雖發熱汗出而解乃溼中兼風病名溼溫天下有如是之陰虛症乎

茯苓塊四錢桂枝三錢炒白芍一錢姜半夏五錢於朮三錢廣皮炭二錢生苡仁五錢澤瀉四錢生姜汁每盃沖三小匙煮三盃分三次服

初十痰飲兼風誤治成壞症前用溫平逐飲除風諸惡症俱減惟寒少熱多熱後汗出未除現在面赤口渴暮夜譫語有風化熱之象但六脈尚弦未盡轉陽也再咳嗽則胸脇小腹俱微痛又有金克木之象

桂枝三錢生石膏六錢青蒿三錢半夏五錢茯苓塊四錢生姜三片杏仁三錢焦白芍二錢大棗去核一枚猪苓一錢炙甘草二錢煮三盃分三次服

十四脈弦數午後潮熱前有白苔茲變爲黃嘔惡口渴頗有溼瘡之象但咳嗽

便潛又有溼溫之形伏邪內陷所致最難清理

生石膏八錢桂枝四錢生苡仁五錢飛滑石六錢知母三錢杏仁泥三錢

茯苓皮五錢青蒿二錢炙甘草一錢煮三盃分三次服

日初十其失其年月并人年歲六脈俱弦而細左手沈取數而有力面色淡黃目白睛黃自春分午後身熱至今不愈曾經大瀉後身輕不渴現在雖不泄瀉大便久未成條午前小便清午後小便赤濁與溼中生熱之苦辛寒法

飛滑石六錢茵陳四錢蒼朮炭二錢雲苓皮五錢杏仁三錢晚續沙三錢生苡仁五錢黃芩二錢白通草一錢五分海金沙四錢山連一錢煮三碗

分三次服

日十三於前方內去蒼朮炭加石膏增黃連黃芩

丁卯七月文三十溼溫舌苔白滑厚濁脈象模糊或弦細而濡川迺宜一焦法初二日文八歲溼溫舌苔白滑厚濁脈象模糊或弦細而濡川迺宜一焦法

先寒熱繼微然後不熱更方三十餘帖大抵不出滲溼之苦辛淡法四十

五日以後方解後以兩理脾胃收功

中燥

乙酉四月傅五十歲感受燥金之氣腹痛泄瀉嘔吐現在泄瀉雖止而嘔不能食
腹痛仍然舌苔白潤肉色刮白宜急溫之兼與行太陰之溼

雲苓塊五錢吳萸一錢川椒炭三錢姜半夏五錢良姜一錢益智仁二錢
生苡仁五錢廣皮三錢公丁香一錢煮三盃分三次服

廿二日背仍痛於原方加良姜一錢吳萸一錢桂枝五錢

廿七日已效陰氣未退再服三帖分四日服完

五月月初服三帖痛減嘔與泄瀉俱止減川椒吳萸良姜之半又服六帖
十三日陰未化陽自不復且心下堅大如盤脈如故再服

廿一日謝四十歲燥金感後所傷者陽氣何得以大劑熟地補陰久久補之日

陽困頓無怪乎不能食而嘔矣六脈弦緊豈不知脈雙弦者寒乎

半夏五錢雲苓塊五錢廣皮三錢苡仁五錢川椒炭三錢生姜三錢乾姜

二錢公丁香八分煮三盃分三次服

五月二日初

於前方內加桂枝三錢增乾姜一錢減川椒炭之半

日十一

嘔痛皆止飯食已加惟肢軟無力陽氣太虛加甘草合前辛藥爲辛甘補

陽方法

日廿一

復感燥氣嘔而欲瀉於前方去甘草加分量自愈六脈弦細如絲陽微之

極

桂枝五錢淡吳萸三錢半夏五錢雲苓五錢川椒炭三錢廣皮三錢乾姜三錢公丁香一錢五分生姜五錢煮三盃分三次服

日廿七

諸症悉減脈稍有神於原方中去吳萸丁香之剛燥加苡仁之平淡陽明

從中治也

乙酉四月李四

十六日歲胃痛脹痛或嘔酸水多年不愈現在六脈弦緊皆起初感受

吳氏醫案

中燥

三

燥金之氣金來克木木受病木有不克土者土受病之由來則自金始也此等山外感而延及內傷者自唐以後無間焉議變胃而不受胃變法即用火以克金也又久病治絡法

雪苓五錢生苡仁五錢枳實四錢半夏五錢川椒炭三錢生姜五錢膚皮三錢公丁香一錢煮三盃分三次服

甘三復診仍用原方

二月初現在胃痛脹痛吐酸之症不發其六脈弦緊不變是胸中絕少太和之氣議轉方用溫平剛燥不可以久任也

桂枝四錢生苡仁五錢廣皮三錢半夏五錢雪苓塊五錢生姜三錢白芍四錢炙甘草一錢大棗去核一枚乾姜一錢煮三盃分三次服無弊可多服

十一 診視已回陽原方去乾姜減桂枝之半

廿四日復診脈仍緊加益智仁餘仍照原方

桂枝二錢焦白芍四錢廣皮三錢雲苓五錢益智仁一錢生姜三錢半夏五錢炙甘草二錢大棗去核二枚苡仁五錢煮三盃分三次服

乙酉五月余五十歲胃痛脇痛脈雙弦午後更甚陰邪自旺於陰分也
初二日

半夏五錢川椒炭三錢吳萸一錢苡仁五錢公丁香一錢五分香附三錢降香三錢川查炭二錢廣皮三錢青皮一錢青橘葉三錢煮三盃分三次服接服辟惡散

十七日診視病稍減脈仍緊加小枳實三錢減川椒炭一錢去山查炭青橘葉

廿四日脈之緊者稍和腹痛已止惟頭暈不寐且與和胃令寐再商後法

半夏一兩小枳實三錢雲苓五錢苡仁一兩煮三盃分三次服以得寐爲度如服一二帖仍不寐加半夏至二兩再服一帖

乙酉五月十六日譚四十歲感受金涼胸脾頭痛脈弦細而緊

吳氏醫案

中燥

主

桂枝三錢 姜半夏三錢 廣皮三錢 雍白二錢 生苡仁五錢 生姜五片 厚朴

二錢 川椒炭三錢 大棗去核二枚 良姜二錢 煮三盃分三次服

十八 燥氣雖化六脈俱弦舌苔白滑與陽明從中治用苦辛淡法忌酸甘

姜半夏四錢 廣皮二錢 生苡仁五錢 雲苓塊四錢 香附三錢 益智仁一錢

川椒炭二錢 乾姜一錢五分 白蔻仁一錢五分 煮三盃分三次服

日一脈仍弦緊熱藥難退咳嗽減效不更方右脇微痛於前方內增香附二錢

日三 右脇痛甚脈弦緊如故於前方內加

旋覆花包三錢 降香三錢 蘇子霜三錢

廿六 脫痛咳嗽皆止痰尙多脈弦未和於前方去香附蘇子霜旋覆花降香加

桂枝四錢 乾姜一錢五分以充其陽氣行痰飲和弦脈

霹靂散方 主治中燥吐瀉腹痛甚則四肢厥逆腿痛轉筋肢麻起卧不安煩

躁不寧再甚則六脈全無陰毒發班抽筋等症並一切癰寒固冷積聚之疾

寒輕者不可多服寒重者不可少服以愈爲度對症宜隨時頻服但非實在純受溼燥寒三氣陰邪者不可服孕婦對症五不忌

桂枝六兩 降香末五兩 烏藥三兩 雄白四兩 草澄茄五兩 吳萸四兩 茶仁

五兩 川椒炭五兩 乾姜三兩 附子三兩 青木香四兩 檀榔二兩 防己三兩

五靈脂二兩 細辛一兩 良姜三兩 公丁香一兩 雄黃五兩 草果二兩 水菖

蒲二兩

方論按內經有五疫之稱五行偏勝之極皆可致疫雖病氣之至多見大症而燥金寒溼之疫亦復時有蓋風火暑三者爲陽邪與穢濁異氣相參則爲溫病溼燥寒三者爲陰邪與穢濁異氣相參則爲寒病現在見症多有肢麻轉筋手足厥逆吐瀉腹痛脇肋疼痛甚至反惡熱而大渴思涼者經謂霧傷於上溼傷於下此症乃燥金寒溼之氣直犯筋經由大絡別絡內傷三陰臟真所以轉筋入腹即死也既吐且瀉者陰陽逆亂也諸痛者燥金

寒水之氣所搏也其渴患涼飲者少陰篇謂自利而渴者屬少陰虛則少陰真水受尅陰火上炎故飲水求救也其頭面赤者陰邪內逼於上陽不能降安其位所謂戴陽也其周身惡熱喜涼者陰邪蟠踞於內陽氣無附欲散且脫也諸班疹者陰邪凝結於血絡同於陽火薰灼也陰病反見陽症所謂水極似火其受陰邪尤重也諸陽症畢現有認定爲陰寒者然必當臍腹痛甚拒按者方謂陽中見純陰乃爲真陰之症否則必有轉筋腿痛等寒症此處斷不可誤故立方會萃溫三陰經剛燥苦熱之品急溫臟真保住陽氣又經爲陽明之上中見太陰又謂陽明從中治且重用芍香急驅穢濁一面由臟真而別絡大絡外出筋經經絡以達皮毛一面由臟絡腑絡以通六腑外達九竅俾穢濁陰邪一齊立解大抵皆扶陽抑陰取義於雷霆奮迅所謂離照皆火至聖陰退避也

(後述)再此蓋自唐宋以後醫者皆不識燥氣所干凡見前證俗名曰痧近時竟

有著痧症書者捉風捕影雜亂無章害人不淺卽以病論未有不干天地之氣而漫然成痧者究竟所感何氣不能確切指出故立方毫無準的其誤皆由前人謂燥不爲病又有燥氣化火之說瑭亦爲其所誤故初刻溫病條辨時雖再三疑慮多方辨難見於雜說篇中而正文祇有化氣之火證無勝氣之寒證其燥不爲病之誤誤在陰陽應象大論篇中脫秋傷於燥一條將在夏傷於溼又錯秋傷於溼以爲竟無燥證矣不知天元紀氣交變五運行五常政六徵旨諸篇平列六氣燥氣之爲病與諸氣同何嘗燥不爲病哉經云風爲百病之長按風屬木主仁大易曰元者善之長也得生生之機開生化之源尚且爲病多端況金爲殺厲之氣歐陽氏曰商者傷也主義主收主刑主殺其傷人也最速而暴竟有不終日而死者瑭自擊神傷故再三致意而後補於原書云

右藥其爲細末開水和服大人每服三錢病重者五錢小人減半再病

基重者連服數次以痛止厥回瀉止筋不轉爲度

乙酉七月趙三十歲感受燥金之氣腹痛甚大嘔不止中有蓄水誤食水果

廿四日

趙八歲

感受

燥

金

之氣

腹

痛

甚

大嘔

不

止

中

有

蓄

水

誤

食

水

半夏

一兩

川椒炭

六錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

防己

三錢

半夏

二錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

雲苓

五錢

公丁香

三錢

廣皮

五錢

兜貢

四錢

小枳實

三錢

生姜

一兩

良姜

四錢

桂枝

六錢

焦白芍

三錢

苡仁

五錢

雲苓

六錢

川椒炭

二錢

烏梅

三錢

苡仁五錢白蔻仁二錢五分生姜三錢煮三盃分三次服

廿八腹痛如故不寐加半夏一兩

八月初太陽癆

飛滑石六錢桂枝六錢片姜黃三錢雲苓塊五錢杏仁五錢晚綠沙二錢
生苡仁五錢防己四錢白通草一錢煮三盃分三次服

初六腹脹停飲於前方去滑石加苦辛之通

大腹皮三錢厚朴二錢廣皮三錢小枳實三錢

初十六脈俱弦內口不開腹脹肢倦宜通六腑及勞者溫之之法也

雲苓塊五錢桂枝六錢大腹皮三錢姜半夏五錢厚朴二錢小枳實一錢

益智仁三錢廣皮五錢川椒炭三錢煮三盃分三次服服此方五帖而愈
張女歲二十日燥金之氣直中入裏六脈全無殂卧如死四肢逆冷已過肝膝
腿痛轉筋與通脈四逆湯加川椒吳萸公丁香一大劑厥回脈出一晝夜

次日以食粥太早復中宛如前症脈復厥體厥又死去矣仍用前方重加溫熱一劑厥回其半又二劑而復活後以補陽收功

顧五十歲直中燥氣嘔少瀉多四肢厥逆無脈目閉無睛不轉與通脈四逆湯加人參川椒吳萸丁香一劑而效三劑脈漸復重與補陽而愈

楊室女五十歲脇痛心煩懊憊拘急肢冷脈弦細而緊欲坐不得坐欲立不得立欲臥不得臥隨坐卽欲立剛立又欲坐坐又不安一刻較一刻脈漸小立刻要脫與解懸散不住灌之約計一時服散約計四兩而稍定後與兩利肝胃而全愈

鄭六十歲先是三月初九日得太陽中風與桂枝湯已愈十二日晚已臥下身有微汗因廚房不戒於火止穿小汗衫一件未著被出外救火俟火熄復卧一覺身微熱惡寒腹中脹痛脈弦數與桂枝柴胡各半湯汗出稍輕究不能解以後外雖化熱而亦汗多如溫病狀以當腑之痛未休否自不

燥斷不敢用辛涼而辛溫之藥或進或退十日不解至二十四日反重用溫熱反佐頂高黃連三錢次日表症裏症一齊俱解如失後與調理脾胃兩陽而全愈

多十六歲燥淫於內裏裏兼病面赤身熱舌黃燥口渴六脈洪數而緊經謂脈盛大以瀦者寒也大便秘小便短通體全似火症只有當臍一點痛拒按此謂陽中之陰乃爲真陰與苦熱芳香一劑而熱退減分量三帖而病全愈

丁亥九月華二十歲感受燥金之氣陽明之上中見太陰胸痛脹腹脹泄濁飲十三日

咳皆太陰病也誤服寒涼勢已重大勉與開太陽合陽明法

雲苓皮五錢 猪苓三錢 厚朴二錢 姜半夏五錢 潤瀉三錢 乾姜一錢 桂枝三錢 川椒炭三錢 廣皮四錢 廣木香一錢五分 煮三盃分三次服

十四仍服一帖

十五 燥症誤用涼藥泄瀉不止右脈如無左脈弦細而緊不寐痰飲咳嗽仍舊

惟胸脇痛止

雲苓皮六錢 猪苓四錢 大腹皮二錢 姜半夏八錢 潤瀉四錢 廣木香二錢

南蒼朮炒一錢 桂枝四錢 廣陳皮三錢 煮四盃分四次服

十六 再服一帖

十七 諸症皆退惟餘咳嗽口渴與辛能潤法

雲苓皮五錢 蘇梗三錢 杏仁泥三錢 姜半夏六錢 乾姜一錢 五味子一錢
生苡仁五錢 廣皮三錢 炙甘草三錢 煎三盃分三次服

十八 於前方內減五味子一錢加炙甘草一錢 改雲苓皮爲塊

十九 咳嗽已止脈靜身涼惟舌白口乾尚有伏飲調理飲食要緊藥與通補脾

胃兩陽

雲苓塊三錢 益智仁二錢 廣皮一錢 姜半夏三錢 炙朮炭二錢 生姜三片

生苡仁五錢 炙甘草一錢 大棗去核一枚 煮三盃分三次服

二十以後通補中焦可收功

丁亥九月 李氏歲四十六 脈陽微之極弦細而緊內而飲聚外而癢痛兼之內苦廿八日 吳萸一錢五分 川椒炭三錢 廣皮三錢 薤白三錢 公丁香一錢 生姜五大片 煮四盃日三夜一分四次服一帖
與陽明之陽爲要

桂枝三錢 姜半夏六錢 乾姜三錢 降香三錢 雲苓塊 連皮五錢 茯仁五錢 吳萸一錢五分 川椒炭三錢 廣皮三錢 薤白三錢 公丁香一錢 生姜五大片 煮四盃日三夜一分四次服一帖

三十 腸虛已久急難猝復餘有原案

姜半夏一兩 雲苓皮五錢 厚朴三錢 小枳實三錢 薤白三錢 川椒炭三錢
廣皮五錢 乾姜三錢 生姜五大片 公丁香二錢 煮三盃分三次服三帖
十一月初如是剛燥脈仍弦緊受病太深之故於前方內去薤白加川椒炭五錢

再服三錢

初六 陽氣稍復痰飲上沖咳聲重濁晝夜不寐暫與薑半夏湯和胃令得寐
日 姜半夏二兩 廣皮五錢 糯米一合 雲苓塊五錢 甘瀉水十盃煮成四盃日

三夜一分四次服二帖

初八 陽微飲聚不寐與半夏湯已得寐但六脈無神陽難猝復病久而又誤用
陰柔苦寒之故一以復陽爲要

姜半夏八錢 桂枝五錢 川椒炭三錢 雲苓塊六錢 乾姜三錢 小枳實一錢
杏仁泥三錢 廣皮三錢 炙甘草一錢 甘瀉水八盃煮三盃分三次服一帖

初十 脈之緊者已和諸見症亦減但脈仍太細陽未全復

姜半夏五錢 桂枝三錢 焦白芍三錢 雲苓塊五錢 乾姜一錢 川椒炭一錢
小枳實一錢五分 炙甘草一錢 廣皮炭三錢 煮三小茶盃分三次服四帖

十四 日 吐不和則卧不安飲以半夏湯脈又弦緊因陽爲痰飲所困皆日前過傷

生冷之故

姜半夏二兩 公丁香一錢五分 穀米一合 川椒炭三錢 煮三盃 分三次服

二帖

十七 痰飲喘咳不得卧 周身覺冷 脈弦緊陽虛極矣

姜半夏一兩 桂枝五錢 乾姜四錢 小枳實五錢 杏仁四錢 廣皮五錢 川椒炭三錢 煮三盃 分三次服 此方服至二十餘帖或作或止 後以鷄飲丸收功

二十一日 某 燥金克木由厥陰外犯太陽季脇偏右攻腰痛不發於春夏而發於冬令不發於已前而發於午後六脈弦數其爲陰邪留滯絡中沈着不移可知以故久而不愈此症當於絡中求之

霹靂散 四兩 每服二錢每日早中晚三次開水和服以清絡中之邪

又 金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之此症病發時不得大便乃所

主疏泄肝受病則不得疏泄但不可寒下耳

天台烏藥散一錢加巴豆霜六厘以泄絡中沈着之伏邪庶可拔其根也

十八日瑞歲二十感受燥金之氣表裏兼受與各半湯加苦溫甘熱法

桂枝五錢姜半夏四錢廣皮三錢柴胡三錢川椒炭三錢生姜一錢吳萸三錢炙甘草一錢大棗去核二枚黃芩三錢煮三盃分三次服

廿三十九至廿二日誤服他人苦寒藥今識陽明從中治燥中見溼故宗其法

桂枝木五錢猪苓三錢淡吳萸三錢姜半夏四錢川椒炭存性三錢澤鴻三錢雲苓皮八錢乾姜三錢炒真山連一錢蒼朮炭三錢煮三盃分三次

服

廿四六脈俱弦怯寒泄瀉表裏三陽皆虛仍與陽明從中治法

桂枝五錢姜半夏五錢吳萸三錢猪苓三錢雲苓塊連皮六錢乾姜三錢澤鴻三錢川椒炭二錢廣皮二錢蒼朮三錢煮三盃分三次服

日五燥症不屬陰邪誤用大苦大寒致傷胃陽晝夜無眠與胃不和則卧不安

例之半夏湯

姜半夏一兩 糯米一合 急流水八盃 煮取三盃 分三次服二帖

日七燥症誤服涼藥胃陽受傷以致不食不飢不便不寐峻用半夏湯和胃稍有轉機仍以和胃爲要

雲苓半塊 半皮五錢 姜半夏一兩 糯米一合 廣皮三錢 小枳實一錢 姜汁每盃沖三茶匙 煮三盃 分三次服二帖

日九胃不和兩用半夏湯和胃已得眠食腹中痞癟未消微痛脈弦夜間身微熱七日不大便小便短赤與辛通苦降淡滲法

姜半夏六錢 青皮一錢 公丁香七分 小茴香三錢 炒山連一錢五分 吳萸三錢 川椒炭三錢 賴皮三錢 煮三盃 分三次服

九月初一日 腹脹甚於前方內加 生苡仁五錢 半夏一錢 炒山連五分 厚朴三錢

雲苓皮三錢再服二帖分量加則力更進

初三於前方內去丁香五分山連五分仍服一帖
初五疝瘕寒熱俱未盡除

姜半夏八錢吳萸三錢炒小茴香三錢雲苓塊五錢厚朴一錢青蒿一錢
川椒炭三錢桂枝尖三錢檳榔剪一錢公丁香五錢廣皮三錢煮三盃分
三次服服此方二帖方見大效

初七前日大用剛熟下焦方知藥力其中寒甚可知猶宜溫熱兼之透絡

桂枝三錢炒小茴香三錢厚朴一錢半夏五錢川椒炭三錢檳榔剪一錢
青蒿八分吳萸三錢公丁香一錢五分廣皮三錢良姜一錢煮三盃分三

次服二帖

己丑正月檀氏二十歲燥金克木連少腹久痛不休腿腳俱痛兼有濫飲與陽明
十五日得中治法

姜半夏五錢 雲苓半塊半皮六錢 淡吳萸三錢 川椒炭六錢 益智仁三錢
良姜三錢 公丁香一錢 五分 廣皮三錢 煮三盃 分三次服七帖

瘧

癸酉七月 吳廿五但寒不熱似乎牝瘧然渴甚皮膚捗之亦熱乃伏暑內發新
涼外加熱未透出之故仍用苦辛寒法加以升提

飛滑石三錢 花粉二錢 蕁香葉一錢 杏仁泥三錢 知母一錢 廣鬱金一錢
生苡仁三錢 青蒿一錢 白蔻仁一錢 老厚朴一錢 黃芩一錢 煮三盃 分三
次服

十七 但寒不熱之瘧昨用升提已出陽分渴甚脈洪數甚熱反多昨云熱邪深
伏未曾透出不得作牝瘧看非虛言也用苦辛寒重劑

生石膏八錢 厚朴三錢 廣鬱金三錢 飛滑石三錢 知母一錢 白蔻仁三錢
杏仁粉五錢 黃芩一錢 生甘草一錢 五分 蕁香梗三錢 煮三盃 分三次服

丙寅正月伊氏二十姪娠七月每日午後先寒後熱熱到戌時微汗而解已近初七日

十日此上年伏暑成瘧由初春升發之氣而發病在少陽與小柴胡法

柴胡五錢姜半夏四錢生姜三錢人參一錢炙甘草一錢大棗去核二枚

黃芩三錢煮三盃分三次服一劑寒熱減一帖減大半第三日用前方三

分之一全愈

廿五申八月朱三十歲體厚木有小腸寒溼糞後便血舌苔灰白而厚中黑滑嘔惡

不食但寒不熱此溼瘧也與劫法

茯苓塊五錢生草果三錢熟附子一錢生蒼朮五錢杏仁三錢橘榔三錢

黃芩炭三錢生苡仁五錢煮三盃分三次服

廿八日前方服三帖而病勢漸減至晝化黃減其製再服三帖而寒來甚微一以

理脾爲主

姜半夏三錢苡仁一錢白苡仁一錢炒於朮三錢廣皮三錢黃芩炭一錢

益智仁一錢煮三盃分三次服服七帖而胃開

孫四十少陰三瘡一年不愈寒多熱少脈弦細陽微損及入脈與通補奇
歲經丸四兩服完全愈

蕭三十少陰三瘡久而不愈六脈弦緊形寒嗜卧發時口不知味不渴腎
氣上泛面目黧黑與扶陽湯法

生剉未先毛鹿茸三錢桂枝三錢當歸三錢熟附子一錢人參一錢蜀漆
用酒煎二錢煮三盃分三次服四帖

乙酉四月五十鄭五歲脈雙弦伏暑成瘡間三日一至舌苔白滑熱多寒少十月之
十九日

久不止邪已深入急難速出且與通宣三焦使邪有出路勿得驟補

雲苓戌五錢知母三錢杏仁泥三錢生苡仁五錢炒黃芩二錢青蒿一錢

藿香梗三錢姜半夏三錢白蔻仁一錢煮三盃分三次服

廿六加青蒿一錢白蔻仁一錢服四帖

五月初脈緊汗多加桂枝三錢服一帖

初四日

六

脈已活動色已華寒大減熱亦少減其計減其半汗至足底時已早至八

十四日

三

瘧與宣三焦右脈稍大熱多汗多舌苔之白滑雖薄而未盡化溼中生

熱不能驟補與兩清溼熱

茯苓皮

五錢

黃芩三錢

杏仁泥

二錢

姜半夏

五錢

知母三錢

生苡仁

五錢

白蔻仁

一錢

五分

黃連

姜汁炒

二錢

白通草

一錢

煮

三盃

分三次服

十九日

加廣皮炭

三錢

薑香梗

三錢

服四帖

廿二日

病減者減其製

每日服半帖

六日服三帖

廿九日

病又減去黃連加益智仁以其脈大而尚緊也

仍以六日服三帖

六月初五日

餘邪未盡

仍以六日服三帖

十三日

三瘧與宣化三焦十退其九

白苔尚未盡退今日診脈弦中兼緩氣來至

靜是陽氣未充議於前法退一寒進辛溫

茯苓塊連皮五錢桂枝三錢沉香梗二錢杏仁泥三錢焦白芍一錢黃芩炭三錢姜半夏五錢萸仁一錢白蔻仁研三錢益智仁三錢廣皮三錢煮

三盃分三次服

廿三日 左脈弦緊右大而緩舌白未化瘧雖止而餘溼未消此方仍服去白蔻仁

一錢黃芩炭一錢益智仁一錢以後又服八帖

七月初四瘧已止胃亦開脈已回陽與平補中焦

茯苓塊五錢焦於朮三錢炙甘草二錢姜半夏三錢生苡仁五錢白蔻仁一錢五分生姜三片廣皮炭三錢大棗去核二枚煮三盃分三次服服七帖後可加人參一錢服至收功

八月初丸方 瘴後六脈俱弦微數與脾腎雙補法

茯苓六兩何首烏四兩炒黑杞子四兩野朮四兩沙蒺藜一兩蔻仁五錢

人參四錢五味子二兩蓮子去心六兩山藥四兩右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二三錢開水送每逢節氣以遼參三五分煎湯送

乙酉六月高歲初十日間三瘧脈弦暑邪深入矣

滑石五錢茯苓皮三錢知母二錢杏仁二錢製半夏三錢黃芩三錢柴胡二錢藿香葉三錢生姜三片青蒿三錢白蔻仁一錢大棗去核一枚苡仁三錢炙甘草一錢煮三盃分三次服

十二 診脈數熱重加知母一二錢

廿三日 捯止熱退去知母柴胡青蒿生姜大棗改藿香梗二錢減滑石二錢餘邪已輕再服數帖

朱三十日但寒不熱舌苔白滑而厚三四日灰黑而滑五六日黑滑可畏脈沈弦而緊太陰寒溼之瘤與牝瘧相參但牝瘧表寒重此則偏於在裏之寒溼重也初起三日用桂枝蒼朮草果茯苓苡仁廣皮澤瀉猪苓三四日

加附子五六日又加蒼朮草果分量再加生姜舌苔始微化黃惡寒漸減

服至十二三日舌苔惡寒皆始退癒愈之後峻補脾腎兩陽然後收功

乙酉七月廿五日姚五歲久瘧不愈寒多舌苔白消溼氣重也宜通宣三焦微偏於溼

杏仁五錢桔梗皮五錢青蒿一錢半夏五錢煨草果一錢五分廣皮四錢

苡仁五錢炒黃芩一錢五分生姜三片蔻仁三錢煮三盃分三次服

八月初前方服六帖瘧疾已止照原方去草果青蒿加滑石六錢益智仁二錢
三日

冬溫

甲子十一月廿五日張六十歲舌黃口渴頭不痛而惡寒面赤目赤脈洪熱甚形似傷寒實

乃冬溫挾痰飲與伏暑一類

連翹六錢苦桔梗八錢荆芥穗五錢金銀花六錢廣鬱金二錢廣皮二錢

半夏八錢藿香梗五錢甘草三錢杏仁六錢白通草二錢共爲粗末分七

包一時許服一包蘆根湯煎

廿六於前方內去芥穗通草

廿七冬溫餘熱未清

連翹二錢細生地三錢薄荷一錢銀花一錢苦桔梗三錢黃芩一錢五分杏仁三錢炒知母一錢甘草一錢水五盃煮兩盃分兩次服

廿九溫病渴甚熱甚面赤甚脈洪甚

石膏八錢苦桔梗五錢荆芥穗三錢連翹三錢杏仁泥五錢廣鬱金一錢銀花一錢姜半夏四錢甘草三錢薄荷二錢煮三盃分三次服

三十溫病最忌食復況老年氣血已衰再復則難治矣口渴甚痰多脇痛

銀花五錢苦桔梗五錢半夏六錢連翹三錢杏仁霜五錢薄荷一錢五分石膏四錢廣鬱金三錢甘草一錢煮成三盃分三次服

十二月大勢已退餘熱尚存仍須清淡數日無使邪復

連翹二錢細生地五錢元參一錢銀花二錢丹皮一錢黃芩二錢麥冬

不去心五錢 生甘草二錢 頭煎二盃二煎一盃分三次服

初三脈洪滑卽於前方內加半夏三錢

日

乙丑二月某 脈不浮而細數大渴引飲大汗裏不足之熱病也用玉女煎法
知母四錢 生石膏一兩 甘草三錢 麥冬五錢 細生地五錢 京米一撮 桑葉
三錢 煮三盃分三次服

日 三溫熱大渴大汗脈數昨日用玉女煎法諸症俱減平素有消渴病用玉女煎
大便稀溏加牡蠣一面護陰一面收下

牡蠣一兩 生石膏五錢 炙甘草三錢 麥冬五錢 大生地五錢 炒知母二錢
京米一撮 煮三盃分三次服

丙寅十一月初一日某 冬溫脈沈細之極舌赤面赤譁語大便閉邪機純然在血分之
裏與潤下法

細生地六錢 元參六錢 粉丹皮三錢 生大黃五錢 麥冬不去心六錢 生甘

草二錢元明粉一錢煮三盃先服一盃得快便止後服外服牛黃清心丸二丸

初一冬溫譖語神昏皆誤表之故邪在心包宜急急速開膻中不然則內閉外脫矣大便閉而正赤暈因潤下未通經謂下不通者死非細故也得藥則嘔忌甘也先與廣東牛黃丸二三以開膻中繼以大承氣湯攻陽明之實生大黃八錢元參八錢老厚朴二錢元明粉三錢丹皮五錢小枳實四錢煮三盃先服一盃得便即止不便再服

傷寒

癸亥二月庚八歲太陽中風尙未十分清解兼之溼痹脾痛
初一日

茯苓皮五錢桂枝四錢半姜黃一錢杏仁三錢防己三錢厚朴二錢陳橘皮一錢五分晚蠶沙三錢炙甘草一錢五分煮三盃分三次服一帖

初四行經絡而和營衛則風癧自止

桂枝八錢 焦白芍四錢 生姜五片 防己六錢 生於朮五錢 大棗去核二枚
半夏五錢 灸甘草三錢 水八碗 煮取三碗 分三次服頭一次飲稀粥令微
汗佳其二三次不必啜粥

初五 左脈沈緊 卽於前方內加 熟附子五錢

初六 脈洪大而數 經絡痛雖解而未盡除 寡也 小便白而濁溼也

飛滑石五錢 桂枝三錢 生苡仁五錢 茯苓皮五錢 猪苓二錢 黃柏炭一錢

杏仁泥五錢 罡瀉三錢 白通草三錢 煮三碗 分三次服

初七 昨服開肺與大腸 滑法溼滯已下小便亦清 身熱已退 但大便與痰中微
有血跡 症從寒溼化熱而來 未便卽用柔藥以清血分 今日且與宣行肺

陽右脈仍見數大 可加苦藥如明日血分未清 再清血分未遲

飛滑石五錢 半夏三錢 生苡仁五錢 杏仁泥三錢 厚朴二錢 黃柏炭一錢

黃芩炭二錢 賴皮一錢 五分細蘇梗一錢 頭煎兩盃 一煎一盃 分三次服

初八 否昔仍有新白衣破稍薄而畏寒身熱已退陽虛溼氣未淨無疑

姜半夏五錢 桂枝三錢 焦白芍二錢 生苡仁五錢 厚朴一錢 生茅丸二錢

杏仁泥三錢 廣皮一錢五分 全當歸一錢五分 頭煎兩盃一煎一盃分三

次服一帖

初十 諸症向安惟營氣煦衛不和寐不實寐後自覺身涼以調和營衛爲主

桂枝三錢 茯苓塊二錢 廣皮一錢五分 白芍三錢 生苡仁五錢 生姜三片

半夏六錢 炙甘草一錢 大棗去核二枚 頭煎兩盃一煎一盃分三天服 六帖

十六 营衛已和即於前方內增白芍一錢 加膠飴三錢 服七帖而安

發亥二月 唐氏六十歲太陽中風漏汗桂枝加附子湯主之

桂枝六錢 焦白芍四錢 生姜三片 炙甘草三錢 熟附子三錢 大棗去核三枚 煮三盃分三次緩緩服

十七 中風漏汗兼之腎水上凌心心悸腹痛昨用桂枝加附子湯諸症悉退今

左脈沈緩右脈滑數表雖清而濁陰未退識苓桂伐腎邪歸荷溫衝脈吳

萸半夏生姜兩和肝胃白芍以收陰氣合桂枝而調營衛加黃芩一以清

風化之熱合諸藥爲苦辛通法此外感之餘兼有下焦裏症之治法也

茯苓塊

五錢

桂枝四錢

淡吳萸三錢

姜半夏四錢

青皮一錢

五分

全當歸

炒黑三錢

小茴香炒黑三錢

生姜三片

黃芩炭一錢

焦白芍一錢

甘瀉水

煮三盃分三次服

日十九

脈緩濁陰久踞兼有滯物續下用藥仍不外苦辛通法稍加推蕩之品因

其勢而利導之大意通補陽明之陽正以驅濁陰之陰若其人陽明本旺
胃陰自能下降六腑通調濁陰何以能聚再胃旺自能坐鎮中州濁陰何
能越胃而上攻心下反覆推求病情自現

桂枝尖四錢

厚朴三錢

焦白芍二錢

茯苓塊三錢

青皮一錢

五錢

小枳實

一錢五分

淡吳萸三錢

烏藥一錢

廣木香一錢

小茴香三錢

吳萸同炒黑

廣皮

一錢黃芩炭一錢川棟子二錢煮三盃分三次服

廿二

凡痛脹滯下必用苦辛通降兼護陽明固不待言前法業已見效細詢病情已十有餘年以半產後得之誤用壅補而成按久病在絡再痛脹偏左下至少腹扳着其中必有瘀滯非純用湯藥所能成功蓋湯者瀉也瀉萬腸胃通和百脈固其所長至於細雕密鏤緩行攻絡是其所短非兼用化癥回生丹緩通不可且湯劑過重有瘕散爲蠭之虞不得不思慮豫防也桂枝尖一錢半夏三錢廣木香八分炒白芍二錢厚朴一錢地榆炭一錢降香末一錢紅花七分炒桃仁一錢五分川棟子二錢小茴香炒黑一錢廣鬱金一錢全當歸炒黑一錢烏藥一錢五分兩頭尖二錢黃芩炭一錢黃連八分廣皮炭八分甘瀉水煎前後四盃日三夜一分四次服五帖

昔李東垣用藥有至三十餘味者張仲景盤甲煎亦有三十幾味後人學問不到妄生議論不知治經治以急峻則用少而分量多治絡治以緩緩

則用多而分量少治新則用急治舊則用緩治急可獨用治舊必用眾獨則無推諉而一力成功眾則分功而互相調濟此又用藥多寡之權衡也

兼服化癥回生丹一丸

廿七宣絡法兼雨利肝胃

炒白芍六錢半夏三錢炒丹皮三錢製香附二錢全當歸三錢川芎五分

炒蒺藜三錢小茴香炒黑三錢炒青皮八分煮三盃分三次服

廿八麻仍不實於前方內加 生苡仁六錢半夏一錢服三帖

三月初一日

姜半夏五錢全當歸三錢製香附一錢五分降香末一錢良姜一二錢桃仁泥一錢五分小茴香三錢烏藥一錢廣皮炭八分乾姜炭五分青皮八分

煮三盃分三次服

初五終瘀多年腹痛脹攻冒食後脹脹今搜去絡中瘀滯飢甚則如刀刮竹絡

氣虛也與通補絡法

炒白芍六錢 丹參三錢 炒杞子一錢 白歸身二錢 丹皮二錢 桂圓肉三錢
小茴香一錢 煮三盃分三次服 九帖全愈

甲子二月

甘一 日 吳氏廿三歲 頭項強痛而惡寒脈緩有汗太陽中風主以桂枝湯

桂枝三錢

炙甘草二錢 大棗去核一枚 白芍二錢 生姜三錢 水五盞

孟頭盃卽啜稀熱粥令微汗佳有汗二盃不必啜粥無汗仍然

甘四 日

不解於前方內加 羌活五錢

甘五 日

服前方業已脈靜身涼不虞避風因而復中脈緊無汗用麻黃湯法

麻黃自去節三錢

白芍三錢 生姜三片 桂枝三錢 炙甘草二錢 羌活二錢

大棗去核二枚

煮兩盃分兩次服

甘六 日

服前藥不知身重疼痛其人肥而陽氣本虛平素面色淡黃舌白溼氣又重非加助陽勝溼之品不可於前方內加重

麻黃去節五錢
桂枝成八錢杏仁泥三錢白朮二錢桂枝二錢熟附子三錢炙甘草一錢共三錢水五碗先煮麻黃去上沫入諸藥取二碗分二次服服一帖而出愈

甲子三月唐五十歲頭風惡寒脈緊言慙肢冷舌色淡太陽中風雖係季春天氣不得看作春溫早問陰胸雨氣虛寒以桂枝二麻黃一法

桂枝六錢杏仁五錢生姜六片麻黃去節三錢炙甘草三錢大棗去核二枚煮三盃先服一盃得微汗止後服不汗再服再不汗促役其間

十七於原方倍麻黃減桂枝加附子三錢一帖

十八照原方服一帖

十九諸症悉減藥當暫停以消息之

二十中風表解後言塞減食則汗頭引痛舌白滑脈微緊宜桂枝加附子湯除

風實表護陽

桂枝六錢焦白芍四錢生姜五片附子三錢炙甘草二錢大棗去核二枚

水五盃煮二盃分溫二服渣再煮一盃服

日一表解後復中惡寒胸痞舌苔厚而白脈遲緊裏急

桂枝六錢 茯苓塊五錢 厚朴三錢 茯仁五錢 熟附子四錢 乾姜三錢 茅朮三錢 小枳實二錢 廣皮二錢 日一帖

日二於前方內去茯苓減芍仁加一炙甘草一錢 生姜一兩 日一帖

日三諸證悉衰當減其製照前方日服一帖

日四中風表解後餘邪入裏舌黃身熱胸痞議瀉心湯瀉其痞

半夏六錢 黃芩炒半黃三錢 生姜五錢 乾姜五錢 黃連炒半黃一錢 頭煎兩盃一煎一盃分三次服

某先寒後熱脇痛腰痛少陽症也講從少陽領邪外出太陽法
柴胡六錢 紫參三錢 甘草三錢 桂枝四錢 黃芩三錢 芒消一錢 五分 生姜三片 半夏一錢 五分 煮三盃分三次服

又 熱後寒退熱存脹脹

半夏五錢廣參金二錢生姜三錢黃芩四錢廣皮炭一錢五分香附三錢

大棗去核二枚生甘草一錢五分煮三盃分三次服

廿五

張 今年風木司天現在寒水客氣故時近初夏猶有太陽中風之症接

太陽中風係傷寒門中第一關最忌誤下時人不讀晉唐以上之書故不識症之所出來仲景謂太陽至五六日太陽症不罷者仍從太陽驅去宜桂枝湯現在頭與身仍微痛既身熱而又仍惡風寒的是太陽未罷理宜用桂枝湯但其人素有溼熱不喜甘又有微咳議於桂枝湯內去甘藥加辛燥服如桂枝湯法

桂枝六錢半夏四錢廣皮三錢白芍四錢杏仁三錢水八盃煮成三盃先

服一盃卽啜稀熱粥令微汗佳有汗二三盃不必啜粥無汗仍然

廿六 太陽中風誤下胸痞四五日太陽症未罷昨用太陽症仍在例之桂枝湯

法今日惡寒已罷頭昏已清惟胸痞特甚不渴舌白而壯熱泄瀉稀水頻
仍仲景法云病發於陽而誤下之成胸痞者瀉心湯主之今用其法
再經謂脈不動數者爲不傳經也昨日以動數太甚斷無不傳之理可畏
在此

茯苓連皮五錢乾姜五錢生姜二片半夏五錢黃連三錢煮三五分三次
服

廿七日 太陽中風誤下前日先與解外昨日太陽症罷卽瀉胸痞今日胸痞解惟
自利不渴舌灰白脈沈數經謂自利不渴者屬太陰也太陰宜溫但理中
之人參甘草恐不合拍議用其法而不用其方

茯苓連皮一兩桔梗炭四錢乾姜五錢半夏六錢廣皮炭一錢生姜五錢
煮三盃分三次服

廿八日 太陽中風先與解外外解已卽與瀉誤下之胸痞痞解而現自利不渴之

太陰症今日口不渴而利止足太陰出陽也脈亦頓小其半古云脈小則病退但仍沈數身猶熱而氣粗不寐陷下之餘邪不淨仲景傷寒論謂真陰已虛陽邪尚盛之不寐用阿膠雞子黃湯按此湯重用黃芩黃連謙用

甘草瀉心法

半夏五錢黃芩四錢生姜二錢雲苓三錢山連三錢大棗去核一枚甘草

三錢煮三盃分三次服

日廿九脈沈數陰經熱陽經不熱是陷下之餘邪在裏也氣不伸而噦噦者傷寒門中之大忌也皆誤下之故議少用了丁香柿蒂湯法加黃連以徹裏熱疏逆氣

公丁香一錢黃芩三錢柿蒂一枚真山連一錢廣皮一錢姜汁沖二茶匙

煮二盃分二次服

初一誤下成胸痞自利兩用瀉心胸痞自利俱止但陷下之邪與受傷之間氣

搏而成噦昨用丁香柿蒂湯去人參加芩連方雖易仍不外仲景先師苦辛通降之法病者畏而不服今日噦不止而左脈加進勉與仲景噦門中之橘皮竹茹湯其力量減前方噦等矣所以如此用者病多一日則氣虛一日仲景於小柴胡湯中卽用人參況誤下中虛者乎

廣皮六錢半夏三錢生姜五錢竹茹五錢炙甘草四錢人參多一錢若無人之大棗去核四枚煮三盃分三次服

初一誤下中虛氣結成噦昨與金匱橘皮竹茹湯今日噦減過半古謂效不更方仍用前法但微喘而舌苔白仲景謂喘家加厚朴杏子佳議以前方內加厚朴杏仁

廣皮六錢老厚朴二錢生姜三錢竹茹五錢杏仁泥三錢大棗去核一枚洋參三錢炙甘草五錢煮三盃分三次服

初二於原方內加柿蒂三錢

初四

誤下之陷症，而喘祚連與金匱橘皮竹茹湯一而補中一面宣邪。茲已邪溫諸惡候如失脈亦漸平，但其人宗氣受傷不淺，議與小建中湯加補皮半夏小小建立中氣調和營衛兼宣胃陽，令能進食安眠。

焦白芍六錢桂枝四錢生姜三片新會皮一錢半夏四錢大棗去核二枚炙甘草三錢膠鈎令勻再上火二三沸煮三盃分三次服。

初五

病解後微有飲咳，議與小建中去膠鈎加半夏廣皮茯苓苡仁蔻仁杏仁桂枝四錢炒白芍六錢廣皮三錢半夏五錢茯苓塊三錢生姜三片苡仁五錢白蔻仁一錢大棗去核二枚杏仁二錢炙甘草三錢煮三盃分三次服。

初六

病後兩服建中胃陽已復，脾陽不醒何以知之？安眠進食是爲胃陽復否？起自滑苔小便短大便不解，脈作數是脾陽未醒而上蒸於肺也。議與宣利三焦法以醒脾陽。

半夏五錢 小枳實三錢 茯苓仁五錢 茯苓五錢 益智仁一錢 廣皮三錢 杏仁

五錢 白通草一錢 煮三盃分三次服

日初入大小便已利脈仍洪數舌白滑苔未除仍宜苦辛淡法轉運脾陽宣行溼

熱

茯苓皮五錢 半夏五錢 黃柏炭三錢 生苡仁五錢 杏仁三錢 蒼朮炭二錢

白蔻仁一錢五分 廣皮一錢五分 黃芩炭三錢 煮三盃分三次服

日十二脈仍沉數舌苔反白滑仍宜建中行溼以除伏邪溼最傷氣非溼去氣不得健與急劫溼法

茯苓皮五錢 製首烏四錢 白蔻仁一錢五分 姜半夏五錢 生苡仁五錢 黃芩炭二錢 煙草果四錢 黃柏炭二錢 炒廣皮一錢五分 杏仁泥三錢 益智仁二錢 煎三盃周十二時服完

乙酉十一月十二日 吳五十內熱外寒兼發症飲喉啞咳嗽痰多頭痛惡寒脈浮與麻杏

石膏湯加半夏廣皮苦桔梗

生石膏六兩麻黃去節五錢苦桔梗六錢姜半夏一兩廣皮四錢炙甘草四錢杏仁泥八錢煮四盃先服一盃得汗卽止不汗再服汗後避風十四肺脈獨浮去麻黃三錢

十七頭浮喉嚨咳嗽痰多

生石膏四兩麻黃去節三錢桔梗五錢半夏六錢廣皮三錢炙甘草二錢杏仁六錢煮三盃先服一盃得汗止後服

廿三脈浮喉嚨咳嗽痰多內飲招外風爲病與大青龍湯法

麻黃去節五錢生石膏四兩廣皮五錢杏仁八錢姜半夏八錢生姜三錢桔梗五錢炙甘草三錢大棗去核二枚煮二盃先服一盃得汗止後服不汗再服

廿四病減者減其製去麻黃三錢廣皮生姜大棗於原方加木通一錢以小便

吳氏醫案

傷寒

至

短也

廿七

喉復啞脈洪數小便已長照前方去木通加生石膏二兩

廿八

十一月廿九日趙十三歲頭痛脈浮弦不甚緊無汗與杏蘇散法

杏仁

二錢

羌活一錢

生姜三片

蘇葉三錢

桔梗三錢

大棗去核一枚

防風

二錢

甘草一錢五分

煮二茶盃先服一盃覆被令微汗不可使汗淋漓得

汗止後服不汗再服第二盃又不汗再作服以得汗爲度汗後避風只啜

粥須忌葷

丁亥十一月十一日某四十歲頭項強痛而惡寒脈浮而緊無汗的係傷寒法當發汗何得

妄爲冬溫而恣用涼藥

麻黃去節六錢

杏仁四錢甘草四錢

桂枝五錢

煮三盃先服一盃覆被令

微汗周身佳得汗止後服不汗再服○盡剝而汗始至足

叶二

傷寒與麻黃湯頭項強痛已解脈不浮緊脣亦開但受傷太重陽虛體弱

畏寒與溫太陽經脈

桂枝六錢 焦白芍四錢 甘草三錢 防己一錢 杏仁泥三錢 生姜五片 廣皮四錢 熟附子三錢 大棗去核一枚 煮三盃分三次服

十三 脈症仍舊陽未全復照前方加附子再服一帖服藥後不必啜粥

十四 痢症身痛大減惟足痛甚溼傷於下仍酸於下也仍與溫通太陽經絡
雲苓皮六錢 桂枝六錢 熟附子五錢 生苡仁六錢 防己四錢 片姜黃三錢
杏仁泥四錢 甘草三錢 海桐皮三錢 煮四盃分早晚中晝夜四次服

十五 諸症向安惟六脈陽微之極仍以補陽爲要但去痢未遠宜通不宜守俟
三四日後毫無遺症再議守補

雲苓塊二錢 桂枝六錢 生苡仁一錢 熟附子三錢 茯苓三錢 灸甘草二錢
煮三盃分三次服一帖

十六 脈沉細背脊仍有畏寒之意舌白滑苔頗厚寒溼未清猶未敢呆補

雲苓皮五錢桂枝八錢川芎蘇四錢生苡仁五錢防己二錢白通草一錢
姜半夏四錢廣皮二錢炙甘草三錢熟附子四錢煮三盃分三次服

戊子正月史三十歲脈浮洪而數頭痛身痛惡寒有汗此爲太陽中風但中風脈

緩今洪數有力恐傳經也桂枝湯主之

桂枝六錢炙甘草三錢大棗去核三枚白芍四錢生姜五錢煮兩盃先服
一盃卽啜稀熱粥一碗覆被令微汗佳得汗止後服不汗再服

十七 脈之洪大已減頭痛身熱惡寒俱減餘邪陷入少陽乾嘔口苦與小柴胡
湯渴者加天花粉

柴胡三錢姜半夏五錢生姜三錢黃芩三錢天花粉一錢五分廣皮三錢
大棗去核一枚炙甘草一錢五分煮一天盃分二次服

廿八 脹脹身涼外感已解惟舌上白濁夾黃苔太甚胃口不清與宣通腑陽切

忌早食多食

姜半夏五錢 益智仁二錢 白蔻仁八分 雲苓皮五錢 小枳實三錢 廣陳皮

三錢 茯仁泥三錢 炒神麴三錢 白通草八分 煎三盃分三次服二帖

乙丑正月 初五日 劉氏五十歲 太陽中風就延五日不解 衝氣上動宛若奔豚腹滿泄瀉

而渴兼有少陰症矣 兩肩兩感太陽少陽並見一兩感也 其人積怒內傷
又加外感此二兩感也可畏之至且先伐其衝氣

桂枝八錢 雲苓塊一兩 川芎一錢五分 當歸三錢 川椒炭三錢 生姜五大
片 煮三盃分三次服

初六 太陽少陽兩感衝氣上動如奔豚與苓桂重伐腎邪今日一齊俱解脈靜
身涼衝氣寂然可喜之至微有痰飲咳嗽當與和胃令能食

雲苓塊六錢 桂枝三錢 生姜三片 姜半夏五錢 廣皮三錢 大棗去核二枚

焦白芍三錢 煮三盃分三次服

乙丑正月二十日 錢三十歲 太陽中風汗多誤與收滯引入少陽寒熱往來口苦脈弦與

小柴胡湯和法其人向有痰飲喘症加枳實橘皮去人參

柴胡五錢 姜半夏六錢 生姜五錢 廣皮五錢 小枳實四錢 大棗去核一枚

炙甘草三錢 黃芩炭一錢五分 煮三盃先服一盃寒熱止止後服毒劑不

止再作服

日三風入少陽與小柴胡湯已解其半仍須用和法寒多熱少而口渴較前方

退柴胡進黃芩加天花粉

姜半夏三錢 柴胡二錢 生姜三大片 天花粉三錢 炒黃芩二錢 大棗去核
二枚 炙甘草一錢 煮三盃分三次服

己丑十一月十四日某四十風寒夾痰飲喘咳吐血業已發汗身熱不退現已右脈洪大

數滑病勢太重勉與大青龍法去表藥加半夏

生石膏四兩 雲苓塊五錢 生姜汁沖三小匙 姜半夏六錢 杏仁泥五錢 甘
潤水八盃煮三盃分三次服

十七日傷寒夾瘀飲吐血誤治喘咳脹數極與大青龍法去表藥加半夏身熱已

退喘已定惟咳血未除

生石膏三兩 姜半夏六錢 橘皮三錢 雪苓皮六錢 杏仁泥五錢 生姜汁沖
三茶匙 煮三盃分三次服