增訂本草備要

增訂本草備要卷之二

休寧汪　昂訂稿著輯　男汪　端其兩

弟汪　桓毅武參訂　姪汪惟寵子錫

同學鄭宮慶賚寰同訂　姪壻仇　澐天一同較

草部

牡丹皮　辛苦微寒入手足少陰心腎厥陰心包肝瀉血中伏火。色丹故入血分。時珍曰。伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故能涼血熱則枯。血熱則瘀不去。新血不生。凉血而生血凉則血自歸經。破積血而

生。通經脈爲吐衄必用之藥。血屬陰本靜因火治中所逼故越出上竅

風五勞驚癇瘛瘲。筋脈伸縮抽掣爲瘛瘲或手足抽掣口眼喎邪卒然昏仆吐涎身軟時發時止爲癇非陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致

除煩熱療癰瘡。涼下胞胎。退無汗之骨蒸。張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精爲志故腎藏志火之精爲神故心藏神

單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒炸蒸用畏貝母兎絲大黃忌蒜胡荽伏翎。時珍曰花白者補赤者利人所宜悟宜分別之

經斷。苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷

肝腎筋骨

中補不足。經疏云。味甘故然。煖子宮。縮小便。破瘀血。治腰痛。胎漏。漉帶。遺精。腸風。血痢。斷二錢。半。每服二錢。米飲下。治時瘧。亦驗。癰疽。腫毒。又主金瘡折跌。以功命名。止痛生肌。女科

外科需為上劑　川產良。狀如雞腳皮黃皺。節節斷者

真去向裏硬筋。酒浸用。地黃為使

骨碎補　苦溫補腎。故治耳鳴。耳鳴必由腎虛。及腎虛久瀉。研末。入猪腎。煨熟。空心食之。腎主二便。久瀉多屬腎虛。不可專治脾胃也。腎主骨。故治折傷。以功命名。

附和傳　牙痛。炒黑為末。擦牙。嚥下亦良。又入厥陰心包。肝。能破血。止血。

後陰利穀。
通行瘀血生新血。

人血行傷故治折傷粥和末塗傷處。根似蒜而偏長去毛用或蜜拌蒸

益母草一名茺蔚。辛微苦寒入手足厥陰心包肝。消水行血去瘀生新。調經解毒。瘀血去則經調治血風血運血痛血淋胎漏產難崩中帶下。帶脈損于腰間病生于此故名為帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升提血虛者養血滋陰而兼調氣為經產良藥消疔腫乳癰瘡癤亦取其散通大小便然辛散之藥臌脹水者忌服。

益母子主治略同調經益精明目。血滯者則宜之活血順氣逐風氣行則血行血活則風散行中有補治心煩頭痛血虛而熱之候胎產帶崩令人有

行補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若子治療胎產消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益根莖花葉專于行子則行中有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖葉花實為末蜜丸治胎產百病近効方搗汁熬膏亦良忌鐵子微炒用

澤蘭　苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰脾肝通九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫防己為使治產後血瀝腰痛未盡吐血鼻洪目痛頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻女科要藥古方澤蘭尤甚多

時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤

節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長葉尤有岐者爲蘭草莖微方節短葉有毛者爲澤蘭嫩時並可按那音而佩之楚詞所謂紉秋蘭以爲佩是也朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥濕不變方可刈佩今之蘭惠花雖香而葉無氣質易萎不可刈佩見人呼爲香草俗名孩兒菊夏月采留髮中則髮不腫浸汕傘髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走氣分故能利水道除痰痺殺蠱蟲惡而爲消渴良藥經曰數食消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能消水腫塗癰毒破瘀除癥而爲婦人要藥以爲今之山蘭者誤矣昉已爲使宗

爽朱丹溪亦以蘭草爲山蘭之葉李時珍考衆說以說之按別本云蘭葉主寒清肺開氣消痰利水解鬱調經閒產爲閒產者力勝李士材云蘭葉禀金水之氣故入肺藏東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集諸家之言曰陳藏器閒覽云楚騷之蘭或以爲都梁香或以爲澤蘭或以爲猗蘭當以澤蘭爲正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著益蘭說以說之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得蘭名楊升菴云世以如蒲萱者爲蘭九畹之受誣也久矣又吳草廬有蘭說云蘭爲醫經上品有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂譌指爲蘭騷之蘭寇氏本草弼于流俗反疑舊說爲非夫醫經爲實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰癖乎其種盛于閩朱子閩人豈不識其土産而辨析若此

此世俗至今猶以非蘭爲蘭何其惑之甚也昂按朱子辨蘭條離騷紉佩以爲證竊謂紉佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈眞露可飲而英可餐乎又云製芰荷以爲衣集芙蓉以爲裳豈眞芰荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可爲定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣足離騷之秋蘭當稽本經之澤蘭無疑也然離騷不常曰春蘭兮秋菊乎不又曰綠葹青蘭而延竚乎不又曰疏石蘭以爲芳乎若秋蘭既與之澤蘭將所云春蘭幽蘭石蘭者又不得爲山蘭當是何等之蘭乎且山蘭爲花中最上之品古今評者列之梅菊之前今反屈于蓀兒菊之下以爲盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品概棄不錄何其不幸若斯之甚也本草救盤之藥採多皆未必有驗至于行水消痰固山蘭之葉乃所優爲者也蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草爲一類二種遂併騷經而

澤蘭可作蔬品幽字何可當也潟血熱

疑之。其澤蘭面黑山蘭遂令。蘭草無復有用之者。不思若以爲一類則本經蘭草一條已極重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭止爲中品乎況一入氣分一入血分迥然不同也又驗經言蘭者凡五除本蘭人所共識其餘秋蘭春蘭幽蘭石蘭若若以爲佩見菊是不特二種一類。且四種一類矣。而以爲九畹之蘭理也哉蓋本經言澤蘭所以別乎山也言蘭草明用莖葉者用其花也驗經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別乎澤也思謂秋蘭當爲澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也寇氏朱氏之論又安可全非乎

姑附愚說以諗多識之士

白薇　苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風

身熱支滿忽忽不知人。陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不

汗出過多。血少陽氣鬱上。氣塞不行而暍婦人尤多此症宜白薇湯白薇當歸各一兩參五錢甘草錢半。熱淋。溫瘧洗洗。寒熱酸痛。能內營故酸痛。每服五錢。

心煩。汗出過多。血少陽氣鬱上。氣塞不行而暍婦人尤多此症宜白薇湯白薇當歸各一兩參五錢甘草錢半。熱淋。溫瘧洗洗。寒熱酸痛。能內營故酸痛。每服五錢。

婦人傷中淋露。血熱。千金白薇散。治胎前產後。遺尿不知時白薇芍藥等分。酒調服。丹溪曰。此胞阿間所開熱甚。廷孔鬱結。神無所依。產虛煩悶。仲景不能收禁之意也。廷孔。女人溺孔也。

婦人傷中淋露。血熱。千金白薇散。治胎前產後。遺尿不知時白薇芍藥等分。酒調服。丹溪曰。此胞阿間所開熱甚。廷孔鬱結。神無所依。產虛煩悶。仲景不能收禁之意也。廷孔。女人溺孔也。

蓋氣竹皮丸用之。經疏云。古方調經。種子。往往用之。蓋不孕緣于血熱。血少。而其源起于真陰不足。陽勝而內熱。故營血日枯也。陰清熱。則血自生耳。

蓋氣竹皮丸用之。經疏云。古方調經。種子。往往用之。蓋不孕緣于血熱。血少。而其源起于真陰不足。陽勝而內熱。故營血日枯也。陰清熱。則血自生耳。

有子矣。須佐以歸地芍藥杜仲續斷等藥。

艾葉　苦辛。生溫熟熱。純陽之性。能回垂絕之元陽。通十

似牛膝。而短小。粟畏。去莖。酒洗用。惡大黃大戟山茱萸。

二經走三陰。太少。理氣血。逐寒濕。煖子宮。止諸血。溫中。開鬱。調經。安胎。胎動腰痛下血。膠艾湯良。治吐衄崩帶。阿膠艾葉煎服。亦治虛痢。治帶。腹痛冷痢。霍亂轉筋。寒濕之要藥。片姜理氣血。逐殺蚘。治癬。外科有用乾艾作湯洗白帶二三錢。洗瘡。然後敷藥者。蓋以人血氣冷。必假艾力以佐陽。而艾性又能殺虫也。酷煎之灸音火。能透諸經而治百病。血熱爲病者禁用灸火。九不行。入藥則熟上衝。不可過劑。○丹田氣弱。臍腹冷者。以熟艾裝袋。熨臍腹。其效。寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內。

陳者良。搗搗如綿。謂之熟艾。灸火用。婦人九散。醋煮搗餅。用爲末用。入茯苓敷片。同研。則易細。煎服宜鮮者。若酒醋香水。

附爲使艾附九調婦人諸病宋時重湯陰艾自明成祖
發明並以野艾爲真
斷艾雖香實非艾種

宣活血利氣

延胡索　辛苦而温入手足太陰肺厥陰心包經能行血中氣滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外諸痛通則不痛凝癖崩淋月候不調乳血不和因而凝滯不以時至產後血運暴血上衝折傷積血疝氣危急爲活血利氣第一

藥然辛温走而不守獨用力迅宜兼補氣血藥通經堕胎血熱氣虛者禁用根如牛蒡肉黄小而堅者良酒炒行血醋炒

止血生用破血炒用調血

紅花 古名紅藍花

辛苦甘温入肝經而破瘀血活血瘀行則血行有血活則潤燥

熱結于中暴吐紫黑血者吐出爲妙吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行潤燥消腫凡血熱血瘀止痛則作腫作痛血閉便難血運口噤胎死腹中非血行血瘀不能下瘀癥血熱本草不言治瘀喉痺不通又能入心經生新血須兼補血藥爲佐使

俗用染紅併作胭脂胭脂活血解毒瘀傅之少用養血多則行血過用能使血行不止而斃生于心色藏于肺屬于衝任紅花汁與相類故治血病有功產婦血悶而死名醫陸氏以紅花數斤煮湯寢婦其

通行血 渴血熱 滑腸

上而薰之湯冷再加半日而蒸金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風。

茜草 色赤入營氣温行滯味酸走肝而鹹走血本經苦寒入厥陰血分心包能行血止血能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血消瘀通經酒煮一兩治風痙黃疸痘有五黃疸殺痘酒痘黃汗痘女勞疸此蓋蓄血發黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱例治當用四物知柏壯其水參术培其氣隨症而加利濕清熱藥崩運撲損痔瘻瘡癰血少者忌用根可染絳忌鐵

紫草 甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血活血利九竅通

二便。（微寒性滑）治心腹邪氣。（即熱也）水腫五疸。瘕癖惡瘡。（血熱所致）及瘡瘑血熱毒盛二便閉澁者。（血熱則毒閉得紫草涼利者忌之活幼心書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣）瀉者忌用。去頭蘆酒洗。

凌霄花（一名紫葳）甘酸而寒入厥陰血分。（心包）能去血中伏火。破血去瘀。主產乳餘疾。崩帶癥瘕。腸結便（不大）血閉。淋閟風痒。血熱生風之症。女科多用孕婦忌之。（本經云養胎經疏云）被血之藥非所宜也。○肺癰有用之爲君藥者。凌霄花爲末和蜜陀僧唾調熬酒服甚驗。

藤生花

瀉涼血

開五瓣黃赤有點不可近鼻聞傷腦

大小薊 甘溫大明曰涼皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女子赤白沃安胎涼血之功小薊力微能破瘀生新葆精養血退熱補虛不能如大薊之治癰腫丹溪曰小薊治本事方一人冷氣入陰囊腫滿痒痛煎大薊汁服立瘥兩薊相似花如髮大薊莖高而葉瘦小薊莖低而葉不皺皆用根

瀉散瘀定痛

三七 亦名山漆甘苦微溫散血定痛治吐血衄血崩血痢血痔目赤癰腫醋磨塗即散已破者爲末摻之爲金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則

血不衝心杖後敷之去瘀消腫易愈
大抵陽明厥陰血分之藥故治血痢此藥近時始出
軍中恃之從廣西山洞來者略似白及地黃有節味微
甘頗似人參以末摻猪血中血化爲水者眞近出一種
而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐
可愛而氣不香根大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七
治金瘡折傷血痛甚
效與南中來者不同

滅止血

地榆　苦酸微寒性沉而澀本草未嘗言澀然能收
澁止血皆酸斂之功也入下
焦除血熱治吐衄下血腸風血虛腸風血餌者爲腸風隨感
禁川而見也血瘀者爲藏
毒積久而發也糞前爲近血血痢藥頌曰古方斷下後
出腸胃藝後爲遠血出肺肝用之寇宗奭曰虛寒

藥頌曰本草圖

生滑行血炒澁止血

瀉痢及初起者忌用　似柳根外黑裏紅取上截炒黑用稍反行血得炭良惡麥冬

蒲黃　甘平厥陰血分藥心包肝　生用性滑行血消瘀通經利小便祛心腹膀胱寒熱同五靈脂治心腹血氣痛名失笑散療撲打損傷瘀痛諸腫一婦舌脹滿口以蒲黃頻摻比曉乃愈宋度宗舌脹滿口御醫用蒲黃乾薑末等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之澁血而可知矣益舌為心苗心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也炒黑性澁止一切血崩帶泄精

香蒲花中蘆厚湯成入藥

生瀉行血炙瀉破血止血

卷柏　生用辛平。破血通經。治癥瘕淋結。炙用辛温。止血。治腸風脫肛。生石上。拳攣如鷄足。俗呼萬年松。凡使鹽水煮半日。井水煮半日。焙用。

茵芋　辛寒有小毒。蝕惡肉。排膿血。殺疥虫。除熱痺。破癥瘕。內經回烏鯽骨。治婦人血枯。根如萊菔。皮黃肉白。葉長微澁。折之有汁結實如豆一顆三粒。其草爲使。

瀉行水散血

茜根　苦辛微寒。別錄微温。入肝經血分。行水散血。散中有補。治陽痿經濕。腰膝骨節重痛。產後血氣作痛。閃挫折

宣行氣解鬱滯涼血破瘀

撲打傷多用之能制蛇見之則爛一葉似菊而薄莖似艾而粗功意爲使

鬱金　辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經宗心熱散肝鬱下氣破血行滯氣亦不損正氣破瘀血亦能生新治吐衄尿血婦人經脈逆行經不下行上爲吐衄諸血症用鬱金末加韭汁童汁童便服其血自清汁中帶血者加竹瀝血氣諸痛產後攻心頭狂失心顛多喜笑尚知畏懼症屬不足狂多忿怒人莫能制症屬有餘此病多因驚憂痰血塞于心竅所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸治一切痰涎壅塞心竅惡血昏迷癲狂頑痰故也治毒入心鬱金一兩韭草

二錢半。煮乾焙研末。冰片五分。每用一錢。加豬血五七滴。新汲水下。治妊娠始有白泡。忽搐入腹。紫黑無膿。下蟲毒。同升麻服。不吐則下。出川廣。體銳。圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。味苦帶土者真。市人多以薑黃僞之。

薑黃　苦辛。本草大寒。藏器大明曰熱。色黃入脾。兼入肝經。理血中之氣。下氣破血。除風消腫。功力烈于鬱金。治氣脹血積。產後敗血攻心。通月經。療撲損。片子者能入手骨。治風寒濕痺。血虛臂痛者勿用。時珍曰。入筒出川廣。陳藏器曰。鬱金治痛。其兼理血中之氣可知。

出川廣。苦寒。色赤。薑黃辛溫。色黃。蓮味苦色青。三物不同。所用各別。經疏曰。薑黃主治。介乎三棱鬱金之間。時珍曰。薑

黃䗪金莪蓬形狀功用大略相近但䗪金入心專治血蓄黃入脾兼治血中之氣蓬入肝治氣中之血稍爲不同今時以扁如乾薑者爲片子蓬黃圓如蟬腹者爲蟬肚䗪金並可染色蓬形雖似䗪金而色不黃也

莪蓬音蓬 辛苦氣溫入肝經血分破氣中之血能通肝經聚血消瘀通經開胃化食解毒止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚痃癖酒醋磨服痃音賢小腹偏疼癖多見于男子癖多見于婦人莪蓬香烈行氣通竅同三棱用治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起臍上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息賁在右脇脾積曰痞氣在胃脘右側腎積曰奔豚在小腹上至心下治之不宜當用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死東垣五積方用三棱莪蓬若

瀉行氣破血消積

非人參贊功成功。按治積諸藥。神麴麥芽化穀食。萊菔化麵食。硇砂阿魏山查化肉食。紫蘇化魚蟹毒。葛花枳椇消酒積。麝香消酒積菓積。牽牛芫花大戟行水飲。三稜莪朮破瘀血。木香檳榔行氣滯。礞石蛤粉攻痰積。巴豆攻冷積。大黃芒硝攻熱積。槟雄黃膩粉攻涎積。蝕虫水蛭攻血積。雖爲泄劑。亦能益氣。王好古曰。故治氣短不能接續大小七香丸。集香丸。諸湯散中多用之。

根如生薑。莖葉俱

生根下似卵不齊。堅硬難擣。灰火煨透。乘熱擣之。入氣分

或醋磨酒磨。或煮熟用。入血分。

荊三稜　苦平。色白扁金。皮黑肉白。入肝經血分。破血中之氣。亦通肝經。兼入脾經。散一切血瘀氣結。癥硬食停。老塊堅積。

瀉火補中止血止痛

乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良昔有人患瘧癖死遺言開腹取之得病塊如石文理五色削成刀柄因刈三稜柄消成水乃知此藥可療瘧癖消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻虛者慎用色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麵裹煨

白茅根　甘寒入手少陰心足太陰陽明脾胃補中益氣除伏熱消瘀血利小便解酒毒治吐衄諸血心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之撲損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋閉寒熱血熱則閉閉林瀝曰血熱則崩傷寒嘔逆卽呃逆說文曰

熱止渴除煩

嘔氣噦也東垣作肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫滿火乾嘔之甚者未是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫滿火時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事苦寒之劑傷冲和之氣烏足知此哉 茅針潰癰癤酒煮服一針潰一孔二針潰二孔

蘆根 甘益胃寒降火治嘔噦反胃胃熱火升則嘔逆食不下金匱方蘆根煎服消渴客熱傷寒內熱止小便數肺為水之上源脾氣散精上歸于肺始能通調水道下輸膀胱腎為水藏而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則脈之氣化行而小便復其常道矣 解魚蟹河豚毒取逆水肥厚者去鬚節用

芦根　甘寒而滑。補陰。破瘀。解熱。潤燥。治天行熱疾。大渴大狂。胎動下血。諸淋血淋。搗貼赤遊丹毒。癰疽發背。金瘡傷折。止血。鯽魚骨哽。搗如龍眼。鷄骨鷄魚湯下。魚骨。魚湯下。汁能化血爲水。芦皮與產婦作枕。止血運安腹上。止產後腹痛。散瘀之功。

漏芦汁療消渴。

薔薇根　苦澁而冷。入胃大腸經。除風熱濕熱。生肌殺虫。治泄痢消渴。牙痛口瘡。煎汁含漱。遺尿。好眠。癰疽瘡癬。花有黃白紅紫數色。以黃心白色粉紅者入藥。子名營實。

薇根 味甘大寒。治天行熱狂煩悶消渴。產後血脹。搗汁塗癰腫結熱。爲末油調傅服。霜後者佳。

芭蕉根 味甘大寒。治天行熱狂煩悶消渴。產後血脹。搗汁塗癰腫結熱。爲末油調傅服。霜後者佳。

大黃 大苦大寒。入足太陰脾。手足陽明厥陰。大腸胃。心包胞。血分。其性浮而不沉。其用走而不守。若酒浸亦能引至至高之分。仲景太陽門。調胃承氣湯。大黃註曰。酒浸。陽明門。大承氣湯。大黃註曰。酒洗。少陽陽明。小承氣湯。大黃不用酒製。皆有分別。東垣曰。邪氣在上。非酒不至。若用生者。則道至高之邪熱病愈後。或目赤喉痛。

大腸血分實熱下有形積滯。

腫膈上熱疾生也用以蕩滌腸胃下燥結而除瘀熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之譫音占溫熱瘴瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕痩積聚杜久成形謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或留飲宿食心腹脹滿二便不通皆主攻吐瘀聚多是氣留飲宿食心腹脹滿二便不通皆主攻吐血衄血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰蝕膿消腫能推陳致新然傷元氣而耗陰血下多亡陰若病在氣分胃虛血弱人禁用新在氣分而用之是爲誅伐無過東垣曰能推陳致新如定禍亂以致太平所以有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩

乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經曰太陰所至爲痞滿又曰濁氣在上則生脹脹甚已病發于陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心許溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足脯肝各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心益一舉而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也

川產錦紋者良有

瀉火除濕

酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩爲使欲取通利者不得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調敷止痛無瘢。

黃芩　苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治泄痢腹痛。使血日瘀寒痛忌用。凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰濕之不同寒宜温熱宜清虛宜補實宜下。食宜消導瘀血宜行散。痰濕宜化痰利濕痛時時手不可按者爲實痛按之痛止者爲虛痛。寒熱往來邪在少陽。黃疸五淋。血閉。實熱在氣逆癰疽瘡瘍及諸失血。消痰。丹溪曰黃芩降痰假其降火也按痰因火動當先降火。利水解渴安胎。胎孕宜清熱凉血血不安行則胎安。養陰退陽補勝冰水酒炒則上行瀉肺火。

利胸中氣。肺主氣。熱傷氣。寫熱所以保肺。治上焦之風熱。濕熱。升溪曰。黃芩上中二焦藥。火嗽。嗽喉腥。五臭肺。五臭腥。目赤腫痛。過服損胃。血虛寒中者禁用。得柴胡退寒熱。得芍藥治痢。得厚朴黃連止腹痛。得桑皮寫肺火。得白朮安胎之聖藥。時珍曰。仲景治少陽症。小柴胡湯。太陽少陽合病下利。黃芩湯。少陽症下後心滿。寫心湯。並用之蓋黃芩苦寒。入心寫熱。除脾家濕熱。使甘火不流入肺。不致刑金。即所以保肺也。肺虛不宜者。苦寒傷土。損其母也。少陽症雖在半表半裏。而胸膈痞滿。實兼心肺上焦之邪。心煩喜嘔。默默不欲食。又兼脾胃中焦之症。故用黃芩以治手足少陽相火。黃芩亦少陽藥也。楊士瀛曰。柴胡退熱不及黃芩。時珍曰。柴胡乃苦以發之。散火之標也。黃芩乃寒能勝熱。折火之本也。東垣治肺熱身如火燔。煩躁引飲。而晝盛者。宜一味黃芩湯。以寫肺經氣分之火。黃芩二兩

瀉火燥濕

煎服本事方用治崩中暴下

黃芩明者良中虛者名枯芩即片芩瀉肺火清肌表之熱內實者名條芩即子芩瀉大腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱龍骨爲使

畏丹皮丹砂

黃連大苦大寒入心瀉火胃也實則瀉其子鎮肝涼血凡治血病防風爲上部之使黃連爲中部之使地榆爲下部之使燥濕開鬱解渴能治消渴除煩益肝胆厚腸胃消心痞能去心止盜汗涼心治腸癖瀉痢使血自癖有藏連九濕熱變而爲痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同人參煎湯呷之但得

下咽便好。喻嘉言曰。下痢必先汗解其外。後調其內。首用辛涼以解表次用苦寒以攻裏。稅要云。後重宜下腹痛宜利。身重宜除濕。脉弦宜去風。風邪內結宜汗。身冷自汗宜溫。膿血稠粘宜重劑以竭之。下痢赤屬血分。白屬氣分。戴氏曰。俗謂赤熱白寒者。非也。痢濕熱燥。仲景治九種心下痞。五等腹痛。熱心痛。伏梁。心肓痛。久乳漬傷。點或合通作點。熱處治。但有新久虛實之分。

痛。清燥。開鬱。導滯。調氣。和血。諸痛疼瘍。歸芍等分。煎湯。癰疽。瘡疥。諸瘡。小兒初熱洗。散熱活血。癰疽。瘡疥。皆屬心火。酒芩。胎毒。生合丑卓為末。蜜。傳信方。羊肝一具。黃連一兩。搗。定驚。鎮。調令勻。燕之。明目。凡凡是目疾。皆治名羊肝丸。

止汗。解毒。除痒。同猪肚殺蚘。蚘得苦。則伏。虛寒為病者禁用。蒸為丸。

久服。黃連苦參。反熱從火化也。昌按炎上作苦。味苦。必燥。燥。則熱。矣。且苦寒沈陰。肅殺伐傷生和之氣也。韓氏

日。黃連與肉桂同行。能交心腎于頃刻。時珍曰。治痢腹
香連丸。薑連丸。用黃連乾薑。薑黃散用黃連生薑。左金
丸用黃連吳茱萸。治口瘡。用黃連細辛。止下血用黃連
大蒜一陰一陽。寒因熱用。熱因寒用。最得製方之妙也
出宣州者粗肥。出四川者瘦小。狀類鷹爪。連珠者良。
去毛。治心火生用。虛火醋炒。肝膽火豬膽汁炒。上焦火
酒炒。有吞酸嘈雜等症。亦有吐酸者。名曰茱
心。宜黃連吳茱萸。降火開鬱。酢音醋。中焦火薑汁
炒。下焦火鹽水或童便炒。食積火黃土炒。治濕熱在氣
分。吳茱萸湯炒。在血分。乾漆水炒。熱眼赤人乳浸。日。時珍
諸法不獨爲之引導。蓋羊炙制其苦寒。鹹寒制其燥性。川者佳之。黃芩龍膽爲使。惡菊花

玄參麥蔥白鮮皮。長於冬牛膝。忌豬肉。時珍曰。方有芩連九。黃連豬肉丸。豈忌肉而不忌藏府乎。殺烏頭巴豆毒。黃連瀉心火佐以龍膽瀉肝膽火。白芍瀉脾火。石膏瀉胃火。知母瀉腎火。黃柏瀉膀胱火。木通瀉小腸火。黃芩瀉肺火。梔子佐之。瀉大腸火。黃連佐之。瀉三焦火。黃芩佐之。○鄭奠一曰。煩燥惡心。兀兀欲吐。用黃連數分甚效。

胡黃連　苦寒。去心熱。益肝膽。厚腸胃。治骨蒸勞熱。五心煩熱。心窩手心足心三消。渴而多飲爲上消。肺熱也。心移熱于肺。傳爲消渴。是也。多食善飢爲中消。胃熱也。痺成爲消中。是也。渴而小便數。有甚爲下消。腎熱而水虧也。五痔。腸痔。血痔。濕熱下漏。傷血分。無所施。治瘧瀉痢。女人胎蒸。消菓子積。則逼肛門而爲痔瘻。

瀉火燥濕補陰

為小兒驚痢良藥。朱二九日解吃烟毒。合茶服之甚効。一性味功用似黃連。故名出波斯國。今秦隴南海亦有之。心黑外黃折之塵出如烟者真。畏惡同黃連

苦參　苦燥濕。寒勝熱。沉陰主腎。補陰益精。養肝胆安五藏。而五藏自安　利九竅。生津止渴。明目止淚。疾為肝熱。則血氣和。純下濁血者。風傷肝也。宜散風涼血。治溫病血痢。下如韮汁者。濕傷脾也。宜清熱滲濕。腸風潤赤黃疸。酒毒。熱生風。濕生虫。又能祛風逐水殺虫。治大風疥癩。然大苦大寒。非腎虛而無熱者勿服。張從正曰。此藥

苦寒也雖苦參止草不可不謂之毒久服必偏勝爲患經曰五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之山也王冰註曰氣增不已則藏有偏脈偏勝則藏有偏絕故令人暴天筆談云久用苦參損牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九謹按人參補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心玄參補腎苦參則治腎命門之藥不先參何然名參者皆補糯米泔浸去腥氣蒸用玄參爲使惡

藥能醫病不能養人食能養人不能醫病

渴火補水潤燥消腸

貝母兔絲子漏蘆反藜蘆苦參一兩或酒煮或醋煮能止天行時毒

知母辛苦寒消上清肺金而瀉火瀉胃熱膀胱邪下潤腎燥而滋陰入二經氣分黃柏入二經血分故消瘀定二藥必相須而行

東垣治便秘以消不渴分之。

。。。莫非清。。。

瀉肝胆火下焦濕熱

腸多服令人瀉。李士材曰。苦寒肅殺非長養萬物者也世以其滋陰施之虛損之人。如水益深矣特表出以爲戒

得酒良。上行酒浸下行鹽水拌炒錢。

龍膽草　大苦大寒沉陰下行。益肝膽而瀉火。相火寄于肝胆。有瀉無補。瀉其邪熱。即所以補之也。兼入膀胱腎經。除下焦之濕熱。與防已同功。酒浸亦能外行上行。治骨間寒熱。腎主骨。驚癇邪氣。肝經風火。時氣溫熱。熱痢疸黃。寒濕腳氣。足傷寒濕則成腳氣。宜清熱利濕。搜風又有攣縮枯細。腫而痛者爲濕。腳氣。宜養血潤燥。咽喉風熱赤腫而不腫者。名乾腳氣。宜養血潤燥。瀉肝胆火。能明目。元素曰。柴胡爲主。龍膽爲使

瘟疫亦過服損胃。甘草水浸一宿。暴用。小兒驚癇痙熱。丹熱傳
使惡地黃。

青黛　鹹寒色青瀉肝。散五藏鬱火。解中下焦蓄蘊風熱。
衍義曰。一婦患腸腹二陰遍生瘡瘍。熱痒而痛。出黃汁。
二便澀。用鰻鱺松脂黃丹之類塗之。熱痛愈甚。其婦嗜
酒喜食魚蝦發風之物。乃用馬齒莧四兩研爛。入青黛
一兩和。塗熱痛皆去。仍服八正散而愈。此中下焦蓄蘊
風熱毒氣。若不出。當作腸風內痔。婦不能禁酒物。果仍發痔。
陰虛火炎者忌用。合杏仁研。置柿餅中。煨食。名聖餅子。治咯血。小兒驚癇痙熱。丹熱傳
癰瘡蛇犬毒。　即靛花。取嬌碧者。水飛淨用。內多石灰。故須淘淨。

大青　微苦鹹大寒。解心胃熱毒。治傷寒時疾熱狂陽毒發斑。熱甚傷血。表實表虛則發斑。輕如疹子。重如錦紋紫黑者。熱極而胃爛也。多死。活人治赤斑煩痛有青湯。

犀角大黃。治熱痢丹毒喉痺。處處有之。高二三尺。莖圓葉長葉對節生。八月開小紅花成簇。實大如椒。色赤。

用莖葉。

牽牛　辛熱有毒。屬火。善走入肺經。瀉氣分之濕熱。肺主能平金而泄肺。能達右腎命門。走精隧。通下焦。蠲邊及大腸風秘氣秘。利大小便。逐水消痰。殺虫墮胎。治水腫喘滿痰

癖氣塊若濕熱在血分胃弱氣虛人禁用東垣曰牽牛苦寒誤矣其
味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥
比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主血血中之濕
宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉
氣使氣血俱病也王好古曰以氣藥引則入氣以大黃
引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥
則泥膈服硝黃藥則若冏知如此三十餘年其人體肥
胷膈梁而多鬱日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降
津液皆化爲痰不能下潤腸胃非血燥也潤劑留滯硝
黃入血不能入氣故無効川牽牛爲末皂角膏丸續服
便通外物素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用
通利藥不効予思此乃濕熱之邪在精道壅隧路病在
二陰之間故前陰小便後陰大便病不在大腸膀胱也
用楝實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下
焦陽虛天真丸川牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破

故紙諸藥採得補瀉兼施之妙　有黑白二種黑者力速亦名黑丑取子淘去浮者舂去皮用得木香乾甚良此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

通行水道下焦血分濕熱

防已　大辛苦寒本經平別錄溫太陽經藥膀胱能行十二經通腠理利九竅瀉下焦血分濕熱為療風水之要藥治肺氣喘嗽水熱氣諸痛下疾溫瘧腳氣濕攣而為熱濕則腫熱則痛防已為主藥濕加茯仁蒼术木瓜木通熱加芩柏風加羌活草薢痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草又有足跟痛者屬腎

虛不與腳水腫風腫癰腫惡瘡或濕熱流入十二經致氣同論。水腫氣分者禁用。十劑曰。通可去滯。通草防己之屬是也。二陰不通者非此不可然性險而健陰虛及濕熱在上焦氣分者禁用。十劑曰。通可去滯。通草防己之屬是也。通與燥劑無以別矣木通甘淡滑氣分濕熱防己苦寒瀉血分濕熱

出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防己黑點黃腥木強者名木防己不佳。陳藏器曰。治風用木防己治水用漢防己。酒洗用惡細辛畏菖蒲。

辛苦大寒。屬火性急大能下氣行膀胱水腑牛水氣膜急者非此不能除。破積聚癥結伏留熱氣消腫除

本集以行水為通劑改熱藥為燥劑

大瀉氣閉通行水。

痰止嗽定喘水濕泛溢爲腫脹逆經利便久服令人虛十劑日漸可去閉葶藶大黃之屬是也天黃泄陰分血閉葶藶泄陽分氣閉氣味俱厚不減大黃然有甜若二種甜者性緩苦者性急泄肺而傷胃宜大棗輔之仲景有葶藶大棗瀉肺湯治胸氣喘急不得臥却按輔以大棗補上所以制水

子如黍米微長色黃合糯米微炒去米用得酒良榆皮爲使

甘遂　苦寒有毒能瀉腎經及隧道水濕直達水氣所結之處以攻決爲用爲下水之聖藥仲景大陷胸湯用之主十二種水大腹腫滿名水蠱喻嘉言曰胃爲水穀之海五藏六府之源脾不能散胃之水精于肺而病于

腎者胃之關也前陰利水後陰利穀

中。肺不能通胃之水道于膀胱而病于上。腎不能司胃之關時其蓄泄而病于下。以致積水浸淫無所底止。王好古曰水者脾肺腎三經所主。有五藏六府十二經之部分。上頭面中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別。不可輕瀉。當知病在何經何藏方可用之。按水腫有爽食積瘀血致清不升。濁不降而成者。有濕熱相生。隧道阻塞而成者。有燥熱冲擊。穢結不通而成者。症屬有餘。有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者。有大病後正氣衰憊而成者。有小便不通水液妄行脾莫能制而成者。症屬不足。宜分別治之。然其源多由中氣不足而起。丹溪曰水病當以健脾爲主。使脾實而氣運則水自行。宜參苓爲君。視所挾症加減。苟徒用利水藥。瘕疝積聚留飲宿食。痰迷癲癇。症者忌用。多致不救。

皮赤肉白根作連珠重實者良。麵裹煨熟用。或用芽草莽花汁浸

三日其水如墨以瓜蒂爲使遂逐志反甘草仲景治心滿爲度再煎裘煨瓜蒂爲使遂逐志反甘草下留飲與甘草同用取其相反以立功此有治水腫及腫毒者以甘遂末傅腫處濃煎甘草湯服之其腫立消二物相反感應如此

大戟 苦寒有毒能瀉藏府水濕行血發汗利大小便治十二水腹滿急痛積聚癥瘕頸腋癰腫風毒脚腫通經墮胎誤服損真氣時珍曰疾涎爲物隨氣升降無處不到入心則迷或癲痴入肺則塞窒爲咳喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則瘡瘍癰腫陳無擇並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則結爲痰大戟能泄藏府水濕甘遂

能行經絡水濕自芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又曰錢仲陽謂腎爲真水有補無瀉復云痘症變黑歸腎者用百祥鼻下之非瀉腎也瀉其府則藏自不實府者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也編謂非爲瀉府乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青綠肝肥之色也痘症毒盛火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津液內竭不能化膿而成黑焰之症瀉其風火之毒所以救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣祝要用大戟一兩棗三枚同煮焙乾去戟用棗九服名棗熬

百祥九　杭產紫者爲上北產白者傷人漿水煮去骨用

得大棗則不損脾長肉煮灰甘草

商陸　苦寒有毒諸家辛酸時珍苦寒沉陰下行與大戟甘遂同功

療水腫腹滿。腫屬肺。腹屬脾。肝腫則陽氣。循行如單腹而不腫者。名蠱脹。爲木橫剋土。難治。腫脹朝覺暮急。爲血虛。暮覺朝急。爲氣虛。朝暮俱急。爲氣血兩虛。腫脹由心腹而散四肢者吉。由四肢而入心腹者危。男自下而上。女自上而下。皆難治。痰疝癰腫。喉痺。不通。薄切醋炒。塗喉中。良。瀝熱之病。瀉蠱毒。傅惡瘡。墮胎孕。令人見鬼神。取花白者根。赤者傷人。只堪貼腫。入癖三分搗貼。小便利。則腫消。黑豆湯浸蒸用。得緑豆。

芫花

苦溫有毒。去水飲痰癖。療五水在五藏皮膚。腹滿喘急。痛引胸脇。咳嗽。癇疝。五水者。風水。皮水。正水。石水。黄汗也。水積胞中。堅滿如石。名石水。汗如柘汁。名黄汗。久不愈。必致癰膿。時珍曰。仲景治傷寒太陽症表未解。心下有水而嘔。乾嘔。發熱。或

大運行水　小運行水

喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔痛引兩脇或喘或咳者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨府去陳莝法也十棗湯芫花甘遂大戟等分棗十枚

葉似柳二月開花紫碧色葉生花落陳久者良醋煮過水浸暴用根療疥可毒魚反甘草

鬬訟者取葉擦皮膚輒作赤腫假傷以誣人

芜花　辛散結苦泄熱行水捉藥主治略同芫花

澤漆　辛苦微寒消痰退熱止嗽殺虫利大小腸治大腹水腫蓋丈夫陰氣生平澤葉圓黃綠頗類猫眼一名

貓兒眼睛莖堪中有白汁粘人李時珍曰別錄云是大戟苗并也功相類爾

常山　辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲風痰寒痰濕痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺爲支飲于肝爲懸飲于心爲伏飲于經絡爲溢飲于腸胃爲痰飲也常山力能吐之下之專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用時珍曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧有經瘧瘴瘧風寒暑濕痰食瘧鬼之別須分陰陽虛實不可槩論常山蜀漆得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心得秋米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草菓檳榔則入脾蓋無痰不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多用爲然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其或吐也世人泥于雷

敷老人久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起抑何愚耶○常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆吐風痰　雞骨者良酒浸蒸或炒川佔婆爲使忌葱蘆吐風痰

茗荎葉名蜀漆功用略同古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結并草

水拌蒸

藜蘆　辛寒至苦有毒入口即吐善通頂令人噦風痛症多用之張子和曰一婦病風痛初一二年一作後漸日作甚至一日數作求死而已值歲大飢采百草食見野草若葱采蒸飽食覺不安吐膠涎數日衍一二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食葱訪人乃葱葱苗即藜蘆是矣李時珍曰和干如年七十中風不省牙關緊閉先考太醫吏目川池翁診視藥不得入

不獲已打去一齒濃煎蔘蘆湯灌之少頃噫取根去氣遂吐痰而甦藥不瞑眩厥疾不瘳誠然吐者頭用黃連爲使及細辛芍藥諸參惡大黃畏蔥白服蔥湯即止

木通　古名通草　甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱心火降則肺熱清矣化津液肺爲水源肺熱清則津液化水道通下通大小腸膀胱導諸濕熱由小便出故導赤散用之凡利小便不多不利大便以小水愈通大便愈燥也木通能入大腸兼通大便通利九竅血脈關節治胸中煩熱遍身拘痛楊仁齋云遍身隱熱疼痛拘急足冷皆伏熱傷血血屬于心宜木通以通心竅則經絡流行也大渴引飲中

火淋癃不通。下焦火心與小腸相表裏。水腫浮大。便利小心移熱于小腸則淋秘。水腫浮大便利小耳聾。泄腎火目眩。口燥。舌乾。舌爲喉痺。咽痛。上焦鼻齆。火炎通竅。音瘖。熱攻清道。失音。清脾主四肢倦則好眠。金脾疸好眠。心爲脾母。心熱清則氣室不通。火不充脾熱。除煩。退熱。止痛。排膿。破血。催生。行經。下乳。于內氣順血行故經謂有津乳汁循常汗多者禁用。東垣曰肺受熱邪。津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受濕熱癃閉約束則小便不通。宜此治之。朱二允曰火在上則口燥眼赤。鼻乾。在中則心煩。噁噦。浮腫在下則淋閉。足腫。必耕此井平之穴。瀉諸經之火。火退則小便自利。便利則諸經火邪。皆從小水而下。降矣。○君火宜木通。相火宜澤瀉。藤有細孔兩頭皆通。故通利水雖同。所用各別。

輕通利水退熱

通草 古名通脫木。 色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經。引熱下行而利小便味淡則升故入胃經。通氣上達而下乳汁。治五淋水腫。目昏耳聾。鼻塞失音。淡通竅寒降火利肺氣。退熱催生

滑通利水滲濕利竅

滑石 甘淡微鹹。入膀胱。利小便。瀉腎經之火。邪功能利濕行水。治消渴痰飲嘔吐。瀉痢腫脹。水疝腳氣。疝痛。淋瀝陰汗。陰間有汗。尿血溲精。濕熱為病。不為虛滑者言也。虛滑則當用濕熱之病。濕熱既除。則清氣上行。又能養正補虛之藥。

藏益氣力。起陰氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功。胃有濕熱則頭重耳鳴目昏。滲去其濕則熱亦隨去。土乃得令。而清氣上行。故本經列之上品。云聰耳明目。而六味丸用之。今人多服昏目。小便過利。而腎水虛故也。眼中有水屬膀胱。膀胱過利。則水涸而火生。仲景八味丸用澤瀉。寇宗奭謂其接引桂附入腎經。李時珍曰。非接引也。乃取其瀉膀胱之邪氣也。古人用補藥必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闔一闢。此乃玄妙。後人不知此理。而一于補。必致偏勝之患。王履曰。地黃山茱萸苓丹皮皆腎經藥。桂附右腎命門之藥。何待接引乎。錢仲陽謂腎為真水。有補無瀉。或云脾虛腎旺。故瀉腎扶脾。不知腎之真水不可瀉。瀉其伏留之邪耳。易老云。去脬中留垢。以其微鹹能瀉伏水故也。昂按六味丸有熟地之温。丹皮之凉。山藥之濇。伏苓之滲。山茱之收。澤瀉之瀉。補腎而兼補脾。有補而必有瀉。相

腎惡燥故兼補爲難

通行水瀉熱涼血

和楫濟以成平補之功乃平淡之神奇所以爲古今不易之良方也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加入有補無瀉且客倍于主責成不專而六味之功反退處于虛地失製方配合之本旨矣此近世庸師之悞也

水拌或酒浸用忌鐵

車前草 甘寒涼血去熱止吐衄消瘕瘀明目通淋凡利水之劑多損于目惟此能解肝與小腸之熱濕熱退而目清矣雷敩曰使菜勿使莖蓋 子甘寒清肺肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功腎有二竅車前子能利水竅亦固腎陰益精令人有子精竭精盛則有子五子衍宗丸用

輕通利水清熱

之。枸杞兎絲各八兩。五味覆盆各四兩。車前二兩。蜜丸。慣遺洩者。車前易蓮子。時珍曰。入服食。須佐他藥如六味丸之用澤瀉可。治濕痺五淋。暑濕瀉痢。歐陽文忠忠也。若單用。則過泄。國醫不能愈。夫人云。而有藥三文一貼。甚効。公不肯服。夫人雜他藥進之。一服而愈。問其方。乃車前子爲末。米飲下二錢。云此藥利水而不動氣。水。旨赤。瞳翳。能除肝熱。催生下。逆。利。則。清。瀏。分。谷。蔵。自止矣。

胎。酒蒸搗餅。癌研。酒蒸搗餅。入滋補藥。炒研。入利水泄瀉藥。

燈草　甘淡而寒。降心火。入心。心能。清肺熱。利小腸。心與小腸火清。則肺清。小腸亦通。氣止血。治五淋。水腫。燒灰吹喉。清而熱。從小便出矣。

痺。塗乳止夜啼。擦癬最良。縛成把。擦摩極痠。時蘸。從草浮水可見十餘次。能斷根。

瞿麥　苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱爲治淋要藥破八正散用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋者八正及山梔滑石之類血淋宜小薊牛膝胃腎虛淋宜補腎不可獨瀉老人氣虛者宜參朮帶木通山梔亦有痰滯中焦作淋者宜行痰兼通利藥最忌發汗汗之必便血破血利竅決癰消腫明目去翳通經墮胎性利善下虛者慎用宋宗奭曰心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣　花大如錢紅白斑點色甚嫵媚俗呼洛陽花用蘧麥丹皮爲使惡螵蛸產後淋當去血瞿麥蒲黃皆爲要藥

扁蓄一名扁竹　苦平殺虫疥利小便治黃疸熱淋蚘咬腹痛

通活血消腫。　通利小便補陰。

玉蝕下部。煮服　葉細如竹。弱莖蔓引。促節有粉。三月開細紅花。

天仙藤　苦溫。疏氣活血。治風勞腹痛。妊娠水腫。藤散前有天仙治子腫。　葉似葛。圓而小。有白毛。根有鬚。四時不凋。一云。即青木香藤。

地膚子　甘苦氣寒。益精強陰。入膀胱。除虛熱。利小便而通淋。時珍曰。無陰則陽無以化。亦猶東垣治小便不通用知柏滋腎之意。王節齋曰。小便不禁。或頻數。古方多以爲寒而用溫澁之藥。殊不知屬熱者多。蓋膀胱火邪妄動。水不得寧。故不能禁而頻數也。故老人多頻

數是滑。胱血少陽火偏旺也治法當補胱胱陰血瀉火邪爲主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之澁之治

治癩疝散惡瘡煎湯洗

其標也

熱丹腫洗眼除雀盲澁痛

葉作浴湯去皮膚風

葉如萵苣赤子類蚕砂惡

蝶蛸

石韋　苦甘微寒清肺金以滋化源凡行水之藥必通胱胱而利水道益精氣補五勞利濕清熱之功高陽負對黃帝治勞傷用石韋九

治淋崩發背炒末冷生石陰桑韌如皮背有黃毛去

通淋瀉濕熱

利濕熱治諸黃

毛微炙用杏仁滑石射干爲使得菖蒲良生古羌上者名羌活亦治淋

海金砂　甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋

萆薢得栀子牙硝蓬砂治傷寒熱狂大熱利小便此釜底抽薪之義也

萆細如線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

茵陳　苦燥濕寒勝熱入足太陽經勝發汗利水以泄太陰陽明之濕熱脾爲治疸黃之君藥脾胃有濕熱則發黃濕熱甚者身如橘色汗如柏汁亦有寒濕發黃身熏黃而色暗大抵治以茵陳爲主陽黃加大黃栀子陰黃加附

宜通利濕清暑

子乾薑各隨寒熱治之　又治傷寒時疾狂熱瘴瘧頭痛頭旋女人瘕痛皆濕熱為病

香薷　辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺為清肅之主藥肺氣清則小便行而熱降暑必兼濕治暑必兼利濕若無濕但治嘔逆水腫發痙服小腳氣口氣魚湯為乾熱非暑也　時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰傘服治霍亂轉筋時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中入內遂病頭痛發熱惡寒煩躁口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散暑和脾則愈若飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴汗出如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃內傷之症宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷是

身寒寒宜當熱寒必病熱渴熱柳勢

重虛其表而濟之熱矣益香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑藥用代茶誤矣李士材曰香薷爲夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者誤服之反成大害世所未知按潔古云中暑爲陰症爲不足中熱爲陽症爲有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清凉 陳者勝宜冷飲熱服令人瀉

青蒿 苦寒得春木少陽之令最早二月生苗故入少陽厥陰血分肝膽治骨蒸勞熱取汁熬膏療勞虛熱凡苦寒之藥多傷胃氣惟青蒿芬香入脾獨宜于血

熱之人以其不犯胃氣也熱黃久瘧久痢癰疥惡瘡鬼氣尸疰時珍曰月令孟夏言伏內庚日采蒿懸門庭可辟邪冬至元旦各服二錢亦良

大燥回陽補腎命火衰微風寒濕入入味九內亦從地黃等補陰

則青蒿之治鬼疰補中明目童便浸蒸用熬膏亦良蓋亦有所伏也

使子勿使葉使根勿使莖

附子　辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不守通行十二經無所不至能引補氣藥以復散失之元陽引補血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒同乾薑桂枝溫引溫煖藥達下焦以祛在裏之寒濕能引火下行亦有津調貼足心者治三陰傷寒吳綬曰附子陰症要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脈沉細者或厥冷腹痛甚則唇青囊縮者急須用之若待陰極陽竭而

當與韭菜牛乳二條參看論治

用之已遲矣東垣治陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑附湯加人參投半斤得汗而愈此神中寒中風辛中曰中漸傷曰傷輕爲感氣重則爲傷又重則爲中聖之妙也

厥厥虛寒面厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脈伏然厥似寒者誤投立斃宜承氣白虎等湯咳逆風寒嘔噦胃膈噎膈噎多由氣血虛胃冷胃稿而成飲可下而食不可下稿在吸門喉間之厥會也食下胃脘痛須臾吐出稿在賁門胃之上口也此上焦名噎食下良久吐出稿在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐稿在闌門大小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血痰寒胃口者如寒痰胃冷則宜薑附參朮胃稿者當滋潤命火宜四物斗羊乳血瘀者加韭汁脾泄不足冷痛寒瀉霍亂轉筋加虛寒客中焦爲霍亂寒客下焦爲轉筋熱宜藿香禁用拘攣風痺癍痕

積聚。腎脉爲病。脊强而厥。小兒慢驚。瘟疫灰白。癰疽不
斂。一切沉寒痼冷之症。經曰。陰盛生內寒。陽虛生外寒。助陽退陰。殺邪
辟鬼。本草通經墮胎。凡陰症用薑附藥宜冷服。熱因寒
未載。通經墮胎用也。蓋陰寒在下。虛陽上浮。治之
以寒。則陰益甚。治之以熱。則拒格不納。用熱藥冷飲下
腦之後。冷體既消。熱性便發。情且不違。而致大益。此反
治之妙也。又有寒藥熱飲。治熱症者。此寒因熱用。義亦
相同也。經曰。正者正治。反者反治。如用寒治熱。用熱治
寒。此正治也。或以寒治寒。以熱治熱。此反治也。經所謂
必伏其所主。而先其所因。蓋借寒藥熱藥爲反佐。以作
向導也。亦曰從治。王好古曰。用附子以補火必防。涸水
如陰虛之人。久服補陽之藥。則虛陽益熾。眞陰愈耗。精
血日枯。而氣無所附
麗。遂成不救者多矣。

母爲烏頭附生者爲附子。連生

者爲側子。細長者爲天雄。兩岐者爲烏喙。五物同出異名。附子以西川彰明赤水產者爲最。皮黑體圓。底平八角。重一兩以上者良。或云二兩者更勝。然難得。生川發散。熟用峻補。

趙嗣真曰。仲景麻黃附子細辛湯。熬附配麻黃。發中有補。四逆湯。生附配乾薑補中有發。其言微矣。丹溪曰。烏附行經。仲景八味。北川爲少陰總導。後世因以爲補藥。誤矣。附子走而不守。取其健悍走下。以行地黃之滯耳。相習用爲風藥及補藥。殺人多矣。昔按附子味甘氣熱。峻補元陽。陽微欲絕者。回生起死。非此不爲功。故仲景四逆真武白通諸湯多用之。其有功于生民甚大。況古人日用常方。用之最多。本非禁劑。丹溪乃僅以爲行經之藥。而云用作補劑多致殺人。言亦過矣。蓋丹溪法重滋陰。故每黜陽藥。亦其偏也。王節齋曰。氣虛用四君子

今人用黑豆者亦焦。

湯血虛用四物湯虛者俱宜加熟附子益四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熟藥本不可輕用但當病水浸麵裹煨令裂取乘熱則雖暑熱時月亦可用也水浸麵裹煨令裂取乘熱

切片炒黃去火毒用又法甘草二錢鹽水薑汁童便各半盞煮熟用長人參壽者甘草防風犀角絲荳童便及貝母半夏栝蔞白及白斂中其毒者黃連犀角甘草煎湯解之黃土水亦可解

烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭

烏附尖吐風痰治癲癇取其鋒銳直達

病所。丹溪治許白雲。屢用瓜蒂。梔子。皆參藥。盛氣吐之不透。後用附子尖。和漿水與之。始得大吐。膠痰數桶。天雄補下焦命門陽虛。寇宗奭張元素皆云補上焦。丹溪曰。可爲下部之法。時珍曰。其尖皆向下生。故下行。然補下乃所以益上也。若上焦陽虛則屬心肺之分。當用參耆。不當用雄附矣。

治風寒濕痺。爲風家主藥。發汗又能止陰汗。側子散

側旁生。宜于發散四肢。充達皮毛。治手足風濕諸痺。

草烏頭　辛苦大熱。按風勝濕。開頑痰。治頑痺。以毒攻毒。

烏頭勝川烏。然至毒無所釀。側不可輕投。野生狀類川烏。亦名烏喙。童子炒或豆腐煮用。炮裂名射罔。俗名

獸見血立死

白附子　辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面上百病陽明之脉營于面白附能去頭面遊風作面脂消斑疵補肝虛祛風疾治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢根如草烏之小者長寸許皺紋有節炮用陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

破故紙一名補骨脂　辛苦大溫入心包命門補相火以通君火煖丹田壯元陽縮小便亦治遺尿治五勞七傷五藏之勞七情之傷

腰膝冷痛腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能
薰蒸脾胃脾胃虛寒運
于運化穀飲食減少腹脹腸鳴嘔逆泄瀉如釜之下
無火物終不熟故補命門相火即所以補脾胃故紙四
兩五味三兩肉蓯蓉一兩炙茱萸一兩婦人之血
盡煮棗九名四神丸治五更腎瀉婦人血氣脫氣陷亦
宜用男子之
腎冷精流墮胎出南番者色赤嶺南者色綠酒浸蒸
用亦有童便乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良薑甘草唐
相國方破故紙十兩酒浸蒸爲末胡桃肉二十兩去皮
爛研蜜和每日酒調下匙或水調服百丸震曰故紙屬
火堅固元陽胡桃木潤燥養血乘木火
相生之妙忌芸苔羊血加村仲名尚媛注
肉蓯蓉 甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟

芸薹油 菜也 補腎命 滑腸

益髓強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻驟用恐妨心滑故有從容之號　驟用恐妨心滑大便長大如管重至斤許有松子鱗甲者良酒浸一宿刷去浮甲蜜炙除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵

蕪荽曰今人所用多取從蓉功力稍劣

巴戟天　甘辛微溫入腎經血分強陰益精治五勞七傷大腸便燥者服之可代從蓉煮粥彌佳　蘇川楠北狀類男陽酥炙

辛溫散風濕治風氣腳氣水腫根如連珠擊破中紫而鮮潔者僞也內雖紫微有白糝粉色而理小堪者真也蜀產佳山雀根似巴戟但色白人或醋煮去心酒浸焙用覆盆子爲使惡丹參

胡盧巴　苦溫純陽入右腎命門壯元陽治腎臟虛冷陽氣不能歸元純陽同茴香巴戟川楝吳茱萸治寒濕腳氣出嶺南番舶者良云是番菜服子酒浸慕或蒸或炒

仙茅　辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失
溺無子心腹冷氣不能食溫胃腰腳冷痺不能行緩筋相
火盛者忌服　葉如茅而窄澗根如小指黃白多涎竹
刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐婆羅門始
盛傳服之多効照前製陰乾蜜丸酒服禁食牛乳牛肉
許眞君書云其能養肉辛能養筋滑能養膚
酸能養筋滑能養膚
和苦酒服之必効也

淫羊藿　辛香甘溫入肝腎補命門時珍曰手足陽
氣堅筋骨利小便治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四

肢不仁手足麻木一名仙靈脾北部有羊一日百合食此藥所致故名去核羊脂拌炒山藥爲使得酒良

蛇床子 辛苦而溫强陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿囊濕女子陰痒陰癢濕生虫同蔥煎湯先子藏虛寒產門不閉炒熱用腎命之病及腰酸體痺帶下脫肛痿痺齒痛濕癬殺虫療風濕諸病煎湯浴去風癢時珍曰腎命三焦惡瘡止氣分之藥不獨補助男子而且有益婦女世人合脏面求補藥千遠域盖非貴耳賤目乎似小茴而細微炒殺毒則不辣以地黃汁拌蒸三遍佳

葸耳皮貝母巴豆

兎絲子　甘辛和平凝正陽之氣入足三陰腎肝脾陰益精温而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴脾虚腎燥而生內熱兎絲益陰清熱祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

肥健人補肝腎之効老學庵筆記子族弟少服兎絲子凡數年飲食倍常血氣充盛忽因浴見背腫隨視隨長乃大疽也適値金銀花開飲至數斤腫遂消兎絲過服尚能作瘡以此知金石藥不可不戒無根蔓延草上子黄如黍粒得酒良淘去泥沙酒浸一宿

覆盆子　甘酸微温益腎藏而固精補肝虚而明目起陽

暴乾搗末山藥爲使

平補肝腎

痿縮小便。寇目日服之當髮髮。悴汁塗髮不白。女子髮髮。髮不白。女子多孕同蜜爲膏。治肺氣虛寒。李士材日。强腎無過熱之偏。固精無凝濇之害。金玉之品也。狀如覆盆。故名。去蒂淘淨。搗餅。用時酒拌蒸。葉絞汁滴目中。出目弦虫。除膚赤。收濕。止淚。

蔆子 苦温。補腎。辛温。瀉肺。氣。面散肝風。益精明目。肝以散爲補。凡補肝治虛勞。腰痛。遺精。帶下。咳逆。肺痿。乳閉。藥皆能明目。

癥瘕。痔漏。陰瘡。頭。肺肝腎三經之病。催生墮胎。主惡血故能破癥下胎

沙苑蒺藜。綠色似腎。故補腎。炒川。亦可代茶。刺蒺藜

補脾殺虫消積

按塊潰堅胡麻皆甘而能殺虫

三角有刺。去刺。酒拌蒸。風家宜刺蒺藜。補腎則沙苑者爲佳。餘功略同。瑞竹堂方。牙齒打動者。蒺藜根燒灰傅之。

使君子　甘温。健脾胃。除虛熱。殺藏虫。治五疳。便濁瀉痢。疳癬。爲小兒諸病要藥。經疏曰。五疳便濁瀉痢腹虫。皆由脾胃虛弱。因而乳停食滯。濕熱瘀塞而成。脾胃健則積滯消。濕熱散。水道利。而前症盡除矣。時珍曰。凡殺虫之藥多是苦辛。獨使君子甘而殺虫。每月上旬。虫頭向上中旬頭横下。下旬向下。道藏云。初一至初五。虫頭向上。凡有虫病者。每月上旬空心食數枚。虫皆死而出也。出蜀。五瓣有稜。肉仁如橄。亦可煨食。久則油黑不可用。忌飲熱茶。犯之作瀉。

益智子　辛熱本脾藥。兼入心腎。主君相二火。補心氣。命門三焦之不足。心爲脾母。補火故能生土。能澁精固氣。宋載又能開發鬱結。使氣宣通。味辛。溫中進食。攝涎唾。胃冷則縮小便。腎與膀胱相表裏。益智辛溫。固腎鹽水炒同鳥藥等分。酒煮山藥糊丸鹽湯下。名縮泉丸。治嘔吐泄瀉。客寒犯胃。冷氣腹痛。崩帶。泄精。溺後餘瀝不盡。

出嶺南。形如棗核。川仁。

砂仁　即縮砂。辛溫。香竄。補肺。溫腎。和胃。醒脾。快氣。調中。通行結滯。治腹痛。痞滿。有傷寒下早。裏虛邪入。面痞者。有食壅痰塞。面痞者。有脾虛氣

弱而病者須分虛實治之不宜偏用利氣藥恐變爲鼓脹鼓脹內脹而外有形痞脹惟覺滿悶而已皆太陰濕病壹腸嘔吐下氣咳嗽赤白瀉痢濕熱積滯客于大腸也壹腸嘔吐下氣咳嗽赤白瀉痢濕熱積滯客于大腸小腸經砂仁亦入大小腸經氣霍亂轉筋奔豚崩帶往來逐冷消食醒酒止痛安胎行氣則痛止氣順則胎安散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨噤壬好古曰得檀香豆蔻入肺得人參益智入脾得黃栢茯苓入腎得赤石脂入大小腸腎通日辛能潤腎燥引諸藥歸宿丹田地黃用之拌蒸亦取其能達下也經疏曰腎虛氣不歸元用爲嚮導殆勝桂附熱藥爲害出嶺南研用

白荳蔻　辛熱流行三焦溫煖脾胃三焦利脾胃轉諸症自平而爲肺家本藥肺主氣散滯氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾

虛瘧疾感寒腹痛吐逆反胃脇胃火盛及白膩腐膜白氣虛者禁用

厚朴能散肺滿太陽經目皆紅筋起目皆番舶者良研用

肉荳蔻一名肉果辛溫氣香入脾煖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒治積冷心腹脹痛者並宜之中惡吐沫小兒吐逆乳食不下又能濟大腸止虛瀉冷痢初起忌用出嶺南似草蔻外有皺紋內有斑紋糯米粉裹煨熟用忌鐵

草荳蔻一名草果辛熱香散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食治瘧痛寒瘧佐常山能截瘧或與知母同用收其一除一陽治寒熱瘧痢盛

草菓治太陰獨勝之寒。散滯氣利膈療因知母治陽明獨勝之火。寒客胃脘。滯因寒者多効。霍亂瀉痢。噎膈反胃。痞滿吐酸。痰飲積聚。解口臭氣。酒毒魚肉毒。故食料通劑助脾熟。耗氣損目。閩產名草蔻如龍眼而微長。皮黃白薄而稜峭。仁如砂仁。而辛香氣和。滇廣所產名草菓。如訶子。皮黑厚而稜密。子粗而辛臭。雖是一物。微有不同。麵裹煨熟。取仁用。忌鐵。

香附一名莎草根。性平氣香。味辛。能散微苦。能降微甘。能和。乃血中氣藥。通行十二經八脉。氣分主一切氣。人身以

氣盛則強。虛則弱。順則平。逆則病。絕則死。矣經曰。怒則氣上。恐則氣下。喜則氣緩。悲則氣消。驚則氣亂。思則氣結。勞則氣耗。此七情之氣也。以香附爲君。隨症而加升降消補之藥。利三焦。解六鬱。疎鬱氣。醫鬱血。健脾。通則。治多怒多憂。痰飲。痞滿。腫脹。腹滿。鬱鬱。食不消。止諸痛。不痛。治多怒。

痰多而經脈氣不運也香附陰中快氣之藥氣順則血和暢然須輔以涼藥補氣之藥丹溪曰能引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義胎產百病能推陳致新故諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不息所以生生無窮即此理耳時珍曰凡人病則氣滯而餒香附爲氣分君藥臣以參朮佐以芎

苦治虛怯甚速也　去毛用生則上行胸膈外達皮

肅熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥或蜜水炒青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且欲共散薑汁炒則化痰飲炒黑又能止血忌鐵時珍曰得參朮則補氣得歸地則補血得木香則散滯和

中。得檀香。則理氣醒脾。得沉香。則升降諸氣。得芍藥蒼术。則總解諸鬱。得梔子黃連。則清降火熱。得茯神。則交濟心腎。得甘香破故紙。則引氣歸元。得厚朴半夏。則決壅消脹。得紫蘇葱白。則發汗散邪。得三稜莪蒁。則消積磨塊。得艾葉。則治血氣。煖子宮。乃氣病之總司。女科之仙藥也。大抵婦人多鬱。氣行則鬱解。故服之尤効。非宜于婦人。不宜于男子也。李士材曰。乃治標之劑。惟氣實血未大虛者宜之。不然。恐損氣而燥血。愈致其疾矣。世俗泥于女科仙藥之一語。惜未有發明及此者。

木香　辛苦而溫。三焦氣分之藥。能升降諸氣。泄肺氣。疏肝氣。和脾氣。怒則肝氣生。肺氣調。則金能制。木而肝平。非木不能土而脾和。治一切氣痛。九種心痛。痛而胃脘口冷。痛熱痛。氣痛。血痛。濕痛。痰痛。食痛。蛔痛。悸痛。甚者心不安。受邪貞心

痛者手足冷過臍逆攻胃霍亂煩滿痢後重同椒椰附劑脫節朝發夕死嘔逆攻胃霍亂煩滿痢後重河間曰痢疾行血則膿血自愈調氣則後重自除癃閉痰飲氣結痃癖癥塊胸毒蠱毒衝脉爲病氣逆裏急殺鬼物鬼疰霧去脹足實大腸消食安胎氣逆則胎不安過服泄真氣丹溪曰味辛氣升若陰火衝上者及助火邪當用黃柏知母少以木香佐之主好古曰本草主氣劣氣不足補也通塞導氣破也安胎健脾胃補也除痰癖癥塊破也不同如此注挽曰與補藥爲佐則補與瀉藥爲君則瀉時珍曰諸氣鬱皆屬于肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬于脾中焦氣滯用之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癃秘肝氣鬱則爲痛下焦氣滯用之者塞者通之也

番舶上來形如枯骨味苦粘舌

者良名青木香。今所用者。皆廣木香。土木香。磨汁用。東垣用黃連製。亦有燕用。麵裹煨用者。煨用實腸止瀉。良久。

去惡氣

藿香　辛甘微溫。入手足太陰。肺脾。快氣和中。開胃止嘔。胃弱胃熱而嘔者忌用。去惡氣。進飲食。治霍亂吐瀉。心腹絞痛。肺虛有寒。上焦壅熱。能理脾肺之氣。古方有藿香正氣散。正氣通暢則。邪逆自除。出交廣。方莖有節。葉微似荊芥。古惟用葉。今枝梗亦用之。因採多傷也。

嫩桐皆治寒

面香　古作懷香。大溫辛熱。入腎。勝於附。附命門陽衰。用面香下

食。調中止嘔。療小腸冷氣。癪疝。陰腫。痛有七種。氣而寒病不屙。腎經以厥陰肝脈絡陰器也。多因寒濕所致。亦有挾虛者。當加參朮。于溫散藥中。乾濕脚氣多食損目。發瘀。小茴辛平。理氣開胃。亦治寒疝。食料宜之。大如麥粒。輕而有細稜者。名大茴出寧夏他處小者名小茴自番舶來。實八瓣者名八角茴香。炒黃用得酒良。得鹽則入腎。發腎邪。故治陰疝。受濕于肝見症于腎。大小茴各一兩為末。猪胖一個。連尿入藥。酒煮爛。為丸服。

芄松香　芄溫。芳香。理諸氣。開胃鬱。治腹卒滿痛。風疳齒

宣痺攻毒

宣痺攻毒

鼠脚膝氣浮。煎湯淋洗。出涼州及陝西。葉如茅根極繁密。用根

山柰 辛溫。煖中。辟惡。治心腹冷痛。寒濕霍亂。風虫牙痛。生廣中。根莖皆如生薑。入合諸香用。

良薑 辛熱。煖胃。散寒。消食。醒酒。治胃脘冷痛。凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘有濕或有虫及因怒因寒而起以良薑酒洗七次焙研四寒者薑二錢半熱者一錢因怒者加二錢當一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙頭少許服初染紙忌心肝痛發神授此方三味等分服後霍亂瀉痢並愈痛脹雅吟痛脹胃熱者入各炒分用

忌之。出嶺南高州子名紅荳蔻溫肺。散寒醒脾。燥濕消食。解酒。與坦脾胃藥並東壁土炒用。

草荳蔻一作草荳蔻。辛熱除胃冷。溫中下氣。消食。去痰。治水瀉氣痢。牛乳點服。治虛冷腸鳴。亦入大小腸經。大冷痰惡心。嘔吐酸水。痃癖。陰疝。辛散。陽明之浮熱。治頭痛。偏頭痛者口含溫水。隨左右以末吹一字入鼻。效。

牙痛。寒痛宜纳草荳蔻細辛。熱痛宜石膏牙硝。風牙痛宜皂角。蜜奁捧方二烏。玉痛宜石灰雄黃。鼻淵多服泄真氣。動肺肺之火損目。出南番嶺南亦有類

楸子而長青色。去挺用頭。醋浸刮淨皮。栗兒傷人肺。

雪行感寒

煙草新增　辛溫有毒。治風寒濕痺。滯氣停痰。山嵐瘴霧。其氣入口。不循常度。頃刻而周一身。令人遍體俱快。醒能使醉。醉能使醒。飢能使飽。飽能使飢。人以代酒代茗。終身不厭。故一名相思草。然火氣薰灼。耗血損年。人自不覺耳。

閩產者佳。烟葉中水能解蛇毒

解蛇毒

金銀花　甘寒入肺。散熱解毒。清熱涼血。凡味甘療風。養血止渴。月溪曰。癰疽發後發渴。黃者六一湯。谷忍冬九。以當忍冬養血。黃者補氣。渴何由作。治癰疽。疥癬。楊梅惡瘡。腸癖。血痢。五種方並經冬不凋。

一名忍冬。文名左纏藤。花葉同功。花香尤佳。釀酒代茶。熬煮並妙。忍冬酒治癰疽發背。一切惡毒。初起便服。奇効。乾者亦可。不及生者力速。忍冬五兩。甘草一兩。水二碗。煎至一碗。再入酒一碗。署煎。分三服。一日一夜吃盡。重者日二劑。服至六小腸通利。則藥力到。忍冬九蒸九晒。為末。以所煮餘酒打糊為丸。陳藏器云。熱毒血痢。濃煎服之。為末糖調。常服。能稀痘。

蒲公英 一名黃花地丁。甘平。花黃屬土。入太陰陽明脾胃。化熱毒解食毒。消腫核。治乳癰。乳頭屬厥陰。乳房屬陽明。同忍冬煎入少酒服。搗敷亦良。

方毒亦為通淋妙品。諸家不言治瘰癧試之甚驗。搽牙烏髭髮有還少丹方。取其通腎東垣。白汁塗惡刺。凡蝗蟲諸蟲盛夏孕育有游諸物上。必遺溺日若寒暑經旬藥。

瀉熱解毒。

汁乾久則有毒。人手觸之成瘃。名狐尿刺。慘痛不眠。百療難效。取汁厚塗即愈。千金方極言其功。葉

如商陸花如單瓣菊花。四時有花。花罷飛絮。斷之莖中有白汁。鄭方升曰。一莖兩花。高尺許者。掐下數尺。根大如斧。多有人形。拱抱。搗汁酒服。治隔噎如神。

瀉熱止痰破血。解毒。

紫花地丁 辛苦而寒。治癰疽。發背。疔腫。瘰癧。無名腫毒。

葉如柳而細。夏開紫花。結角。生平地者。赶莖生。滑竦者。超葵。

牡牛膝 一名天名精。 土寒微毒。能破血。一婦產後口渴。一名地脈。

大便泄。小便秘。用行血利水。藥不効。用牡牛膝濃煎。吞飲下血一掃。小便通而愈。止血。止痰。除

熱解毒殺虫治乳蛾喉痺砂淋血淋良方云濃煎加孔磐少許神効小兒牙關緊閉急慢驚風不自人事者絞汁入好酒灌服之即甦以醋拌渣傅項下服汁吐痰涎驚風服之亦效汁止牙疳搗之傅蛇虫螫毒取其吐痰

根白如短牛膝地黃爲使煎湯洗瘡瘻忠處良

鴉虫　苦辛有小毒殺五藏虫治蚘嘴腹痛發時止者爲虫痛肥肉汁調末服　沈存中筆記云楚杜牛膝子別是一種最粘人衣有狐氣炒熟則香

山豆根　苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則

不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清則大腸亦清消腫止痛治喉痺喉風齦腫齒痛合之嗌汁喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒傅禿瘡蛇狗蜘蛛傷瘀人馬急黃血熱極所致苗莫如竟

經冬不凋

牛蒡子一名鼠粘子一名惡實辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理瘀啾消斑疹利二便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣性冷而滑利疫症虛寒泄瀉者忌服實如蒲萄而褐色

酒拌蒸待有霜取去用根苦寒竹刀削淨絞汁焙和服

治中風汗出乃愈搗和豬脂塗瘡腫及灰花瘡肉灰出如花狀

山慈菰　甘微辛有小毒功治清熱散結治癰瘡疔腫瘰癧結核醋磨解諸毒蠱毒蛇虺狂犬傷根與慈菰小異滁和間有之

蒜相類去毛殼用玉樞丹中用之竇筆記云出處州遂昌縣洪山無毛少真者有毛恐也

蒲盧　鹹咸堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經下乳排膿止血生肌殺虫治遺精尿血癰疽發背古方以蒲盧湯為稱首及預解時行瘟疹毒取其寒勝熱又能入陽明故也

出閩中莖如油麻枯黑如漆者真甘草拌蒸連翹為

使。

瀉熱解毒。

貫衆　味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治崩中帶下。產後血氣脹痛。破癥瘕。發斑瘡。王海藏快斑散用之化骨雄。能軟堅。殺三蟲。根似狗脊而大汁能制三黃化玉金伏鯉乳結砂制汞。解毒軟堅。以此浸水赴中。日飲其水。能修時疫。

瀉火解毒散血消腫。

射干　苦寒有毒能瀉實火火陷則血散血消而痰結自解故能消心胛毒血行太陰厥陰之積痰。肺胛。治喉痺。咽痛。為要藥。搗汁醋和。嚼之引涎下。消結核腫痛。便毒金瘡。治猴痺。百鳥骨骾。

瘡毒。煎甲煎九。治瘡毒用之。通經。開利大腸。鎮肝明目。皆取其降厥陰相火也。通經開利大腸鎮肝明目

扇竹花根也。葉橫鋪如鳥羽及扇。故一名鳥扇。鳥翼。洪水漬一日。壅竹

葉煮半日用。

續隨子一名千金子。辛溫有毒。行水破血。治瘕瘕。疾飲冷氣。脹滿。蠱毒。鬼疰。利大小腸。下惡滯物。攻疥癬。瘡。玉樞丹用之。治百病多效。經疏曰。時珍曰。乃以毒治毒之功。去殼。取色白者。壁去油用。續隨與大戟澤漆甘遂。葉葉相似。主療亦相似。長于利水。用之得法。皆要藥也。

馬蘭子一名蠡實。甘平。治寒。疝。喉痺。癰腫。瘡癤。婦人血氣煩

瀉通痰
校毒出
有形滯
物

悶。血運。崩帶。利大小腸。久服令人瀉。　葉似蓖而
長厚。結角子如麻大。赤色有稜。炒用。治疝用。醋拌根葉
同功。

蓖麻子　辛甘有毒。性善收。亦善走。能開通諸竅經絡。治
偏風。不遂。喎邪。搗餅。左貼右。右貼左。即正。口噤。鼻窒。耳聾。搗爛。綿裹
塞耳塞鼻。
嗽痰。舌脹。細作紙。捲。能利水氣。治水癥。浮腫。研服。當下青
黃水。壯人只
可三。。。

二粒巴豆一粒麝香一分貼臍中併足心胎下即去之若子腸挺出者搗蓖塗頭心即收能追腸拔毒傅瘰癧惡瘡外用膃肭油能引藥氣入內故諸膏多用之然有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕率黃連水浸每晨用淡水吞一粒至三四粒治大風疥癩形如牛蝨黃褐有斑點煮去皮研或取油用忌鐵食蓖麻者一生不得食炒豆犯之則服死

白頭翁　苦堅腎寒涼血入陽明血分胃大治熱毒血痢仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連黃柏秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之腸則下焦虛故以純苦之劑堅之溫瘧寒熱齒痛骨痛腎主齒骨齦屬陽明鼻衄禿瘡瘧瘧血痢

痔偏墜搗傅患處即目消贅　有風反靜無風則搖近根處有白茸得酒良

澤熱利水行血

王瓜即土瓜根　苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴搗汁飲便數帶下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳遍乳藥多用之單服亦可墮胎　根如栝蔞之小者味如山藥根子通用經疏曰主治畧似栝蔞傷寒發斑川王瓜搗汁和伏龍肝末服甚效

通行血

王不留行　甘苦而平其性行而不住能走血分通血脈乃陽明衝任之藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經催

便下乳催生俗云穿山甲盂不留婦人服之乳長流治金瘡止痛排膿散血出

竹木刺孕婦忌之花如鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

冬葵子甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脉行津液利二便消水腫用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎秋葵復種經冬至春作子者名冬葵子根葉同功療葵子亦滑不堪入藥

葍花赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關格皆取其寒潤滑利之功

也。

白鮮皮　氣寒善行。味苦性燥。行水故燥入脾胃。除濕熱兼入膀胱小腸。行水道通關節。利九竅。爲諸黃風痺之要藥。一味白鮮皮湯。治產後風。時珍曰。世醫止施之瘡科。淺矣。兼治風瘡。疥癬。女子陰中腫痛。濕熱乘盛。客督膀胱所致。

根黃白而心實。取皮用。惡粟。

蛇牀根　狀若車前。

車前　主苦性平。入足陽明厥陰。脾肝。祛風去濕。以固下焦。陽明主肉。痿濕。厥陰主筋。痿風。補肝虛。風。堅筋骨。風濕去。則筋骨堅。益精明目。

治風寒濕痺腰痛久冷腸鳴老血膀胱宿水陰痿失溺
葶藶遺溺淳瘧惡瘡諸痢皆陽明濕熱流入下焦車前
能除濕分清古方有車前分消飲
史國信云若欲興陽先滋筋力若欲便清先分肝火萬
金護命方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必
因大腸秘熱不通水液只就小腸大腸愈加乾澁甚則
身熱心躁思水飲重症也此疾本因貪酒色或過食辛
熱煎賦之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便
時作痛也此便數而痛與淋症溺而痛不同宜用車前
一兩鹽水炒為末每服二三錢使水道轉入大腸仍
以葱湯頻洗教道令氣得通則便數及痛自愈也

有黃白二種黃長梗音硬白扁秋收者良濕莖為使長大

黃柴胡前胡忌茗醋時珍曰車前發熱土枯苓形不同
而主治不甚相遠宜一類數種乎

車前 根細長淺白。

葵根 作塊赤黃。

土茯苓 甘淡而平陽明主藥。胃大腸。健脾胃祛風濕脾胃健則營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘攣楊梅瘡毒。楊梅瘡古方不載明正德間起于瘡表其症多鬱陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也醫用輕粉劫劑共性燥烈大陽明劫去痰涎從口齒出齒即乾愈然毒氣常入經絡筋骨血液枯涸筋失所養變為拘攣瘡潰克致廢痼土茯苓能解輕粉之毒土陽明濕熱川一兩為君。

苡仁 金銀花 防風 木通 木瓜 牛膝 皮各五分。皂角子四分。氣虛加人參七分。血虛加當歸七分。各搜風解毒湯瘰癧瘡腫濕變而為熱瘀滯不消則生瘡腫經云濕氣害人皮肉筋脈是也土茯苓淡能滲土能制

患癰疥者煎湯代茶甚妙　大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

白斂　苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌止痛治癰疽瘡腫面上疱瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮或半夏為斂瘡方多用之故名每與搽凍耳同黃栢末酒服　白及相須搽凍耳未油調

葛赤枝有五葉根如栝而長三五枚同窠皮黑肉白一種赤斂功用皆同　鄭奠一曰能治溫瘧血痢腸風痔瘻赤白帶下

預知子　苦寒補五勞七傷治痃癖氣塊天行溫疾蛇虺

補腎

咬毒殺虫療蠱綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而預知之故名利便催生　藤生于如皐莢褐色光潤出蜀中云亦難得

旱蓮草一名鱧腸又名金陵草　其鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭千金云當及時多收其効甚速經疏云性凉不益脾胃故千金方金陵煎丸用薑汁和劑　苗如旋覆實似蓮房斷之有汁須臾而黑熬膏良

滑破血止血

劉寄奴草　苦温破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利　一莖直上葉尖長糙澁花白蘤黃如小菊花有白絮如苦蕒絮子細長亦似苦蕒子莖葉花子皆可

用。劉裕小字寄奴。微時射一蛇。明日見童子林中搗藥。問之。答曰。吾王為劉寄奴所傷。合藥傅之。裕曰。王何不殺之。童曰。寄奴王者。不可殺也。此之不見。乃收藥。則每遇金瘡傅之立愈。

馬鞭草 味苦微寒。破血通經。殺虫消脹。治氣血癥瘕。癪瘕。陰腫。搗塗。墟陌甚多。方莖葉似益母。對生。夏秋開紫花。穗如車前。草類蓬蒿而細。根白而小。用苗葉。

穀精草 辛温輕浮。上行陽明胃。兼入厥陰肝。明目退翳之功。在菊花之上。亦治喉痺。齒痛。陽明風熱。收穀後荒田中生。葉似嫩秧。花如白星。小兒雀盲者。羯羊肝一具。不洗。竹刀剖開。入鹽

精煮熟食之。或作茶下。

青葙子一名草決明。味苦微寒。入厥陰肝。祛風熱鎮肝明目。治青盲障翳。虫齒。齊惡瘡。瞳子散大者忌服。能助陽火。類雞冠而穗尖長。

決明子　甘苦鹹平。入肝經。除風熱。治一切目疾。故有決明之名。又曰益腎精。瞳子神光屬腎。曰華曰明曰甘曰干。黑豆作枕治頭風　狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。搗碎煎惡大麻仁

蓼實　辛溫。溫中明目。耐風寒。下水氣。時珍曰。古人種蓼爲澆收子入藥。今

惟酒煮用其汁主良

香參青蓼紫蓼為良　有香蓼青蓼紫蓼赤蓼木蓼水蓼馬蓼蓼

辛平輕揚清肺解熱毒飲中用之散血止嗽治喉痺吹喉中良或加白礬

痛吹喉或痛搐喉取吐痰愈鼻衄失音外用傅諸瘡良

生濕地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取粉

川

木鱉子　苦溫微毒有小毒利大腸治瀉痢痃積療癰瘡

疹乳癰蛇毒消腫追毒生肌除黑皯黑斑治入外科　核

白扣撚絲色淋去油者能壽狗