

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院解驗奇効良方大全卷之六十四

石室和說

萬物生於陽升於陰加四亭無差萬物稟天地之一氣男女從精血之
而陰氣純厚子稱極保兩月而陰氣方生兒時為牙
在百日名妳星至半載而為誇乳童週期而陰陽各半孩兒半
日乃真氣方奢此際全在乳母能調則和不調則違且和者其
母慈祥能調寒暑乳哺得宜是以百病頓釋形貌充悅筋骨
盛情性異常造者乳尚失節不能調攝或嗔怒

或酒醉乳兒令兒驚恐或有孕乳兒令兒黃疳

先令兒患驚風異疾或吐後乳兒令

令兒多熱喘急或夜坐未定

睡口鼻之氣侵火額門令兒鼻

加大汗熱氣藥令兒患熱病風溼

衣服晝於月下眠過夜被

疾或將惡相異物嬉戲不忽

無辜以為殃童子未成兒稀勿

精損血形體黧黑四肢枯瘁病之生

載其說乳下嬰孩之疾有病難治者

片無所據中古巫矯氏著

顱頸經以占壽夭歷世相授於是小兒醫方興焉其次晉宋江

左推譜蘇家小兒方傳習有驗隋間有巢氏方撰集病源唐有

孫真人留心此術造後賢俊羣集名醫頗衆然小兒治法散在

諸書傳考群書論說但有證而無治法張渙有方而闕脉證惟

鍼氏一書古今所重謂小兒方脉固難求證不可以言語取者

乳下之嬰孺褓之孩故事於一科古之有言醫之為難而熟幼

科比諸醫者又出人一頭地雖然人有長幼病感則一但幼小

不能言者耳人有四百四證能調則生失和則死幼者歸罪於

每生考或四氣七情或飢飽勞逸或嗜慾慾犯皆能成疾故上古神農氏之王天下也觀人之遺和啜草木之味以定酸鹹甘苦以治疾病沉疴鹹以軟之酸以收之甘以緩之苦以堅之奇哉辛味摠攝四傍然後播種百穀以養人之形骸古者巢居穴處不昧其道故能全形逐質以道自守氣血堅剛終保百年之壽於是乎明醫間出繼踵不絕岐和振被於前李華馳聲於後悲哉後人巧偽日增故此天壽不滿雖有明醫續世詮視無功蒼祀妖邪以求福可謂息燈覓朗枯鑿駕舟雖欲求生反遭艱險大抵養生之士要識違和之理則天命無窮矣

○小兒初生總說

天人稟陰陽二氣而生得患起自三焦冠壯易明童幼難治古云不能察其幼小者是以別為一門謂理耳小兒所稟形質寿命長短者全在乎精血

在母之胎中十月

而生一月如露珠二月似桃花三月男女分四月形像具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足又顙頷經云一月胎胞精血凝也二月胎形成胚也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄五月五行分五臟六月六律足六腑七月精闢竅通光明也八月原神具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成而生也大抵寿夭窮通聰明愚癡皆以預定豈能逃乎小兒所稟全習父母之餘氣以長形質故肥不可生瘦瘦不可生肥大小與父母不等則難養也初生難多患若形躰相稱則寿也小兒回舒轉首遲滯稍費人雕琢者寿之兆也若小兒預知人意身輕力懦者難養也古人有言譬如梅花早發不覩歲寒甘菊晚榮終於年事故知晚成者寿之兆也若小兒陰大而黑與身相等者可養之子若陰小而白者難養也若小兒形躰

弱頭面多青脉精神尙爽者難養也若小兒剛惺眼目凌朗神氣爽健髮紺而澤者壽之兆也若小兒精神實則少病改湯養衰成也若形痺而多病者難養也若小兒眼內黑珠少白睛大面色㿠白者非壽之相也縱長不及天年若眼中黑珠大而白睛少面色黑形不淡者亦要觀其小兒眼中黑白分明表裏相稱曰壽曰康若黑珠動搖光明閃爍縱長亦憂目疾壽亦不及四旬矣凡嬰孩始生坐婆急以綿裹指拭兒口中惡物令淨方可浴穢若不急拭啼声一出喫下則生百病矣如或浴水未到且以綿絮包裹大人懷中浴湯極須調和若冷熱失所則令兒驚亦致玉臓疾矣雖浴出亦當緩之若遇暑月亦未可去其綿絮乍出母腹不可令冒寒氣也宜以預先煎下沸湯以掩收之臨時漸燥不犯生水則兒不生蒼如此一月為佳自然長而少病矣初生小兒未乳之先用黃連半少漫汁調乾臘脂一塊

穀抹兒口中去其腹中旧糞方可與兒乳之一日內以少疎砂
入蜜少調灌半塊敷一膈以牛黃少許徐徐抹兒口中若兒
多癪煥勿強與乳之新生浴兒用猪膽一枚取汁和入湯中浴
兒則終身不生瘡疥又用五根湯浴兒亦可五根者桃榔棟梅
槐加之苦參白芷煎湯浴之辟諸不祥大丸小兒冬不可久浴
浴則傷令夏不可久浴浴則傷熱頻浴則背冷而發驚若遇熱
時以軟絹蘸湯拭之小兒肌膚未成不可燙衣燙則令筋骨軟
弱病常宜見風日若愛惜不見風日令兒肌膚脆軟便易傷損
當將父母穿過旧絮着衣少假父母之餘氣幸勿以新綿着兒
適其天氣和緩無風之時令人抱向日中嬉戲數見風日則血
變氣剛肌膚堅密堪耐風寒不致疾病若藏惟帳之中重衣溫
暖譬如草木生於陰地不見風日軟脆不耐風寒又當消息衣
服無令衣多多則令兒汗出汗多則致虛損風邪易感夫小兒

當慎風池在頸項筋肉轍之間諸疾從此而發小兒脅帶寒熱不可頻浴頻浴則脇中入水撮口脇周背從凹起不可不慎此刀前人之成說實後人之龜鑑者歟

○看小兒三脉五脉法

水鑑先生曰小兒雖受陰陽二氣成其形氣尚未周言有脉直至交蒸候盡陰陽氣足方可看脉其髫亂之年方生陰陽古云男子七歲曰髫生其原陽之氣女子八歲曰鬱其陰陽方成故未滿髫鬱之年呼為溥陽若髫鬱滿後呼為童兒始可看脉小兒初生至半歲之間有病速看額前眉上髮際下以無名指中指食指輕手涌按之若三指俱熱感寒鼻塞氣急三指俱冷上吐下瀉若食指熱胃脢不寬無名指熱乳食不和以致病也半歲已上方可看虎口週歲已上看虎口兼一指脉若五至六十四日交蒸滿足只看一指脉以食指按之上下袞轉分取三

邵允言三部非寸關尺也小兒三部面看其色為一部兜口脉
絃為二部二指脉為三部五脉者上按額前下按太衝并前三
部共為五脉小兒有疾病無惡候不必常診太衝之脉此脉足
生死之要會如七八歲脉一息六至為常人之脉一息八至為
熱九至風五至虛四至損三至脫二至死十至必是病勞虛損
形容瘦劣若或體肥面色青白一息十一二至謂之虛是風病
死是為脉亂若一息一二至者為脉不來其人當厥冷而死遲
若一息十二至者必死速則不滿三月何謂一息一呼一吸
為一息呼吸者即是出一氣入一氣謂之一息其滯若指下來
硬隱指急大者是有積若來微細即是冷若輕緊即是熱虛時
復一大即是人驚若大小不勻即是惡候數者緊也浮者輕也伏者
結為寒沉細為令大小不勻為惡候數者緊也浮者輕也伏者
貼也重乎方見結者亂也沉者重沒沉細者微也大小不勻即

是或大或小而不匀是謂氣不生其人必死也且如前人備述三脉立脉之法書之于左後率將此不可視以細事人命所繫要誠心診察既已業已庶幾則可設有所誤禍之不輕醫為人之司命可不謹乎

○辨虎口紋訣

夫小兒三歲以前若有患須看虎口脉次指表節為命閔次氣閔次風閔古人所謂初得風閔病猶可傳入氣命定難陳是也男子以左手女以右手觀之

有此通交三關脉候是極驚之候必死餘外並可醫治

風閔青如魚刺易治是初驚候黑色難治

氣閔青如魚刺主癲勞身熱易治

命閔青如魚刺主虛風邪傳肺難治

風閔青黑色如點針主水驚

氣閑赤如懸針主痺蒸肺臟積熱

命閑有此凡五色皆是死候三閑通度如懸針者主慢驚風難治

水

風閑如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣閑如水字主膈上有涎并虛積停滯

命閑如水字驚風癆證夾驚候不拘五色三閑通度者難治

乙

風閑如乙字青黑色主慢脾風難治

氣閑如乙字主驚風

命閑如乙字青黑色主慢脾風難治

弓

風閑如曲虫者痃病積聚脅前如排筭子肚皮如吹起

氣閑如曲虫主大腸穢積

命閑如曲虫主心臟傳難治

〇六

風關如環主肝臟并有積聚

氣關如環主肝入胃吐逆不治

命關如環難治

端

此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治

此紋若在手上或在面上或左右臉邊皆是死候

八

脉曲向裏者是氣辨

脉曲向外者是風痺

八

脉斜向右是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左是傷風身熱不食有汗

八

双勾脉者是傷冷

弓

脉三曲如長虫是傷硬物

弓

脉兩曲如鉤是傷冷

弓

脉一頭如環又有脚者是傷冷

○○○頭面肚上有大脉并青筋並是食毒驚積雜一

面上有些點子並是再發之候

○○○脉如亂魚是常疳亦有重疳蛔虫食積之疳治之必瘥
九脉不足細者並是風氣但消疳然後取虫為効

一風易治 二氣 閔病深 三命閔死候

小兒驚風脉候

青色天雷四足驚

赤色飛禽因外入

黑色只因遭水撲

風閔候脉應心經



◎辨三部脉證

上黑湏知腎臟傳

中閔黑候又經綿

人驚此患兩相雜

目多直視定癥涎下膏

下黑頭知是再驚

但宣風積便和平

上下是同因打撲

熱來悶閑沒心情

上青肝臟有風停

目直便青面更青

中是人驚并四足

渴來發燥不惺

下青原是再驚根

解熱宣腸是何論

上下俱青候是惡

十箇之中得二存

上赤風多入肺停

或來發熱噯聲頻

中是風來入心臟

胸痛頻頻下鴻青

下赤重驚見本宗

但調心臟有神功

上下一同難治療

口開目下是知由

上青肝臟本因留

目閉身疼四体柔

中是水鳴并再撲

熱來喘嗽不知休

下殊
骨

下青因是再驚來

妙藥宣風定少火

上下若青俱發熱

四肢逆令奄泉臺

上黑之時目上瞪

乃般

大便流糞又薰青

中見之時消渴

下熱尿黃便安寧

下黑若見赤相隨

氣多下瀉候如斯

下淖金角

上下俱同湏晝半

虛煩燥渴速求醫

○再看三關脉色細訣

上關見此脈是心之候也轉鴻愁虛而生風癥俱

下頭心火
風散

中中關若赤便多風熱

又下躁

下關若赤發熱大腸閉結

平

上關見此黑脈是腎臟之脉為順若是大腸秘澁生風之候也

下殊沙清中關黑脈生風之候不為惡候

下躁

下關黑見無惡候起

下宣肺寒若自鴻足陽冷

只下溫藥

不得轉換

五上關若見此脉四肢述嘔吐加喘者惡候吐喘定生候

下烏牛味

中關青脈風搏觸心急与治風即瘥

下殊沙清中關青脈風搏觸心急与治風即瘥

下烏牛味

下閨青脈若見無候即不宜轉上中俱同四肢熱為和四肢逆
而候也

青上閨黑并眼下黑量生未滿二歲得此脉与候者及大腸
流或身體壯熱全者湏渴若下發熱或無渴与解之瘥先下大
便後下珠

赤黑脉錯亂者腹脹是候或下痛即是積候下宣風丸散以
一日赤脉亂者是打摸息下頭心水脉透中閨立麥風候
忌搏藥傷虛動脾臟生逆吐者亦候用勻氣散補虛

赤如第一日便見此脉三閨都見是五臟之應患若第二日
中閨部隱匕或下見尺中閨見者多氣候若三閨都見或隱匕
或面浮者是精氣候常隱匕者不交出後數旬而死

赤正如左手 上部脉曲歸裏者是傷積下承曲歸外者客風猶
之即發搐也下結驚 中閨若歸裏者是客風傳變下肝中
脉之曲外

者凶候曲候過命閑并外有惡候起者凶候

上閑脉亂者傷令之患

下均

中部脉亂死者傷熱傳風

盛之疾

下烏
明察而詳之

下閑若亂急湧下溫脾臟若下進食

凶

此兩變指閑若見青與赤相雜如紫色無黑者

思上
候上
閑脉

見傷寒必發咳嗽須解表微

七浮入中閑是風候

下肩
金
骨
下閑若

見頻退為吉不退為凶候若孩童從氣閑傳至命閑方可調治

已上秘訣為神聖之醫也此前人消息後之學者宜細推之

左心小腸肝膽腎

右肺大腸脾胃命

孫華二真人曰凡小兒左手見右手脉逆惡也右手見左手脉為逆惡候也此陰陽定之而決生死何況兒口脉平五歲已上至十歲已下自斷乳而進食陰陽備矣故可善一指而定三閑分寸闊尺象天地之尤候也

○正定三十一般死候不治

凡小兒病鴟聲放黑黃如青牒手擇衣縫目多直視語帶喘息人虛笑覆面向地啼哭無淚目無精光四肢就頸足卧瘞到口不納四肢卧地變娇汗出如珠擣眉咬指甲引身長吁出氣變寒冷水脚曲如鉤反張不已言語聲震唇口吐舌出唇黑久唇脣紅不氣無定久患愛喫泥土服毓脾鴟變瘤成赤紅更有無華之疾候是也

○辨孩兒生下三膈已前中病不治

風噤
猢猻噤
脣風
撮口
咳嗽
伏声
木舌

解顫

項強

宵高

重齶

○变蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未具全自生之後即長骨脈五臟六腑之神智也變者易也又生变蒸者自內而長自少而上又身熱故以生之日後三十二日一變變每畢即清

性有異於前何者長生臟腑智慧故也何故三十二日長骨添
精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二
十數自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百
二十段為一變亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入齟上作三十二
齒而齒牙有不及三十二數者由齟不足其常也或二十八日
即至長二十八齒已下倣此但不過三十二之數也凡一周變
乃發熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃
金而未壯也故初三十二日一變生腎志六十四日再變生膀
胱其發耳與髓冷腎與膀胱俱主於水水數一故變生之九十
六日三變心喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚
心為火火數二百六十日五變生肝哭一百九十二日六變
生膽其發目不閉而赤肝主木木數三百二十四日七變生
肺聲二百五十六日八變生大腸其發膏熱而汗或不汗肺者

金金數四二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃
其發不食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也
太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脉手足
手受血故能持物足受血能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一
歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微下不可別治是
以小兒須變蒸蛻齒者如花之易苗所謂不及三十二齒由變
之不及齒當與變日相合年壯而視齒方周觀諸變蒸熱作驚
須視目角左邊眉間脉紅是也大凡初蒸見一條長一二分在
眉上者輕自日角垂至眉上此重蒸蒸發熱見二條紅者兩三
次蒸熱在內不解脉紅滯久因驚而蒸脉青亦蒸多次青在左
太陽因傷風而蒸自信門青至眉之上因驚而蒸三處皆青三
證俱見若及三十二齒者蒸足也此篇載之於錢氏之書書
之於右使後人易於便覽云

○小兒諸熱湏分主治

驚熱

溫壯

壯熱

胎熱

脾熱

風熱

煩熱

潮熱

積熱

虛熱

實熱

疳熱

血熱

骨蒸

夫小兒驚熱者慢因驚着執以為常致令心氣不和身體微熱睡夢驚遍身有汗甚者手足掣縮變成癇疾此由氣血不和實熱在內心神不定所以發搐又小兒夜寐亦微驚所以然者亦熱盛故也治之以七寶散天竺黃散丹露散辰砂金箔散皆可治之小兒因驚則生熱上則心不寧故睡卧不安身體慄動心主驚實則發熱飲水虛則卧而慄動不安此其候也

小兒溫壯者由胃氣不和氣行壅塞故蘊積體熱名曰溫壯若大便糞臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若糞白而酸臭則挾宿食不消當服紫霜丸輕者少服重者節乳哺增加丸藥當取微利可也

小兒壯熱者因五臟生熱薰動於外故身體壯熱大抵與溫壯相類而有小異但溫溫然不甚盛是溫壯也其壯熱者一向熱而不止甚則發驚也以七宝散大黃朴硝湯背能治之

小兒胎熱者但有初生下肌膚紅白二膚已後遍身黃腫眼閉不開作冷聲此因胎內有熱或因母服熱藥所致亦謂之血疽治之以辰砂金箔散牛黃膏乳上吮之兼以黃芩皮煎湯浴之此良法也

小兒脾熱夫弄舌者脾臟微熱令舌絡微緊時以舒舌治之便不可用涼藥下之少與龍腦飲子地黃膏治之若大病未已弄舌者齒學者慎之

小兒風熱若身熱面青口中亦熱煩呼不特有風證者宜虎睛丸天竺黃散哈之若熱甚大便秘者四順飲子亦可服之小兒煩熱者由臟腑實熱血氣盛表裏俱熱則苦煩躁不安反

膚壯熱也以八珍飲子七宝散皆可服之小兒手足多熱心煩
燥哭唇深紅飲水不止以竹葉石膏湯加硃甘露散治之

小兒潮熱者時間發熱遇時即退來日依時而發此欲發驚風也
大抵血氣壅盛五臟驚熱發於外故與溫壯相類或來伏熱
或帶宿寒夾伏熱者大便黃而臭帶寒者大便白而帶酸臭氣
皆緣臟腑冷熱之氣俱盛腸胃蘊積故也治之以金連飲丸効
湯加硃甘露散過期不解小柴胡湯或竹葉石膏湯也錢氏云
假如潮熱是一臟實一臟虛而內發虛熱也法當補母而泻本
臟則愈且如日中發潮熱者是心虛也肝為心之母則宜先補
肝上實而後瀉心上得母氣則內平以潮熱愈也醫見潮熱妄
謂其實乃以大黃朴硝草諸冷藥利之利既多矣不能禁約而
津液內竭縱取一時瘥鮮有不成瘍病而身瘦也

小兒積熱者由表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便

焦黃先以四順飲子三解牛黃散利動臟腑熱即去既去復熱者裏熱已解而表熱未解也當用惺七散或紅綿散表熱乃去表熱既去又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼寒或舟鮮表或以為不可醫慎致大瘍者甚多此表裏俱虛氣不歸原而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用異功散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體便涼熱症者衣砂金箔散治之錢氏白木散亦可

小兒虛熱者因患後下復血氣未匀四躰羸弱時多發熱治宜調氣補虛其熱自退如錢氏白木散異功散加四均子湯之類或未退人參生犀治之此為良法

小兒實熱者頭昏煩赤口內熱小便赤澁狀如豆汁大便堅硬或秘滯不通腰急此熱證也宜四順飲子大黃朴硝湯八珍散零候動臟腑即安

小兒脾熱者發熱形瘦多渴喫食不長肌膚者為之疳熱三四歲後有此疾蓋喫食則有疳用金爪丸五瞻丸肥兒丸之類治之最為穩當

小兒血熱者每早食後發熱夜則涼世醫多謂虛勞或為疳熱此血熱證也宜服龍膽丸地黃膏之類時以與服即瘥

小兒骨蒸熱者一歲至十歲衣袴皆不得着新綿又不得冬月以火烘衣被勿令食桃杏楊梅果實又不得食灸燭熱燄之類皆令兒體熱或因傷寒後食肉太早令兒體熱者有之或作骨蒸者宜服生犀散克効湯地骨皮飲七寶散金連飲子治之蓋小兒純陽未有虛羸形瘵之證溫補之劑寡矣且如前人論小兒發熱有一十四證見證立方多獲功效今人當效前人之心觀形察色切脉論證以分表裏虛實設有所悟非惟夭閼人命
卻且欺於心哉

凡見初病先見面部與虎口之脉色吉凶相合

面部圖形

立夏 白露 秋分 寒露

露降 来寒

亥 小雪

酉 金

戌

立秋

申 太陰火臺

未

立冬

未 太陽火臺

辰

小暑

日角

巳

火傷胎

鷦

火傷胎

午

傷寒表薄
葉薄盡鷦

印堂 心脈經刺津

大便不通津

中督

發水門

子 冬至

太雪

丑 小寒

子

夏至

月角

辰

火傷胎

巳

火傷胎

午

火傷胎

未

火傷胎

未

火傷胎

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

未

未

未

未

未

未

未

未

火傷胎

腦背圓形

百會穴

尖

凡驚吊後或百會水下有
此二條脉青下對耳名
連谷穴久愈者不治也

也弱怯血母路

陰陽

尖



○虎口脉色

脉色純紅者為初得病。為陽。為熱。為病在外。

脉色紅而紫者。為病傳變。為內。外尚有熱或但熱為陽。脉色紅或紫而青。為病在苒。為病一寒一熱外為之變作

脉色純青者。為病久而過經。為冷。

脉色熱在內。青而黃為陰。為病。

變極。萬物於極則變熱。則實力為虛寒。則為五臟之邪相干陰陽之證相反。脉色青而黑。為病極。或為久病再作形色黧黑。

脉色黑而黃。黃而露出者十無一生大凶。

○面部

赤紅乃心氣絕。蓋火屬心主炎上。故知心絕則死。

主咬牙

弄舌

虛舌出

滿口生瘡

木舌

鴟口

眼閉

舌上白胎

舌下重吊

咽喉腫爛

痰涎上壅

魚口。此為色急惡候。

左太陽并日角

紅脈現變蒸候 主煩躁啼叫頭肚上溫溫壯熱一二日而退

太陰上紅脈現傷寒之候

主壯熱鼻塞

文臺上紅脈現傷寒三日餘

主內熱頭疼

太陽脉紅至太陰

內外有熱

又連文臺熱極不解至武臺

漸生變證

顴門紅脉胎受熱受驚之候

主不時驚跳時多啾唧夜啼誰睡

額上紅脉至眉心驚風發熱之候引入印堂驚痰搐搦有熱主

小便澀少

印堂紅脉現心經積熱眉心連印堂紅脈或紅影心肝上焦熱

蘊痰涎上壅貫上焦夜啼將生驚候近眉頭左下有凸

伏驚時睡中驚跳

額門紅脉腫凸此風熱痰生驚正緣熱氣上衝攻急心胃有熱

癥不止漸成驚風之候以涼劑去炎汗即安如顙門
上紅脈引入印堂此驚候搐動多日子

左眉頭紅變蒸熱未退肝肺有熱之候當以清肺陳風熱正胃
氣之劑

風池紅有風熱在上中焦瞬息將有搐動之候桂鳳化痰
氣池紅傷風久傳變在臟三焦有熱之候可頻解利

眉心印堂紅有熱驚發飲不吐則成驚搐

印堂至山根紅脈是心與小腸熱候 小便赤澁而火

山根下至鼻柱紅心胃氣候 小便連大便皆赤澁

印堂連至上準紅三焦有積熱可以清涼之劑過之

準上紅黃色此平穩無恙

頤門紅脉外腎因風溫候

生熱葛帛

齒堂紅內有煩躁而熱

右太陽并日角紅脉因喫乳母傷風壅你汁成乳癩停滯生

○風熱痰等證

右太陽紅脉突乳母熱病痰妳

恐生痰候引入

武臺紅脉漸成吐瀉生驚之候

風池紅母不忌掛姜麪或狼羊骨汁毒生風

氣池紅母有熱痰乳兒雖至十歲病亦須發見此熱痰乳入兒

○五臟令兒眼目生翳傳變他病

頸門紅腎中氣病緣母能飲或好異物及食鷄鵝鴨子生魚葷
蒜將來傳變異疾

七表 洋乳滑實弦緊洪

浮主中風乳失血

滑吐實下分明別

弦為拘急緊為寒

洪脈由來偏主熱

八裏 微沈緩濶逢伏濡弱

逢寒緩結微為痞 濶脉敗血濡氣滯

伏患癬痛沉積冷 弱因患後虛浮是

九道 長短虛促結代牢動細

脈長陽毒在三焦 短脉腎中食不消

虛主多驚人恍惚 足時加峻命難逃

結為氣痞代羸瘦 牢者骨蒸似大燒

動則血崩精不固 細還麥腫主枯標

○視嬰孩大要

一視兩眼精神 二視聲音響大 三前後頂額 四形貌

五毛髮

一兩目為五臟精華所聚一身之神氣所鐘若精珠黑光滿輪
精神明快主兒有壽一生少病雖有病亦易愈若眼白多
睛昏懶睛珠或黃或小此是稟受怯弱兒多患也

二聲音大而響亮五臟之氣壯令兒易得長浪如孩兒自生未
不曾大啼哭乃嘉音不出此乃一臟或二臟之陰竅不通
神氣怯或叫聲如啾唧咿喨之狀此兒不壽而難養必矣
三顙門乃母氣血充實令兒顙門堅實而耐養如母多病氣血
怯弱令兒顙門虛軟而不實又後頂顙乃父之精元氣充
實令兒後頂上堅硬而耐養如父之原氣不足耽酒多慾
令兒後頂虛孔不堅亦不壽如父母俱怯生下兒女俱不
壽若如此其父母自亦不能保於天年前額又曰信門道
家為泥丸後信名腦後頂門頭中心頂上又名百會穴華
陀者面部訣載甚詳顙字信同音凡前後信及百會開而
虛名解顙

四盤貌口大鼻端眉聳目秀方福此嬰孩易長福氣堅厚如口
小鼻噶眉目醜鄙令兒惟異不貧則夭亦是乖離此等難

剖次

五蒙乃血之餘母之血氣充實則蒙黑而光潤如母因血虛帶
漏敗墮月事不調或耽酒多澁或母胎有患令兒蒙黃焦
槁生瘡熱瘡癰之患

尤視小兒神氣色脉無出於此五者不能全見但得兩目精神
聲音響亮此可保其六七此乃漢東王氏之心法口授之
秘訣也

○驚風搐不治證

如驚風傷觸客定精神如常神思不收即是燥冒煩躁不安須
急急調理稍緩則不爻事亦懼不療須要兩眼鮮明為吉
其餘難察之證須詳細審察

敵風搐兩眼不開不治驚風定了兩眼亦開不得不治
叫不出說不得更不唧聲不治驚風連搐不止不治

手按胸膈又咽喉間不治 口中不時吐出鮮血不治
吐不出者不一月死 信門腫起紅青脉交橫見不治

大便瀉紫黑血不治 信門如燒陷青脉現不治

驚風搖動連日不下不治 尋常無事時雙只瞳眼連日不須重

痰涎滿口咽喉間始解鋸不治 痰涎如水鷄聲刀二氣爭不治

聲音不出口不治

○驚風治證

諸方書所載急驚風易治慢驚風難治此古今之通論也意之
度之出自人傳授別是一邊機杼猜思其訣錄方術真神仙
之妙旨也有看小兒授病之原即驚風寒暑痰食各有由爲若
治療之法迥出一人頭地如寒禹膀胱驚熱禹心風屬肝痰食
禹脾胃冤湯氏幼幼之說驚風痰常相繼於表裏大要察其部
位脈色燭見其病之底蘊充時獲効矣

○驚

脈左顙門額上印堂三處一紅微則初驚方熱 紫微則重驚而熱 顙門屬腎 眉際屬膀胱 印堂屬心
顙門先紅又印堂青此心之微邪滌水 顙印皆紫紅此同前
上證皆輕 顙門青又印堂紅此腎之正邪動心大必危
顙印皆青同上證病危 如加之左太陽上紅傷風內熱
目角紅至眉中變蒸兩熱生驚 右太陽紅食了乳母傷風乳汁
右太陽紅青喫乳母傷寒乳汁

○風

瞳看左太陽又風池 左太陽與風池紅風邪輕 青受風邪
重 左太陽屬膀胱 左太陰屬腎 左風池屬肝 右風池屬腎門
加之又看左太陽紅傷風初熱 左太陰紅感寒初熱
左太陰紅熱有五七日傳經了 左太陽紫傷風再發

左太陰紫傷寒再得 左文臺紫三四次熱了

右文臺紫久熱不退 左太陽青風變蒸 左太陰青生敬鴉了
左文臺青再傳經熱不解 印堂紅主風熱生敬鴉

○痰

右太陽屬三焦 右太陰屬脾 右文臺屬肺 右武其室屬胃
右太陽紅突母感冒熱妳 右太陽青突母感冒熱妳

印堂青 右太陰青 右文臺青此三處主痰與食
印堂紅心熱生痰 印堂青黑主胎中驚痰飲

印堂紫主有熱痰 印堂青黃主有風痰

右太陰青紫傷寒夾風熱妳 右太陰青傷寒妳

○食

右太陰青 及文臺青 武臺青背是食

如食傷因飽食不節或為冷硬之物或油膩之物或令頤

寒發熱嘔吐宿食肚疼如傷在膈上痞塞者藜蘆散吐之
停於肚中嘔吐肚疼宜用三物湯瀉之

有滯食緣胃弱魁化不迭心胃滿閉肚疼與化鐵丸消食
二陳湯快膈有中食因其兒脾胃怯常有停飲或食飽無
飲滯而不化痞塞三焦如驚風搐搦或迷悶而不省似夢
如醉神思昏亂發熱金星丸主之

○五癪附症

風癧為病癱手足或一手一足或兩手兩足如癱不隨或噦眼
或健口或口渴牽引煩重

食癧為病傷肉食手足搐動角弓反張或拳攣或張狂大聲如
羊如犬犬吠吐出飲食方定其飲食盡被痰涎包裹在其中
驚癧為病廢頭目吊口目或一目雙目或昏或盲或邪視或頑
瞓或搖頭或戰慄

癲癇為病此患似張狂作之不常或半年一作或一年或一月或一日一次或一日三次一身驚搐不廢手足不廢頭目其人張狂如夢中如半醉燈下不知人皆從夢寐中作所

以無常也忽耳不能聞其目不能視如狂飲癇為病此患喫食不知飽忽然連三五日不甚思食手足搐動多自夢寐中作食之大飽亦便發作

○癰附症

若瘡病如寒邪中得患者十有九死

又熱溫病及中暑發惡熱者十無一生

頭疼發熱頸項強硬不能回顧搖頭口噤間之全不應人漸漸角弓反張癲在咽喉響者死仲景瓜萎膏根湯小續命湯入麝局方大防風湯主之且小方脉者書立方者一百餘家各有所長惟鍼氏比諸家優詠之切後之學者熟

讀玩味治嬰孩之疾則百發百中矣今畧各證通治方臘
列于後

○小兒證通治方

七寶散治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱晚涼此藥
涼心臟消風熱

川大黃蒸

赤芍藥

甘草炙

川當歸各二錢

麻黃

白朮

荆芥穗

各二錢

右為末一歲一錢水半盞葱白一寸薄荷一葉煎至三分
不拘時溫服

天竺黃散治小兒驚風熱

天竺黃研

川芎金

山梔子

白僵蚕

炒去沙土常

蟬殼去土

甘草各等分

右為末一歲半錢熟水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心腑止煩渴安神穩

糖加硃砂名加硃甘露散

寒水石

研軟而微青中
有細散者是

石膏

研各二兩堅白有褐斑
如無以方解石代之

生甘草末

一兩

右件為末和勻量兒大小或一錢或半錢熱月冷服寒月

熱服用薄荷湯調或燈心湯調被驚心熱不安肺皆可服

小便不通快麥門冬燈心湯調若驚熱入硃砂少許不拘

時服一方有赤茯苓一兩蘇碗方用滑布不是石膏錢氏

名玉露散每服一字或半錢或一錢然後溫白湯調下

辰砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不寧驚惕煩渴恍惚怔忡

夜卧不安齒斷睡爛及痰實咳嗽咽喉不利

辰砂

另研

桔梗

各二錢半

人參

白茯苓

各一錢半

蛤粉

四分

牙硝

半錢半

甘草

三分半

片腦

一分半

金箔一升

右為末一歲半錢薄苛湯調不拘時百味小兒臘脣多熱
睡目不穩大便不利蜜湯調一字

四順飲子治小兒三焦積熱遍身丹腫唇口生瘡忽驚狂潮諸
熱等證

川當歸

赤為藥各二

川大黃

溫紙裹煨香名二錢半

甘草

錢半

右剉碎三歲小兒用二錢水六分薄苛二葉煎八九沸去
粗不物時服大小以意加減與之小便不通加燈心木通
同前服

紫霜丸治小兒變蒸發熱不解反次食冷溫壯汗後熱不歇
及腹中有痰醉乳哺不進乳則吐噃食癟先寒後熱者

代赭石

一兩大根附子

赤石脂

一兩

杏仁

五十粒去皮尖令滑

巴豆

散

十粒去膜出油

右件研入糊為丸如麻子大一粒少乳下食頃後與少乳勿令多日服二丸此藥無所不療雖行不虛人米飲下可牛黃膏治驚化痰祛邪熱止涎嗽

薰豆粉

二兩找石五錢

甘草末

半錢

牛黃

一錢另研

腦子

少許

甜硝

三錢

甘草末

半錢

鵝砂

二分半

方硃砂

半錢

薄荷湯磨化服不拘

右為末和勻煉蜜丸如豆實大金箔為衣或一丸或半丸

龍服飲子此瀉脾經熱可代瀉黃散用治小兒瘟熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱咳嗽中暑煩躁一切風壅

甘草

四錢

人搘子

三兩

藿香葉

二兩

石膏

一兩

縮沙

半錢

人糞各

七錢半

右為末每服一錢蜜水調服不拘時治傷寒餘毒潮熱霍汗加竹葉煎服

地黃煎丸治小兒風壅上膈熱煩臭呴口瘡咽喉腫癰口舌生瘡或血熱五心常熱多渴飲水

生地黃
熟地黃各一
薄荷葉一
蒟蒻草微炙

山梔十仁

玄參各半錢

片腦半錢

右為末水密為丸如芡實大每服一丸白湯磨化乳後服
熟地湯治朝熱往來火而不解煩渴脊憊肌瘦減食

地骨皮

兩紫胡

防風

黃芩

甘草

葛根各七錢半

右剉碎每服二錢用水六分煎至三分不拘時服

竹葉右膏湯治小兒虛羸少氣口逆欲吐四體煩熱

石膏三兩

半夏洗

人參各七錢半

麥門冬去心

兩

甘草

錢七半

淡竹葉

十托

右剉碎每服二錢用水六分粳米二十四粒生薑二片煎至三分去粗不拘時服

金蓮飲子治小兒蘊積壯熱赤眼口瘡心煩躁悶咽乾多渴潮熱不止

防風

甘草

炙

連翹

柴胡

去蘆

山梔子

各半兩

右為末每服二錢用水六分煎至三分食後服

三解牛黃散治小兒潮熱實熱壯熱煩悶不思乳哺大小便不利及諸風癰癧實

川大黃

溫細累半

牛黃

黃芩

白附子

防風

半兩

白茯苓

桔梗

共草

人參

全蝎

微鷄

白僵蚕

法絲鱗金

黃同本草
各二錢

右為末薄苛湯和熟蜜調半錢不拘時服津身熱渴吐瀉
用防風湯調若壯熱不止甘草柳枝湯調服

大黃朴硝湯治小兒驚熱涎風前後不通

川大黃蒸 甘草生 朴硝各一兩

右剉碎每服二錢水半盞入蜜少許煎至三分不拘時服
惺七 敷治小兒傷風壯熱及瘡疹毒氣時疫溫壯風熱等疾

桔梗 細辛 人參 白朮

瓜蔓根

牛蒡灸

白朮芩

川芎各等分

右剉碎每服二錢水半盞生薑薄苛各少許煎至三分不
拘時如傷風無汗加荳豉薄苛煎服

紅綿丹治小兒急慢驚風手足抽掣目直涎壅壯熱氣癧及胎

癇中風

蝎梢炙黃

瓦砂各二錢半

牛黃一錢另研

赤足蜈蚣一條酒浸黃酒

天南星

薑汁蜜水片

藜香

各二分半

蛇含石

火燄醋淬半兩

右為末米糊丸如鷄頭大金箔為衣量兒大小一歲半粒

薄荷湯磨化服不拘時

異功散治小兒吐瀉食慾中和氣凡小兒虛冷病先與數服以正其氣一名正氣散一方加薯蕷等分又名六神散

人參

白朮

茯苓

甘草

白扁豆

薯蕷

各等分

右為末每服二錢用水六分生薑二片紅棗一枚煎至三分量兒大小加減不拘時服如虛冷泄瀉加附子風證加天麻酒加聖稟

錢氏白朮散治小兒脾弱多睡乳食減少調中和氣止吐逆除煩渴

人參

白朮

茯苓

甘草

藿香

乾葛

各二錢

木香

一兩

右為末一歲用二錢水五分煎至三分不拘時服

即解不語多啼泣畏明體骨重白膜遊睛喜卧冷地

熟地黃

八兩

山茱萸

各三錢

乾山藥

錢四

澤鷗

牡丹皮

白茯苓

各三錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大三歲毛下每用三五丸白湯化下不拘時服

人參生犀散治小兒骨蒸肌瘦煩亦口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦及大病瘥後餘毒不解或傷寒病後

一食羊肉體熱不思食

羚羊角

錢

地骨皮

肉

秦艽

去土

麥門冬

去心

松散

錢炒

川大黃

蒸

柴胡

去蘆

赤茯苓

去皮

赤芍藥

桑白皮

黃芪

人參

葛根

去根
醋炙
名時分

右剉碎每服二錢水半盞烏梅半箇煎至三分不拘時服
地骨皮飲治小兒骨蒸潮熱壯來心膈煩惱及傷寒後氣未解

紫胡

去蘆

地骨皮

各二兩

知母

甘草

炙半兩

右剉碎一歲二錢水六分薑梅各一片煎三分不拘時服
金瓜壳治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服令兒肥白

黃連

黃柏

甘草

微炙

青橘皮

去穰各半分

右為末入麝香少許猿猪膽汁和入石墨禹湯煮五已沸
掛風處一宿丸如棗豆大米飲下五七丸至十五丸不拘

時日三服

肥兒丸治小兒疳病者多因觸乳喫食太早所致或因久患癧

肺胃虛熱動目漸羸瘦腹大不能行髮豎無精神

黃連

山藥炒略

大麥蘖

肉豆蔻

史均子

去二嫩者

木香

一錢

檳榔

見大茴不

右為末麵糊為丸如羅蕷子大白熟水下三五十丸看大

小增減空心服

五蟾丸治小兒五種疳疾

五靈脂

研散砂

黃連各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如黍米大以五色為丸一分膩粉為衣一分蜜陀僧為衣一分百草霜為衣一分硃砂為衣一分青黛為衣晒乾和作一處每服三四十粒不拘時米飲湯下目三服

龍膽丸治小兒食後多發熱或夜則涼此血熱證疳熱皆可治

宣黃連去毛亦可藥酌半草龍膽去苗青皮去梗各

楨榔

一箇大者

麝香少許

右為末猪膽汁少入麵糊為丸蘿蔔子大每服三二十丸

米飯湯空心服

珠砂膏治小兒鎮心臟壓散萬化瘀墮涎除風

珠砂

另研

白僵蚕

炒去殼

白附子

炮炙

天南星

炮炙

乾蝎

一兩
瓦罐內炒令熟不可太過

右件入麝香半錢共為細末麵糊為丸粟米大珠砂為衣
每服十九煎金銀薄荷湯下如盜汗煎麻黃根湯下不拘
時服

調中散治吐瀉

人參

白茯苓

二錢

丁香

二十

白术

二錢半炮

甘草

一兩

紫蘇

二錢半

右為末每服一錢用木瓜煎湯入鹽半錢調服不拘時

青金膏治小兒諸疾

青黛

另研

雄黃

另研

胡黃連

熊膽

溫水化開

蘆薈

另研

硫磺

另研各分

白附子

二錢

麝香

少許

蟾酥

水銀

各一毫

鉛霜

龍腦

各少許

右為末重入乳鉢內研細令勻用瀆豬膽一箇取汁熬過
浸薰餅少許為丸如黃米大曝乾器內收蜜封或用時旋
取為丸每服二丸各依後項湯使送下

釐風白湯下二丸 搗搗將一丸溫水化開滴入鼻中待
噴嚏即可更用薄荷湯吞二三丸 久患五疳瘦瘠腳細
腹脹肚上青筋頭髮稀疎愛喫泥土時咬指甲瘦弱米飲
下 鴻瘡頻併米飲下 痒蛔虫咬苦練子煎湯下
裏下赤爛口齒疳蟲所蝕 口瘡並用乳汁化開塗在患處
辨眼雀目取白羊肝一葉用竹刀批開納藥二丸以麻線

綽定米泔水內煮熟令兒食肝恐小不能食乳母齏與兒
啖乳母用忌毒物墨蒜鷄鴨豬肉此藥隔二三日服一次

能除孩子百病

紅綿散治小兒四時感胃寒風遍身發熱諸如寒熱驚風等諸驚胎驚丹毒等熟並皆治之及急慢驚風亦宜服之

人參

半錢

天麻

半錢

煙蠶

炒一錢半

麻黃

去節半錢研

全蝎

去毒名二錢

甘草

炙一錢

辰砂

另研半錢

右件為末然後入硃砂和勻得乳極細每服半錢用水半盞煎數沸入乾胭脂少許再煎一沸溫服不拘時

烏犀丸治小兒驚疳乳食不化內成積聚腹大體小潮熱往來

五心煩熱搔指咬甲蛔虫自利頸項結核肚痛無時遍身
瘡疥小便如瀉夜多盜汗嗜泥炭喜耳甜或癟或渴或吐
或瀉或百日内外因吞惡血絞刺啼叫脾部虛弱易為傷

犯故百疾發生並宜服之常服消宿食破帶氣發散瘧毒
不可疑藥味微苦兼見巴豆可畏不容服則殊不知脾主
中州萬物發生之原脾積閉飲血榮氣衛寧免蹇澁可疾
不因此發生累上用驗告勿他疑

巴豆

一百單八粒並去心模削七片數得定不可失落
星尼更用沉香水浸隔日服此膜在精膜務在精膜

膜有不淨者勿服

橘皮

一兩去白切如小片而大片令勻將巴豆拌和
受腹露七夜二件同內文武大炒令黑色取出巴

豆令出內再研爲細末

普木

六味

內微炒透將橘皮同研為末將巴豆搗入內

右件為末和水浸蒸餅糊為丸如蘿蔔子大量兒大小
加減丸數臨臍生姜湯送下

五癇先治小兒五癇驚癲狂發搐止盛涎潮等疾如疊常延

盛着緊慢並宜服之不動脈脈養小之家宜預合以應倉卒其驗如神

皂角

四兩去皮箇碎水五六碗浸加
茶葉過在器內成膏子

白芨

四兩括酒

半夏

洗足一錢

天南星

一錢各

白芍

一錢各洗沙天絲

麝香

一錢

白附子

一錢炮

白僵蚕

洗沙天絲

蜈蚣

大者一條足酒浸一錢

烏蛇

可浸去皮骨

白芷

一錢半

右件為末用皂角膏為丸如未能就加此生姜汁打糊同為丸如葷豆大砂為衣六七歲三四粒薄荷湯生姜湯俱可送下不拘時服

神丹治諸癰

倒便手足搐搦或吐或不吐或喉間一塊熱

下方甦有熱瘀多日擣冷麥多夜擣若氣血強盛渐止減

少或虛弱擣五穀之虛實邪氣相干有食癰風癰瘍胎癰因傷感而得或因驚所得或喜怒而得病狀雖不同且

別其靈實冷熱為大要大抵冰形氣色吹於腎中一二有
眼眶陷或如鴟眼牛眼羊眼或眼白紅如血皆不治不動
言聲音全不出口頭青如靛或青脉為頭信膜信暗頭頂
十字開無辜手足俱廢半眼無精光眼珠平小半眼努力
看人全不動瘡症不能言不能行皆不治或吐痰涎或清
或似膠漆在咽喉溫溫有聲常止頭目沉重或癢痒總發
動一日不省人事

天南星

光白大者七箇切作頭泡水去

硝砂

一兩青鹽炒沙填入南星鋼內

赤腳蜈蚣

七只去頭足去

全蝎

七只去毒此二味焙乾為粗細俱入南星鋼內

裝滿切用刻下
木醋調用角星口

已上同南星以紙數十重裹了以酒醋浸透於泥地上掘
一穴坑方丸一尺四圍排定磚用炭十斤燒坑并磚通紅
掃淨以酒醋各二升潑在坑內却將南星包兒放在中間

更磚蓋定次用炭圍上護之經宿次日取出細切焙乾碾為細末入後藥

粉霜

另研

辰砂

各半另研

西麝香

一錢另研

凌霄花

一兩末另研

針砂

半兩米泔水另研

右件各為末和入前藥再乳極細分作四分一分猪心血丸一分羊心血丸一分羊蹄草根汁為丸一分煮黃肉為丸如小篆豆大每三歲兒三十九十歲兒一百九釐心棗湯送下日三服

○諸熱驚

人參羌活散治小兒傷寒頭疼發熱凍身向急時行瘡疹

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

各七分

桔梗

人參

茯苓

天麻

枳殼

五分

地骨皮

薄荷

甘草各三分

右作一服水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

人參辛便湯治小兒傷風發熱鼻塞咳嗽時行瘡疹

人參七分細辛五分

桔梗

乾葛

升麻

白朮

枳苓

柴胡各七分

薄荷

甘草各五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

人參清解散治小兒感風發熱頭疼鼻流清涕及溫壯悉治

人參

防風

天麻

前胡

紫胡各七分

茯苓

桔梗

枳殼各五分

細辛三分

川芎七分

薄荷

甘草各三分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

人參前胡散治小兒感風發熱咳嗽

人參五分

前胡

半夏各七分

茯苓

紫蘇

陳皮各五分

乾芍六分

枳殼

桔梗各五分

甘草五分

右作一服用水一鍾牛薑三片煎至五分不拘時服

天竺黃薄苛散治小兒傷寒發熱頭疼驚熱極主風咳嗽癰

延壅滯鼻塞不通

天竺黃七分薄苛一錢

全蝎

白附子一錢

甘草一分

羌活

僵蚕

麻黃去節

一方加天麻防風各七分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分入竹瀝汁半盞

剉散不拘時服

白虎湯治小兒復寒熱渴不已

知母一分

石膏半分

粳米八分

甘草五分

加人參一
半

右作一服用水一鍾紅棗一枚煎至五分不拘時服

人參前胡散治小兒傷寒退餘熱

前胡五
分

紫胡

半夏湯泡七分

黃芩去心

人參去芦

桔梗

七分各半

甘草五分

右作一服用水一鍾生姜三片棗子一枚煎至五分不拘時服

藿香正氣散治小兒傷寒發嘔

藿香

厚朴姜製

半夏

陳皮

蒼术

泔水浸一宿取出

甘草七分半

炒各半

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

枳殼半夏湯治小兒傷寒嘔者

枳殼去穰

半夏

湯泡七分

甘草七分

炒各半

右作一服用水一鍾生姜五片煎至五分不拘時服
加減達中湯治小兒傷寒自汗當補虛和陰陽

黃芩

一錢

白芍藥半錢

人參

熟地黃各六

甘草

五分

桂枝半錢

人參

熟地黃各六

右作一服用水一鍾煎至五分不拘時服

竹茹湯治小兒胃熱嘔苦汁

青竹茹

如彈子大乾葛一錢

粳米四十

半夏

湯泡七次

半

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

小柴胡湯治小兒傷寒鼻頭

柴胡

一錢

半夏

黃芩

人參

各七

甘草

五分

加生地黃一錢

右作一服用水一鍾生姜三片蜜一枚煎至五分不拘時服

抱龍丸治小兒傷寒溫夜發熱昏睡氣麗風熱痰實咳嗽及中

暑沐浴後可服之

牛膽南星兩半錢黃半兩雄黃

辰砂鐵粉半

麝射五分

右爲細末甘草膏爲丸如芡實大每服一丸用薄荷生薑湯臨睡化下

○感寒吐瀉通治

藿香安胃散治小兒感寒逆吐瀉

藿香一錢

半夏湯泡

陳皮

厚朴姜製

砂仁一分七

蒼朮米泔水浸宿

一錢

甘草五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服吐逆加
煨生薑汁半蛤蜊殼

人參白朮散治小兒吐瀉微熱作渴

人參三分

白朮

茯苓

藿香一分七

乾葛一錢

木香

甘草

三分

加陳皮砂仁各七分

一名人參和中散

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服

益黃散治小兒不熱吐瀉四肢困倦脾胃虛弱

陳皮

一錢

青皮

荳子

各五分

丁香

甘草

三分

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

益脾散治小兒吐瀉虛弱調理脾胃

人參

各七分

白朮

茯苓

各一錢

陳皮

厚朴

各七分

木香

甘草

三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

實脾散治小兒脾胃虛冷吐瀉不止不進乳食慢驚慢脾等語

及治下痢

人參

白术

茯苓

肉豆蔻

薏苡仁

山藥各五

砂仁

神曲炒

麥蘖

扁豆

陳皮

冬瓜仁

甘草

木香

丁香各二分

石蓮肉炒去心七分

陳水

丁香各二分

石蓮肉炒去心七分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服
寶膈散治小兒泄瀉腸滑脾虛此藥厚腸胃

茯苓

肉豆蔻

陳皮

砂仁

羣朴姜製

荳子煨

蒼朮米泔水浸一

宿分

木香

甘草各三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服
異攻散治小兒吐瀉不思乳食溫中和氣虛冷

人參

白术炒

茯苓各半

陳皮七分

甘草炙

木香各五分

右作一服用水一鍾生姜三片棗一枚煎至五分食前服

人參和中散治小兒冷熱不調上盛下瀉

人參

白术

茯苓

木香三分

陳皮

當歸

川芎

前胡各五分

甘草

炙三分

右作一服用水一鍾生姜三片棗一枚煎至五分食前服

肠胃膏治小兒胃寒吐瀉乳食不化不思乳食脾胃虛弱

人參去芦

白术炒

白茯苓

甘草炙

丁香各五錢

砂仁四十錢

木香三錢

白豆蔻四錢

乾山藥一兩

肉豆蔻四錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸用米飲湯磨化

食前服

人參膏治小兒吐瀉脾胃虛困倦不食腹痛

人參

木香

詞子

炮

肉豆蔻

煨

丁香

藿香

砂仁

甘草

姜分

右為細末煉蜜丸如芡實大每服一丸白湯化下不拘時
安胃和脾散治小兒脾胃不和中脘氣痞心腹脹滿全不思食
嘔吐痰噫逆氣吞酸面色痿黃肌肉消瘦腹脹刺痛泄瀉
不止便利不調

蒼术

二兩生姜炒

厚朴

姜製

人參

陳皮

去白

木香

藿香

澤瀉

砂仁

廣茂

炮

檀榔

白术

茯苓

青皮

去白

甘草

半兩炙各

小紅棗

二十四箇夫核倍乾

右為細末每服一錢用淡生姜湯食前調下

○痢疾通治方

胃風湯治小兒下痢赤色肚腹虛滿腸鳴疼痛

人參

白朮

茯苓

芍藥

冰各七分

官桂

川芎

當歸

粟米

一撮各五分

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

生熟飲子治小兒虛積腹肚疼痛下痢赤白裏急後重日夜

無度並皆治之

栗殼

去肅

詞子

煨

白朮

炒

黃芪

炙各七分

陳皮

當帰

各五分

烏梅

木香

甘草

炙各三分

黑豆

炒四粒

淮棗

二箇

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服

大効至聖子金飲子治小兒脾胃虛弱下五色先因嘔吐復作

泄瀉臍腹痛脇脹滿虛鳴下痢膿血相雜或如豆汁

黃芪

陳皮

栗殼

炙

木香

白芍藥

地榆

當歸

白朮

訶子

地各

枳殼

黃連

甘草

黑豆

炒四粒

烏梅

一箇

淮棗

一箇

右作一服用水一錠煎至五分食前服

瘡頂丹治下痢赤白裏急後重

乳香

沒藥

鐵各五

杏仁

十四箇去皮尖

巴豆

二十五粒去油

黃蠎

黃丹

飛各一兩

右為末用黃蠎研化為丸如黍米大每服七丸赤白痢甘草湯下白痢乾姜湯下不拘時

木香立丸治小兒下痢腹血

木香

內豆蔻

累各五錢

黃連

七

地榆

當歸

白芍藥

炒半

七

右為細末蒸烏梅肉九如麻子大每服三十九用棗湯送

下食前服

沒石子九治小兒熱鴻久痢皆可服

黃連

半錢
炒

沒石子

大者
炒

诃子

七枚
炒

木香

炮
二錢

肉豆蔻

七箇
炮

右為末搗爛餃為丸如黍米大每服三十九白湯送下食

前服

二順散治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澁

猪苓

一錢
炒

澤瀉

一錢
炒

茯苓

一錢
炒

白朮

一錢
炒

甘草

一錢
炙

官桂

半
錢

乾薑

半
錢

杏仁

一
錢
去皮
炒另入

右為細末每眼一錢用新汲水調下不拘時服

益中膏治小兒吐瀉胃虛嘔逆

陳皮

一
兩

丁香

二
錢

荳子

一
錢

肉豆蔻

一
錢

甘草

半
錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸食前米湯化下
人參散治小兒臘寒泄瀉

人參

木香

白朮

茯苓

附子尖

山藥

半錢

肉豆蔻

一分

甘草

半錢

右為末每服一錢用水同薑薑煎量兒

小以意加減不拘時服

詞子湯治小兒泄瀉

詞子

炮

人參去蘆

白朮

白朮

兩一錢

木香

陳皮去白

肉豆蔻

半錢

牛草

二錢

右為末每服二錢用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服久瀉手足厥冷加附子大小增減服之

○咳嗽通治方

橘蘇半夏湯治小兒咳嗽身熱有痰

橘紅

半夏姜製

貝母各七分

紫蘇

甘草

各三分

桔梗黃芩各五分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分食後服

漏白散治小兒肺臟氣實心腎壅咳嗽煩喘大便不

升麻

地骨皮

桔梗

瓜萎仁各五分

半夏

桑皮

杏仁各七分

甘草三分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分食後服

潤肺散治小兒咳嗽氣喘有痰

人參

陳皮

杏仁

貝母

麻黃

阿膠

桔梗各七分

甘草三分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分食後服

知母陽治小兒齁氣喘壅發熱咳嗽

知母

月母

滑石

麻黃

詞子

甘草

各五分

羌活

苦蘗藤

各三分

大黃

二分

小麥

三十粒

補肺散治小兒肺氣不足咳嗽喘急

阿膠

牛蒡子

杏仁

各一錢

馬兜零

七分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分食遠服一方有定喘芎蘇散治小兒咳嗽氣喘

皂麻子

去殼膜

川芎

紫蘇

各七分

粟殼

蜜炙五分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

百部丸治小兒咳嗽

百部

培

麻黃

去節各

杏仁

四十粒

另研

去皮

右為細末煉蜜為丸如米實大食後白湯化下一丸仲陽

方加松子肉五十粒

○撮口

麝香散治小兒撮口胎熱

麝香

丹砂各二分半

蛇蛻皮一尺多

右為細末每用一字鹽調塗唇上

丹砂九治小兒臍風撮口

丹砂

麝香

牛黃各二分半

半夏

丁香

白附子

鐵粉

天麻

南星各五分

右為細末煮粳米飲為丸如麻子大每服五丸用荆芥湯

不拘時下

定命散治小兒撮口吐白沫

川烏尖生三箇麝香少許

赤足蜈蚣半條酒炙乾

另研水青黛一錢

右為細末每服半字用金銀薄荷湯調服不拘時

○口噤

立聖散治小兒口噤不開不收乳食

乾鵝稍七箇膩粉一錢

乾蜘蛛一枝去口足用新竹

瀝浸一筋灸乾焦用

右為細末每服一字乳汁調與服時灌之

瓜蒂散治小兒口噤

瓜蒂七枚

全蝎一枚炒

赤小豆十四粒

右為細末每服一字米飲湯調服以吐為度

五福化毒丹治小兒上焦有熱胎熟胎毒口舌生瘡

玄參一兩

桔梗八錢去苦

赤茯苓

人參

馬牙硝一錢

另研水青黛

甘草一錢

麝香

右為細末陳蜜為丸如芡實大每服半丸用薄荷湯不拘時

時化服

○臘風

錦灰散治小兒七日臘風發腫

錦帛

燒灰存雄
性一錢

單龜

七枝

大棗去核

麝香少許

麝香少許

右為末搗棗肉為膏封裹脰上

白龍散治初生小兒臘風

天紫子

一枚禮
直者

蜜粉

少許

右同為末每服一字用薄荷湯調服不拘時

一字金治初生小兒七日之外忽成臘風搾口牙閨緊閉

殼

去絲
四兩

歲靈仙

去壳
生用

明礬

生用一
錢

甘草

二錢各

細辛一錢

右為末每用半錢

煎荆芥湯調塗兩牙閨內

臘瘡

封麝散治小兒腳瘡濕腫爛

旣帶灰

亂髮灰

白薑灰

紅帛灰四
兩

南星

白斂

當歸

赤小豆

五倍子

五味為末

血竭

龍骨

煅

海螵蛸

百草霜

胭脂

六朱同研

右各等分同拌勻再研極細每用一字如濕乾摻乾用清
油調塗腳上

白礬散治小兒腳瘡不乾

白礬

桔

龍骨各半

右爲末摻敷腳中

神効散治小兒風腳水腳腫爛

黃連

薺金

黃柏各一錢輕粉二分半

白礬

五分
估用

右同為末以葱煎湯先洗淨然後用藥參附上日三四次

五福化毒丹頻服方見前

○胎驚胎風

至聖保命丹治小兒胎驚胎風內吊腹肚堅硬目睛上視手足
搐掣角弓反張涎壅壅盛一切急慢散風並背治之

全蝎箇

十四

僵蚕沙直者

白附子

天南星炮

硃砂

研

麝香

研各一錢

防風去芦

天麻錢二

蟬蛻

去頭

金箔

十片

右為細末以粳米燶飯取中心軟者搜和為丸每一兩作
四十丸每服一丸用金銀薄荷湯不拘時化下

全蝎餅治胎驚寧神定志

全蝎

十四箇去毒用薄荷叶浸多

白僵蚕五錢

茯神

天花粉

苦梗去芦

天麻炮

遠志肉

羌活

甘草

名三

右為米麯糊為丸如芡實大捏作餅子每服半餅用金銀薄奇湯化下不拘時

奪命丹治急慢驚風胎風癇客忤物忤目睛斜視痰壅搐掣等證並治

人參

夫芦

南星

姜製

半夏

炮

獨活

荆芥

德

遠志肉

川芎

酸棗仁

白附子

炒

川白芷

桔梗

甘草

石菖蒲

各五
錢

白茯苓

白朮

天麻

全蝎

去毒皮
炮

防風

去芦

羌活

茯神

川烏

炮去皮

礪石

炒

細辛

去葉三錢

蟬蛻

十四箇去頭

辰砂

雄黃

麝香

一錢

金箔

二片

銀箔

三十片五
錢

右同為細末以至生薑汁打麪糊和丸如芡實大以朱砂
為衣每服半丸或一丸用金銀薦奇湯化下不拘時

○客忤

麝香湯治小兒客忤卒痛及氣滿腹痛

半夏

黃芪各一錢

乾薑炮

甘草

肉桂各五分

麝香

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

犀角散治小兒客忤驚啼壯熱

犀角

麥門冬

鈎藤

丹砂各二錢半

半黃半分

麝香火許

右同為細末每服半錢用薄荷湯調服不拘時

雄麝散治小兒客忤物忤

雄黃一錢

麝香一字

乳香半錢

右為末每服半錢用刺鷄冠血無時調服

○多啼

猪苓湯治小兒邪熱面赤多啼小便不利

猪苓

去皮一兩

澤鴻

二兩

白朮

半兩

赤茯苓

二兩

一方 甘草五分

右同為末每服一錢用車前子生地黃麥門冬同煎湯
不拘時調服

金箔鎮心丸安神鎮心退熱

山藥

半兩

殊砂

一兩

馬牙硝

一錢半

紫河車

黑豆水煮熟二錢半

甘草

人參

茯苓

各五錢

麝香

片腦

一錢

金箔

十斤爲衣

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸或一丸用薄荷
湯化下不拘時

烏梅散治腹疼及臍下冷痛狀如盤腸內吊疝氣多啼等疾

烏梅和孩

玄胡索

甘草炙各

乳香

沒藥

鈎藤各

萊菔一錢

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

白芍藥湯治小兒胃寒腹痛至夜多啼

白芍藥

澤鴻七錢半

白朮五錢

桂心二錢半

當歸半錢

乾薑三錢

甘草三錢

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分空心服

寧心膏治小兒驚悸不寧心經有熱多啼安神定志

人參

白朮

茯苓

茯神

山藥

菟活

甘草各一

硃砂二兩

斤腦一錢

麝香少許

金箔二十片

石為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用薄荷湯無鹽

化下

三解散治小兒心經有熱面目赤狂躁急驚癲

人參

防風

天麻

茯神

大黃

煨

麝金

白附子

各二分

赤芍藥

黃芩

六分

僵蚕

各三分

枳殼

二分

全蝎尾

十五箇去尖毒

粉草

六分

右同為細末每服一錢用薄荷湯調服不拘時

○驚悸

金箔鎮心丸治小兒驚悸睡卧不寧心經恍惚皆治之方見前
砂膽星膏治小兒發熱驚熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂

一兩

牛膽南星

一兩

琥珀

青礞石末

各一分

天竺黃

二分

甘草

五分

麝香

少許

石為細末煉蜜為丸如芡实大每服半丸用生薑湯不拘

時化服

木通散治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚耗

羌活

山梔子各二錢

大黃

一錢

木通

赤茯苓

甘草各一錢

一

右剉碎每服二錢入紫蘇葉些少用水一盞煎至五分不

拘時服

○急驚

人參羌活散治小兒久染驚搐多因感胃蓋失表散致熱極生風先以解表退熱方見前

木通散治小兒急驚初發宜与此藥瀉其心氣祛除風邪

木通

石菖蒲

防風

枳殼

全蝎沙

僵蚕沙

木香

甘草

天南星

炮各等分

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分生姜三片同煎
可不拘時服

太乙金丹治小兒急慢驚風胎驚天吊等證

全蝎

十九

防風

白附子

炮

僵蚕

炒

天麻

五

朱砂

二

牛膽南星

天竺黃

各一

蟬蛻

五

麝香

二

牛黃

一

分

乾蟾

一枝

赤脚蟆

一條

僵蚕

上開一隙入

麝香茶

右為細末煉蜜為丸芡實大用金箔為衣每服半丸用金銀薄荷湯不拘時化服

全蝎散治小兒急驚風

全蝎

十九

僵蚕

炒

川芎

一分

黃芩

一分

南星

一分

天麻

一分

甘草

一分

赤芍藥

一分

桂皮

一分

麻黃

各等分

右剉碎每服二錢用一盞生姜三片煎至五分不拘時
候服

○慢驚

觀音金剛散治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢
驚等證

全蝎

二十

天麻

炮

防風

去芦

羌活

各半

川白芷

甘草炙

扁豆

姜製

黃芪

蜜炙各

砂仁

赤茯苓

各五

右同爲末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉祥醒脾散治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參

白朮

木香

白朮各半

白附子

天麻

全蝎

炒

殼衣

去殼

蜜制

右剉碎每服

一錢水

一盞生姜三片棗

一枝煎至五分

分

分

狗時服

○急慢驚風

抱龍丸治小兒發熱咬瑞驚風

方見散熱類

太乙保生丹治小兒急慢驚風痰熱喘嗽

全蝎

白附子炮

僵蚕炒沙

牛膽南星

蟬蛻

琥珀

防風各二錢

朱砂一錢

麝香

五分

右為細末采米糊為丸如芡實大每服一丸用薄荷不
拘時磨化服

保安散治小兒急慢驚風及諸癇癓涎壅盛

川烏尖生

七分消防星五分

甘草五分藍珠砂

花蛤肉各一錢酒

輕粉

麝香

片腦各一錢

蝎梢一錢半鹽炒去毒

赤脚蜈蚣 一服矣

右為細末每服半錢用薄荷生薑湯不拘時調服

○慢脾

大醒脾散治慢脾風內虛昏悶不省

人參

茯苓

木香炮

全蝎焙

南星泡

白朮

陳皮

石蓮肉

甘草炙

丁香

砂仁

白附子炮各等分

陳米一升

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎至五分
不拘時服量兒大小加減與服

實呼散治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參

白朮

白朮

砂仁

麥芽

神曲

陳皮

石蓮肉

乾山藥

良姜

焰炒

青皮

冬瓜仁

冬子
嫩子

丁香

木香

薏苡仁

炒

扁豆

姜炒
嫩子

青附子

甘草

陳米

炒
一錢

豆蔻

裸
二錢

右為細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服
固真陽治小兒吐驚後脾胃虛弱迷憚慢風不省人事

人參

白茯苓

白术

附子

炮制去皮
附子三錢半
甘草二錢

乾山藥

黃芪

肉桂

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎至五分
不拘時服

○驚風

搗鼻開闔藥搗鼻而嚏者可醫不嚏者難治

皂角

北細辛

南星

生用

半夏

半生用各
半分

加入麝

一錢少許

右同為極細末每用少許以竹管盛藥吹入鼻中牙關緊
用烏梅煎濃汁調和藥末擦入兩牙閂內

天麻防風丸治一切驚風壯熱痰涎壅盛

天麻

煨

防風

人參

各一

牛黃

一茶

陳砂

雄黃

麝香

各二分半

僵蚕

沙去殼留頭

右為細末煉蜜為丸如芡实大每服一丸用薄荷湯不拘
時化服

防風湯治驚風熱不退時復手足搐心神不寧

防風

川芎

白芷

黃芩

細辛

薄荷

茯苓

甘草

各半茶

右同為細末每服一茶用白湯不拘時調服

○口渴并失音

礞砂丸治小兒口眼喎斜筋脉牽引

礞砂五錢

全蝎

天麻

白附子炮

僵蚕炒去頭脚

乾姜炮

牛黃各五分

麝香一分

右為末搜米糊丸如米大每服三十九用薄荷湯不拘

時化服

全蝎散治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎

川芎

黃芩

僵蚕炒去頭角

赤芍藥

甘草

礞砂

南星湯泡去皮脐皮

天麻各三錢

右為細末每服一錢用生姜湯不拘時調服

寬氣飲治小兒風痰壅滯風傷於氣不能言語

枳殼

去櫟

人參五錢

天麻

僵蚕炒去頭角

羌活

甘草三錢

炙甘草炙各

右剉碎每服二錢用水一盞生姜三片煎五分不拘時服
木通湯治小兒血滯於心心緩不通語言不出

木通

石菖蒲

多用防風

枳殼

全蝎

僵蚕

炒

甘草

木香

南星

炮各半分

右剉碎每服二錢用水一盞猪心三片生姜一片紫蘇五葉煎至五分不拘時服

○拘攣

續命湯治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃

人參

黃參

川芎

芍藥

甘草

防風

杏仁

去皮

官桂

去皮

防己

附子

炮裂去皮

半分

右剉碎每服二兩水一鐘生姜三斤煎至五分不拘時服

追風散治小兒感冒發熱手足拘攣宜服此藥

人參

茯苓

防風

川芎

柴胡

羌活

枳殼

桔梗

甘草

各半分

右剉碎每服二錢水一鍾生姜三片煎五分不拘時服
薏苡仁丸治小兒手拳不能展用

薏苡仁

湯皮當歸

防風

牡丹皮

羌活

酸棗仁

去皮及子

牡丹皮

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸用荆芥湯不拘

時化下

海桐皮散治小兒脚癓不能伸牽

海桐皮

當歸

牡丹皮

熟地黃

牛膝酒浸者

各一斤

山茱萸

補骨脂

各五兩

右剉碎每服二錢水一盞葱白二寸煎至五分不拘時服

○驚積

青砂保安丸治小兒乳食停滯膏膈不寬肚腹脹脹脾疳驚積

積聚並皆治之

青附子

二分

砂仁

白术

神曲

去麸各半

麥芽

各一
分

糖冰

半分

益智

陳皮

各半
分

甘草

三分

木香

薄荷

火均子

去麸各
半分

右為細末煉蜜為丸如芡实大每服一丸米湯空心化下
三棱散治小兒飲食停滯肚腹脹滿驚積食積發熱等證

三棱

四分

青附子

各一
分

人參

七分

青皮

陳皮

半分

半夏

枳殼

益智仁

神曲

八分

麥芽

半分

蓬术

蘭草

大黃

半分

紫蘇

八分

茯苓

各一
分

甘草

八分

大黃

半分

右剉碎每服二錢用水一盞生姜三片薑至五分不拘時
服量大者加減與服

○解鬱

補腎地黃丸治小兒羸賦不足腎氣虛弱骨骼不充顴縫不合

體瘦力弱

熟地黃

酒浸
炭火

川牛膝

酒活

鹿茸

蜜金

山茱萸

酒去核取皮

莢莖

蜜金

白芍藥

酒浸黃酒

澤鴻

二升

乾山藥

酒格五

牡丹皮

洗淨

白茯苓

酒格三

澤鴻

二升

右為末煉蜜為丸如麻子大每服十五丸或二十丸空心
用鹽湯或溫酒任下

調元散治小兒羸瘦元氣不足頹顛間解

乾山藥

五兩人參去芦

白木

去芦

白芍藥

蜜金

白茯苓

茯神

當歸

蜜金

熟地黃

黃芪

半兩

甘草

蜜金

川芎

格二

桂枝

蜜金

右剉碎每服二錢用水一鍾生姜三片紅棗一枚煎至一
鍾不拘時服

柏仁散治小兒解顛不合

防風半兩一
細辛一錢一
桂心一錢一
白芷二錢

右為細末每用一字用乳汁調敷顛上

桂心散治小兒顛開不合

桂心一錢一
細辛五分一
乾姜半錢一
半

右為細末每用一字或半錢用乳汁調敷顛上

參芪當帰散治小兒臟腑虛弱氣血不榮以致顛瘓

人參一錢一
黃芪一錢一
當帰一錢一
白朮一錢

飼子五分一
五倍子一錢一

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

○寒熱

人參前胡散治小兒感冒寒熱往來

人參

前胡

紫胡各一

桔梗

半夏

甘草

炙

地骨皮各五

右剉碎每服二錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服
秦艽湯治小兒陰陽相勝寒熱往來

秦艽

鰲甲

燙

灸黃

二錢

大黃

燙

麻黃

去節

甘草

紫胡各五

檳榔

三錢

右剉碎每服二錢水一盞煎至五分不拘時服

二姜丸治小兒寒熱與瘧相似

乾姜

良姜

各等分

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三五丸用白湯空心
化下

○譏語

寧心膏方見多啼類

寧眠膏治小兒驚熱心神恍惚讒語睡卧不穩

甜消

人參

硃砂各一兩

茯苓

山藥

甘草炙

寒水石煅各一兩

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薄荷湯下不拘時
小柴胡湯治小兒傷寒胃風身熱胸滿腹脹

柴胡

黃芩

半夏

人參

甘草各一兩

右剉碎每服三錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服
大柴胡湯治小兒風熱腹脹及裏證未解讒言妄語躁利大便

柴胡四兩

黃芩去芦

赤芍各一兩

大黃次半

半夏半

枳實半

甘草一兩

右剉碎每服三錢用水

一盞生姜三片紅棗一枚煎至五

分不拘時服

○口瘡

一捻散治小兒口瘡

青盛

黃柏

詞子炮

密陀僧各等分

加入枯白礬少許

蒲黃少許

右每用少許貼口瘡處

五福化毒丹 方見口瘡類

砂散治小兒口舌生瘡咽喉不利重舌馬牙

硼砂

蒲黃

淨硝

孩兒茶

薄荷

甘草

各二
青黛一
片腦少許

右為末每用少許付點口中瘡處

○齒齦

鎮驚丸治小兒發風咬牙心神不寧

辰砂

铁粉

京墨

片脑

麝香各一
字

右為末，糊丸如梧桐子大，每服三四丸，用荆芥湯不拘時服。

蝉花散治小兒驚風咬牙

蝉花

和散
去土

礞石

去沙
分

雄黃

玄胡索

各等分

右為細末，每服半錢，用蟬散湯，不拘時調服。

五癩通治方

散風丹治小兒風癩，先用此藥

牛膽南星仁

羌活

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荆芥穗

細辛各一
末

右為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服二丸，用薄荷茶湯

不拘時送下

保安丸治小兒諸風癇久後亦驗

五靈脂半斤川烏生用去皮

火二兩半

右為末猪心血為丸如梧桐子大每服一丸用生薑陽化
下不拘時服

獨活湯治小兒風癇解表通裏

獨活

麻黃去節

川芎各一

大黃

甘草半錢

沙参

右剉碎每服二錢用水一鐘生姜二片煎至四分不拘時
溫服

細辛大黃湯治小兒風癇內熱

天麻

防風各半

細辛

大黃

川芎各半

甘草半錢

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一盞煎至四分不拘
時服

牛黃丸治小兒風癇迷悶抽掣等症

半膽南星

全蝎

培去

蟬殼

各二分

防風

牛黃

白附子

直僵蚕

炒去

天麻

麝香

半錢

右為末以煮棗去皮核取肉和水良半升研極細次入藥
未和丸如黍豆大每服三五丸用荆芥生薑煎湯送下不
拘時服

○驚癇

比金膏治小兒驚癇

人參

琥珀

白茯苓

遠志肉

姜製

硃砂

天麻

川芎

石菖蒲

頭節

南星
鹽片
水浸齊齊一字

青黛
一束

右丸末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五丸煎金艮牌等
湯磨化不拘時服

鎖驚丸治小兒一切驚癇

茯神
去木

鐵粉

遠志
去心
制及焰

紫石英
燒瑞
淬研

人參
云蘆

琥珀

滑石

蛇黃
搗碎淬
研

南星

炮各二
半牛龍齒

熊膽
分

輕粉
三分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三五丸
煎金艮陽磨化不拘時服

虎睛丸治小兒驚癇邪氣入心

虎睛
細研

遠志
去心
姜製

焙犀角
鋸

大黃
溫
眼

石菖蒲

麥門冬
去心
二半

右為細末粟米粉打糊為丸如梧桐子大每服五七丸竹

兼煎湯化或金艮煎陽亦可不拘時服

七寶鎖心丸治小兒驚癇心熱

遠志去心姜
製桔子

雄黃

鐵粉

琥珀各二

硃砂一
朱

金艮消四片
麝香少許

右為細末黃棗取肉為丸如梧桐子大每服三五丸煎去心麥門冬湯化下不拘時服

清神散治小兒驚癇

牛角

白蘚皮

石菖蒲

遠志

去心姜
製桔子

半夏半夏本
二分半
茯神五分

大黃

培

人參

甘草各半
生

右為末每服半錢煎去心麥門冬湯調不拘時服

妙聖丹治小兒食積通利

雄黃

一
喝稍

硃砂

代赭石

煅醋淬

輕粉

麝香各二分

巴豆

三箇去皮加鹽炒

杏仁

去皮尖搗炒

一升

右為末蒸熟肉為丸如梧桐子大每服三五丸木香煎湯

磨化不拘時服

天麻丸治小兒食癪有痰

南星

炮二分

白附子炮

天麻

牙硝

川靈脂

全蝎

焙各一分

輕粉

半分

巴豆霜

去油三分

二分

右為末稀麵糊為丸如麻子大每服十丸用薄荷煎湯或

薑湯送下亦可不拘時服

牛黃清心丸治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒

牛黃

一兩

麝香

研

龍腦

另研

鈴羊角

木

綿各一分

當歸

去蘆

防風

去蘆

黃芩

麥門冬

去心

白芍藥

白朮各一兩

柴胡

去苗

木

桂去皮尖及入

另研

桔梗

白茯苓

去皮

芎窮

各一分

阿膠

蜜炒碎

半分

肉桂

去金皮

大豆卷

研沙各半

蒲黄

炒

人参

去蘆

神曲

炒沙各半

甘草

炒五分

雄黃

研末另

白欽

乾姜

各七分

金箔

一千二百片內四百片

人薑

研末另研入藥內

犀角末

二分

乾山藥

十分大棗

研末

人薑

研末去皮研成膏入藥

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十丸用金箔為衣每服一丸溫白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹華煎湯溫化服

蛇黃丸治小兒諸癇

蛇黃

一錢假臘片

朱砂

各一錢

雄黃

各二錢

雄黃

二

青礞石

七分研細

硫砂

各一分

鐵粉

研淨四分

右為末搗硬米飯為丸如梧桐子大每服三五丸人參煎湯化不拘時服

斷續丸治小兒諸癧癩盛

皂角

鹽水三升
切片浸過油器內燒成膏

白礬

粗末半錢

燭硝

炒

直僵蠶

炒

雄黃

另研

硃砂

另研

白附子

各半錢

麝香

另研

烏蛇

酒浸取肉焙

南星

溫熱裹炮一兩

赤蜈蚣

一條僵酒浸炙去頭足

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為丸如梧桐子大
每服三五丸用生姜湯磬化不拘時服

當歸大黃湯

治小兒諸癧壯熱利下心中惡血

大黃

鐵頭

裹炮裹黑

甘草

炙

當歸

酒浸

赤芍藥

細末

半夏

製

川芎

各二錢

右為末每服一錢或二錢用水八分鐘煎至四分不拘時

代赭石散

治小兒陰陽相通用

代赭石

末研為末

右每服半錢以金銀器皿煎湯或和金箔銀箔在內同調
不拘時服食久小兒腳胫上自有赤班卽邪氣發出其病
隨瘥若無赤班則難治也

地龍散治小兒諸癆發歇無時

乾地龍

碎

兩虎睛

一對

人參

半

水

金銀箔

三十片

半

金

銀箔

三十片

半

天竺黃

半

水

珠砂

半

水

代赭石

碎

芒硝

各二分

鐵粉

各二分

水

半

雄黃

半

水

輕粉

半

水

右為末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

定癆丸治小兒五癆

赤脚蜈蚣

一條去頭足

酒浸炙

一錢

水

竭梢去毒

一錢

烏蛇肉

半錢

眉炙

一錢

白附子

生

大南星

末

圓白半夏

末用姜汁和一
兩各二分半

水

半

熊膽

一錢

水

白礬

新丸

上

水

鐵粉

各二分半

水

右為末稀糊為丸如梧桐子大珠砂為衣每服二三丸

用薄荷煎湯磨化不拘時服

○胎熱

釀乳方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通乳食不能進

澤瀉

一兩半

猪苓

一兩半

赤茯苓

一兩半

天花粉

一兩半

生地黃

一兩箇陳

甘草

一兩半

右剗碎每服一兩用水一鐘煎至八分食遠令乳母裡去宿乳却服此藥

生地黃湯治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之證皆因母受熱而傳於胎也凡此證宜服略與小兒服之

生熟地黃

赤芍藥

川芎

當歸

天花粉

各半

右剉碎每服五錢水一盞煎至五分食後服

○五
辨

五疳保童丸治小兒五種疳疾

青黛 五倍子 生用解毒
熟用止血

夜明砂 布裹蒸熟去砂土

龍膽草生用干蟾頭炙

苦練根皮

葛根另研 薑黃仁

蝶故
卷之三

右為細末用粟米粉打糊為丸如麻子大一歲小兒服一

十九用米飲湯送下不拘時服量兒大小加減

連肩香丸治小兒疳氣羸瘦生寸白虫

胡黃連 白蕪英 黃連

黃連
木香
各半

衣砂
易研
半
齊香

右為細末用粟米粉打糊為丸如麻子大一歲小兒服五

七丸至十九三五歲已上者可服三五十丸米飲湯送下

五所所因心之癥
兒瘦弱夜熱發
渴漫上瞤者心之病
也主於心治則少耗
肝之病身熱瘦白
脛道睛者肝二病也
主乎肝治則木可疏
肺之病則瘦脣不紅
無定處好食涼土味
地而眼為脾之病神
真得大士自能
肺之病創膚起瘡
瘡潰素常口鼻空
瘡肺之病也主於肺
治以金華膏止之
附身熱消極瘦

上焦、曲

黑頭瘡血

流鼻脣

更不接生

宜速治

利通自

活筋方

大瘡末九治小兒瘡癰殺蟲和胃止瀉

胡黃連

黃連

蘆薈

白蕪英仁

木香

青橘皮

雷丸

破爛白猪佳赤
入猪用

鵝頭

嫩炒名
麝香二分

大瘡末

楊栗米飯為丸如葵豆大每服一二十丸米飲

湯下不拘時服

龍粉散治小兒瘡渴

草龍膽

定粉

散

烏梅肉

倍
糞

黃連各半

若為細末煉蜜為丸如麻子大每服二三十九用米飲湯
下不拘時服

消氣丸治小兒癰疾腹脹喘急氣急

木香

二錢

龍芻子

半兩用巴豆一錢半

炒黃色去巴豆不用

右為細末麵糊為丸如棗豆大三歲兒三十九用米飲湯
下量兒大小加減不拘時服

分氣丸治小兒疳證

木香二錢半 黑牽牛半兩生用

右為細末麵糊為丸如棗豆大三歲兒三十九用米飲湯
送下不拘時服

子丑散治小兒疳證

梘糞一分 黑牽牛各等分

右為細末三歲兒每服一錢用橘皮湯調不拘時服量兒
大小加減

庚七丸治小兒疳證

黃土一錢 陳皮一錢

木香半兩

巴豆三十粒去油

右為細末麵糊為丸如棗豆大三歲兒三十九煎黑豆湯

下不拘時服量大小加減

又方治喫土

黃連

黃土各等分

右為細末麵糊為丸如棗大三歲兒二十九煎黑豆湯
下米飲湯亦可不拘時服

○項軟

天柱丸治小兒風熱氣血不和頸軟頭不得正或前或後或左

或右

蛇含石

一大塊大者用鹽水七次

川爵金末

少許

右並碾細末入乳鉢內再研極細入麝香少許和勻用煮
大米飯搗爛為丸如圓眼大每服一丸用荆芥湯化服又
入生姜汁一二滴或金銀薄荷湯亦可不拘時服

五加皮散治小兒頸軟

五加皮不拘多少

右為末酒調塗傳頸骨上

健骨散治小兒久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒謂之

○五軟

白僵蚕不拘多少

右為細末三歲每服半錢薄荷酒調下

生筋散治小兒證如前

木鱉子

六箇去殼

單麻子

六十箇去殼

右為細末先抱起頭顱摩頸上令熱先用生山藥搗汁和
藥二味調貼之

吐血

鵝砂散治小兒喉間生瘡風寒熱毒臭衄出血吐血

山藥

四兩

膾子

二錢

甘草

二兩

牙硝

四兩

鵝砂二兩生麝香四分另研

右為末每服三分或五分量兒大小加減用茶清湯食後調服

三黃丸治小兒積熱吐血咽膈不利

黃連去須

黃芩去蕊

大黃等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十丸熟水下如臟腑壅實加服丸數小兒積熱亦宜服之量大小加減
茯苓補心湯治小兒心虛為邪氣所傷有熱吐血

陳皮去白

桔梗去黃

甘草去皮

枳殼去殼

沙

木香各五分

紫蘇葉

茯苓去皮

半夏湯洗姜製

乾葛

前胡去蘆

人參三分

當歸去蘆

川芎

芍藥

熟地黃各五分

右作一服水一盞半生薑三片紅棗一枚煎至六分不拘

時服

天門冬丸治小兒吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬一兩

甘草

各半兩

阿膠

白茯苓

貝母

杏仁

炒另研
各半兩

右為細末入杏仁和勻煉蜜丸如梧桐子大每服一丸噙化日夜可噙

是齊白朮散治小兒積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃
吐血者最宜服之

白朮

二兩

人參去蘿

白茯苓去皮

黃耆

蜜炙各一兩

柴胡

二兩半

山藥

百合去心各

甘草

炙各半兩

煎胡枝子

二

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至五分

食後服

藕汁飲治小兒吐血衄血不止

生藕汁

生地黃汁

大薑汁各三

生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小匙不拘時服
四生丸治小兒吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉

生父葉

生柄葉

生地黃各等分

右爛研丸如圓眼大每服一丸水一盞煎至四分不拘時服
千金龙膽湯治小兒山腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱
吐噃者若已曾進乳哺中實食不消壯熱及變蒸不解中
客忤鬼氣并諸驚癇悉主之

尤膽

鈎藤

紫胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓一方用
茯神

甘草炙各二
半

燒娘二枚

大黃一兩
炒熟

右剉碎每服三錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

便血

槐角丸治小兒五種腸風下血脫肛

槐角

炒一兩

地榆

黃芩

當歸

去芦宿根水浸一宿燒熟

防風

去石一錢

枳殼

炒半兩各

右為細末酒糊為丸如菜豆大每服二十九米飲湯送下
食乳前服

槐花散治小兒腸風臘毒下血

槐花

炒一兩

柏葉

炒半兩

荆芥穗

一錢

枳殼

炒半兩

右為細末每服一錢空心米飲湯調服

槐角散治小兒腸胃不調脹滿下血

蒼术

炒一兩

草朴

二兩

陳皮

一錢

當歸

枳殼

炒一兩

槐角

二兩

甘草

一錢

烏梅

炒半兩

右剉碎每服五錢水一盞前至五分不拘時服

烏梅丸治小兒大便下血不止

烏梅

三兩
鹽水
性

右為末用醋打米粉糊為丸如棗豆大每服三十丸空心
米湯送下

黃連散治小兒腸風下血疼痛不止

黃連

鷄冠花

貫眾

大黃

右為細末每服一錢用溫米飲調不拘時服

黃連貫眾散治下血

黃連

貫眾

大黃

烏梅

各一

甘草

二

枳殼

荆芥

各五

右為細末每服一錢用溫米飲湯調食前服

○秘結

牛黃散治小兒上焦熱臟腑秘結

大黃一兩

白牽牛頭末五錢

右為細末每服一錢有麝令用溫酒調下無麝令而手足煩者蜜湯調下不拘時服

郁李仁丸治小兒脾臟大小便不通并驚熱痰實

郁李仁一兩

去皮川大黃一兩

去龜皮與者研碎

半日晒乾炒為細末

滑石一兩

研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲服

二三十丸更量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前服

犀角丸治小兒風熱痰實面赤大小便秘結三焦邪熱臟腑蘊

毒諫導極穩

生犀角一錢人參半

去苦半兩

黃連

枳實一兩去核

大黃二兩酒浸功作大

片用巴豆內一粒貼在大黃上

研取去巴豆

大黃根乾研

右各味同為細末煉蜜為丸如麻子大每服一二十九粒
卧熱水下未動再服

瀉藥散治小兒風癧滯血留著上焦胸膈高起大便不通

瀉藥

大黃

枳殼

桔梗

木香

甘草

桔梗

右剉碎每服三錢生薑二片水一盞煎至五分不拘時服

○諸淋

逍遙散治小兒心虛蘊熱小便赤澁或成淋痛

生乾地黃

木通

甘草

各等

右剉碎每服三錢水一盞竹葉十片煎至六分不拘時服
玉琳散治小兒腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿
如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並背治之
如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並背治之

赤茯苓

六錢

赤芍藥

當歸去苦

甘草

生用各二

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分空心服
八正散治小兒心經蕴熱臟腑秘結小便赤澁癃閉不通及熱
淋血淋並皆治之

車前子

瞿麥

篇蓄

滑石

甘草

山梔子仁

木通

大黃

各五錢裹

右剉碎每服五錢水一盞燈心七根煎至七分食前服
清心連子飲治小兒上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱
小便赤澁或欲成淋並宜服之

黃芩

半兩

黃耆

蜜炙

白茯苓

石蓮肉

去心

人參

各七

車前子

甘草

炙

麥門冬

去心

地骨皮

各半

右剉碎每服五錢水一盞煎至六分食前服如發熱如紫

胡薄荷

五味散治小兒伏熱小便赤痛如淋

澤瀉

半兩去皮

猪苓

去皮

赤茯苓

去皮

白朮

五味子

內桂

去皮

右為細末每服一錢用燈心湯調不拘時服

○蟲動

靈藥散治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂

末半兩

白礬

末半兩

石同為末每服二錢水一盞煎至五分不拘時服當吐虫出愈

史均子尤治小兒臟腑虛滑及疳瘦下痢腹脹滿不思乳食

若常服安虫補胃消疳肥肌

厚朴

去皮姜皮

半兩

史均子

去殼一兩為度去頭不用切焙

陳皮

去皮

半兩

甘草

半兩

荳子

半生半熟

法拔

半兩

青黛半

西枝是蕷蕷湯即
入此末如麻硝不調不消

右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一丸米飲化下或
乳汁化下亦可不拘時服

○癰瘍瘡

漏蘆湯治小兒癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫

漏蘆

黃芩

白芨

麻黃

去節各
絲炒

大黃

三兩

白薇

粉草炭

枳殼

去白
絲炒

芍藥

升麻

各二

右剉碎每服四錢水一盞煎至六分空心服

冬散治小兒渴疾既愈須預防發癰疽之患

忍冬草

一兩

甘草節

大黃

生嚼

右為末每服三錢水一盞煎至七分調乳香末些少不拘
時服

時服

○瘡疥

加味羌活散治小兒四氣外搏肌膚發為瘡疥增定發熱身庠

羌活

前胡各一兩

入參

桔梗

茯苓

甘草炙

川芎

枳殼炒少分

天麻各半兩

蟬蛻去頭足

薄荷各二錢

右剉碎每服三錢水一盞生薑三片煎至六分不拘時服
當歸飲子治小兒心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或
腫或痒或膿水浸淫

當歸

去芦

赤芍藥

川芎

生地黃

蒺藜炒去

刺

荆芥穗

防風去頭足各一兩

何首烏

黃耆去芦

炒去

甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢水一盞生薑三片煎至六分不拘時服

丹毒

麻黃湯治小兒惡毒丹毒及風疹

麻黃 升麻 葛根各一

射干

雞舌香 甘草各二兩

石膏大半

右剉碎每服四錢用水一盞煎至六分不拘時服

搗湯方治小兒敷腫丹

當歸 大黃生

甘草生

苦窮

白芷 濁活

黃芩

赤芍藥

升麻 沈香

木香

木蘭皮各一兩

芒硝三兩
另入

右剉碎以水一升二升煮取四升去滓內芒硝在內試其

冷熱以綃帛揭在患處

敗毒散治小兒癰毒初發遊走遍體燥悶腹脹啼哭

桔梗

天花粉

乾葛

川升麻

川芎

赤芍藥

獨活

柴胡

甘草各半錢

右剉碎每服四錢水一盞生薑二片煎至六分不拘時服

○癮疹

地龍散治小兒風熱癰疹狀如傷寒耳尖及手足冷

地龍洗去土半兩培乾

穿山甲半兩以皂角灰炒令黃

硃砂研細一錢

右前二味為細末後入硃砂一錢再研和勻每服一錢用

紫草煎湯調不拘時服量兒大小加減

消毒飲治小兒頭疼發熱癰疹如粟米狀

牛蒡子三兩

荆芥半兩

甘草研一

右為末每服三錢水一盞煎至六分不拘時服

清涼飲子治小兒癰疹大便結燥

大黃

溫性
寒味

常肺

赤芍藥

甘草

右剉碎每服三錢水一盞薄荷三五葉煎至七分食遠服

○湯火

治湯火所傷方

用黃蜀葵花浸油內以油敷患處或收黃蜀葵花晒乾碾末香油調敷亦可

又方

右用定粉碾極細末隔月猪脂調敷患處

又方

右用草麻子肉碾爛入蛤粉寺分如乾再入香油與火調擦患處

○癰骨

治魚鱗骨癰用貢紙為末井花水調令濃大呷一口慢上嚥下

又方

以野夢寐根淨洗搗爛每用如圓眼大如被雞骨所餽以雞糞化下魚骨則以魚汁化下

又方

以南鵝砂不拘多少噙化其骨脫然而下

又方

以瓠瓜於咽喉下邊舐患處効

漱骨經

以象牙梳或牙笏或器血磨水嚥下効

○中毒

食牛羊馬肉毒

又以蘆根煮汁頻服有効

治蠶毒

用生甘草為末白礬末各一兩不拘時用冷水調下一錢即吐喉痺及嶺南嘔痺

○吐逆嘔逆

香薷湯治小兒陰陽不順清濁相干中暑霍亂吐逆體熱煩燥昏冒多渴

香薷

厚朴
數
皮

黃連

用姜汁半
作糊色各一
兩

右剉碎每服五錢用水一鐘酒少許煎至五分去渣水中原頭令乳母同服一方入白扁豆炒等分

王氏半夏散治中暑伏熱生痰嘔吐

半夏

赤茯苓
去皮

甘草
各一
錢

陳粳米

五十
粒

右剉碎作一服水一鐘倍加生姜煎至五分不拘時服

湯氏玉露散治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體熱頭疼

石膏

長用
白膏

寒水石
一錢

甘草
五錢

右為末每服一錢用白湯調入生姜汁少不拘時服暑
熱涼水調服亦可

竹茹陽治小兒胃熱嘔吐

青竹茹

如彈大半夏

泡七錢瘦米

四十粒乾薑一錢

右剉碎作一服水一鐘生薑三片前至五分量兒大小加
減與服亦治傷寒後嘔吐

附子理中湯治小兒寒證嘔吐不止防傳慢驚

人參

去芦二兩半

白朮

炮一錢甘草六分

乾姜

炮

附子

各半錢

右剉碎作一服水一鐘煎至五分不拘時服一方加木香
不換金正氣散治小兒感寒熱嘔吐

藿香

去土七分

草朴

去皮一錢

甘草五分

半夏

七分

湯泡

蒼术

去皮一錢

陳皮

各一錢

右剉碎作一服水一鐘生姜三片棗二枚煎至五分食遠

溫服

益胃散快膈益脾止嘔進食

木香

丁香

藿香

陳皮

縮石

白豆蔻

各二錢半草一錢

右為細末每服一錢用薑裹煎湯調服一方加茯苓

醤乳治小兒冷氣入胃嘔吐及慢驚癇多驚啼及頭面黃脉

細者難治

人參

木香

藿香

沉香

神曲

麥蘖

陳皮

各等分丁香減半

右剉碎每服五錢用水一鐘生薑五片紫蘇十葉紅棗三

枚砂瓶內煮至半鐘令乳母服後擦去乳汁仰卧塞時

令藥入乳絡令兒喫數口不過飽乃良法也嘔定令兒服

木方八仙散 吉州醒脾散

○吐瀉泄瀉

五苓散 治小兒霍亂吐瀉煩渴飲水小便不利

澤瀉

半兩

猪苓

去皮一兩

白茯苓

白朮

各半兩

官桂

去皮一兩

右為末每服一錢溫湯調不拘時服如渴燥耕水調下

調中丸

又名理中丸

治小兒脾胃虛冷

人參

去皮一兩

白朮

甘草

炙各半兩

乾薑

四分之一兩

右為細末煉蜜丸如棗豆大每服二十九食前溫水送下
或作芡實大米湯化亦可

香薷餅子治傷食聚瀉

木香

炮一兩

青皮

去白一兩

陳皮

去白各二錢半夏朴

制七分半

神曲

炒一兩

麥蘖

炒半兩

右為末煉蜜丸作餅用淡生薑湯化不拘時服
調中散治小兒傷食泄瀉

人參去苦

白茯苓

白术

乾薑炮

藿香葉

香附子炒去毛

甘草炙各

縮砂仁二錢

木香炮

丁香各一

半

右為細末每服一錢用姜棗煎湯調服不拘時服量兒大小加減或作煎劑亦可

保安丸治小兒癩瀉傷食瀉

香附子炒

砂仁各一

白姜

青皮

陳皮

三棱炮

蓬木炮

甘草炙各五

右為細末麥蘖碾末打糊為丸如菉豆大每服二三十丸淡姜湯下食前服

沉香煎丸治冷積熱積脾積食積乳積中脘不和痞氣鬱結或

萬病中寒癥肚腹疼傷食泄瀉等證並背治之

乳香

沉香

杏仁炒

木香

丁香各一

百草霜二錢

肉豆蔻一錢

巴豆七粒去殼

右為細末炒黃嘴入酒少和為丸如菉豆大無服三五丸姜湯送下兼治肚痛不止以通為度

○滯痢

胃風湯治小兒風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉腹脹虛滿
腸鳴痺痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血等證

方見痢疾頭類

黃連阿膠丸治冷熱不調下痢赤白裏急後重脅腹疼痛口躁
煩渴小便不利

黃連去薑三兩

阿膠一兩半炒

茯苓二兩去皮

右各為末水煮阿膠膏搜和丸如菉豆大每服二三十丸

空心溫米飲送下

金匱湯治小兒下痢赤白或先因寒邪中臍腑致發熱者

紫胡

去芦

前胡

去芦

人參

去芦

茯苓

去皮

羌活

去芦

獨活

去芦

枳殼

去穰炒

桔梗

去芦

川芎

甘草

陳倉米

各半分

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗二枚煎至五分
不拘時服

真人養臟湯治小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急
後重脾腹病痛脫肛墜下熱毒便血並皆治之

罌粟

去頭換蜜炙

人參

去芦

當歸

去芦消沒各五錢

肉桂

去皮三分

訶子

去核六錢

木香

不見火七寸

肉豆蔻

麪裹煨二錢半

白术

培土培土三分

白芍藥

八錢

甘草

生九錢

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服如癓寒者加

附子煎服

駐車丸治小兒一切下痢無間冷熱

阿膠

葛根皮或珠葛本半兩半錢或蜜日一

黃連

去根三兩

當歸

去根一兩半

乾薑

一兩

右為末以阿膠膏為丸如菉豆大每服二三十丸食前用

米飲送下

道氣湯治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥

一兩

當歸

五分

大黃

一分

黃芩

一分

黃連

一分

木香

一分

擯榔

各一分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服

神効參耆散治小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血
或如豆汁或如魚腦或下瘀血及紫黑血或赤白相雜裏
急後重日夜頻併無間新舊並皆治之

白扁豆

人參去芦

木香各一

白茯苓去皮

肉豆蔻

煨各二兩

陳皮去白

粟殼去筋膜

名六兩

木香兩

聖姑散治久痢

右為細末每服一二錢不拘時用米飲湯調服

赤石脂

煅

白龍骨

阿膠各一兩

健脾炒研子肉各去核

木香炮

黃連

乾姜

甘草半兩

右為細末每服一二錢煎粟米飲湯調空心服

羣腸丸治血崩脫肛

川練子

去核

黃連

沙各一兩

木香炮

阿膠

煅炒去核

當歸酒洗

各二兩

吳茱萸

同黃連一兩

半兩

右為細末粟米飯為丸如黍米大每服二三十丸食前水湯送下

感應丸治小兒停積宿食苓物不能消化有傷脾胃或泄瀉臭

如抱懷雜子或下刺腰血服北通利

百草霜用村家鍋底上

杏仁

云皮尖要肥者

巴豆

去皮心膜此由研細如粉三十五兩

肉豆蔻

去壳川乾薑

南木香

去皮半錢一兩

丁香

七分

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味杵為細末與前三味同拌研令細用瀝置先將蠟三兩溶化作汁以重錦懶去滓更以好酒半升於銀石器內溶蠟瀝數沸傾出候酒令其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏脩合用清油半兩秋冬用清油七錢半於銚內熬令香熟次下酒煮蠟工兩同化作汁就鍋內粟熱拌和前項藥未成劑分作小錠子以油單紙裹之旋丸如菉豆大每服三五丸空心薑湯送下消食丸又名消乳丸消積滯化乳食

砂仁

橘皮

炒

京三棱

炒

蓬莪术

炒

神龜妙

麥蘖妙

甘草半兩

香附子妙一

右為細末湯浸蒸餅為丸如麻子大每服三十丸食遠白
湯送下量兒大小加減

水耆丸治乳積食積氣積

木耆

蓬木

砂仁

青皮去白

朱砂細研

代赭石二味研

石

大丁香一錢

巴豆肉

細研六味一錢

右為細末和匀飛白粉糊丸如麻子大風乾每服三十五丸
至十丸乳傷乳汁下食傷米飯下不拘時

七聖丸治小兒宿食不消肚腹飽悶

京三棱

蓬莪术

川練

內取

青皮去穰

陳皮

去白

杏仁去皮

去皮

芫花

先用醋浸

一宿沙漬乾

入三錢

蓬莪术同研

末

白芨入

蜀安川

鹽一兩研

末分各半

月水

右前件爲細末另入杏仁細研一兩醋糊丸如黍米大每服三十丸臨睡熱水送下使日間所食之物一夜而消化未無疳疾之證一方用巴豆十粒同杏仁研末辦積者可用當服只用杏仁七聖丸也

異香散治小兒食積過飽飽後噫酸調理脾胃

石蓮肉

一兩蓬莪术

益智仁

京三棱

甘草各

三

青皮去穰

陳皮各二

夏枯草

姜汁炒半斤

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片棗一枚鹽少許煎至五分不拘時服化未淡鹽湯調服亦可

縮砂香附陽治小兒噫宿腐氣心腹膨脹或時冷痛

香附子

五枚去毛

烏藥

二刀

縮砂去皮

粉草

一斤

右爲細末每服一錢紫蘇三葉盐少許煎佛湯調下不拘

時服如大便秘橘皮湯調服又名寬氣散

敷神丸治小兒宿食留飲積聚中脘噫酸氣悶

人參

縮砂

香附子炒去毛去子

三棱炮

義木燂

青皮

陳皮

神曲炒

麥蘖沙

枳殼炮去白分

米湯下

右為末煮粳米鴉爛為丸如黍米大每服三五十丸空心
米湯下鹽湯服亦可

七香丸消食恢肺和胃氣止腹痛

木香

丁香

檀香

甘松

丁皮各一兩

陳皮去白

縮砂仁去殼

三棱醋煮

蓬术正一兩

白豆蔻各二錢

益智仁三分

香附子炒去毛去子

石為細末水糊丸如麻子大每服三五十丸食遠淡薑湯
送下米湯亦可

保和丸治小兒脾胃虛弱飲食不能消化日久羸瘦

糖
桂

四兩

陳皮

茯苓

半夏

麵各五

蘿
菊
子

三分

白
木

史均
子肉

神
曲

麥
蘖
酪

一分

木
香

錢二分

砂
仁

四兩

黃
連

五分

右為細末水發為丸如蘿菊子大每服一錢不拘時米飲

湯送下

褐丸子治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不調心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癟乳癖痃氣痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳食及療五種疳氣八種痢疾肌肉消瘦氣餒腹大神色昏憤情意不樂常服散冷熱調和臟腑去疳積止瀉痢進飲食生肌肉悅顏色功効非常不能盡述

蘿
菊
子

三兩

陳皮去白

三分

白
朮

三分

史均
子肉

神
曲

五分

京三棱炮

蓬术

一兩半

胡椒

半兩

木香

二兩半
不見火

黑草牛

一兩半
生用

一半
炒

右為細末水煮麪糊為丸如麻子大每服二三十丸空心用蘿蔔煎湯或姜湯送下量兒大小加減服之

長生丸

治小兒清上實下補脾治痰及治傷食乳不消化大便

酸臭

木香

半兩

擯榔

三兩

全蝎

二十隻去毒

枳殼

一兩去殼
炒裹煨

丁香

半錢

肉豆蔻

縮砂

半錢

半夏

姜湯泡各三錢

七錢

右除肉豆蔻外七味為細末次入肉豆蔻再研極細末用米飲和丸麻子大每服三五十丸空心乳汁或米湯送下

○丁奚嘯露

十金丹治小兒手足極細項小骨高兒削體瘦腹大脣突號哭智隔或成穀穢是名丁奚虛熱住來頭骨分開翻食吐虫

煩渴嘔噦或是為嘔露二者皆因脾胃火虛不能消化水穀
不禁血氣致肌肉銷鏠腎氣不足復為風冷所傷榮骨疽
露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無毒種類之疾並
難治宜服此藥

青皮去白

陳皮去白

蓬木僵

白豆蔻仁

川芎

五靈脂

薑薑

雞心檳榔各半

木香

蝦蟆灰

史均子肉培各

三錢

右為細末用猪膽汁浸糊丸如麻子大每服二三十丸
不拘時米飲送下有熱薄晈湯下亦可

麝香進食丸治小兒脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌肉不榮
羸瘦痰氣不宣吸吸苦熱及頭骨門解翻食吐虫煩渴嘔
噦並背治之

麝香另研

當歸酒流

枳殼去穰

各半兩

木香

炮代赭石

煅硃砂另研各一錢

巴豆

去油

右為末麪糊丸如麻子大每服三五丸食後姜湯送下

搽癬丸治小兒穀癩等證

青皮

去白

木香

蓬木

代赭石

研細末

五靈脂

去砂石

大黃

各三錢

巴豆

去油

右為末醋糊丸如棋子大每服三五丸食後姜湯送下

○鶴膝

錢氏地黃丸治小兒羸瘦不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈

露如鶴之膝

熟地黃

八錢培山藥

乾山藥

各四錢

澤瀉

白茯苓

去皮牡丹皮各三錢

加龜茸

酥炙

川牛膝

各二錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服三錢已下一丸三歲

已上二丸空心溫水化下

○ 沐辨寒氣

木香名治小兒癰癬癩

木香

蓬术

砂仁

青皮

代諸石

板研珠砂

研細各半

大丁香

川巴豆

紙裹去油各一錢

右為細末和勻飛白麵糊為丸如麻子大每服三五丸乳
積乳汁下食傷米飲湯下不拘時服

代赭丸治小兒腹中結癖塊痛

代赭石

研細各半

川大黃

各半

木香

五靈脂

朱砂

川大黃

各半

木香

辣桂

巴豆肉

六分半

桃仁

浸皮去

桂枝

右為細末湯浸樣糊為丸如麻子大每服五丸姜湯下
不拘時服

五味丸治小兒一切食積

青皮

生黄

乾姜

炮茱萸

五灵脂

蓬术

醋

巴豆霜一錢

右為細末搗米飯為丸如麻子大每服三五丸米湯送下
不拘時服

廣茂滑堅湯治小兒痃癖腹有積塊堅硬如石

草朴

黃芩

當歸

草豆蔻仁

黃連

半夏

廣茂

益智仁

紅花

吳茱萸

升麻

生甘草

紫胡

澤鴻

神曲

青皮

橘皮

三分

如渴加葛根四分

右作一服水一鐘先浸少時煎至六分食前服

木鱉膏貼小兒癬

木鱉子

去皮獨蒜

椎黃

半

右件同紙為膏入醋少許攤於蠟紙上貼患處

○腸滿積聚

肥氣丸治肝之積在左脇下如覆盆有頭足如散魚一枚久不愈發疾癰嘔吐其脉弦而細

當歸頭

卷之三

青皮妙用

蛇舍石

七言聯半津

卷之三

三
稜

鐵滑粉各

卷三
錯
考

卷之二

右為末，醋煮米糊為丸，如麻子大。每服四五十丸，食遠用當歸浸酒送下。

息青湯治肺之積在右脇下大如覆杯又不愈病酒洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰其脉浮而毛

半夏七湯

大选

吳茱萸

洗

桂心

10

人参

井草文

* 1

梨白皮丸

6

華嚴經疏

右剉碎每服五錢水一盞生薑五片棗二枚煎至五分食

前溫服

散瘀湯治久氣積聚狀如癰腫隨氣上下發作有時心腹絞痛
攻刺腰脇小腹脹脹大小便不利

半夏

湯洗七次

檳榔

當歸

絡七

陳皮

去白

杏仁

去皮尖端炒熟

桂心

各二錢

茯苓

甘草

炙炙炙炙

附子

炮去皮

川芎

枳殼

麸炒

厚朴

姜制

吳茱萸

湯泡各一錢

利加大黃

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服如大便不利加大黃

伏梁丸治心積起於脐上至心大如臂久不愈病煩身熱脾股
皆腫環脐而痛其脉沉而芤

茯苓

厚朴

人參

枳殼

麸炒去殼

白朮

半夏

湯泡

三棱

炮各一錢

右為末水煮麵糊為丸如麻子大每服二三十丸米飲不拘時服作散酒調服亦可

痞氣丸治脾積在胃院腹大如盤久不愈病四肢不收黃疸飲食不為肌膚急痛微背脊痛微心其脉浮大而長

大烏頭

炮去皮洗
二兩半

附子

炮

桂心

炮半
兩

赤石脂

炒醋川椒炒出
半

乾姜

炮各
兩

右為細末煉蜜為丸如麻子大珠砂為衣每服一二十九丸不拘時用米湯送下

奔豚湯治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨蒸少氣其脈沉而滑

甘李根皮

培乾葛各一
二兩半當歸

川芎

白芍藥

甘草炙
二兩半

黃芩

略二

半夏

易泡七次
二天半

右剉碎每服五錢水一鐘生姜三片煎至六分不拘時服

天七氣陽治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹脹

痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

益智仁陳皮去白京三棱蓬术

青皮去白桔梗去芦肉桂不見

甘草炙半兩半香附子炒去毛

一兩半

右剉碎每服五錢水一鐘煎至五分食前服

香稜丸治五積破瘀癖消癰塊及冷熱積聚

木香不見丁香各半

京三棱酒浸

枳殼去皮

青皮去白川練子炒各

茴香炒各

一兩

蓬术一兩桂枝去皮同炒黃色去皮正不用

巴豆三十

不用

右爲細末臘煮麵糊爲丸如棋子大硃砂爲衣每服二十丸少生姜益湯下溫服亦可不拘時服

○腹痛

四順清涼飲治小兒熱證腹痛血熱虛結壅滯

。

大黃日乾上茶赤芍藥當歸

甘草微炙

加青皮

桔梗各半錢

右為粗末每服三錢水一鐘煎至五分不拘時服

指迷七氣湯治小兒冷證腹痛面青四肢冷

辣桂

青皮

陳皮

桔梗

三棱

蓬莪术

薑香

益智仁各一錢

香附子

半兩

甘草炙

加半夏

各半錢

右為粗末每服三錢水一鐘生姜三片紅棗一枚煎至五

分調和化蘇合香丸不拘時服

蘇合香丸治小兒卒暴心腹疼痛亦能順氣化痰驚搐瘧瘧時

方見氣門

當歸散治小兒胎寒腹痛面唇青身溫肢冷多啼

當歸炒

黃芪蜜炙

北細辛去皮

肉桂去皮

陳皮去白

白姜炮

縮砂仁

甘草炙各等分

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片糯米五十粒煎至五

分空心服

立積散治小兒中寒腹瀉手足厥冷寒顫口噤暈門口吐涎沫

不能啼哭

白芷

川芎

甘草炙

茯苓去皮

當帰去芦

肉桂去皮

芍藥各三

陳皮去白

枳殼去蕊

麻黃去根節各六朱厚朴四朱去皮委圓搘梗兩二朱

大腹皮炮乾姜四

半夏皮炮七朱加附子炮

蒼朮米泔浸兩副

葛根四兩

甘草各二

桑葉蔓炒各等分

右為末每服五錢水一鍾半生姜三片紅棗二枚煎至七分子母同服不拘時

一方用食鹽同茱萸炒裝綃袋內熨兒臍腹上下

○心痛

鈎藤膏治小兒稟受虛怯邪干心痛及內吊夜啼面唇青今

乳香細末心五靈脂

浸藥

當歸各

麝香一字

右為末煉蜜為丸如豌豆大百日內兒一丸煎鈎藤湯化
下一歲二丸三歲三丸或乳香湯化不拘時服

乳附丸治小兒胃冷腸寒心腹疼痛便清泄瀉啼叫有汗

附子炮去皮

乳香

當歸

詞子炮去核

桂心

乾姜炮

吳茱萸各等分

右為末酒糊為丸如麻子大每服三十九吊藤湯或米湯
食前送下量兒大小加減與服

蓬仙丸治小兒心腹刺痛

桂心去皮

乳香

蓬莪术生研各五分

右為末酒糊為丸如麻子大一歲兒服二三十丸食前鈎藤湯下量兒大小加減

參香丸治小兒心腹疼痛及腸冷便青

乳香

木香

石菖蒲

人參

良薑炒各等分

右為末酒糊丸如麻子大一歲兒十丸食遠米飲湯下量兒大小加減

化虫丸治小兒虫咬心痛來去不定不思乳食

鵝虱炒

檳榔

胡粉

苦練根各半

白藜炒

三件心

右為末白糊為丸如麻子大三歲兒三五十丸用溫水入油三五滴食前下有小虫皆化為水大虫自下月初服

甚妙

安虫先治小兒虫咬心痛因上焦中焦虛冷胃寒所作

乾漆

炒半
研細

黃芩

巴豆

霜二
錢

右為末白糊為丸如麻子大三歲兒三十丸煎石榴根湯

食前送下量兒大小加減

遣虫丸治小兒虫動心腹痛啼叫口吐涎沫

擗榔

炒各
分

蕪荑

去皮

雷丸

定粉

鵝虱

炒各
分

右為末煎苦練根湯調白麵打糊為丸如麻子大每服三十九食前空心子湯送下千金方云虫攻下部燒艾葉烟熏之

○浮腫

實脾散治陰水浮腫用此先實脾上

厚朴

姜皮去皮

白术

木瓜

去穰

木香

不見火

乾姜

炮

草果仁

大腹子

附子

炮去皮

甘草

炙

白茯苓

去皮各一兩

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗一枚煎至五分

不拘時服

大橘皮湯治小兒濕熱內攻心腹脹滿并水鍾小便不利大便

滑泄

橘皮

取白兩半

茯苓

去皮一兩

木香

甘草

各二半

楂榔

三錢

滑石

火硝細末

白朮

猪苓

澤瀉

肉桂八分

肉桂

八分

右剉碎每服三錢生姜三片煎至六分不分不拘時服

苦蘚木香散治暑濕傷脾水鍾腹脹小便赤大便滑

葶苈

木香

茯苓

肉桂

滑石

猪苓

澤瀉

木通

牛草

白术

分各等

澤瀉

右為末每服一錢不拘時白湯調下

二物湯治小兒患氣急積久不癆遂成水病攻面且身從腰以

上腰腫並當發汗

麻黃

去二兩即

甘草

五分

右剉碎每服五錢水一鐘煎至五分不拘時服

牡礪散治大病差後腰以下有水氣者

牡礪

煅

澤瀉

洗炒

蜀漆

洗炒

商隆

蕕薢

海藻

括樸根

分各等

右為末每服一錢用燈心煎湯調空心服量兒大小加減
牽牛丸治小兒脾氣頭面浮及四肢腫

黑牽牛

半生半炒

白牽牛

半生半炒

青皮

陳皮

分各等

右為末麵糊為丸如麻子大每服三十丸不拘時米湯送
下

小兒小腫常服自消

五皮散治小兒諸般浮腫氣急可食

桑白皮

大腹皮

茯苓皮

陳橘皮

姜皮

各等分

右剉碎每服五錢水一鍾紫蘇三五葉煎至五分不拘時
服滌察方用五加皮地骨皮

內消丸治小兒頭面手脚虛腫

丁香

十四去核

木香

炮一

青皮

去穰

防風

巴豆

七個去核

右青皮搗碎同巴豆炒黃去巴豆不用將青皮研末入餘
藥末內和勻用麵糊為丸如麻子大每服二三十丸不拘
時男女孩兒搐風湯送下女孩兒艾葉湯送下

謂氣散治小兒一切浮腫

木香

二分
半包

陳皮

蘿蔔子

研細

甘草

五分
各

赤小豆

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗二枚煎至五分不拘時服量兒大小加減

○腹脹

中滿分消湯治中滿寒脹寒痞大小便不通陰躁足不能收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下焦沉厥

益智

半夏

木香

桔梗

升麻

各七
分半

川烏

炮皮
去

人參

青皮

當歸

生姜

柴胡

乾姜

草澄茹

黃連

各半
分半

黃芪

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

黃蘖

各一
分半

一方有麻黃

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服忌濕廻生

冷硬物

中滿分消先治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹

黃芩去膚

人參去苦

白木

姜黃

黃連
鈎蟲
炒

半夏湯
七味

枳實

猪苓

甘草一
炙各

白樅谷

縮
砂

乾生

夏朴一義
刀鑄表

知母剉炒

澤鴻

陳皮

右各味為細末和勻水浸蒸餅為丸如麻子大每服五十丸用白湯不拘時服

四炒丸治小兒氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼炒黃豆

酸切作片，用蘿蔔子

用營不一兩同
炒黃去蘿蔔子

一分用乾漆一丙同炒黃去乾漆一分用茴香一兩
同炒黃去面香不用止用砂糖碾為極細末

右用同妙蒼木等四味藥用水三碗煎至一碗去滓將蒼
木寺藥汁羹麵糊為丸如麻子大每服五十丸食遠用米
飲湯送

瘡氣丸治小兒疳腹脹喘急并面浮腫

丁香

胡椒

炒半分

蘿蔔子

炒半分

白牽牛

生半分

右為細末白麵糊為丸如麻子大三歲兒三十丸食前用
米湯送下量兒大小加減

消氣丸治小兒疳氣腹脹喘急

木香

二分另研

半蘿蔔子

五分同巴豆

三分半

炒黃色去巴豆

不用

半

右為末麵糊為丸如麻子大每服二十丸不拘時米湯下
量兒大小加減

導氣丸治小兒腹脹氣急

京三棱

青皮

蘿蔔子

炒半分

皂角

酥者

者

黑牽牛

半生半炒各等分

右為末麵糊為丸如麻子大每服二三十丸不拘時用米湯送下

○口瘡

鴟心湯治小兒心臟積熱薰蒸上焦口舌生瘡

宣黃連

去鬚一錢

右為細末每服一字至半錢或一錢臨睡白湯調下

七寶洗心散治小兒壯熱煩躁風熱上壅心經積熱口苦唇燥

眼聾多淚大小便秘澁

大黃

溫熱各等分

甘草

炒

當歸

酒洗

麻黃

不去節三分

芍藥

荆芥穗

各二分

白朮

三分

半二

右為粗末每服三錢水一鍾生姜二片薄荷三葉煎至五分食後服

涼膈散治小兒臟腑積熱口舌生瘡

連翹

甘草

黃芩

川大黃

朴硝

梔子

薄荷葉

分等

右剉碎每服五錢竹葉五葉蜜少許煎至五分食後服
大連翹飲子治小兒上焦壅熱口舌生瘡小便赤澁

連翹

瞿麥穗

滑石

牛蒡子炒研

車前子

赤芍藥

一木通

山梔子

川當歸

防風各

半

黃芩

荆芥穗各一兩

柴胡去

甘草炙各

半

蟬蛻去足二

錢半

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

鴻黃飲子治小兒風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼去白

炒

黃芩

防風去芦

半夏湯洗

七次

石斛各一

錢半

甘草半兩

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服
榔花散治小兒口舌生瘡

玄胡索

黃連

黃檗

青黛另研各

蜜陀僧

另研各三錢

右為細末每用少許貼口瘡上有津液吐出頻用不拘時
一方治小兒心有客熱滿口生瘡

用天南星末醋調貼兩脚心有用吳茱萸末米醋調空亦

一方

用黃連細末以蜜水調抹口中患處

一方

用黃柏末青黛等分腦子少許另研入藥次水調抹乾亦可

○眼疾

小防風湯治小兒熱毒眼患

大黃蒸

山梔子

耳草炙

赤芍藥

川當歸洗

防風

羌活分等

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後用

小兒氣飲治小兒風毒眼患

蟬蛻去足

甘草

羌活

天麻

川當歸

防風

大黃

赤芍藥

薄荷

杏仁各等

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後用

生熟地黃湯治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明怕日及至開眼

有如內瘡矇矇失所

生乾地黃洗

熟乾地黃

洗各

麥門冬五分心

川當歸

枳殼炒

米泔浸一宿去皮

半錢

赤芍藥

防風

甘草

赤芍藥

二錢

右剉碎每服五錢水一鍾黑豆七粒煎至五分食後服
小菊花膏治小兒積毒眼患

黃連

黃芩

大黃

菊花

羌活

蒼朮

米泔浸

荆芥穗

防風

右等分爲末煉蜜爲膏如小指大每服一餅細嚼白湯化
不拘時服

密蒙花散治小兒瘡痘并諸毒眼服

密蒙花

二錢半青葙子

決明子

車前子

各半

右爲末羊肝一葉搗開作三片摻藥令勻仍合作一片用
湿紙七重裹於灰中煨熟空心食之

牛黃丸治小兒失誤築打觸着頭面額角薰倒撲令兒肝受驚
風遂使兩目睛闇名曰通睛

牛黃

白附子

燒

肉桂

全蝎

芎
薑

石膏

酒過半

白芷

藿香五錢

殊砂二錢

鹿麝香二分半

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薄晉湯化食後服
通頂散治眼疼風熱腫脹作楚

瓜蒂

藜蘆

洛一

毛角肉半錢

麝香少許

右為末每用少許吹入鼻中

○鼻

貼顴通關膏治小兒被乳母鼻息咬着兒顴令兒鼻塞不吃乳

荆芥

一兩

香附子

炒五錢

白僵蚕

洛七錢

半錢

半

半

半

半

半

半

半

川芎

一兩

細辛

五錢

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

消風散治鼻塞冒運頭目不清

人參

川芎

羌活

白葵苓

白僵蚕

藿香葉

防風

荆芥穗

甘草炒

蟬殼各

厚朴製

陳皮各半

右為細末每服一錢或半錢食後用防風荆芥湯調服
辛夷散治肺虛為四氣相干鼻內壅塞涕出不已氣息不通

川芎

木通

防風去芦

甘草炙

辛夷仁

細辛桂土

藁本去芦

升麻

白芷

各等分

右為細末每服一錢食後茶清湯調服

噙化蘇澄茹丸治小兒鼻塞不通

蘇澄茹

半兩薄荷

三分

荆芥穗一斤半

右為末凍蜜丸如芡實大每服一丸噙化津嚥如小噙不得用薄荷湯磨化服不拘時

○肺耳

牛角飲子治小兒風熱上壅兩耳龍耳閉內外腫痛膿水流

牛角

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆炒

甘菊花

各一錢根甘草半兩

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服
龍骨散治小兒聰耳膿出不止久不瘥成龍耳也

龍骨一錢

黃丹

炒七分枯礬

麝香少許

胭脂四分

右同研令細先以綿杖子撫去耳中膿用竹筒納藥少許
吹入耳內勿令風入本方加海螵蛸半錢亦妙

花胭脂膏治小兒聰耳常出膿水不止

花胭脂

白龍骨

枯礬

白石脂各一

右研如粉用蒸棗和丸如棗核大以綿裹一丸塞耳中日

三換之

紅綿散治小兒聰耳出膿及黃水

白礬

一錢半

麝麝香少許

右為細末研勻用綿杖子擦去耳中膿水用竹筒納藥少許吹入耳中

○脫肛

敗毒散治小兒久痢邪入大腸脫肛墮下

方見前

養臟湯治小兒久痢寒熱門出不收

五倍子

白礬

蛇床子各等分

右為末水煎浸洗後用赤石脂為末以少許摻在芭蕉葉上頻用托入

靖皮散治小兒肛門或因洞泄或因用力過多脫出不收

靖皮

一錢半

磁石

一錢半

桂心

各半

右為末每服一錢空心米飲調下

香荆散治小兒脫肛

香附子

炒去半

荆芥穗

二兩

右為末每用五錢水一大碗煎熟淋洗

又方

用草麻子四十九粒研爛水調作餅子貼頂門上即收

○陰癩

茱萸內消丸治小兒陰癩偏大上攻臍腹疼痛脣囊腫脹或生瘡瘍時出黃水

川練

炒一
及半

大腹皮

五味子

海藻

洗

玄胡索

各一
半

茴香

炒

桂心

川烏

炮去
皮附

吳茱萸

各一
半

桃仁

炒研

食茱萸

各五
分

木香

半
子

桔梗

青皮

山茱萸

炒一

右為細末酒糊為丸如麻子大每服三十丸空心溫酒送下
當歸散治小兒癩病

牽牛

微炒取仁半錢

辣桂

各半錢

當歸

大黃

各二分半

全蝎

一钱半

桃仁

浸去皮尖二分半

右剉碎每服三錢水一鍾入蜜半匙煎至五分食前服以利為度

川練散治小兒癩病小腹痛引腰脊攀曲身不能直

木香

擗榔

三棱

蓬木

炮

青皮

去白

陳皮

去白

川練肉

芫花

米醋浸炒半两

辣椒

牽牛

生取仁各三分

巴豆

不去油不炒

右為細末飛麵糊為丸如麻子大每服三丸空心用生姜湯送下

牡蠣散治小兒外腎腫大壅物透明

牡蠣粉二錢
乾地龍一錢

右為細末用津唾調傅久腎熱背雞子清調傅

○陰瘡

木通散治小兒小便蘊熱溫毒邪于留熱於膀胱故生陰瘡

木通去皮

萹蓄去梗各

赤茯苓去皮

甘草去皮三

瞿麥去梗各

滑石末

山梔仁

車前子

黃芩各二

右剉碎每服五錢水一鍾燈心十根薄荷五葉煎至五分
食前服

膾茶散治小兒陰囊生瘡疼痛水出久不癒

膾茶

五倍子各五
膾粉少許

右為末先用葱搗湯洗然後用香油調貼

一方治陰囊生瘡疼痛

右先用川椒、荆芥、槐枝、柳枝、蛤床子煎湯洗後用朴硝為末雞子清調敷

一方治陰生瘡不乾

右用烏賊骨為細末乾貼瘡患處

一方

用紫蘇葉煎湯淋洗又作末貼之妙

一方治小兒陰瘡不乾

右用輕粉密陀僧為末貼之如癬加山梔子訶子燒存性研同前藥為末先將米泔水洗瘡淨然後敷貼此藥

○天釣

釣藤飲治小兒天釣風潮熱四肢抽掣

釣藤

人參

犀角

各半

甘草

半兩

全蝎

天麻

各半

右為篋末每服一錢半水一鉢煎至四分不拘時服

釣藤飲治天吊風搐

釣藤

犀角

天麻各七

全蝎五箇

木香

甘草各五

右作一服水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

釣藤飲子治驚風天吊卒然驚慄眼目翻騰

釣藤

分五

麻黃去節

甘草三分

天麻

川芎

防風

人參各七

全蝎炒去毒五箇

蠶蚕

箇七

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

牛黃丸治小兒一切驚風五癎天吊客忤瘥癰四肢抽掣

白花蛇

酒浸

白附子

全蝎

川烏

一隻重半兩
生用去皮

葛根半

巴戟六

味先為細末次入

天麻

薄荷

茶半

巴戟六

味先為細末次入

雄黃

半兩

辰砂

三錢

牛黃

一錢

麝香

片腦

各半兩

右件為細末一撮和勻麻黃去節二兩酒一升煎麻黃至
一盡去麻黃用酒入蜜少許熬成膏劑前藥末為丸如芡
實大用金箔為衣每服一丸用薄荷湯化下大能發散風
塗頂膏治天吊風備急

烏頭

生用去皮附子

芸薹子

絡二錢

右為末每用一錢新汲水調敷兒頂上

天漿子散治小兒天吊驚風

天漿子

炙

蝎梢

犀角

屑

丹砂

另研

雄黃

另研

附子

去皮附子

南星

炮去皮

白附子

半夏

水銀

另研

乳香

另研

白僵蚕

膩粉

另研

朱黃

另研

各麝香

一字

銀箔

另研五片

右為細末和勻每服一字用薄荷湯調下量兒大小加減

青黛丸治小兒天吊客忤五疳，一劑十二種驚癇

青黛

天竺黃

乾蝦蟆

去屎

一箇黃泥包裹燒赤

乾蝎牛殼

黃連

人參

地龍

去土

釣藤沙

龍膽草

各二分半

熊膽

一分半

牛黃

麝香

雄黃

丹砂

各一分

夜明沙

去土

胡黃連

各三分

右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三丸空心米飲湯

送下

再生散治小兒夫釣鱉風潮搐項筋緊強手足厥冷

烏蛇

酒浸

天棘

南星

鹽炙

全蝎

沙子二升去毒各半

麝香

威靈

五

大砂

二升另研

牛黃

另研

西附子

炮

各為細末
水煎

金銀

湯調下量大

三白散治小兒盤腸氣吊先服此藥後服

牛蒡根

白芍一兩

白木

炒

大皮

甘草

陳皮

白牽牛
各三子

木通

各三子

大皮

陳皮

右為細末每服半錢用生薑湯調不拘時服

鈎藤膏方見心痛類