

婦
科
玉
尺

沈氏尊生書卷五

婦科玉尺

沈金齋撰

帶下

帶下之因有四。一因氣虛。脾精不能上升而下陷也。一因胃中溼熱及痰流注于帶脈。溢于膀胱。故下獨液也。一因傷于五臟。故下五色之帶也。一因風寒入于胞門。或中經脉。流傳臟腑而下也。然有赤白之分者何也。赤者屬血。屬熱。熱入小腸而成。若實熱鬱結。則爲赤白兼下。白者屬氣。屬寒。寒入大腸而成。因血少復亡其陽。故白滑之物下流。亦有溼痰流注下焦。或肝腎陰溼之溼。或緣驚恐而木乘土位。濁液下流。或色慾太甚。腎經虧損之故。或產多之婦。傷血傷液。皆能成帶下之疾。宜概用蓮鬚杜仲續斷之輩。大抵屬痰與熱者居多。以溼熱下注而化痰也。宜投止滌升提之品。寒

者十無一二。宜投鹿角膠溫滋之品。然總要健脾燥溼升提胃氣。
佐以補滻如茯苓白术柴胡川芎之類。總之婦人多鬱鬱則傷肝。
肝傷則脾受尅。溼土下陷。脾精不守。不能輸爲營血。而白物下流。
宜開鬱補脾。若色如濃泔臭穢者。溼熱甚也。宜二术芩柏半夏車
前佐以升提下如雞子白狀。脾腎虛也。腰腿痠疼。面目浮腫。必脾
腎雙補。八味丸婦人又多憂思恚怒。傷損心脾肺臟之火。時發。
血走不歸經。而患赤白帶下。白是脾虛。蓋肝氣鬱則脾受傷。脾傷
則溼勝。皆由風木鬱于地中使然耳。宜開提肝氣助補脾元。宜補
氣湯加茯苓桑白皮山藥蒼朮黃柏麥冬
或六味丸加杜仲牡蠣牛膝海螵蛸火爲要子
黃柏車前兔絲子昔人云。崩中日久。變爲白帶漏下。
多時骨水枯竭。何謂也。蓋崩久氣血虛脫。故白滑之物。下流不止。
也必大補之。赤帶多因心火。時熾不已。久而陰血漸虛。中氣漸損。

而下赤矣。必養心和肝，緩中涼血，清氣之品。若赤帶久不止，必血虛矣。宜膠艾四物湯加麥冬杏仁牡蠣。帶下之因，不外乎此。其詳更有可述者，如白帶腥臭，多悲不樂，陽氣虛衰者，大寒也。宜桂附湯脉息沈微。赤白帶下，腹中痛，陰中亦痛，經來愆期，子宮虛冷，不能成孕者，寒甚也。宜元戎六合湯。白帶久不止，臍腹冷痛，陰中亦痛，經水不止，或因崩後，脉弱無力而瘦疼，由于虛也。宜東垣固真丸。產後去血多，經水不調，白帶如傾瀉，濕臭穢，亦由虛也。宜痛生湯。內熱脈數，赤白帶下不止，由于熱也。宜杞子生地散。或二黃三白丸，白芷散，肥人白帶，陰戶痛，身黃皮緩體重，由于熱也。宜升麻葛根湯。溼而挾熱，大便或泄或閉，小便塞，脉濁而氣盛，溼熱也。宜十全大補湯。下身畏冷，帶下如雞子白，脾腎虛也。宜補骨肉漏血。久冷，赤白帶下，月大不調，面黃肢弱，經水或多或少，如梔子生地散。

子汁如屋漏。水血虛而寒也。宜八珍湯加升麻南。帶下方白帶溼水不絕。精神虛損也。生夏陳皮香附。血氣不調。溼熱白帶。四肢倦怠。五心煩熱。痰
癆增雜也。宜解帶散。脉數而白帶不止。七情所傷也。宜側柏皮丸。女人癥瘕
痃癖。腹脹胸滿。赤白帶下久患。血氣虛弱。痿黃無力。乃由寒溼也。宜宣萬安散。赤白帶下不止。燥熱煩渴。由溼熱鬱于下焦之分也。宜明導水。
勞役過度。飲食不節。損傷脾胃。以致陽氣下陷。白帶久不止也。宜補中丸。時時帶下。由胃虛有痰。飲食減少。中氣不和也。宜六君子湯。健忘。恆驚悸。不寐。怠惰體困。不思飲食。時常白帶不止。由思慮過
傷。心脾也。宜歸脾下冷。據痛陰冷。大寒而白帶時下也。宜延胡
脾湯。勞。傷血脉胞絡。受寒。小便白濁。日夜無度。臍腹疼。痛腰膝無力也。宜苦棟湯。
金鹿癩。白帶下注。腳氣。腰以下冷。尿數與白帶長流而不禁。固
茸丸。肌瘦。身重。面白。目無見。行步欹側。腿膝枯細。大便閉。心下痞悶。懊

懷飲食不下。背寒此上中下三陽真氣俱竭也。故噦呕不止爲胃寒已極。脈沈緊而澀。按之空虛爲陰寒已竭。宜酒煮當歸丸老年白帶白淫不止。日久淋澀皆氣多血少虛寒力衰也。宜老年白帶方十全大補湯加益智仁室女帶下純白衝任虛寒也。宜白朮丸寡婦師尼室女鬱火盛熾陰戶或痒或痛而成赤淋乃血熱也。宜瀉膀胱之火宜赤其或白淋則氣虛也。烏金丸如是以治帶病寧有或遺哉。

脉法 脉經曰：診婦人漏血下赤白。归下血數升。脉急疾者死。遲者生。又曰：診婦人漏下赤白不止。脉小虛滑者生。大緊蹇數者死。又曰：婦人帶下脉浮惡寒者不治。又曰：婦人帶下六極之病。脉浮則爲腸鳴。腹滿緊則爲腹中痛。數則爲陰中痒痛。生瘡弦則陰中掣痛。李梴曰：腎脉浮遲主患帶濁。

帶下原由症治 孫思邈曰：諸方說三十六疾者十二瘕九痛。

七害五傷三痼不通是也。何謂十二痼。是所下之物。一曰狀如膏。二曰如黑血。三曰如紫汁。四曰如赤肉。五曰如膿痴。六曰如豆汁。七曰如葵羹。八曰如凝血。九曰如清血。血似水。十曰如米泔。十一曰如月浣。乍前乍卻。十二曰經度不應期也。何謂九痛。一曰陰中傷痛。二曰陰中淋瀝痛。三曰小便卽痛。四曰寒冷痛。五曰經來腹中痛。六曰氣滿痛。七曰汗出陰中如有虫噉痛。八曰脇下分痛。九曰腰膀痛。何謂七害。一曰竅孔痛不利。二曰中寒熱痛。三曰小腹急堅痛。四曰臓不仁。五曰子門不端引背痛。六曰月浣乍多乍少。七曰害吐。何謂五傷。一曰兩腹支滿痛。二曰心痛引脇。三曰氣結不通。四曰邪思洩利。五曰前後痼寒。何謂三痼。一曰羸瘦不生肌膚。二曰絕產乳。三曰經水閉寒。病有異同方亦不一。又曰三十六種疾。皆由子臟冷熱勞損而下起。

于陰內也。陳自明曰：帶下有五因：經行產後邪入胞門，傳于臟腑而致之。若傷足厥陰肝經，色如青泥；傷手少陰心經，色如紅津；傷手太陰肺經，形如鼻涕；傷足太陰脾經，色如爛瓜；傷足少陰腎經，黑如蚯血。人有帶脈橫于腰間，如束帶之狀，病生于此，故名爲帶。成無己曰：東垣云：血崩久則亡陽，故白滑之物下流，未必全拘于帶脈，亦有溼痰流注下焦，或腎肝陰淫之溼勝，或因驚恐而木乘土位，或思慕爲筋痿，或人以六脉滑大有力，用宣導之法，此鴻其寔也。東垣以脈微細沈緊，或洪大而虛用補陽調經，乃兼責其虛也。丹溪用海石、南星、椿根皮之類，乃治其濕痰也。竊謂前症皆當壯脾胃，升陽氣爲主，佐以各經見症之藥，色青屬肝，小柴胡加山梔防風，溼熱壅滯小便赤澁，龍胆瀉肝湯，肝血不足，或燥熱風熱，六味丸，色赤屬心，小柴胡加

山梔當歸。思慮過傷。妙香散。色白屬肺。補中益氣湯。加山梔。色黃屬脾。六君子加山梔柴胡。不應歸脾湯。色黑屬腎。六味丸。氣血俱虛。八珍湯。氣血下陷。補中益氣湯。溼痰流注。前湯加茯苓半夏蒼朮黃柏。氣虛痰飲下注。四七湯送六味丸。不可拘肥多瘦。瘦多火而以燥溼瀉火藥輕治之。張從政曰。聖惠方以帶下由風冷。巢氏內篇又以爲寒則多白。熱則多赤。二家之說皆非也。蓋以衝任督三脈皆統于募戶循陰氣行廷孔溺孔之端。以帶脉束之。因諸經上下往來。遺熱于帶脉之間。熱者血也。血積多日。不流火則從金之化。而爲白乘少腹間。冤熱白物滑溢。隨洩而下。綿綿不絕。或有痛者。則因壅碍而成癟也。內經曰少腹冤熱。洩出白液。冤者屈帶也。病非本經爲他經冤抑而成此疾也。猶之赤白痢。赤者新積屬心火。白者舊積從肺金故。赤白。

病不可曲分寒熱。又如癰癧始赤血，次潰白濃，又豈爲寒哉？且
赤白病者是邪熱傳于大腸，下廣腸出赤白也。帶下者傳于小
腸入脬經，下赤白也。據此二症皆可同治溼法以治之。先以導
水丸禹功散瀉訖，次以淡劑降心火，益腎水，下小溲，分水道，則
自愈。然有此法，又不可偏執，更宜詳其虛實而用之。內經惟腸
澼便血，血溫身熱者死。赤白帶下，白液白物，蠱病，腎消皆不能
死人，有死者藥之過也。室女同戴思恭曰：赤白帶下皆因七
情內傷，或下元虛冷，感非一端。大率下白帶多間有赤者，並宜
順氣散，吞震靈丹，仍佐艾附圓，或米飲調沙參末，帶下不止成
疳羸者，四物加煅牡蠣五分，吞固真圓，多服取效。有帶疾愈後，
一二月或再發，半年一發，先血而後下，帶來不可遏停，未幾
又復傾瀉，此名漏帶，最難治者也。下截之血，小腹主之，有因血

虛而虛熱陷下小腸致小便澁痛色白如泔或成淡粒不可作
淋治用冷劑宜四物五苓各半貼和煎。李梃曰瘦人多熱脉
數外症潮熱乃陰虛火盛也芩柏樗皮丸不止用地骨皮一兩
生地五兩酒十盞前三盞分三服肥人多溼身黃脉緩陰戶如
冰或痛白帶升陽燥溼湯溼痰流下滲入膀胱二陳加二術升
柴因日久淋瀝不已或崩中暴下或產後去血過多以致陰虧
陽竭榮氣不升經脉凝注衛氣下陷精氣累滯于下焦蘊積而
成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂加當歸煎吞苦棟
丸始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下腥臭多悲不樂附桂湯
常用酒煮當歸丸風邪入胞門或中經脉流傳臟腑俱宜胃風
湯或單地榆散平時陰陽過多及產後亡血下虛風邪乘虛入
于胞絡緩宮丸加姜附吳萸孕婦帶下全是溼熱芩术樗皮丸

室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或當風取涼故經水止而卽患帶下琥珀硃砂丸又有白溼一症如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥王肯堂曰有溼痰而弱不禁攻者燥之熱溼宜涼燥寒溼宜溫燥帶下久而枯涸者濡之常以四物料蜜丸服以此療年高婦人白帶良驗爲潤劑也有脉微食少及久病曾經攻下者俱非虛治有熱用涼補無熱用溫補有因腸間敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛卒無已期者治須排膿爲先白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍枯礬各五錢蠟丸空心及飯前米湯下十九或十五丸候膿盡仍別以補藥補之吳崑曰白芷性香而升舉黃荆寔性辛而利氣瓦楞子性燥而勝溼炒焦則火可生土土可防水煅粉則燥可勝溼溼勝則無以下注而白帶止此古人于此三物有單用一物以止

之也。又曰葵花稟草木之陰，涵天地之陽，故能潤燥升陽，使營衛上行，不復陷于帶脉之下而爲帶病也。又曰婦人無病容單下白帶者責之溼熱下注。婦人久病赤白並責之氣血下陷多成瘵也。又曰氣陷下焦則白帶血陷下焦則赤帶必澁藥止之將未盡之帶留而不去以利藥下之則既損其中又傷其下皆非治也。千金用白馬毛散以白馬則得乾之剛可以利氣毛得血餘可以固血氣利則白愈血固則赤止以此意也。龜鰐牡蠣外剛內柔離之象也。去其柔而用其剛故可以化癥而赤白之成帶者無復中留可使營衛之行不復陷下營不陷則無赤衛不陷則無白。武之望曰白淫謂曰物淫如白淫大同多憂思過度所致用平補鎮心丹思傷脾胃者四七湯精之狀又有日夜津流如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白

下白丸子病悶少食者。沈香降氣湯。勞傷腎氣心腎不交者。金鎖正元丹。

治帶下病方

膠艾四物湯 治婦人赤帶。 四物湯加 阿膠 艾葉

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒。 肉桂一錢 附子二錢 黃柏知母各五分

如食少常飽

有時似腹脹加白芍五分 不思飲食加五味子二十粒 煩惱面上麻木如虫行乃胃中元氣極虛加黃芪二錢人參七分炙草三分升麻五分此方乃補陽氣極虛用知柏爲引用又升

降陰陽藥也

膠艾四物湯

治元戎六合湯 又名元戎四物湯。 治赤白帶下。 脉沈微腹痛或陰中痛。 四物湯各一錢加

內桂 附子各五分

一方四物加茴香肉桂

東垣固真丸

治白帶大下不止。 膽腹寒痛如冰。 陰中亦然。 日治火齒惡熱。 溜火

白石脂煅。 柴胡各一錢。 酒

煮龍骨飛二錢。 酒洗當歸三錢。 乾姜炮四錢。 酒黃柏二錢。 白芍各五分。 翻丸每三十丸

空心沸湯下少頃以粥圍之是不令熱藥犯胃
忌生冷硬物

衛生湯

二黃二白湯

治帶下由于熱者。白芍 甘草一錢 治帶下由于熱者。酒川連
當歸 川連 各一錢 醋香附 白石脂 白术 黄柏各一錢
椿白皮二兩

白芷散

治赤白帶下。白芷一兩 海螵蛸三錢 胎
髮煅一錢 每末二錢酒下

補骨脂丸

治年老人久帶。五味子各三兩 車前子二兩 杜仲
補骨脂 五錢 茄葉一兩

老年白帶方

治帶下由于血虛者。黃柏一錢 車前子各四錢
川椒一錢 杜仲各四錢 茄葉一兩
砂仁一錢 酒炒艾葉一錢 醋化阿膠五錢
川芎一錢 砂仁一錢 白芍一錢

血虛帶下方

治帶下由于血虛者。四君四物二湯加陳
皮一錢 杜仲一錢 茄葉一錢 砂仁一錢
黃芪一錢 香附一錢 黃柏一錢

母 蜜丸

烏金丸

治赤白帶下。烏頭 烏附 藥术 艾葉
共用醋煮爛搗如泥再以熟地當歸各四

烏艾丸

兩醋湯下。白芍、川芎各二兩爲末和前藥泥丸淡
醋同上。烏藥二兩半、艾葉六兩、香附四
兩、將艾浸醋中十數日再將香附後一日晒
乾共爲末醋糊丸酒下。

赤淋丸

治赤淋。

茯苓、丹參

甘草

白芍

黃柏

續斷

白馬毛散

治帶下赤白。

白馬毛二兩

龜甲四兩

牡

小柴胡湯

治肝膽經症寒熱往來、晡熱潮熱、默然不欲飲食或怒火口苦耳聾、咳嗽發熱、胸下作痛、甚者不能展側、兩脇悶痛或泄利或吐酸食苦水皆主之。

柴胡二錢、黃芩一錢、人參半夏各七分、甘草五分

歸脾湯

治脾經失血、少寐發熱盜汗、或思慮傷脾、不能作痛、大便不調、或經候不準、帶下、晡熱內熱。人參、白朮、黃芪、茯苓、木香、當歸、龍眼肉各一分、棗仁、遠志各一錢、姜、棗、帶下。

龍胆瀉肝湯

治肝經溼熱。兩肋脹痛或腹中疼痛。或小便澀滯等症。用此加減。治帶下。

龍胆草澤瀉各

一錢山梔酒生地車前子木通酒當歸

妙香散

治心氣不足。精神恍惚虛煩少睡。盜汗等症。亦用此加減。治帶下。

人參甘草炒桔梗各

黃芪各一兩姜汁炒山藥茯苓遠志

硃砂另研三錢麝香另研二錢

煨木香二錢半每末二錢溫酒下

四七湯

治七情鬱結成痰。或如梅核梗於喉中。或中脘停痰氣痞。或痰壅氣喘。或痰飲嘔逆恶心。亦治

帶下有痰者。半夏錢半蘇葉厚朴

黃芩各二兩

導水丸

治赤白帶下隨宜酌用大黃滑石各四兩水泛丸臨卧

黑牽牛頭末黃芩擣白皮

柏子仁川芎滑石海浮石青黛當歸

禹功散

治同上。黑牽牛頭末四兩炒茴香一兩

或加木香一兩每末一二錢臨卧姜汁下

芩柏樗皮丸

治瘦人多熱致成帶下黃芩擣白皮

柏子仁川芎滑石海浮石青黛當歸

白芍醋糊丸

芩术膠皮丸

治孕婦白帶

黃芩

白朮各三錢

黃柏錢

琥珀硃砂丸

治室女帶下

琥珀

木香

當歸

沒藥各半

川連各二錢

酒糊丸

溫酒下

三補丸

治赤帶兼服此丸

黃芩

黃連

黃柏

等分

震靈丹

一名紫金丹治婦人血氣不足崩漏虛損帶下

乳香另研

五靈脂另研

硃砂飛一兩

代赭石同根石

苦棟丸

治赤白帶

苦棟碎酒浸

荷香炒

當歸

等分酒糊丸每三十九空心酒下腰腿

疼四物四兩加羌活防風各一兩煎湯送下

酒煮當歸丸

治癩癧白帶下注腳氣腰以下冷等症當歸一兩茴香五錢炮附子良姜各七錢

右四味剉如麻豆大酒一升半至酒盡爲度焙乾研細末入炒黃丁香各五錢全蝎三錢柴胡二錢升麻根木香各一錢

苦棟子炙草各五分延胡索酒炒四錢酒煮麵糊丸每二十九空心宿食消盡淡醋湯

解帶散

治溼熱痰鬱白帶酒當歸一錢二分芥蒂蒼朮

陳皮丹皮各一錢川芎延胡索各八分炙草四分加姜二片空心服

側柏樗皮丸

治七情所傷白帶椿根皮二兩醋香附白芍白术各一兩側柏葉川連黃柏

炒各五錢白芷灰三錢粥丸

大聖萬安散

治寒溼帶下白术木香胡椒各二錢半陳皮黃芪桑皮木通各五錢白牽牛炒取頭末二兩每末二錢臨卧姜湯下少

頃再飲姜湯數口催之平明可行三五次取下少惡物以粥補之服此藥忌食量酒晚飯

延胡苦棟湯

治大寒帶下。
柏一分 附子

延胡索
肉桂各三分

苦棟子各二分
炙草五分

黃

黃

熟地一錢

白薇丸

治室女帶下。
鹿茸二兩 醋艾煎汁打糊丸

白薇 狗脊製去毛各一兩

內金鹿茸丸

治勞傷帶渴。
鹿茸

黃芪 五味子

雞內金

附子等分蜜丸

壯蠅桑螵蛸

龍骨

金鎖正元丹

治真氣不足。呼吸短氣。四肢倦怠。腳膝瘦軟。目暗耳鳴。盜汗遺精。及婦人白濁白淫等症。
肉蓯蓉

巴戟 葫蘆巴各一斤
五倍子八兩 茯苓六兩
骨二兩另研 破砂三兩

酒丸 每二十丸。鹽湯下。

崩漏

大凡女子自天癸既通而後氣血調和。則經水如期不先不後。自無崩漏之患。若勞動過極。以致臟腑虧傷。而衝任二脉亦虛不能約束其經血。使之如期而下故或積久或不須積久忽然暴下。若山之崩如器之漏。故曰崩漏。究其原則有六。大端一由火熱。二由虛寒。三由勞傷。四由氣陷。五由血瘀。六由虛弱。何以見火熱之所由也。或脾胃傷損。下陷于腎。與相火相合。溼熱下迫。血色紫黑臭如爛肉。中挾白帶。則寒作于中。脉必弦細。中挾赤帶。則全由熱作。脉必洪數。其症兼腰臍下痛。兩脇急縮。心煩悶。心下急。不眠。欲崩先發寒熱。平時臨行經亦發寒熱。此必大補脾胃而升降氣血。宜中益氣湯。與涼血地黃湯相合。加減用。或心氣不足。心火大熾。旺于血脉之中。又脾胃失調。而心火乘之。肌肉顏色如常。此爲心病。經水不時下。亦暴

下不止。治必大補氣血脾胃少加鎮墜心火以治其心補陰瀉陽

而崩自止矣。

宜六味丸加黃連麥冬

或肝經有熱血得熱而下行

宜四物湯加柴胡

梔蒼

或風熱鬱于肝經血得風而妄行

宜加味逍遙散

或怒動肝火肝家

血熱而沸騰宜小柴胡湯加山梔丹皮龍膽或脾經鬱熱血爲熱迫而不歸經宜

脾湯加柴胡

或悲哀太過損傷胞絡令血下注

宜四君子湯加柴胡丹麻山梔或

血爲熱傷脉象虛洪所下皆紫黑色宜河間生地黃散或血室有熱崩下

不止服溫藥不效宜金華散或天暑地熱陽來乘陰經血沸溢宜簡易

黃芩湯

以上皆火熱所統之病也何以見虛寒之所由也或心氣不足又

勞役飲食不節其脈兩尺弦緊而洪按之無力其症臍下如冰求

厚衣被以禦寒白帶白滑之物雖多間下如屋漏水下時有鮮血

不多右尺脉時微洪屋漏水多暴下者是急弦脉爲寒多而洪脉時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脉時出者命門

包絳之火也。黑物多赤物少，合成屋漏水之狀。宜丁香附艾湯
此條脈症與方本
東垣或經候過多，其色瘀黑，甚者崩下，呼吸少氣，臍腹冷極，則汗出如雨。尺脉微小，由衝任虛衰爲風冷客乘，胞中氣不能固。宜鹿茸丸或氣血勞傷衝任，脉虛如經云非時忽然崩下，或如豆汁或成血片或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸。宜伏龍肝散或經血適下過服寒涼之藥等物，因愈崩漏，壯腹痞悶，飲食不入，發熱煩躁，脉洪大而虛，由脾經氣血虛而發躁，緩治則不救。宜八珍湯加炮姜以上皆虛寒所統之病也。何以見勞傷之所由也？或因勞役令脾胃虛弱，氣短氣逆，自汗不止，身熱悶亂，惡見飲食，肢倦便洩，漏下不止，其色鮮明。宜當歸芍藥湯此條亦本東垣或思慮傷脾，不能攝血，致令妄行，并健忘怔忡，驚悸不寐，心脾傷痛，怠惰少食。宜歸脾湯或憂思鬱結勞傷心經，不能爲血之

主遂令妄行。宜柏子或緣卒然大怒有傷肝臟而血暴下。宜養血

平肝散

以上皆勞傷所統之病也。何以見氣陷之所由也。或經漏不止。鮮血項筋急。腦痛。脊骨強痛。不思飲食。宜柴胡調經湯或露下惡血。月水不調或暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食不節。或勞傷形體。或素有心氣不足。因飲食勞倦致令心火乘脾。必怠惰嗜卧。四肢不收。困倦乏力。無氣以動。氣短上氣逆急上衝。其脉緩而弦急。按之洪大。得之脾土受邪也。脾主滋榮周身者也。心主血。血主脉。二者受邪。病皆在脉。脉者血之府也。脈者人之神也。心不主令。胞絡代之。故曰心之脉主屬心系。心系者胞絡命門之脉也。主月事。皆由脾胃虛而心胞乘之。故漏下血水不調也。況脾胃爲血氣陰陽之根蒂。當除溼去熱益氣。氣上伸以勝其溼。又云火鬱則發之。宜調經溼湯。此條或衝任氣虛。經脈不調。崩中漏下。宜斷下湯。以上皆氣陷

所統之病也。何以見血瘀之所由也。或血大至純下瘀色成腐勢不可止。甚則頭目昏暈。四肢厥冷。腹痛。宜膠艾湯或血崩不止。昏迷不省。宜五靈脂散或瘀積血崩所下皆成五色。宜香附子散或瘀積久而血崩

臍腹疼痛。宜立效散或室女二七之期。天癸未至而後至。亦有卒然暴下淋瀝不止。有若崩漏者。其失血必多。宜加減四物湯以上皆血瘀所統之病也。何以見虛弱之所由也。或崩中不止。結作血片。如雞肝色碎爛。宜小茴根湯或崩血無度。虛損羸瘦。宜鹿茸散或諸虛不足。久不受孕。骨熱形羸。而崩中帶下。宜補宮丸或帶下漏血不止。及風寒。冷。熱。勞。損。衝任崩中暴下。腰重裡急。淋瀝不斷。宜芎藭湯以上皆虛弱所統之病。也就此六者。而分類推之。以究其原。崩漏之病。寧有遺哉。然其治之。亦必有道矣。方氏云。血屬陰。靜則循經榮內。動則錯經妄行。凡人七情過極。則動五志之火。五志之火亢甚。則經血暴下。久而不

止謂之崩。中如風動木搖火燃水沸之類。治崩次第初用止血以塞其流。中用清熱涼血以澄其源。末用補血以還其舊。若止塞流而不澄源。則滔天之熱不可遏。若止澄源而不復舊。則孤子之陽無以立。故本末不遺。前後不紊。方可言治。方氏此論乃治崩要法。醫者深悉乎六者之由。而運之以塞流澄源復舊三法。則庶幾其得之矣。

脉法 仲景曰寸口脉弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相搏。此名曰革。婦人則半產漏下。旋覆花湯主之。脈經曰問曰五崩何等類。師曰白崩者形如涕。赤崩者形如絳津。黃崩者形如爛瓜。青崩者形如藍色。黑崩者形如漆血也。又曰診婦人下赤白。日下血數升。脉急疾者死。遲者生。婦人帶下脉浮惡寒。漏下者不治。又曰尺脉急而弦大。風邪入少陰。

之經。女子漏白下赤。又曰漏血下赤白不止。脉小虛滑者生。大緊寢數者死。陳自明曰。寸脉微遲爲寒。在上焦則吐血衄血。尺脉微遲爲寒。在下焦則崩血便血。大抵數小爲順。洪大爲逆。大法當調補脾胃爲主。又曰尺寸脉虛者。漏血脉浮者。俱不治。李梃曰。脉微弱爲少氣。女子崩中漏下。致面色焦枯。心脉獨沈。主氣鬱下。流血崩去。紅腎脉浮芤。腎虛也。女人則經漏後部彈手陰蹻脉也。主裡急。

崩漏原由症治。素問曰。陰虛陽搏謂之崩。又曰少陽司天初之氣。風勝乃搖。候乃大溫。其病血崩。陳自明曰。婦人血崩而心痛甚。名曰殺血。心痛由心脾血虛也。若小產去血過多而心痛甚者亦然。用烏賊骨炒爲末。醋湯調下妙。失笑散亦妙。嚴用和曰。婦人平居經脈調適。衝任二脉互相涵養。陰陽二氣不用

相偏勝則月事時下。若將理失，宜喜怒勞役過度，傷肝。肝爲血庫，傷之則不能藏血于宮。宮不能傳血于海，所以崩漏漏下者，淋瀝不斷，病之輕者也。崩中者忽然暴下，乃漏症之甚者也。倘人不止而黃肌瘦，虛煩口乾，臍腹冷痛，吐逆不食，四肢虛困，甚則爲脹爲腫者不治。李杲曰：婦人脾胃虛損，致命門。脾沈細而數疾，或沈弦而洪大有力，寸關脉亦然，皆由脾胃虧下，隔于腎與相火，收合溫熱，下迫經漏不止。其色紫黑而臭，中有白帶者，脉必弦細，寒作于中。中有赤帶者，其脉洪數疾，其熱明矣。必腰痛或臍下痛，臨經欲行，先見寒熱往來，兩脇急縮，兼見脾胃症。如四肢困熱，心煩不卧，心下急，宜以大補氣血之藥，舉養脾胃，微加鎮堅。心火之藥治其心，補陰鴻陽經自止矣。又曰：婦人血崩，是腎水陰虛，不能鎮守，包絡相火，故血走而崩也。涼血地

黃湯。朱震亨曰。東垣治法。洵不容易。但學者尤當尋思。急則治標。用白芷湯調百草霜末。甚者用棕灰。後用四物加炒乾姜。調理。因勞用參芪。帶升補藥。因寒用乾姜。因熱用黃芩。崩過多。先用五靈脂末一服。當分寒熱。蓋五靈脂能行能止。紫色成塊者熱也。四物加黃連之類。李梃曰。崩漏之由。虛與熱而已。治法多端。隨症制宜。如經行犯房。勞役過度。氣血俱虛。忽然暴下者。宜大補氣血。氣虛。四物加參芪。血虛。四物加膠艾。炒乾姜。虛寒。臍腹冷痛。伏龍肝散。膏粱厚味。致脾溼下流于胃。與相火合。爲溼熱。迫經下漏者。解毒四物湯。四物坎離丸。飲食失節。火乘脾胃下陷。容顏似無病。而外見脾氣困倦。煩熱不卧者。宜補陰。瀉陽。升陽調經湯。升陽舉經湯。子宮爲四氣相搏。血亦難停者。風搏。不換金正氣散。加川芎。官桂。四物加荆芥。寒搏。及等老久。

崩。伏龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃丸。暑搏單葵心丸或益元散加百草霜。溼搏升陽除溼湯。悲哀甚而包絡絕。包絡絕而陽氣內陷。發則心下崩。數溲血者。偹金散。四製香附丸。徐春甫

曰。崩漏最爲大病。年少之人。火熾。血熱。房事過多。經行交感。俱致斯疾。大都涼血固澁。升氣益榮。而可愈也。中年以上人。及高年寡婦。多是憂慮。過度。氣血俱虛。此爲難治。必須大補氣血。養脾升胃。固血庶保十之二三。若不早治。正如圮廬之難支也。蓋血崩症。有因虛。有因熱。虛則下陷。熱則流溢。視其緩急。標本治之。緩用四物加條芩附子。急用神效丸。有因血臟虛冷。宜四物加黃芩阿膠參芪。東垣謂崩帶下久。有属于寒。不可一論。王肯堂曰。冷者脉緊細。手足寒紅而淡黑。或五色當歸建中湯。加龍骨血竭附子送下紫石英丸。熱者脉洪。四肢溫。心煩。口苦燥。

血沸而成黃夢湯清心蓮子飲加竹瀝生地甚者生地汁磨京
墨百草霜冷服虛者膠艾湯加麥冬鹿茸龍骨棗仁寢者腹中
痛四物加香附心虛者恍惚多夢健忘舌強盜汗小便多而紅
柏子仁湯酸棗仁湯加龍骨京墨百草霜若崩中作麝香當歸
香者心氣已散急服靈砂龍骨等又曰血者心之色也血見黑
卽止腎水制心火故也又曰凡血崩脉沈弦而洪或沈細而數
或崩而又兼久瀉者皆胃氣下陷也故以升舉爲要萬全曰
崩中多因中氣虛不能收斂其血加以積熱在裡迫血妄行故
令暴崩久不止遂成下漏治法初病宜止血四物調十灰散
以血止爲度次則清熱用涼血地黃湯如血未盡再吞十灰丸
血已盡止裡熱盡除然後補其虛宜加味補中益氣湯地黃丸
參术大補丸以平爲度武之望曰丹溪云旋鬱胸中清氣不

升。故經脈壅遏而降下。非開濶不足以行氣。非氣升。則血不能歸隊道。此論血泄之義甚明。蓋開胸膈濶。則清氣升。清氣升。則血歸隊道。不崩矣。故其症或腹滿如孕。或臍腹疼痛。或血結成片。或血出則快。止則悶。或臍上動。其治法宜開結。痰行滯氣。消瘀血。余嘗謂丹溪先生善治癥。觀此另得一種見解。不益信哉。鰲按。痰鬱氣遇是崩漏中。有此一症。非必定如是也。

治崩漏病方

補中益氣湯

治脾胃虛損崩漏。

人參 黃芪 白朮 各一
炙草 當歸 陳皮 各七分 升麻 一束

胡各三分

涼血地黃湯

治同上。又治血崩由腎水陰虛不能鎮守。包絡相火。故血走而崩者。

生地 蘭本 川芎 升麻 各五分

黃連 二分 黃柏 知母 荆芥 各一分

炙草 防風 羌活 黃芩 細辛 芫荊子各二分 紅花一分

歸脾湯

治思慮傷脾。不能攝血妄行崩漏。人參黃芪。

當歸遠志圓眼

棗

河間生地散

治脉虛洪血色紫黑。生地熟地白芍。

柴胡地骨皮便血

黃芪天冬杞子

柴胡地骨皮便血

金華散

治血室有熱而崩漏。延胡索瞿麥穗當

丹皮乾姜各一兩石膏二兩威靈仙桂心各七錢蒲黃五錢每末三錢水

簡易黃芩湯

治天暑地熱經血沸溢。黃芩末三錢用秤錘燒紅淬酒中名辟露酒下

丁香膠艾湯

治漏下屋漏水之狀。當歸錢二分丁香各四分白芍

熟地各三分川芎當歸錢二分丁香各四分白芍

鹿茸丸

治風冷客乘胞中崩漏。鹿茸酥炙赤石脂

伏龍肝散

治氣血勞傷衝任脈虛崩漏。川芎三兩龍肝赤石脂各一兩艾葉微炒

婦科玉沴

崩漏

赤石脂

丸酒下

桑葉各五錢

當歸熟地川斷各二兩桑

桑

二兩
肉桂
麥冬兩半
當歸
乾姜各七錢半
甘草各五錢
每粗末四錢加棗一枚
煎

當歸芍藥湯 治勞役傷脾胃崩漏。
黃芪錢半 白朮
歸身 甘草各一錢熟地
分 生地 陳皮各三分
灸草各三分 柴胡二分

柏子仁湯 治勞傷心經崩漏。
柏子仁 香附 川芎
鹿茸 茯神 當歸各錢半
膠 遠志各一錢 川斷二錢
醋青皮 丹草五分 阿

養血平肝散 治大怒血崩。
當歸 白芍 香附各二錢
柴胡 川芎 甘草各八分
生地 各八分 姜三片

柴胡調經湯 治漏下鮮血。
羌活 獨活 升麻 蒙本各
五分 蒼朮一錢 柴胡七分 葛根
菟草各三分 紅花少許 略熱服取微汗

調經升陽湯 治漏下惡血。
升陽湯 防風 獨活各五分
當歸 獨活各五分 空心服少時以早膳押
立止
之

五靈脂散

治血崩昏迷。五靈脂炒熟溫酒下末一錢。

香附子散

治崩下五色。香附末每二錢米飲下。

斷下湯

治衝任氣虛崩漏及經不調并三十六種帶病。
人參熟地 醋艾葉各一兩 烏賊骨灰
酒當歸各二兩 阿膠 川芎各七錢 炮

立效散

乾姜五錢 治血崩臍腹痛。香附三兩 當歸一兩 赤
芍 良姜 五靈脂各五錢 每末三錢酒一
盞童便少許煎。

加減四物湯

治室女下血。四物湯四錢加
姜五片 治陽傷于陰漏血。小薑莖葉搗汁 生地搗
汁各一盞 白朮五錢 入水一盞煎半溫服

小薑根湯

治虛羸漏下。鹿茸一兩 龍骨 龜甲熟
地白芍 白石脂 繩斷烏賊骨各二兩

鹿茸散

肉蓯蓉兩半 每末二錢食前米湯下。

補宮丸

治諸虛不足崩漏。白薇 牡蠣 白芍 鹿
角霜 山藥 白朮 白芷 茯苓 烏賊骨
等分 糊丸

芎菊湯

治四氣勞損衝任下血。川芎

吳茱萸

黃

芪白芍生地各二兩
姜各一兩水一斗煮三升分三服。若經後乾
有赤白不止者去生地吳萸加人參杜仲各二
兩

伏龍肝散

治崩中下赤白或如豆汁。伏龍肝如彈子大
七枚

生地

剉四升

甘草

艾

葉

赤白脂

桂心

各二兩

水一斗煮三升

四物坎離丸

治脾溼下流于腎與相火合爲溼熱迫經下漏
紫黑臭腐。生地兩半酒浸熟地搗膏當

歸身二兩酒白芍兩半酒黃柏

知母各六

連翹六

一兩槐子側柏葉各一兩同炒

錢蜜丸

升陽舉經湯

治飲食勞倦暴崩不止或下水漿怠情嗜卧四肢困倦及帶下脫漏。肉桂川芎紅花各

五分子獨活細辛六分人參熟地各一錢附

防

風各二錢甘草各錢半羌活藁本

白朮當歸

桃仁十枚

白朮當歸

附

片分作四帖煎

夏月不

用桂

不換金

正氣散

治風冷血崩

厚朴

陳皮

霍香

半夏

甘草一枝

升陽除溼湯

風淫盛血崩

神曲

澤鴻

猪苓各五分

陳皮

甘草

草

麥芽各三分

姜

蜜

平補鎮心丹

治白崩桂枝

茯苓

五味

車前子

肉

冬

熟地

各兩半

棗仁

二錢半

遠志肉

山藥

天

半

人參

硃砂各五錢

蜜丸每三十九米

飲下

解毒四物湯

一名溫清飲治崩漏面黃腹痛

四物湯各一錢加黃芩

黃連

黃柏

山梔

生地各

一錢

此四物湯與黃連解毒湯合劑也

脩金散

治血崩不止靈脂炒一兩。

每末三四五錢空心醋湯調

銀尾兩錢

五

地黃丸

治足三陰虧損經行數日不止。

及帶下無子。

山萸蕪蔓仁白芍微炒代赭石

各一兩

蜜丸酒下日三

姜炒炮乾姜

厚朴各三錢

五灰散

治下血不止成血崩
絹血條 棕皮以上共燒存性
黃炒 直竭 京墨 每細末一二錢調服

十灰散

治下血不止 錦片 木誠 棕皮 柑葉
乾瀉 艾葉 當歸 血條 鮫魚鱗 鯉魚
鱗 以上各燒存性等分研末 入麝香少許

十灰丸

每末二錢空心酒下
治崩漏不止 緜灰 黃精灰 馬尾灰 艾
葉灰 蘿蔔灰 蓮房灰 油猪胰 赤松皮
灰 檸灰 滌黃灰 等分醋者米糊丸每五
七十丸至百丸空心米飯下

沈氏尊生書卷六

婦科玉尺

婦女雜病

沈金鰲撰

婦女者陰之集常與溼居者也。男子之爲道也以精。婦女之爲道也以血。精爲陽。此其所以成男子也。血爲陰。此其所以爲婦女也。蓋自十四衝任脉通而天癸至。血氣之存外循經絡。內榮臟腑。不失其度。則月事以時下。而諸疾不生。如不然者。陰氣浮溢。百想絰心。內傷五臟。外損姿容。月水去留。前後互異。瘀血停滯。中道斷絕。其間傷損不可具論。聖惠方云。婦女所以別立方者。以其氣血不調。胎妊產生崩傷多異之故。旨哉言乎。可見婦女之不同于男子。婦女之病難治于男子數倍也。蓋以男子之病。多由傷精。婦女之病。多由傷血。然而婦女之慾。每甚于丈夫。故感病亦每易于丈夫。

又況姊妹憂患係戀愛憎入之深者之固情。不自抑不知解脫。由陰凝之氣鬱結專滯。一時不得離散。非若陽氣之偶有所抑。畢竟易于發散。故其爲病根深也。夫婦女之病。莫有如經。莫有如胎。莫有如產前後。莫有如崩中帶下。此數大端。別自有論。此外有最易作而最難治者。一日癆。一日積聚。癥瘕。一日浮腫。其癆。療之由復有數種。或因先天氣血不足。乍寒乍熱。不思飲食。尪羸無力。宜滋陰地黃丸。或吐衄。咳唾血。發熱盜汗。痰嗽。心惱。因虛勞而經水不調。宜補益丸。或心肺俱損。血脉虛弱。皮紫毛落。亦因虛勞而致經水不調。宜滋陰地黃丸。甚或其有先經水不調而致勞瘵者。則五心煩熱。寒熱如瘧。或煩熱潮熱。盜汗痰嗽。宜逍遙散加味。至如室女思慮傷。心經閉成癆。則名乾血癆。其候最難調治。只宜益陰血。制虛火。宜養血活血散。勿妄用通經破血之藥。宜柏子仁丸澤蘭湯。或因產後早犯房事。勞役過度。將理失宜。皆

能致病。名曰產後癆。

宜人參鬱附散

又或血氣既虧爲風冷所搏。

則不能溫子肌膚使人虛羸憔悴飲食不消又或風邪兩感于肺。

肺受微寒喘嗽口乾頭昏百節痛又或風邪侵于營衛流及臟腑。

寒熱如瘡益汗背膊煩悶四肢沉重名曰尋癆俗總謂之產後癆。

宜黃芪丸當與產後篇參看精聚癆瘕者本男女皆有之病而婦

白朮苓散當與產後篇參看精聚癆瘕者本男女皆有之病而婦

人患此大約皆胞胎生產月水往來血脉精氣不調及飲食不節。

脾胃虧損邪正相侵積于腹中之所生準繩謂推之不動爲癆推

之動爲瘕是也試詳言之癆有二一血癆由臟腑氣虛風冷相侵

或飲食失節與血氣相搏適值月水往來經絡痞塞惡血不除結

聚成塊漸至心腹兩腸痛苦害于飲食肌膚瘦羸

宜桃仁五靈脂生地牛膝大黃

甘草二食癆亦由月信往來食生冷之物而臟腑虛弱不能消化與

氣搏結聚而成塊盤堅不移也癆有八一黃癆內經來或大小

產後血氣未定。臟腑空虛。或當風便利。陰陽開闊。關節四邊。中子風溼邪從下入于陰中。積留不去。所成其症。寒熱身重。淋露不食。左脇下有結氣。拒按。宜皂夾散二青痕。由新產起行浣洗太早。陰陽虛。產門四邊解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。又犯風溼所成。其症苦寒。洒酒入腹。煩悶。結熱不散。惡血不除。聚在兩脇下。藏于背。督其後月水不通。或反不禁。宜青痕坐導方三燥痕。由月水未盡。或以夏暑。或以舉重汗出。卒以恚怒致月水與氣相搏。反快涼飲。月水橫流溢入他臟。有熱毒成燥痕。大如半杯。上下腹中。痛連兩脇。下上引心而煩喜。嘔吐。腰背重。足痠削。忽遺溺月閉。宜療燥四血痕。由月事中止。飲食過度。五穀氣盛。溢入他臟。或大飢寒。呼吸未調。而自勞動。血下未定。左右走腸胃。箇留絡不去。內有寒熱。與月水合會。而成其症。不可俯仰。橫骨下有積氣。堅如石。少腹急痛。背疼。腰。

腹寧。陰中若生風冷。月水來止不常。宜療血瘕方桃仁煎五脂瘕由月信初來。或生未滿月而交。胞門傷。子戶失禁。關節散。臟腑津流道。瞞動百脉。四解子精與血氣相遇。不能成子而成脂瘕。其症少腹重。腰背如刺。四肢不舉。卧不安。左右走腹中痛。時少氣。頭眩。身體解。併苦寒惡風。二便血。月事來止不常。宜療脂瘕方導散方六狐瘕由月來悲憂。或風雨雷電驚恐。且受濕。心神恍惚。四肢振寒。體倦神散。邪入陰裡不去。而成其症。少腹滯。陰中腫。小便難。胸膈腰背痛。氣盛善食。多所思。如有身狀。宜療狐瘕方七蛇瘕由月新止。陰陽未平。飲汚井之水。食不潔之物。悞吞蛇鼠之精。留臟不去。而成其症。長成蛇形。在臍上下。或左右。腸不得吐。氣上蝕心肝。少腹熱。膀胱引陰中痛。腰痛。兩股脛間痛。時寒熱。月水或多或少。宜療蛇瘕方八鼈瘕由月水新至。其人作勞。適受風溼。恍惚覺悟。心尚未平復。見所好心爲之開。

魂魄感動。五內消脫。或沐浴不以時出。而神不守。水氣與邪氣俱入。至三焦中幕。玉門先閉。津液妄行。留絡不去。而成其症形。如小杯。小腹切痛。左右走上下。腹中痛。持之躍手。下引陰裡痛。腰背亦痛。不可以息。月事不通。宜療體。由此推之。又有近臍。左右各有一條筋脉急痛。大如臂。小如指。因氣而成。如弦之狀。名曰痙者。又有僻匿在兩脇間。時痛時止。名曰癲者。皆由陰陽乖經絡。痞飲食滯邪。冷搏而成也。俱宜麝香丸。又有臟腑虛弱。氣血勞傷。風冷入腹。與血相結。留聚浮假而痛。推移則動。名曰疝瘕者。乃由經產後。胞中有惡血。復爲邪結而成也。宜乾漆散。又有所謂腸覃者。寒客大腸。與胃相搏。大腸爲肺傳送。寒則濁。氣凝結日久。便生瘻肉。始如雞卵。大如懷胎。按之堅。推之動。月則時下。此氣病而血未病也。宜驗露丸或二

陳湯加

又有所謂石瘕者。寒客下焦。血氣俱爲所閉。寒口益大。亦

如懷子但不得推移且多墜小腹與腸覃相類而寔異

宜見
曉丹要之

婦人積聚之病雖屢多端而究其寔皆血之所爲蓋婦人多鬱怒

鬱怒則肝傷而肝藏血者也婦人多憂思憂思則心傷而心主血

者也心肝既傷其血無所主則妄溢不能藏則橫行迨至既溢既行離其部分或遇六淫或感七情血逐瘀滯而隨其所留臟腑所

入經絡于是而百疾作有如前種種惡症矣若夫月經偶閉或產

後惡露未盡乘風取涼爲風冷所乘便成瘀血而此瘀在腹中必

至發熱面黃食少體瘦然此但爲瘀血而未成積聚等症者不早

圖之堅結成形亦難免矣婦女浮腫之病有先斷經而後致四肢

浮腫小便不通者乃血化爲水古人謂之血分

宜救仁丸人參丸亦有先

因小便不通而後身面浮腫竟至經水不通者乃水化爲血古人

謂之水分

宜草

其原皆由外傷六淫內傷七情飲食失度起居失

宜漸至脾胃受傷。失生發統攝之節。氣與血俱乖而後然也。蓋人身氣血本屬相須。血者氣之化。氣者水之母。非氣無以生血。非血無以養氣。若經水不通。則血病。血病而氣亦病矣。血不通而化水者寔是氣壅不能化血。遂變爲水也。至薛氏云。月水不通。凝結于內。久而變爲血瘕。血水相搏。亦爲水腫。夫血凝成瘕。因而致腫。亦屬於水。此症之故。則以血水相搏。既凝之血。亦從乎水者矣。當細思之。總之血分者。不可以水治。水分者。不可以血治理。固然也。以上皆最易作而最難治之病也。其有不易作而實難治者。婦女陰中之疾是已。如陰戶腫痛不閉。寒熱。溺濁體倦。少食。宜補中益氣湯。加升柴量。
大黃芩
山梔。陰戶不閉。小便淋瀝。腹中一物。攻動腹痛。宜逍遙散。加柴胡。山梔。車前。皆由肝脾有傷之故。嘗考石室秘錄曰。婦人羞隱之處。不便明言。然大約非寒即熱。今擬一方。先用歸芍各三錢。川芎一錢。熟地五

錢甘草柴胡白芥子各一錢黃芩炮姜各三分水煎服之後較前平善。則是虛症隨用四物治之可也。未好。則是熱痛作祟方中加梔子三錢治之必奏效此誠可謂善于試之者矣。至若陰瘡陰挺一切等症詳載雜病源流前陰條參考可也。而婦女之疾關係最鉅者則莫如乳。如乳癰乳瘤乳吹等症亦詳雜病源流身形門茲不贅其有乳癰者女子十三四歲經脈將行或一月二次或過月不行致生此疾多生于寡薄虛弱之人每乳上止有一核可治若串成三四個卽難療宜服敗毒散加生地再服黃芩丸通用逍遙調經湯其有乳癓者多因厚味溼熱之痰停畜膈間與滯乳相搏而成又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有拘怒氣激滯而生者煅石膏瓜萎子青皮甘草節皆神效藥也然此病若早治之立消有月經時悉是輕病者到五六十歲無月經時不可作輕易看也。其

有未產而乳自出者。謂之乳溢。生子多不育。產後乳汁自出者。乃胃氣虛。宜服補藥止之。或治以漏蘆散亦可。以上皆不易作。而難治之病也。此外若婦女氣盛于血。往往無子。且變生諸症。頭暈膈滿。有所必至。抑氣散異香四神丸。若血風體痛。寒熱盜汗。頰赤口乾。胸滿痰嗽。月水不調。臍腹病痛。瘕癖成塊。宜人參荊芥散。若風虛夢與鬼交。妄有所見。言語錯亂。宜扶神湯。若經水不調。血氣攻注。遂至腹腸疼痛。積聚成塊。聚寶丹。若怒氣傷肝。不能藏血。血失常經。以致肌膚手足間俱有血線絡隱然可見。宜橘歸丸。則皆婦女之病所不可忽者。至于尋常雜病。與男子略同者。已詳雜病源流中。故可無贅。惟此種種乃婦女所。獨因不憚條載而縷述之焉。

脈法 脉經曰。婦人癥瘕積聚。脉弦急者生。虛弱者死。又曰。少陰脉浮而緊。緊則疝瘕。半產而墮。傷浮則亡血。惡寒絕產。

虛勞原由症治

王肯堂曰。勞倦所傷用補中益氣湯調治乃

暴病也。失治而有發熱潮熱盜汗咳嗽諸症出焉。謂之虛勞。

復失治而有皮聚毛落飲食不爲肌膚骨髓中熱經閉不行諸

症出焉。謂之瘵骨蒸熱。至于傳尸勞別自一種。其原不起于勞

倦。其流至于滅門。鱉按婦女虛勞多半由于經血卽有由勞倦者亦必內傷脾胃及于衝任之故不與男子一

虛勞
一般

大全曰。婦人冷勞卽無熱虛勞也。由血氣不足臟腑虛

寒。以致臍腹冷痛手足時寒月經失常飲食不省或時嘔吐惡

寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦面色痿黃也。婦人熱勞卽有熱虛

勞也。由心肺壅熱傷于氣血以致心神煩躁頰赤頭疼昏乾眼

澁口舌生瘡神思困倦四肢壯熱飲食無味肢體痠疼心悸盜

汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自愈矣

又曰。婦人有瘵骨蒸熱多因經行胎產或飲食起居七情重傷

肝脾所致。又有失于調攝，或過于攻伐而成。與男子治法稍有不同。故方亦專治婦人。薛已曰：無熱虛勞。有內外真寒。有內外真熱。有內真熱而外假寒。有內真寒而外假熱者。若飲食難化。大便不寔。飲食畏寒。手足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內外真寒之症也。宜用附子理中湯。以回陽。八味丸。以壯火。若飲食如常。大便堅寔。胸腹痞脹。飲食喜冷。手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內外真熱之症也。宜用黃連解毒湯。以消陽。六味丸。以壯水。若飲食如常。大便堅寔。胸腹痞脹。飲食喜寒。手足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內真熱而外假寒也。亦用解毒湯。六味丸。若飲食少思。大便不寔。吞酸噯氣。胸腹痞滿。手足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。亦用理中湯。八味丸。當求其屬而治之。經曰：益火之源以消陰翳。壯水之主以制陽光。

屬。謂。心。肺。也。

使不知眞水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾未去。新病復生矣。夫所謂屬者。猶主也。謂心腎也。求其屬者。言水火不足而求之于心腎也。火之源者。陽氣之根。卽心也。水之主者。陰氣之根。卽腎是也。非謂火爲心源。爲肝水爲腎主。爲肺也。又曰。有熱虛勞。乃壯火食氣虛火煎熬。眞陰之所以致也。王太僕云。如大寒而甚熱。之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。是無火也。當治其心。如大熱而甚寒。之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽往來。時動時止。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎盛則生寒。腎虛則寒。動于中心。虛則熱。收于內竊。謂此症。若由肝脾血虛。用四物參术。肝脾鬱怒。小柴胡合四物。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝脾血虛。加味逍遙散。肝經風熱。加味小柴胡湯。心經血虛。天王補心丹。肺經氣虛。人參補肺湯。肝經血虛。加味四物湯。大

抵午前熱屬氣分用清心蓮子飲午後熱屬血分四物加參术
舟皮熱從左起肝火也寔則四物加龍胆山梔虛則四物加參
术黃芪熱從腑下起陰火也四物加參术知柏酒拌炒黑又五
味麥冬肉桂不應急用加減八味丸不時而熱或無定處或從
腳心起此無根虛火也加減八味丸及十全大補湯加麥冬五
味 武之望曰療骨蒸者此主肺之病也夫腎主骨骨至于蒸
真陰竭矣陽何以附曰骨蒸者由積熱附于骨而然也又曰傳
戶瘡瘍復連無辜皆由脾胃虧損所致其形羸瘦腹脹泄痢肢
體無力傳于腎則盜汗不止腰膝冷痛夢鬼交侵小便赤黃傳
于心則心神忡忡喜怒不時頰唇赤色乍熱乍寒傳于肺則肺
滿短氣咳嗽吐痰皮膚甲錯傳于腎則兩目昏暗脣下妨痛閉
戶忿怒五臟既病則難治療

室女勞瘵 寶宗夷曰人以氣血爲本人之病未有不先傷氣血者若室女童男積想在心思慮過度多致勞損男則神消散女則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散月水先閉且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發噦腎水絕則水氣不榮而四肢乾瘦故多怒髮髮焦筋骨痿若五臟傳遍則死自能改易心志用藥扶持切不可用青蒿蟬衣等涼血行血之藥 薛已曰經云五穀入胃其精粕精波宗氣分爲三隊故宗氣積于胸中出于喉嚨以貫心肺而行呼吸榮氣者泌其精液注之于脉化以爲血以榮四末內養五臟六腑若服苦寒之劑復傷胃氣必致不起

蓐勞症治 薛已曰產後蓐勞宮扶養正氣爲主六君子湯加當歸若肺脾氣虛而咳嗽口乾補中益氣湯加麥冬五味若因

中氣虛而口乾頭暉。補中益氣加葛根子。肝經血虛而腹痛作
痛。四物加參术。肝腎虛弱而自汗盜汗。寒熱往來。六味尤加五
味。脾虛血弱。壯腹作痛。月水不調。八珍湯倍白术。脾虛血燥。皮
膚搔痒。加味逍遙散。大抵此症多因脾胃虛弱飲食減少以致。
諸經疲憊而作。當補脾胃飲食。一進精氣生化。諸臟有所倚賴。
其病自愈。仍參虛損發熱方論主治。

積聚癰瘕症治。薛已曰婦人食癰由形氣弱。須先調補脾胃
爲主。而佐以消導。若形氣充寔。當先疏導。而佐以補脾胃。若氣
壅血滯而不行。宜用烏藥蓬术肉桂當歸桃仁青皮木香等分
爲末。每二錢熱酒調下。名烏藥散。散而行之。如肝氣虛而血不
行。宜用四君芎歸補。而行之。若氣鬱而血不行。宜用歸脾湯解
而行之。若肝脾血燥而不行。宜加味逍遙散。清而行之。大抵食

積痞塊之症爲有形。蓋邪氣勝則塞。真氣奪則虛。當養正鬪邪而積自除矣。又或問。癥一也。何以知是血癥。曰。血外之症。昏悶煩躁。述妄驚狂。痰嘔汗多。骨熱肢冷。其畜在下焦者。必膚下急結。外熱內痛。尺脉洪而數也。又曰。子和云。遺溺閉癃。陰痿浮獅。精滑白淫。皆男子之癥也。若血癥。月事不行。行後小腹有塊。或時移動。前陰突出。後陰痔核。皆女子之癥也。但女子不謂之癥。而謂之疝瘕。

乳疾形症 陳襄功曰。初起紅赤腫痛。身微寒熱。無頭眩口乾微疼者。順已成。焮腫發熱疼痛。有時一囊結腫。不侵別囊者。輕已。潰膿黃而稠。腫消痛漸止。四邊作痒。生肌者順。潰後。膿水自止。腫痛自消。新肉易生。瘡口自合者順。初起一乳。遍病大痛。不紅不寒。熱心煩嘔吐。不食者逆。已成不熱不紅。堅硬如石。口乾不

照胸痞食少者逆已。潰不腹正頭脣脛勢急。渴煩渴。口渴者死。潰後肉色紫黑。痛苦連心。流氣日深。形體日削者死。初起發熱惡寒。頭眩體倦。六脉浮數。邪在表。宜散之。發熱無寒。心嘔吐。口乾作渴。胸膈不利者。宜清之。憂鬱傷肝。思慮傷脾。結腫堅硬微痛者。宜疏肝行氣。已成癰腫發熱疼痛。有時已欲作膿者。宜托裡消毒。膿已成而膿痛者。宜急開之。如脾胃虛弱。更兼補托。潰而不斂。膿水清稀。腫不消。痛不止。大補氣血。結核不知疼痛。久而漸大。破後流汗。不宜養血清肝。張介賓曰。產後乳自出。乃陽明胃氣不固。當分有火無火。而泄不止。由氣虛也。十全大補湯。若陽明血熱而溢者。保陰煎。肝經怒火上衝。乳脹而溢者。加減一陰煎。乳多脹痛而溢者。用溫帛熨而散之。

治婦女雜病方

補中益氣湯

治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清寒下陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸弱

人參

黃芪

白朮各一錢

炙草五分

當歸陳皮各七分

升麻柴胡各二分

本方加生地花粉名加味補中益氣湯

補肺湯

治勞嗽五臟虧損喘熱發熱自汗盜汗唾痰喘逆人參黃芪紫苑五味子各五分

熟地桑皮各一錢入蜜少許食後服

滋陰百補丸

治婦人勞傷氣血諸虛百損五勞七傷陰陽不和乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食虛羸無力

香附一片用酒醃童便各浸一分焙益母草半斤酒洗當歸六兩熟地姜汁炒

芎

白朮各四兩

芍藥各二兩

白芍三兩

延胡索

川芎一兩

蜜丸空心

人参

白朮

芍藥

白芍

延胡索

川芎

蜜丸空心

五六十九

附子理中湯

治真陽不足飲食難化大便不通腸鳴腹痛飲食畏寒手足逆冷人參白朮炙草乾姜附子等分每咀片四錢加姜十片煎

十全大補湯

治婦人冷勞最妙草當歸白芍

人參白朮

熟地黃芪

川芎

蜜丸空心

桂各二錢

逍遙散

白茯苓散

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重
仲頰赤口燥咽乾發熱盃汗減食嗜卧及血熱
相搏月水不調臍腹眼痛寒熱如瘡又主室女
血弱陰虛榮衛不和痰癆潮熱肢體羸瘦漸成女
骨蒸酒洗當歸酒炒白芍茯苓柴胡
各一錢 采草五分 加姜三片薄荷少許
方無薄荷加麥冬二十粒如熟甚丹皮山梔
骨蒸加知母地骨皮一錢加五味子紫苑梔
查神麌加半夏貝母瓜萎仁飲食不消加山梔
連山梔發渴加麥冬花粉以利關節手
地丹皮自汗加黃芪棗仁吐血加阿膠
姜掉加防風荆芥薄荷氣憊胸膈痞悶
足頭遍身痛加羌活防風川芎久泻加炒黑乾
枳通加桃仁紅花蘇木右腹氣塊加香附延胡索
黃連山梔小腹痛加香附延胡索經閉
青皮香附怒氣傷肝眼目昏花加龍膽
桂各五錢頭目四肢疼加木香枳榔三稜蓬
桂各兩後葛頭目四五肢疼煮黃芪
至二錢先以水三盞煮猪腰一對人參一
桂各五錢物湯各五錢
桂各兩後葛頭目四五肢疼煮黃芪
前藥先以水三盞煮猪腰一對人參一
桂各兩後葛頭目四五肢疼煮黃芪

黃芪丸

治蓐勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力羸乏
黃芪一錢半當歸各一兩川芎一錢白芍一錢

內桂一錢川斷一錢肉蓯蓉一錢柏子仁一錢牛膝一錢

五味子一錢熟地各五錢

人參鼈甲散

治動作勞傷暮勞。鼈甲一錢人參一錢茯苓一錢當歸一錢白芍一錢麥芽一錢

七錢半

熟地一錢

桃仁一錢

桂心一錢

甘草一錢

桑寄生各一錢

姜五聚

先煮猪腰一對

荊芥一錢

五錢

川斷一錢半

地骨皮一錢

丹皮一錢

每末二錢入開

三取汁入藥末二錢葱白三寸烏梅一個荆芥

五穂煎服

產後虛羸發熱自汗欲變暮勞。

當歸一錢

白芍一錢

丹皮一錢

每末二錢入開

不可攪吃不可

胡氏牡丹散

治產後虛羸發熱自汗欲變暮勞。當歸一錢人參一錢桂心一錢地骨皮各五錢丹皮一錢

芍一錢

桂心一錢

没藥各二錢

地骨皮各五錢

丹皮一錢

每末二錢入開

不可攪吃不可

吹

柏子仁丸

治血虛有火成勞。柏子仁一錢牛膝一錢卷柏各五錢澤蘭一錢川斷各二兩熟地三兩煉蜜丸

一錢半

澤蘭一錢

川斷各二兩

熟地三兩

煉

澤蘭湯

治同上并與前方兼服。澤蘭三兩當歸白芍各一兩甘草五錢每劑末五錢煎服

婦科玉尺

舞病

卷六

七

皂莢散

治黃癰導方 川椒 鮑莢各一兩 胡辛兩
半爲末以三角囊大如指長二寸貯之內陰

中欲便則出之便已復內之惡血出洗以溫湯

療瘻坐導方

三日勿近男子 照方治。戎鹽一升 炙皂莢五錢 胡辛一
兩 治法 照前方但卧瘻當下青如葵汁養之

如產法

療瘻痕方

照方治。大黃如雞子許 乾姜二兩 黃連
三兩 厚朴四兩 桂心 郁李仁各一兩
麤虫炒三枚 雞肫黃炙一枚 每末三錢清
早酒服瘻當下養如產法三月勿交無子者當
有

療血痕方

照方治 大黃 當歸各半兩 皂莢各一兩
各一兩 細辛 戎鹽各二錢半 猪臍丸如
指大每一丸綿裹內陰中正坐良久瘻當下養

桃仁煎

如乳婦法 治血瘕血積經候不通。桃仁 大黃各一兩
煎取升半下大黃桃仁蟲虫攬煎至可丸下硝
水下五九日午下如赤豆汁或如蕤肝蝦蟆衣
狀未下再服如鮮血來卽止隨以調補氣血藥

補之 氣虛血弱者忌用

療脂痕方

照方治 皂莢七錢半 石燒二錢半 五味川椒乾姜細辛各五錢 為末香脂和丸大豆許著男子陰頭以合陰陽不三行其癥卽愈

導散方

治同上。皂莢炭 大黃戎鹽各二兩 當歸各一兩 川椒乾姜大黃戎鹽各二兩 細辛 麻石燒五味各二分 為末以絹袋如指大長三寸盛滿內陰中坐卧隨意只勿走小便時去之別換新者

療狐瘕方

照方治 取新死鼠一枚裹新絮塗黃土穿地坎足沒鼠身置其中桑柴火灼其上一日一夜出之研爲末肉桂心末二錢半酒服二方寸七病當下甚者不過再服

照方治 大黃大如指者一尺炙

水六升煮數沸下渣下硝適寒溫服

甘草芒硝各半兩

烏賊魚骨二枚 皂莢酥

之十日一劑空腹服之瘕當下

側子各五錢

療蛇瘕方

照方治 大黃兩半 乾姜附子人參各三錢七分半 蘆薈一寸七桂心兩二錢半 細辛土蟲各七錢半 白朮一兩 為末酒服方寸匕日三

麝香丸

治婦人癰癩冷氣兼疰氣心腹痛不可忍
香另研五錢 阿魏二錢半 五靈脂三錢
各七錢半 桃仁七錢 芫花醋炒
一兩 蓬术 桂心 没藥 當歸
五錢 飯丸每十九丸淡醋湯下不拘時
木香各

乾漆散

治婦人癰癩久不消令人黃瘦眩暎兩脇妨悶
心腹疼痛 乾漆炒水香 芫花醋炒赤
芍 桂心 當歸 琥珀另研 川芎各半兩
大黃炒二兩 牛膝七錢半 桃仁一兩
麝香二錢半 每末一錢不拘時酒下

黑神丸

治疝瘕 神曲 茴香各四兩 川椒 丁香
各五錢 桔梗四枝 漆六兩半生半炒爲細
煮半日令香 右除椒漆外皆半生半炒爲細
末用前生熟漆和丸彈子大又用茴香末十二
兩錦陰地蔭乾候乾并茴香收器中至極乾去
齒治腎氣膀胱痃癖及疝墜五臟血崩產後諸
血漏下赤白並一丸分四服下死胎一丸皆
灰酒下難產炒葵子四十九枚搗碎酒煎下
諸疾不過三服痃氣十服膈氣癥瘕五服血
瘕 三丸當瘥

治寒客下焦直氣閉塞而成瘕甘以益大狀如
懷子名曰石瘕 炮附四錢 鬼箭羽箭 蒜石如

見曉丹

英各二錢

澤瀉肉桂

延胡索木香

各半水蛭板榔

二錢半大黃七錢

椒仁丸

治酒先經斷後浮腫

湯食前下化爲水名曰血分

甘遂炮附子郁李仁

當歸延胡索吳萸

葶苈丸

陳皮各五錢黑牽牛五靈脂

湯下一丸當歸芍花醋浸石膏各三錢

大黃青班貓各十個

麵糊丸梧子大每

人參丸

治先小便不利後浮腫水化爲血名曰水分

甜葶苈炒另研千金子另研各五錢乾第

末一兩棗肉丸梧子大每七丸扁竹湯下如大便利者減葶苈千金各一錢加白术五錢

歸經脉不利血化爲水名曰血分人參當

抑氣散

芍药十五丸治氣盛于血

甘草各一兩甘草一錢治婦女虛勞人參

香附四錢美癟

香附四兩甘草各二錢

異香四神散

治同上

香附四錢陳皮

烏藥各二錢

人參荆芥散

治婦女虛勞

白术

甘草一錢

荆芥生地柴胡

加味逍遙散

治同上

桔梗

麥冬

生地

當歸

白芍

赤芍

桂心

川芎

當歸

防風

丹皮

赤

甘草各五分

姜二片

柴胡

白芍

當歸

知母

地骨皮

山梔

黃柏

茯苓

滋血湯

治同上

地各錢半

當歸

白芍

山藥

黃芪

熟地

黃芩

熟

滋陰地黃丸

治同上

麥冬

生地

知母

貝母

當歸

澤鶴

各兩半

蜜丸

香附各

茯神湯

治同上

茯神錢半

赤芍

五分

茯苓

人參

菖蒲

各

橘歸湯

治積塊

橘紅

四兩

當歸

二兩

蜜丸

酒下

神仙聚寶丹

治積塊

琥珀

另研

當歸

各一兩

乳香

研

麝香

另研各一錢

木香

研

麝香

另研各一錢

水丸

每兩作十五丸

酒磨溫酒下

清心蓮子飲

治心煩發渴

車前子

地骨皮

麥冬

黃

芩

各錢半

蜜黃芩

人參

茯苓

石蓮

內各七分半

一方加遠志

菖蒲

各一錢

發熱加柴胡薄荷

附錄前人效方

益母草九

治婦人骨蒸勞瘦月候不調心神煩熱四肢疼痛不能飲食
益母草 青蒿各二斤 桃枝一握長一尺 先剉四味用童便一

榆枝各一握長一尺 桃枝三升去渣熬成膏再用

青蒿各二斤 桃仁泥五兩

赤芍各一兩 麝甲二兩

天靈蓋酥炙微亦 研砂 木香 炙草各二

兩 麻香五錢 用前膏搗丸每三十丸烏梅

甘草湯下不拘時