

嬰
童
百
問

嬰童百問卷之九

虛羸第八十一問

仲陽云。虛羸者。脾胃不和。不能乳食。致使肌膚瘦弱。亦因大病。或吐瀉後。脾胃尚弱。不能傳化穀氣也。有冷者。時時下利。唇口青白。有熱溫壯。身熱肌肉微黃。此冷熱虛羸也。冷者木香丸主之。夏月不可服。如有此症。則少服之。熱者胡黃連主之。冬月不可服。如有此症。則少服之。傷寒後虛羸者。竹葉湯主之。常服四君子湯。異攻散。參苓白朮散。主之劑。皆可服也。橘連。

丸久服充肥兼服肥兒丸

木香丸

治疳痢冷熱不調五色雜下裏急後重。

黃連

淨一錢

木香

紫厚朴

蜜製一錢

砂仁

夜明沙

隔紙炒各二錢

诃子肉

煨二錢

右爲末粳米飯丸麻子大每十五丸乾艾葉生薑煎湯食前溫服下。

胡黃連丸

治疳勞癆漏乾疳

黃連

半兩淨猪膽汁

一夜晒乾

括蔞根

烏梅肉

杏仁

浸去皮尖

石蓮子

各二錢

右爲末牛膽汁浸糕糊丸麻子大每十五丸煎
烏梅薑漿湯下。又療蟲後附消渴方論式藥可
治癥渴及五乾癥。

竹葉湯

治傷寒表裏俱虛

及諸煩不安

石膏

二兩

半夏

四錢

人參

甘草

各二錢

麥門冬

六錢去心

右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片
粳米七粒同煎嘔加竹葉生薑。

四君子湯

治兼衛俱虛，臟腑怯弱，不食泄利。

人參

去蘆

茯苓

去皮甘艸

白朮

各等分

右爲末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘時鹽少許白湯點服溫和脾胃進益飲食辟寒

邪障霧氣

異攻散

治吐瀉不思飲食調中和氣及脾胃虛冷

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香

等分

右爲末每服三錢薑裏煎服一方去木香

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進多困少力煩滿痞噫心
忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳嗽此藥中和不熱
久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

白扁豆

半斤去皮微炒

人參

去蘿各二

白茯苓

白朮

炙半斤

山藥

各一

蓮肉

桔梗

薏苡仁

縮砂仁

各一

右爲末每服二錢，棗湯調下。小兒量大小加減。

瓶速丸

治瘦久服消食和氣長肌肉

廣陳皮 黃連

各一兩
去鬚

右爲末別研入麝半錢用猪膽七箇分藥入膽內將水煮僵臨熟以鍼微劄破以熟爲度取出以粟米粥和丸如菜豆大每服二三十丸米飲下量大小與之無時

肥兒丸

治疳多因餓乳食肉太早以致肌肉消瘦

黃連

局方加
刻豆蔻

陳皮

去白局方去
此用木香

神麴

炒局方有
使君子

麥蘖

炒各一兩加
三棱蓬虆

白蕪荑

牛兩局方用梢榔

川練子

一兩去核炒

右爲末神麴糊丸麻子大每服二十丸空心卷

飲吞下。

快活丸

治脾胃虛弱雖進乳食則遲化而中滿嘔吐肚急面黃肚疼臟腑不調寃中快膈亦治太人十噎五膈竝宜服之。

檀香

益智

蓬朮

各五錢

三稜

一兩

砂仁

薑黃

甘松

白豆蔻

甘艸

各一
兩半

陳皮

七
錢

香附子

三
兩

右爲末滴水丸麻子大每服三十九草湯自

湯任下。

胃氣不和虛冷

第八十二門

但陽云胃氣不和面光白無精光口中氣冷不思食
吐水肌瘦虛弱腹痛當補脾益黃散主之凡人以胃
氣爲本惟治病亦然胃氣有實有虛實者則有痞滿
內熱之証虛則有嘔吐不食之証虛者益之實者損
之欲得其平則可矣平胃散觀音散銀白散壯胃之
劑不可缺也

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化因倦力少滑腸夜起并消虛盜汗并除唾沫鎖下

陳皮

去白一兩丁香二錢一方用木香

調子

去自

青皮去白

甘草炙各半兩

右爲末。三歲一錢半。水半盞。煎三分。食前服。

平胃散

治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿短氣。嘔噦惡心。嗳氣吐酸。面色痿黃。體弱肌瘦。怠惰嗜臥。體重節痛。常多自利霍亂。痞噎膈氣翻胃。茲宜服之。

厚朴

去粗皮水浸一宿剉薑汁製炒五十兩

甘草

炙十兩

陳皮

去白

荳蔻

去胡皮水泔浸一

半兩

砂糖

五斤炒

右爲末。每二錢水一盞。薑二片。棗二箇。煎七分。
去薑棗。熱服。食前入鹽一捻。沸湯點服。亦得常
服。調氣暖胃。化宿食。消痰飲。辟風寒暑溫。四時
非節之氣。

觀音散

治小兒胃氣不和。嘔逆。肚利。

石蓮肉

去心

人參

神麌

炒各

白茯苓

二錢

甘艸

炙

木香

繡黃

炒各

白扁豆

炒去皮

白朮

各一錢

右剉散。每服二錢水一盞。棗一枚。藿香三葉。煎

空心溫服。

銀白散

治止吐瀉壯胃氣治糞青。

糯米

炒二兩

扁豆

炒二兩

藿香

一分

白朮

炒一分

丁香

二錢

甘草

炙三錢

右爲末。紫蘇米飲調下。加天麻砂仁白朮芩快脾正色。加炮白附全蝎木香石蓮薑煎服。

食積冷熱第八十三問

巢氏云。夫宿食不消者。脾胃冷故也。小兒乳哺飲食。取冷過度。冷氣積于脾胃。胃爲水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣調和。則乳哺消化。脾傷於冷。則宿食不消。脉沉者。傷食不化故也。亦有傷乳。傷食而身熱者。惟肚腹之熱尤甚。人之傷積。肚熱糞極臭酸。而夜間有熱。傷積之明驗。人所未曉也。冷者消食丸。木香丸。夜間有熱。天明復涼。乃是傷寒夾食失解故也。當服白餅子。先與微利。次與參蘇飲。發熱地骨皮飲。秦艽散。

退熱而安。有實熱者大柴胡湯去大黃亦可服。傷寒論人病有宿食何以別之。師曰。寸口脉浮而大按之反澁。故知有宿食。當下之。宜大承氣湯。其喘而發熱者。紫霜丸主之。冷症用進食丸尤佳。亦治食厥。乃四肢逆冷。面色青黑是也。或當吐而甦。有痰者。溫膽湯加減服。痰定而嘔自痊。冷症可香丸可服。白餅子下痰亦可。

消食丸常服寬中快氣消乳食正顏色

縮砂

陳皮

三棱

蓬朮

神麩炒

米泔水

麥蘖炒

香附子

米泔水宿炒

枳殼

檳榔

烏梅

各五錢

丁香

二錢五分

右爲末。麩糊丸如菜豆大。食後紫蘇湯送下。二

三十九。

木香丸

常服治吐乳鴻乳食積停滯不化

木香

蓬朮

砂仁

青皮

去白

朱砂

研細

代赭

研各二錢

大丁香

一錢

川巴豆

肉油去

右爲末和勻。飛白麩糊丸。麻子大風乾。每服二

三丸。乳傷乳汁下。食傷米飲下。

丁香丸

丁香

砂仁

二十粒

史君子肉

五錢

烏梅肉

巴豆肉

各三箇去油

右爲末，燜飯丸，麻子大。每服二三丸，陳皮湯下。

虛實腫脹

第八十四問

議曰腫脹二症此由虛中有積久患失治日漸傳變
症候多端隨輕重察盛衰審表裏以主治先固其本
後正其標斯無恙矣有濕腫有毒氣腫傷寒虛腫瀉
痢虛腫氣血虛腫有肝脹氣脹癥積脹鎖肚脹脘膈
脹食膨脹蛔氣脹虛冷積脹以上腫脹虛積茲當下
之各有其法其受濕於脾胃久不消化氣浮四肢頭
面皆腫食毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停蓄于脘膈
致虛入腹作腫傷寒下之太蚤乘虛入腹作腫瀉利

之人脾氣亦虛是以致腫以上宜平調胃氣補臟充實方可去腫其氣血虛腫皆由榮衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脉表裏俱虛邪正相亂以致四肢浮腫腹肚膨滿以上先調榮衛之順次服分氣以散之其疳氣積脹宜先與保童當兼塌氣以去之其痞癧氣脹癟脹宜三稜以消痞其鎖肚脹宜與珍珠大麻丸以通之其上膈中脘食傷膨脹宜三稜塌氣大茱連丸以消磨之其蛔脹宜下蟲丸以化之其虛冷積脹宜沉香煎以溫之以上諸症宜調和胃氣消磨

通利腫脹必然平復矣。如有熱者必以葶苈子半牛蒡
輩以治之。推氣丸劑亦可服。

分氣飲

治小兒腫脹喘急而氣短。

桔梗

赤茯苓 陳皮

桑白皮 劍

大腹皮

枳殼 炒 半夏麪

真蘇子 微炒

紫蘇

甘艸 炙各二錢 草菓仁

一錢

右剉散每服一錢半。薑棗煎服。

五疳保童丸

治五種疳疾

五倍子

生青黛

夜明沙

裹洗苦練根皮

蘆薈

熊膽

研

黃連

去毛洗龍膽艸

乾蟾

酥炙去皮各等分

麝香

研

蕪荑

取仁

右爲末。粟米糊丸。麻子大。一歲兒二十九。飯飲
下二三服。

楊氏塌氣散

治小兒腹脹氣喘體腫面浮。

陳皮

金步青皮炒黃色去巴豆用

甘草

參各半兩

黑牽牛

二錢半炒炒

肉豆蔻

二錢半炒炒

右末半錢米飲調下。加檳榔一箇。

瘡氣丸

治小兒痘氣腹脹喘急並面浮腫

丁香

胡椒

炒各五錢

萊菔子

炒白牽牛各七

牽牛

各半錢

右爲末麵糊丸小豆大。三歲三十丸米湯下。

瘡氣散

治小兒腹脹氣粗并痘疾相攻面目浮腫

木香

一錢

青皮

五錢

巴豆

三十粒

同炒豆

黃色去巴豆用

右爲末。三歲半錢。米湯下。食前連進即效。

三稜煎丸

治嬰孩食傷生冷甜膩毒熱等物。脾胃積滯久不消化。令兒壯熱脚冷。痞癧寒熱及療癥瘕中。脘不和。膨脹上膈氣壅心腹不得通宣。所以作疾。此藥溫涼但是諸積滯食不化。竝宜與服。

京三稜

成塊而
煮半兩

蓬木

竝炮
半兩

茺花

二錢半
醋浸炒

鼈甲

去裙米
醋煮半兩

淡豆豉

二錢

巴豆

二十
粒去殼

川當歸

半
生
桑
皮
半
兩

杏仁

去皮
尖二錢

半炒

令末

右前四味一處以米醋一碗煮令乾仍用炒起
更細剉焙爲末次入當歸末杏仁巴豆淡豉和
勻水煮麪糊丸麻子大每服二十九。薑湯下大
小量加減服之。

三稜丸

治小兒停積腹脇脹滿乾噦惡心全不入食

三稜 根 木香 神曲 炒 陳皮 去白
半夏 製各兩 丁香 桂 各五錢

右爲末麪和丸如黃米大每二十九。乳食後溫

生薑湯下

真珠天麻丸

治急驚風。請量用之。以通爲度。此方仍治附陽。
鎖肚撮口至妙。丸如麻子大。初生患者三日三
丸。五日五丸。七日七丸。加青黛名青黛丸。

天南星

炮天麻

白附子

炮各二

膾粉

半錢

巴霜

一字

蕷黃

炒

全蝎

滑石

各二

錢半

右爲末。煮細麪糊丸如麻子大。一歲每服五丸。

二歲十九丸。大小加減。薄荷湯點茶清送下。

大柴連丸

治小兒飲食過度。胸膈膨脹。上下氣不宣通。驚
滯迷悶。情思少樂。大則作喘。飲食不化。作渴煩
躁。坐臥不任。肢體倦怠。腹脇疼痛。

蓬朮

京三稜

各二錢半
研者

乾薑

炮

陳皮

去白

木香

丁香

各三錢

巴豆

二十一粒去膜心出油用

綠綬小茱萸

二錢

右爲末。醋和爲丸。麻子大。每服七丸。至十九大。

者加服生薑棗子湯下。

下蟲丸

治疳蛔諸蟲

苦練根皮

酒浸
焙

綠色貫衆

木香

蕪荑

焙

桃仁

浸去皮
焙

雞心

檳榔

二錢

鶴虱

炒

輕粉

各半錢

乾蝦蟇

炙三錢

史君子

五十個
取肉用

疳勞之症。

右爲末飛麪糊丸麻子大每服二十丸天明清
內汁下內加當歸川黃連各二錢半治積疳兼

沉香煎

治脾氣冷積

乳香

沉香

丁香

杏仁

炒

百草霜

木香

各一錢

肉豆蔻

一個

巴豆

十四粒如霜油

右爲末酒煮蠟丸大。每服三五丸。生薑湯送下。應患肚痛不止者。服之效。常服以通爲度。

推氣丸

治三焦痞塞氣不升降大便祕滯

太黃

陳皮

檳榔

枳實

炒去殼

黃芩

黑牽牛

各等分
生用

右爲細末煉蜜丸菉豆大每服二三十丸臨臥溫熱水下量虛實加減

遇僊丹

治諸蟲取諸積

牽牛 三斤 大腹子

二兩 灰

二兩 灰

大黃

四兩 雷丸

四兩 青木香

鶴虱

各二兩

乾漆

十一兩 皂角

四條

右後四味煎水服用粟米煮粥初用牽牛末次用

大腹末三用錫灰四用大黃五用雷丸六用

木香相劑丸如梧桐子大每服五七丸用薑湯
熱水送下

此藥專治男子婦人積蟲氣塊，五勞七傷，赤白
痢疾，便血，注下，皮黃水腫，一般氣，十一般惡蟲。
又進飲食，除病悅顏色，不與他藥相反。四季可
服，細末三四錢量大小加減，服時不喫晚飯。三
更用清茶下。次盃，桶子內蟲積及粒米盡方可
洗面溫粥補之。傷寒孕婦不可服。

蛇蟲第八十五問

巢氏云蛇蟲者九蟲之內一蟲也長二尺亦有長五六寸者或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中痛發作脛聚行來上下痛有休止亦攻心痛口喜吐涎及清水貫傷心者則死診其脈腹中痛其脉法當沉弱而弦反脉大則是蛇蟲也此痛因食物太早愛甜怕苦痛時便高聲啼叫只看人中上鼻頭唇口一時黑色即是此症當服史君子丸檳榔散化蟲丸藥取下便無事仲景云蛇厥者其人當吐蛇今

病煩此爲臟寒烏梅丸主之其蛻蟲穿心者用薏苡根煎湯治之卽安。

史君子丸

治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復痞痛不進飲食漸至羸瘦茲宜服之。

白芍藥

厚朴

繫

陳皮

去白

川芎

甘艸

各二錢半

史君子肉

湯浸去黑皮一兩

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸陳米飲化下大治小兒腹痛。

檳榔散

治腎疳宜露候良方去蟲後服此。

木香

檳榔

人參

黃連

甘草

火谷等分

右爲末每一錢水者五分熟水調服。

化蟲丸

治小兒蟲咬心痛來去不定不思乳食。

鴻虱

炒一錢半

檳榔

胡粉

練根皮

各一兩

白礬

微火搗半

火搗半

右爲末。麪糊丸。茱豆大三歲三十丸。溫漿水入油三五滴吞下。食前有蟲皆化爲水。大蟲自下且初服甚妙。

烏梅丸

治蛻厥。其人當吐蛻。今病者靜而復煩。此爲陽寒蛻蟲上入其腦。故須臾復止得食而僵。又主者蛻聞食自出。其當自吟蛻。又治久痢。

烏梅

七十个

乾薑

二兩

黃連

四兩

獨根

一兩

當歸

各

細辛

人參

附子

炮去

桂枝

去皮黃藥

各一兩半

右爲末用酒浸烏梅肉一宿去核蒸飯杵成泥
和藥勻丸麻子大每服十九食後米飲下日三
服忌生冷等物

陰腫疝氣

第八十六問

巢氏云。足少陰爲腎之經。其氣下通於陰。小兒有少陰之經虛而受風邪者。邪氣衝於陰。與血氣相搏結。則陰腫也。然兒有大小壯弱。起止中節可也。苟腎經氣虛。或坐石不起。冷氣凝之。或近地經久。風邪濕氣傷之。不爲陰腫者幾希矣。間有啼叫怒氣。閉擊於下。結聚不散。加以水竇不得。亦能發爲此疾。治法桃仁丸。如小兒外醫腫大。莖物通明。牡蠣粉研極細。雞子清調傅爲佳。又有疝氣名偏墜。急宜下藥。小兒生下。

亦有如此者。不疼不痛。此皆不須攻擊。不治而自愈。若腫痛甚急。當服藥。宜五苓散。青木香丸。湯氏化生丸。并疎氣藥。濟生方。牡丹皮防風爲末。酒調服。極效。五苓散加防風。牡丹皮亦效。此症有熱甚者。三黃丸治之。

桃仁丸

治腎經氣虛。或坐石。不起。冷氣凝之。或近地經久。風邪濕氣傷之。而成陰腫。間有啼叫。怒氣閉擊於下。結聚不散。加以木實不行。亦能發此疾。

桃仁

去皮尖微炒少

辣桂

黑牽牛

白蒺藜

炒香去刺少

牡丹皮

大黃各一錢

右爲末煉蜜丸麻子大每服五丸或七丸青皮木通葱白入鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香灌下亦可

五苓散

治水道不分以水氣

澤瀉

半兩

猪苓

半兩

白朮

半兩

茯苓

半兩

桂

一兩

右爲細末每服二錢煎湯調下不拘時服多飲

熱湯有汗出卽愈又治濕熱在裏身發黃疸濃
煎茵陳湯下食前服痘病發渴及中暑引飲亦
可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿
黃蓍人參末少許服之前十六問辰砂五苓散
參用。

青木香丸

治寬中快膈腹脇痛心下堅癰腸中水聲及陰
腫等症。

黑牽牛

炒一兩半

朱香

補骨脂

炒

草澄茄 檳榔

各四錢

右先將粟米飯包檳榔仍用濕紙包裹煨焦去
飯用檳榔同煎藥爲末滴水丸蒙豆大每服二
十丸白湯送下。

楊氏化生丸

治疝氣心腹痛上引腰脊飲食不節而色痿黃。
身不能直百藥俱試經涉年歲已在嘗盲宜服
此藥灸脊俞三壯痊。

木香

兩 三棱

根

莪朶

溫紙裹

檳榔

半

青皮

巴豆炒
去巴豆

陳皮

炒
川練子去核

芫花

各等兩
醋浸炒

右爲細末。麪糊丸如黍米大。熟水下。日進三服。
牡丹皮散

治小兒癩卵癰瘍

防風

去蘆牡丹皮
等分

右爲末。每服二錢。溫酒調服。如不飲酒。鹽湯點
服亦可。加入五苓散。木通湯下尤妙。

三黃丸

消三焦積熱。有熱攻衝。眼目赤腫。頭項腫

痛。口舌生瘡。中焦有熱。心膈煩燥。不美飲食。下焦有熱。小便赤澁。大便秘結。五臟俱熱。卽生背癰癧毒。及治五般痔疾。糞門腫痛。或下鮮血。消酒氣效。

黃連

去蘆

黃芩

去蘆

大黃

根各半兩

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每三十九。滾湯下。如感腑壅實。加服丸數。小兒積熱可服。

盜汗骨蒸第八十七圖

白雲盜汗出者乃睡而自汗此肌肉虛也。圃參湯治小兒盜汗虛汗或心血液盛亦發爲汗此藥收斂心氣湯氏云汗者血也血虛亦能自汗作熱宜服圃參湯牡礪散龍膽湯治小兒一切盜汗又有通神丸治通身多汗小兒精氣未盛體性多熱若衣裘傷厚過食熱物或犯時氣大病之後重亡津液陽氣偏盛手不勝火腑臟積熱蒸灼肌體甚則銷爍骨髓是爲骨熱之病久而不已變成骨蒸日晚發熱肌瘦頰赤

口乾。日夜潮熱。夜有盜汗。五心煩熱。四肢困倦。飲食減少。瘥後餘毒不解。生犀散主之。

園參湯

治小兒虛汗盜汗。或心血液盛。亦發爲汗。此藥收斂心氣。

新羅人參

川當歸各五錢

右剉散用雄豬心一箇。切三片。每服三錢。猪心
一片。水一盞。煎六分。食前兩次服。

錢汗方

治表虛自汗

黃連

牡蠣粉

貝母

各半兩

米粉一湯匙

右末傅於身上。

牡蠣散

治血虛自汗或病後累虛津液不固自汗。

牡蠣散

兩

黃芪

二兩

生乾地黃

一兩

右剉散每服二錢水半盞煎五分去滓不拘時
服或爲末米湯下或加小麥煎。

龍膽湯

治小兒血虛自汗

龍膽草

鈎藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘坤

蟻娘

二枚去頭且足

大黃

一兩

各六錢

右十味㕮咀以水一升取五分爲劑也服之如後節度藥者有虛實藥宜足數合水也兒生一日至七日分一合爲三服兒生八日至十五日分一合半爲二服以漸加服皆得下卽止勿再服也。直指方爲末每服一錢井聚煎服或加防風麥門冬以導心熱黃芩減半去蟻娘亦可。

治小兒白日精神歡悅至夜臥通身多汗。

龍膽草

不拘多少

右爲末。米醋煮糊丸如椒目大。每服五七丸。用飯飲下。一方加防風等分。水煮糊丸。

生犀散

治小兒骨蒸潮熱。盜汗肌瘦。

犀角屑

鼈甲

各一錢

柴胡

知母

地骨皮

胡黃連

各一錢

大黃

桃枝

各半錢

右剉散。每服二錢水一盞。煎五分去滓服無時。

議曰。凡初生至周辟之兒不可自汗。自汗則亡陽氣。性脈虛神散。驚風有作。凡乳幼自汗切勿止之。宜用白朮二錢半。小麥一撮。煮令乾去麥爲末。煎黃耆湯調與服。以愈爲度。有傷寒熱症。自汗當以小柴胡加龍膽治之。夏月自汗多立白虎湯主之。熱多自汗而喘者。葛根黃連黃芩湯主之。

小柴胡湯

治小兒傷寒潮熱少陽汗出

人參

去蘆

甘艸

炙各

三錢

黃芩

二錢

柴胡

去蘆八錢

半夏

湯泡七次
乾二錢半
水一錢半

右剉散每服二錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。煎去滓溫服。不拘時。

白虎湯

涼夏月自汗及陽明風邪不解。

知母

三兩甘草一兩石膏八兩粳米三合
另研

右剉散每服三錢水一盞。煎六分米熟爲度去

滓溫服聖惠方加乾葛

鴉根黃連芩湯

治太陽病桂枝症後下之利遂不止。脉促者

未解也。喘而汗出者。

葛根

二兩

黃芩

黃連

各七錢
五分

甘草

五錢

白朮

右剉散。每服三錢水一盞。須七分去滓加減服。
喘甚加葶苈子。

渴症 第八十九圖

議曰小兒渴症一見唇紅如丹三五分卽發三五分渴若紅甚卽渴甚唇紅焦黑者卽久渴虛盛疾加轉極症危篤故也。凡小兒三焦虛煩作渴引飲不歇宜服三黃丸。小兒傷寒後發渴唇口焦乾煩燥盛者自虎湯主之竹葉湯亦可服小兒瀉利作渴者五苓散去桂加乾葛尤妙。香薷飲車前子散皆可服。小柴胡湯加天花粉亦佳加乾葛尤穩。大熱煩躁而渴者黃連解毒湯亦可服。七物黃連湯亦可服。極穩大抵小

兒本自盛實。易爲生熱。熱氣薰蒸。故渴而引飲也。

三黃丸

治小兒三焦虛煩大渴引飲

黃連

去蘆

黃芩

大黃

銀各
十兩

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每三十丸。熟水下。如臘
肺壅實。加服丸數小。兒積熱可服。

竹葉湯

治傷寒發渴

石膏

二兩

半夏

四錢

人參

甘草

炙各一錢

麥門冬

六錢
去心

右剉散。每服二錢。水一盞。青竹葉生薑各四片。

水一盞。

青竹葉生薑各四片。

梗米七十粒同煎啜加生薑竹葉

白虎湯

治陽明經口渴欲死

知母

三兩甘草一兩石膏八兩

梗米

三分另研

右剉散每服三錢水一盞煎六分米熟爲度去

滓溫服聖惠方加乾葛

五苓散

澤鴻

二兩半

猪苓

白朮

茯苓

一兩半

桂

一兩

右爲末每二錢熱湯調下不拘時服多飲熱

湯

有汗出卽愈。又治濕熱在裏身發黃痘濃煎茵

陳湯下。食前服痘病發渴及中暑引飲亦可用

水調服。小兒加白朮末少許如發虛加綿黃蓍

人參末少許服之。前十六間辰砂五苓散參用

香薷飲

治夏月中暑下咽卽甦

香薷

一兩

白扁豆

炒厚朴

蓋製各半兩

右剉散每三錢水一盞生薑三片煎服。一方加

黃連治瀉痢一方加芍芷香蘇散治霍亂吐瀉。

暑月感冒傷暑之症。

車前子散

治暑月伏熱霍亂吐瀉

去滓溫服不拘時

黃連解毒湯

治大熱煩躁而渴

黃連

三錢

黃芩

五錢

梔子

四個

黃芩

一兩

右剉散。每服三錢水一盞，煎六分去滓溫服。

治症同前

七物黃連湯

黃連

茯苓

芍藥

各七錢半

黃芩

甘艸

乾薑

各二兩

小麥

三分合

右剉散。白水煎止渴，加枳實半兩。

煩燥 第九十一門

論語云：噬煎不安是煩，噬嗟不定是躁。噬煎者，心經有熱，精神恍惚，內煩不安。心煩則滿，自然生驚。噬嗟者，心經有風邪，精神恍惚，心燥生風。熱多不安，煩久而驚風多不定。燥久而搐，治法涼心經退熱，通利小便爲佳。熱甚者，黃連解毒湯；輕者，導赤散；玉露散，風熱者，至寶丹；琥珀散，解毒丸，皆可服。有傷寒症者，小柴胡湯；白虎湯；大柴胡湯；去大黃加乾葛治之。有驚熱者，金箔鎮心丸；七物黃連湯尤妙。

黃連解毒湯

治煩渴欲死下咽即生

黃連

三錢

黃芩

半兩

梔子

四個

黃芩

一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

玉露散

治噦瀝煩躁不安

寒水石

石膏

各二兩水飛

甘草

三錢

右爲末每服半錢麥門冬湯下湯使隨意加辰

砂金箔名桃紅散亦治急驚入梔子仁名金蓮

散加滑石半兩名玉真散湯氏方治小兒春秋夏

伏暑多有熱吐黃涎頭額溫五心熱小便赤少

或乾嘔無物宜服香薷 又宜服玉露散生薑

汁和白湯調下獨用薑汁一服而止。

導赤散

治心驚內虛邪熱

生地黃 甘艸

木通 各等分

右㕮咀竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎服。

至寶丹

治精神恍忽心燥生風

生犀屑

玳瑁屑

琥珀 研

朱砂

細研水飛

雄黃

細研水飛一兩

金箔

五十片一兩爲衣

銀箔

五十片研水飛一兩

麝香

一錢研牛黃半兩

安息香

一兩半爲末以無灰酒飛濾去沙石約取一兩慢火熬膏

右生犀屑玳瑁搗羅爲細末研入諸藥令匀

將

安息香膏以重湯煮凝成和搜爲劑如乾卽入少熟蜜盛不津器中旋丸桐子大二歲兒服二

丸人參湯化下大小以意加減又治大人卒中

不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死

胎不下竝用童便少許生薑自然丹三五滴同

溫過化下五丸立效

琥珀散

治煩躁不寧消風活痰

辰砂

一錢半

牛黃

僵蠶

炒去
絲者

南星

水浸夏三日春秋五月
冬七日牛膽中烈火燒

全蝎

去毒

白附子

代赭石

天麻

乳香

蟬蛻

各一錢

麝香

五分

片腦

一字

右爲末三歲半字薄荷湯下慢驚加附子

青解毒丸

治小兒五臟積熱毒氣土攻胸膈煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒而赤身

熱心煩燥而渴飲食不下。

寒水石

石膏

研各八兩青黛

四兩

右研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調丸芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯下亦可中諸毒竝宜服及小兒驚風潮熱痰涎壅塞心胸煩燥頰赤多渴坐臥不穩每三歲兒可服半粒量大小加減

小柴胡湯

治少陽傷寒煩躁不眠

人參

去皮

甘草

黃芩

錢

柴胡

去皮

二錢

半夏

湯泡七次
乾二錢半

右剉散。每二錢水一盞。生薑三片。棗一枚。去滓。

溫服不拘時。

白虎湯

治陽明煩躁

知母

三兩
甘艸一兩
石膏八兩
炙

石膏

八兩
另研
粳米三分

右剉散。每三錢水一盞。煎六分米熟爲度。去滓。溫服。聖惠方加乾葛。

大柴胡湯

治腹中結硬煩躁下之。取愈。

柴胡

去蘆八錢

黃芩

赤芍藥

各三錢

半夏

湯泡七次切片
焙乾二錢五分

枳實

去穰頭炒五分

右咬咀薑聚煎加減服之。欲下加大黃五錢。

金箔鎮心丸

治驚悸瘧聚上腕煩躁欠安

朱砂

一兩

白茯苓

人參

甘艸

各半兩

山藥

一兩半

腦子

一錢

牙硝

一錢半

麝

五分

紫河車

二錢半

黑豆煮

金箔

十二帖

爲衣

右爲末。煉蜜丸。每兩半作五十丸。以金箔爲衣。

每服一丸。薄荷湯下。含化亦可。隨時常服安心。

鎮神祛邪熱涼咽膈止驚啼。

七物黃連湯

治夏月傷寒。四肢煩痠。發熱。其人喜煩囁逆。
滿劇如禍祟。寒熱相搏。故令喜煩。

黃連

茯苓

芍藥

各一兩

黃芩

甘艸

乾薑

各一兩

小麥

三合

右剉散。白水煎。欲止渴。加枳實半兩。