

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之八

脫肛并痔症

第七十一問

湯氏方治脫肛大腸自糞門出宜用蔥湯薰洗令軟款款送上此因瀉利得之者亦可服瀉利之藥然後用槐花等藥又有用_一螺五倍_一煎湯入朴硝薰洗而縮者又有用真蒲黃碾極細以猪膽拌勻傅肛門上而入者全嬰方用遊腸散兼有痔症腫痛者用黃丹滑石等分_一井冰調塗_一卽消并用_一銻白霜半錢_一片腦半字好酒調傅腫處甚佳黃連解毒湯亦可服用若

參湯洗亦效。亦有蜜陀僧白礬片腦末傅上。更用荆芥防風等項洗之。用生括蕪根者效。

一 澁腸散

治小兒久痢。大腸脫出不收。

訶子炮

赤石脂 龍骨

右爲末。臘茶少許。和藥摻腸頭上。絹帛搽入。又治痢米湯調。又方治脫肛。五倍子焙爲末。入茶依前方用。

丹石散

治外痔如神

黃丹

滑石

等分

右爲細末新汲水調塗口三五上

勝雪膏

治隨腸番花鼠妳等痔熱痛不可忍或已成瘻者。並皆治之

片腦

鉛白霜

右件各半字。用好酒少許研成膏子塗之。隨手輒愈。

黃連解毒湯

治痔漏下血大腸火症

黃連

三錢

黃蘗

半兩

梔子

四個

黃芩

右剉散。每服三錢水一盞煎六分。去滓服。

苦參湯

治脫肛并痔

枳殼

黃連

大黃

甘草

荆芥

苦參

赤芍藥

黃芩

各等分

右剉散。每用五錢以車前子茅草同煎薰洗。

又方

用生括蕒根研粉。猪油溫煖投入。又用草麻子貼頭頂上。腸卽入。便去草麻。

便血臟毒

第七十二問

議曰。兒生七日之內。大小便有血出者。此由胎氣熱盛之所致也。母食酒麪炙煖物。流入心肺。兒在胎內受其熱毒。亦傳心肺。且女子熱入心。故小便有之。男子熱入肺。故大腸有之。血出淡淡。有似坯水。盛則其血加鮮。凡遇有此。不可以他藥。只以生地黄根。取自然汁。入蜜少許。和勻。溫溫與服。移時自安。男子皆效。甘露飲宜兼與服。茅根茅花煎濃湯服亦妙。犀角地黃湯亦可服。臟毒聚金丸用之效。地黃丸亦可用。

有瘀血者桃仁承氣湯下之。

甘露飲

治小兒胃中客熱牙宣口氣齒齲腫爛時出膿血常欲合閉或饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫疼瘡疹已發未發皆可服之療身面皆黃腫體微腫胸膈氣滿大便不調小便黃澁或時身熱並皆治之。

熟地黃

麥門冬

去心

枳殼

去穢

甘艸

炙

山茵陳

枇杷葉

地

石斛

去虛

黃芩

生乾地黄

天門冬

各半斤

右剉散每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服小兒一服分作二服仍量歲數加減服

聚金丸

治大便秘下血發熱煩燥腹中熱痛作渴脈來弦數或驚熱目赤昏澁或有酒毒去血竝治之。

黃連

四兩一兩水浸晒乾一兩炒一兩炮一兩生川

黃芩

防風

去蘆各一兩

右件爲細末煮麩糊丸桐子大每服五十丸量

意加減以米泔浸枳殼水下。不拘時候夏月入
大黃一兩三時不須用。或枳殼爲末。入前藥爲
末亦效。小兒九菉豆大。亦治血痢。

犀角地黃湯

治傷寒及溫病。應發汗而不發汗。內有瘀血吐
血鼻衄。面黃大便黑。此方主消化瘀血。兼治瘡
疹出得太盛以解之。

生犀屑

如無以升
麻代之

牡丹皮

去骨各
一兩

生地黃

半斤

芍藥

七錢

右剉散每服三錢水一盞煎服

千金地黃丸

治心熱腸風臟毒去血。

黃連

四兩
粗末

生地黃

半兩研取汁連滓二
味拌今日中晒極乾

右末蜜丸桐子大每三十九食後麥門冬湯下
量大小加減。

枳仁承氣湯

治大便秘積下鮮血或黑

川大黃

四兩

桂皮

甘州

芒硝

各二兩

桃仁

五枚去尖雙仁
皆同惟外書用一伯五士

右剉散每三錢米煎服以快利爲度末利再投

大便不通

第七十三

議曰。小兒大腸熱。乃是肺家有熱在裏。流入大腸。以致秘結不通。乃實熱也。當以四順清涼飲。加柴胡。熱甚者。加山梔。黃芩。流利之。其表裏俱熱者。而黃頰赤。唇燥口乾。小便赤澀。大便焦黃。無汗者。先解表。以柴胡散汗之。解後。大便秘。或肚疼者。以清涼飲。大柴胡湯。承氣湯。皆可下之。積熱者。神芩丸尤妙。

四順清涼散

通順大腸。令無壅閉。

赤芍藥

當歸

甘草

大黃

各等分

右吹咀三歲已上每服一錢水一盞煎七分作
兩服欲利小便用赤芍藥虛熱加甘艸不利減
大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上視
加獨活量兒大小虛實加減微溽利為度可加
荊芥。

柴胡散

治大便不通

石膏

黃芩

甘艸

赤芍藥

葛根

各一

麻黃

去節

柴胡

半兩

右吹咀三歲兒每服一錢水一小盞生薑少許

蔥白三寸。豉二十粒。煎五分。去滓。溫服。不拘時。

出汗爲效。治熱嗽。加杏仁五味子各二錢。

大柴胡湯

治大便秘結蓄熱于內

柴胡

去蘆八錢

黃芩

赤芍藥

各三錢

半夏

湯泡七次切片焙乾二錢五分

枳實

去穢炒半錢

右咬咀。薑棗煎。加減服之。欲下加大黃半兩。

大承氣湯

治邪熱結于胃中及宿積不去

大黃

芒硝

各半兩

厚朴

一兩

枳實

二枚

右剉散。每服三字。薑三片煎服。

神考丸

治熱積于內大便閉塞

大黃

黃芩

各二兩

生牽牛末

一兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

滑石 四兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十九食後
溫水下。一方加蒲黃止血症用

輕虢散

治見初生大便不通

輕粉

一分

蜜

少許

右以熱湯調開蜜糊輕粉點兒口卽通與一二
次再不可與

小便不通

第七十四明

湯氏云凡小兒小便不通皆因心經不順或伏熱或驚起心火上攻不能降流腎水不能上升故使心經愈然而小腸與心合所以小便不通木通湯主之甚者八正散又小便不通臍腹脹悶心神煩熱梔子仁散主之積熱者神芩丸效

木通湯

治小便不通小腹疼痛

木通

滑石

各兩

黑牽牛

炒各兩

右咬咀燈心蔥白煎去滓大小加減以意

八正散

治小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引
飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口
舌生瘡咽喉腫痛及治小便赤澀不通熱淋血
淋之症。

車前子

瞿麥

滑石

大黃

濕紙
裹

山梔

扁蓄

木通

甘艸

右剉散每二錢水一盞入燈心煎七分去渣溫
服食後臨臥小兒量力少少與服。

葱號散

治七日小便不通

葱白

三四寸

人乳

右件同搗如泥付兒口內卽與乳下

梔子仁散

治小兒小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁

五枚

茅根

剉

冬葵子

各半兩

甘艸

減半

右剉散每服立錢水一小盞煎五分去滓不拘

時候溫服

神芩丸

治症見前大便不通并治小便不利

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

二兩

滑石

四兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五丸食後
溫水下。一方加蒲黃止血症。

大小便不通

第七十一問

議曰調理嬰孩傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚
夾食寒熱大小便閉澁不通煩燥作渴冷汗妄流夾
積傷滯脘滿脹急青黃體瘦日夜大熱及療傷風傷
暑驚癇客忤腎臟疳氣等熱並宜脫甲散主之亦可
服大連翹湯加大黃神芩治小兒驚風積熱大小便
澁滯其效尤速又掩臍法用連根蔥一根不洗帶泥
土生薑一片豆豉二十一粒鹽二匙同研爛捏餅烘
熱掩臍中以綿扎定良久氣透自通不然另換一劑

小便不通亦可前一問通用。

脫甲散

治大小便不通

柴胡

去蘆

當歸

洗

龍膽

去蘆

白茯苓

各二錢半

人參

二錢

知母

甘州

寒

川芎

各三錢

右判散每服二錢水一小盞連翹蔥白三寸煎

至半盞溫服不拘時此方散熱扶表救裏表虛

令汗不妄行裏熱冷氣不閉結外卽通關內卽

開渠通關流行經絡開渠不壅臟腑熱在表裏

之間施無不可積傳驚之痼用立見功

大連翹湯

治二便閉結

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

蟬蛻

柴胡

活石

甘艸

炒各錢山梔仁

黃芩

各五分

右剉細每服一錢加紫草煎濃服熱甚加大黃

更詳症加減爲佳

神效丸

治二陰並閉

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

二兩

滑石

四兩

黃連

薄荷葉

川芎

各生

右爲細末。滴水丸。桐子大。每服四五十丸。食後
溫水下。一方加蒲黃止血症用。

掩臍法

治大小便不通

海螵

四十粒

蔥根

帶土

黑豆

七個

搗少許

右同研爛捏成一餅。烘熱放臍上。以帛扎定。久

則自通。

五淋

第七十六問

張氏云。小兒諸淋者。腎與膀胱熱也。膀胱與腎爲表裏。俱主水。水入小腸。下于胞。行于陰。爲小便也。膀胱熱。則津液內溢。水道不通。停積于胞。腎氣熱。則蒸故令水道不利。小便淋瀝。故謂之淋。其狀小便出少而數。其小腹急痛。引臍是也。又有石淋。氣淋。熱淋。血淋。寒淋。五淋形症。各有說焉。其石淋者。淋而出砂石也。腎與熱所乘。則化爲石。小便莖中痛。尿不能卒出。時自痛。引膀胱裏急。砂石從小便而出也。其氣淋者。腎

與膀胱受肺之熱氣則脹氣爲熱所乘故流入膀胱則氣壅不散小腹氣滿水不宜利故小便澁而成淋也其熱淋者三焦有熱氣得于腎與膀胱故熱氣流入于胞而成淋也其血淋者是熱之盛甚則尿血帶之血淋心主血其熱甚者血則散漫失其常經滲入胞而成血淋矣若熱淋者其病狀先寒戰然後尿是也小兒取冷過度下焦受之冷氣入胞于正氣交擊寒氣正氣相勝則戰寒氣解故得小便也治淋之散立效五苓散木通散等劑機變用藥必可

求痊導赤散亦效。與大方脉相參用藥不亦可乎。

金砂散

治小便淋瀝不通

鬱金

海金沙

滑石

甘艸

各等分

右爲末。三歲兒一錢煎落蒂湯調下。燈心木通湯亦可。冬瓜最治小兒小便不通淋瀝并渴。

立效散

治小兒諸淋不通。腹中疼痛。

木通

甘艸

白孩兒花

名王不留行

胡荽

滑石

海金沙

山梔

檳榔

各等分

石剉散每服二錢水半盞煎三分去滓服

木通散

治小兒小便不通小腹疼痛

木通

滑石

各兩

黑牽牛

炒字兩

右爲粗末燈心蔥白煎去滓大小加減以意

遺尿 第七十七問

巢氏云遺尿者此由膀胱有冷不能約于水故也腎主水腎氣下通于陰小便者水之餘也膀胱爲津液之府既冷氣衰弱不能約水故遺尿也楊氏云小兒尿床由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出宜破故紙散治之益智之劑亦不可闕。

破故紙散

治小兒夜間尿床由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出。

破故紙

右一味炒爲末熱湯調下

又方

益智

生

白茯苓

去皮 茯神

去皮

等分

右爲細末空心清茶調下亦治白濁

又方

五倍子

一半生一半燒存性

右爲末雪糕爲丸每服三十粒米飲下

尿白濁 第七十八調

湯氏曰。小兒尿白者。由乳哺不節。過傷于脾。故使清濁不分。而尿白如米泔也。久則成疳。亦心脾伏熱。兼而得之。宜疎脾土。消食化積。通利小腑也。茯苓散主之。三稜散消食丸。可選而用之。分清飲亦可服。

茯苓散

治小兒尿白如米泔。因乳哺失節。有傷于脾。致使不分清濁。而色白也。久則成疳。亦心脾伏熱。兼而得之。

三稜

蓬朮

煨

縮砂仁

赤茯苓

各半兩

青皮

陳皮

滑石

甘艸

微炒各二錢半

右爲末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下。

三稜散

治小兒尿白者由乳哺不節過傷于脾故使不分清濁而白也久則成疳宜疎土消食化積

三稜

蓬朮

煨各一兩

益智

甘艸

神麩

炒

麥蘖

炒

橘皮

各半兩

右爲末每服一錢白湯調下

分清飲

治通心氣補漏精治小便餘瀝并赤白濁

益智仁 川草薢 石菖蒲

天台烏藥

各等分

右爲細末入些子鹽空心服或燈心煎湯調下。
可加茯苓白芍藥

疴症 第七十九節

仲陽云諸疴皆脾胃之病。內亡津液之所作也。因大
瀉或吐瀉後。以藥吐下。致脾胃虛弱。內亡津液。且小
兒病疴。皆庸醫之所壞病。如潮熱是脾臟虛。一臟實
而內發虛熱也。法當補母而瀉木。臟則愈。假令中日
發潮熱。是心虛熱也。肝爲心母。則宜先補肝。肝實而
後瀉心。心得母氣而內平。而潮熱愈也。醫見潮熱。妄
謂其實。乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之。既利多矣。不
能禁約而津液內亡。卽成疴也。又有病疴。其疾發作

寒熱飲水。腸下有形。硬痛。治癖之法。當漸消磨。醫反
 以巴豆礪砂輩下之。小兒易虛易實。下之既過。胃中
 津液耗損。漸以疳瘦。楊氏曰。小兒臟腑嬌嫩。飽則易
 傷。乳哺飲食。一或失常。不為疳者鮮矣。則疳以傷得
 恣食甘肥粘膩。生冷鹹酸。以滯中脘。則疳因積成。或
 乳母寒暄失理。飲食乖常。喜怒房勞。即與兒乳。則滯
 因母患傳氣而入。此非病家不能調適之過。半疳之
 為候。頭皮光急。毛髮焦稀。腮縮鼻乾。口饒唇白。兩眼
 昏濼。揉鼻持眉。大目聳體黃。鬪牙咬甲。焦渴自汗。尿白

海酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土
而飲水飲者皆其候也。夫疖曰五疖。病關乎五臟以
別之。心疖卽驚疖。外症身體壯熱臉赤唇紅。口舌生
瘡。胸膈煩悶小便赤澁。五心煩熱盜汗發渴咬牙虛
驚是也。肝疖卽風疖。外症搖頭揉目白膜遮睛眼青
多淚頭焦髮立筋青腦熱躁渴汗多。下利瘡癰是也。
腎疖卽急疖。外症腦熱肌削手足如冰寒熱時來。滑
泄肚痛口鼻乾渴齒齦生瘡爪黑面紫身多瘡疥是
也。肺疖卽氣疖。亦名疖蠶。外症咳嗽喘逆壯熱惡寒

皮膚粟生。鼻痒流涕。咽喉不利。頭爛唾紅。氣脹毛焦。
泄利頻併是也。脾疳卽食疳。亦名於疳。外症身面俱
黃。肚大脚細。吐逆中滿。水穀不化。泄下酸臭。合面困
睡。減食喫泥是也。諸疳宜大蘆薈丸。肥兒丸。胡黃連
丸。地黃丸。生熟地黃湯。皆要藥也。集聖丸。噎疳散。脂
連丸。五疳良方。至聖丸。通神丸。天麻丸。地黃清肺飲。
化蠶丸。靈脂丸。下蟲丸。龍膽丸。黃連丸。香薷丸。木香
丸。褐丸。子黃著湯。髓血煎。蚶殼丸。厚朴丸。等劑。對症

詳明施治。

大蘆薈丸

治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連

白蘘蕘去蘆薈

木香

青皮

雷丸

破開白佳赤者殺人勿川

鶴虱

微炒各半兩

麝香

二錢另研

右爲細末粟米飯丸菜豆大米飲下一二十九

不拘時服

肥兒丸

治疳多因缺乳食肉太早或患臟腑胃虛癆諸般疳化虫治黃瘦肚急消疳可常服退疳熱

黃連

局方加肉豆蔻

陳皮

去白局方去此用木香

神麴

炒局方有史君子

麥蘖

炒各一兩加三養蓮朮

白蕪蘘

牛兩局方用檳榔

川練子

一兩去核炒

右爲末神麴糊丸麻子大每服三十九空心米

飲吞下

又方

三稜

煨

蓬朮

煨

川練子

龍膽草

黃連

各四錢

柴胡

地滑皮

各十兩

枳殼

麩炒

麥蘖

當歸

各三錢

白蕪蘘

二錢

蘆薈

木香

各一錢

右爲末神麩糊丸麻子大每服三十九米飲下

胡黃連丸

治痢如神

胡黃連

黃連

各半兩

硃砂

二錢半另研

右上物爲細末研入硃砂末却填入猪膽內用漿煮以杖子於銚子上川線釣之勿令着底候一炊久取出研入蘆薈麩香各二錢半飯和丸麻子大每服五七丸至一二十九米飲食後一作食前治痢症有熱

又方

治嬰孩一切疳疾及一切虛痢。他藥無功。此藥極效。

胡黃連 黃連 蘆薈 肉豆蔻

煨

桂心 人參 硃砂 麝香

史君子 木香 釣藤 龍齒

白茯苓

各等分

右爲末。取臍豬膽兩枚。裂汁和末。令勻。却入袋內。盛之以繩扎定。湯煮半日。取出。切破袋子。更

入葭若子二錢。微炒黃丹一錢。一味別研如粉。入前藥和勻。搗五百杵。爲丸。如菉豆大。但是疳與痢。用粥飲下五七丸。幼者三丸。不喫粥飲。乳頭含吻。能治一十二種疳痢。及無辜疳之症。功效非常。

吳希亮疳方

治一切疳

三稜

煨

蓬朮

煨

神麩

炒

麥蘖

炒各半兩

青皮

陳皮

烏梅肉

蘇莢仁

胡黃連

百草霜

雷丸

錢

玄胡索

炒

甘艸

各二錢

巴豆

五十粒

加川練子史君子亦可

右爲末合了。先用一兩入巴豆五十粒丸如麻子大。每服五七丸米湯下。大小以意增減。

地黃丸

治腎病

熟地黃

八錢

赤茯苓

山茱萸肉

當歸

川練肉

牡丹皮

山藥

澤瀉

史君子肉

各錢

右爲末蜜丸如桐子大。每服三丸溫水化下。

生熟地黃湯

附眼閉

治疳眼閉合不開內有朦霧

生地黃

熟地黃

各半兩

川芎

赤茯苓

枳殼

炒

杏仁

水浸去皮

川黃連

半夏麩

天麻

地骨皮

甘艸

炙

當歸

各二錢半

右判散每服二錢薑三片黑豆十五粒水一盞

煎至六分空心溫服

脾積丸

治疳積妙

山查子

青者多川

香附子

烏藥

紫金皮 砂仁

甘艸 各等分

右爲末。山查子生用。搗碎成末。米糊丸。桐子大。米飲下。三五十九。大人小兒皆可服。

集聖丸

治諸疝通川

蘆薈

五靈脂

夜明沙

焙 縮砂

橘皮

青皮

去穢

蓬朮

煨

木香

各二錢

黃連

史君子

蝦蟇

炙焦各三錢

右爲末。雄豬膽二枚。取汁和藥。入糕糊。丸。麻子大。每服十五丸。米飲下。疝勞瘦弱。本方加當歸。

一錢半。川芎三錢。

噤疳散

治疳

蘆薈

黃連

各一錢

瓜蒂

猪牙皂

蝦蟇灰

各半兩

麝香

少許

右末吹入鼻內，嚏出可療。

疳連丸

治五疳潮熱，肚脹髮焦。

胡黃連

五靈脂

右爲末，積猪膽汁丸。麻子大，每服十五丸，米飲。

下。五疳潮熱。慎勿用大黃黃芩。

五疳良方

治疳

川黃連

蕪荑仁

神麴

炒

麥蘖

炒

陳皮

木香

蝦蟇

燒存性
各一兩

史君子

三十個
煨去殼

肉豆蔻

生
二十個

雞心檳榔

二個

麝香

一字

右爲細末。雄豬膽二箇。取汁入好酒打清麩糊。

丸芥子大。每服十五丸。米飲下。

茯苓丸

治心疳與驚疳

扶神

蘆薈

琥珀

黃連

淨洗

赤茯苓

各三錢

釣藤皮

遠志肉

薑製焙乾

蝦蟇灰

各二錢

石菖蒲

一錢麝香 少許

右爲末。粟米丸。麻子大。每服十九薄荷湯下。

神效換肌丸

治小兒脾疳。肌瘦潮熱。盜汗。飲食易傷。臟腑不調。泄瀉。糟粕不化。頭大腹急。

川黃連

炒 鼈甲

酒炙

肉豆蔻

炒

史君子

神麩

炒 麥芽

炒 麝香

半錢

訶子肉

半錢

右爲末。麩糊丸如芥子大。米湯下。量大小加減。
天麻丸 治肝疝風疝疝

青黛

川黃連

天麻

五靈脂

夜明沙

微炒

川芎

盧薈

各二錢

龍膽草

防風

蟬蛻

去足各一錢

全蝎

二枚

麝香

少許

乾蟾頭

炙

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸如麻子大。每服十九。
薄荷湯送下。

地黃清肺

治肺熱疔腫咳嗽氣逆者喘壯熱惡寒

桑白皮

炒牛
兩

紫蘇

非訶胡

防風

赤茯苓

黃芩

天門冬

去心

當歸

連翹

桔槔

生地黃

甘艸

炙各二
錢五分

右判散每服二錢水煎食後服。

化膿丸

殺毒虫聖方

蕪荑

蘆薈

青黛

川芎

白芷稍

胡黃連

川黃連

煅礬灰

各等分

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸。麻子大。每服二十九。
 食後臨臥杏仁煎湯下。其鼻常用熊膽泡湯小。
 筆蘸洗。俟前藥各進數服。却用青黛當歸赤小。
 豆瓜蒂地榆黃連蘆薈等藥均分。雄黃少許細。
 末入鼻。欬瘡。

靈脂丸

治脾疝食滯

白豆蔻

麥蘗

炒

五靈脂

縮砂仁

蓬朮

煨

青皮

史君子

橘紅

蝦蟇

炙焦各
二錢

右爲末。米糊丸。麻子大。每服十九。米湯下。

下蟲丸

治疳蝨諸蟲

苦練根皮

酒浸焙

綠色貫衆

木香

蕪荑

焙

桃仁

浸去皮焙

檳榔

各二錢

鶴虱

炒

輕粉

各半錢

乾蝦蟇

炙焦三錢

史君子

五升合螺取肉用

右爲末。飛麩糊丸。麻子大。每服二十九。天明清肉汁下。內加當歸川黃連各二錢半。治脊疳兼

疳勞。

龍膽丸

治疔疔疔疔熱餅

龍膽艸

川升麻

苦練根皮

赤茯苓

蘆薈

防風

油髮灰

各二錢

青黛

黃連

各三錢

右爲末猪膽汁浸糕丸麻子大每二十九薄荷湯下食後仍以蘆薈末入鼻。

黃連丸

治疔疔疔疔渴乾疔

黃連

半兩淨猪膽汁浸一夜曬乾

括萎根

烏梅肉

杏仁

浸去皮焙

石蓮子

各二錢

右爲末。猪膽浸糕糊。麻子大。每服十五丸。煎烏梅薑蜜湯下。又瘵虛後附消渴方論式藥可。

治疳濁及五乾疳。

香薷丸

治疳瀉

黃連

炒三

肉豆蔻

生

木香

訶子

煨

縮砂仁

茯苓

各二錢

右爲末。揉飯丸。麻子大。每十五丸。食前米飲下。

木香丸

治疳痢

治疳痢。冷熱不調。五色雜下。裏急後重。

黃連

淨三錢

木香

紫厚朴

薑炒

縮砂仁

夜明沙

隔紙炒各二錢

訶子肉

煨一錢半

右爲末。粳米飯丸。麻子大。每十五丸。乾艾葉生

薑煎湯食前溫服。

褐丸子

治疝腫脹

萊菔子

炒一兩

陳皮

青皮

去白

檳榔

黑牽牛

取淨半生半炒

北五靈脂

赤茯苓

蓬朮

煨各半兩

木香

二錢半

爲末。麩糊丸。如菉豆大。每服十五丸。紫蘇葉

白湯送下。

黃耆湯

治疴勞咳嗽不定，虛汗骨蒸，渴而復瀉，乳食遲進而不剋化。

黃耆

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

蟬土足
炙焦

鹽田

滯炙焦
各三錢

人參

白茯苓

陳皮

半夏麴

柴胡

史君子

甘艸

炙各
一錢

右剉散，每服二錢，薑棗煎食前服。

龍血煎

治疔癆

蕪荑

柴胡

川芎

各一兩

人參

半兩

史君子

二十一个

胡黃連

川黃連

各兩

右用龍血一盞。吳茱萸一兩。拌和二黃連。淹一宿。次早炒乾。煉出茱萸并血。只用二黃連。夾塗藥。拌末。粟米糊丸。麻子大。每二十九。食前服。

阿坡丸

治無辜諸疔。一服虛熱退。二服煩渴止。三服寫

尚佳

蟾蜍

一枚夏月溝渠中取腹大不
跳不鳴者其身上多癩毒

右取糞蟲一杓置桶中。以尿浸之。桶上要乾。不
與蟲走。却將蟾蜍打死。頓在蟲中。任與蟲食。一
日一夜。次以新布袋包繫定。置之急流水中。浸
一宿。取出。瓦上焙爲末。麝一字。揉飯糊丸。麻子
大。每二三十丸。米飲下。

君朴丸

治小兒諸疳。小便白濁。久則黃瘦。不長肌肉。

史君子

漿

厚朴

製

黃連

各一兩

木香

三錢

右爲末糊丸如小豆大。三歲二十九。米湯下。二
五服效。

疔傷 第八十疔

楊氏云五疔出蟲五臟疔也其餘曰餽疔曰脊疔曰
腦疔曰乾疔曰疔渴曰疔瀉曰疔痢曰疔腫脹曰疔
勞曰無辜疔曰丁奚曰哺露其狀非一不可不撮其
要而條析之五疔出蟲者疔傷之源雖起于乳哺不
調然臟腑停積已久莫不化而爲蟲其蟲或如絲髮
或如馬尾多出于頭項腹背之間黃白或赤者可治
青黑者難療也蛔疔者失乳飯蚤食肉太蚤或傷胃
停畜甜膩化爲蛔蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛

肚脹青筋唇口紫黑搖頭齒痒是也。脊疔者。蟲食脊
脊身熱羸黃積中生熱煩渴下利拍背如鼓鳴脊骨
如鋸齒或十指皆癢頻嚙爪甲是也。腦疔者。胎中素
挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡。腦熱如
少髮結如穗遍身多汗顛腫顛高也。乾疔者。瘦悴少
血舌乾其病在心。目不轉睛乾啼少淚其病在肝。身
熱尿乾手足清冷其病在腎。聲焦皮燥大便乾結其
病在肺。搭口癡眠胸脘乾渴其病在脾。總爲五疔也。
清濁者。臟中風有骨氣加之乳母恣食五辛酒麪炙

傳使兒心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則溲
止是也疳瀉者毛焦唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下
精粕是也疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停
積宿滯水穀不聚須下惡物是也疳腫脹者虛中有
積其毒氣交併故令腹肚腫脹由是脾復受濕故令
頭面脚手虛浮是也疳勞者潮熱往來五心煩熱手
足心及胸前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是也或
渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治
無辜疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不

疹。其間有蟲如米粉。不速破之。則蟲隨熱氣流散。淫食臟腑。以致肢體癱瘓。便利膿血。壯熱羸瘦。頭露骨高是也。針刺破。用膏藥貼。或澣濯兒衣。露于簷下。爲雌鳥落羽所惡汚。兒着此衣。蟲致皮毛。亦致無辜之疾。兒衣已曬。須微火烘之。其若手足極細。項小骨高。尻削體瘦。腹大臍突。號哭胸陷。或生穀癩。是爲丁奚。虛熱往來。頭骨分開。翻食吐蟲。煩渴嘔噦。是爲疳露。皆因脾胃久虛。不能消化水穀。以致精神減損。無以榮其血氣。故肌肉銷燂。腎氣不足。復爲風冷所傷。使

形骨枯露。亦有胎中受毒。臟腑血少致之。此皆無辜。疔傷數種之疾病而至此。不幾殆哉。宜肥兒丸。大蘆薈丸。五疔丸。胡黃連丸。至聖丸。茯神丸。天麻丸。地黃丸。十全丹。香薷丸。福丸子。消食丸。鼈甲丸。下蟲丸。集聖丸。黃雞煎丸等藥。及早治之。方爲全美。又有疔傷久利。腸胃受濕。得之狀如狐惑。傷寒齒蝕之症。或以走馬命名。蓋齒屬腎。腎虛纔受熱邪。疔氣直奔上焦。故以走馬爲喻。初作口氣名曰臭息。次第齒黑盛則齩爛。熱血迸出。曰宣露。甚者齒皆脫落。治之之法。用

銅綠生蜘蛛細研入麝少許合和擦齒如無蜘蛛用其殼亦可

肥兒丸

治疳多因缺乳食肉太早患臟腑虛化虫治黃瘦肚急消瘳可常服之退身熱

黃連

肉方加
肉豆蔻

陳皮

去白局方去
此用木香

神麴

炒局方用
史君子

麥蘖

炒各一兩加
三棱蓬朮

白蕪荑

半兩局方
用檳榔

川練子

去核
一兩

右爲末神麴九麻子大每三十九空心米湯下

大蘆管丸

治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑

檳榔

木香

青皮

雷丸

破開白者佳去者發人勿用

鷓鴣

炒各半兩

麝香

二錢另研

右爲末。粟米飯九蒸。豆豉水淋下。三十九無時。

五疳良方

治疳

川黃連

蕪荑

取作

神麩

炒

麥蘖

炒

陳皮

木香

蝦蟇

燒存性各一兩

史君子

三十個煨去殼

肉豆蔻

二個

雞心檳榔

二個

右爲末。入麝少許。雄

膽二枚。取汁入好酒。打

清麪糊丸。芥子大。每十五丸。米飲下。

胡黃連丸

治疳

胡黃連

黃連

各半

朱砂

二錢半
另研

右。上。物。爲。細。末。研。入。朱。砂。末。却。填。入。猪。膽。內。用。漿。煮。以。杖。子。於。銚。上。用。綫。釣。之。勿。令。着。底。候。一。炊。久。取。出。研。入。蘆。薈。麝。各。二。錢。五。分。飯。糊。丸。如。麻。子。大。每。服。五。七。丸。至。一。二。十。丸。米。飲。食。後。一。作。食。前。治。疳。症。有。熱。

集聖丸

治疳通用

蘆薈

五靈脂

夜明沙

焙

縮砂

仙皮

青皮

蓬朮 張

木香

各二錢

黃連

史君子

煨川肉

蝦蟇

炙焦各三錢

右爲末雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲下疝勞瘦弱本方加當歸

一錢川芎三錢

天麻丸

治肝疝風疝疝眼

青黛

川黃連

天麻

五靈脂

夜明沙

微炒

川芎

蘆薈

各二錢

龍膽艸

防風

蟬退

去足各一錢半

全蝎

二枚焙

麝香

少許

乾蟾頭

炙焦
三錢

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸如麻子大。每服十丸。

薄荷湯下。

地黃丸

治腎虧

熟地黃

八錢

赤茯苓

山茱萸肉

當歸

山藥

川練肉

牡丹皮

澤瀉

史君子肉

各三錢

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服三丸。溫水化下。

茯神丸

治心非驚

茯神

薑黃

琥珀

黃連

赤茯苓

各三錢

釣藤皮

遠志肉

焙製

蝦蟇灰

各二錢

石菖蒲

麝香

少許

右爲末粟米糊丸麻子大每服十九薄荷湯下。

十全丹

治丁美爾露

青皮

陳皮

川芎

五靈脂

蓬朮

白豆蔻

檳榔

蘆薈

各半

史君子

焙

蝦蟇灰

木香

各三錢

右爲末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每二十九米

飲下有熱薄荷湯下。

湯氏十全丹

治丁奚哺露。夫哺露者，因乳哺不調，傷於脾胃，致令脾胃虛弱，漸不能食，血氣減損，肌肉不榮，而柴骨麻露，其臟腑之氣不宜，則汲汲苦熱，謂之哺露也。宜服麝香進食丸。

檳榔

枳殼

湯浸去穰
麝皮炒

青皮

去穰

陳皮

三稜

煨

蓬朮

煨

砂仁

炒各
作兩

丁香

木香

一錢

香附

一兩
炒

右爲末神麩糊丸黍米大空心食前下一百丸

香豆蔻丸

治疝瀉

黃連

炒

肉豆蔻

生

木香

訶子

縮砂仁

茯苓

各二錢

右爲末揉飯丸麻子大每十五丸食前米飲下

褐丸子

治疝腫脹

蘿蔔子

一兩 微炒

陳皮

青皮

檳榔

黑牽牛

取淨半生半炒

北五靈脂

赤茯苓

蓬朮

煨各半兩

木香

二錢半

右爲末麩糊丸菜豆大每服十五丸紫蘇湯下
消食丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃
爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺
消化脾傷於冷則宿食不消此藥寬中快氣滋
乳食正顏容

縮砂仁

橘皮

三稜

蓬朮

神麩

麥蘖

香附

一

右爲末麩糊丸菜豆大食後紫蘇湯下二十九

醫甲九

治小兒無辜疳腹中毒氣四肢瘦弱宜服

龍甲

醋塗炙令黃去裙爛

黃連

枳殼

夜明沙

微炒各一兩

訶藜勒

二枚一
生一熟

麝香

一字
蠟虎一枚
令微炙

右爲末煉蜜丸菜豆大每以粥飲下五九日三服量兒大小加減服之

蒸雞丸

治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面黃食

不生肌肉。日夜啼多渴少食。

黃連 二兩 鶴虱

蕪荑 各半

柴胡

秦艽

知母

丹參

史君子

去殼 一兩

右爲末。黃雌雞一隻。約斤餘。籠之。專以火麻子

飼之。至五日後。去毛令淨。於背上開孔。去腸肚

淨。拭乾。令前藥入雞腹內。以綫縫之。小甌先以

黑豆鋪甌底。厚三寸。安雞在甌中。四旁將黑豆

圍裹。上以黑豆蓋之。自日出蒸。至晚候溫冷。取

雞淨肉。研和得所。如硬。入酒麪糊。同藥末。爲

如小豆大二歲二十九以意加減米湯下無時
如十五歲以溫酒送下忌食猪肉黃雌雞肉

下蟲丸

治疳蝨諸蟲

苦練根皮

酒浸焙

貫衆

綠色

木香

蕪荑

焙

桃仁

浸去尖

檳榔

谷二錢

鶴虱

炒

輕粉

各五分

蝦蟇

炙焦三錢

史君子

五十個

環用肉

右爲末飛麩糊丸麻子大每二十九天明清肉
汁下內加常歸黃連各二錢半治脊疔兼疔勞

集聖丸

治諸疔通用

蘆薈 五靈脂 夜明沙 焙 陳皮

青皮 蓬朮 煨 縮砂 木香 各二錢

黃連 史君子 煨取肉 蝦蟇 炙焦各三錢

右為末雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子
大每服十五丸米飲下疴勞瘦弱本方加當歸

一錢半川芎三錢

經驗黃雞煎丸

柴胡 知母 秦艽 洗淨 川練麩 炒

黃黃 各兩 胡黃連 蘆薈 鶴虱

燕蕩

檳榔

丹參

川芎

神麩

炒

麥蘖

炒

青皮

五靈脂

各半

史君子肉

一兩半

水銀粉

一錢

麻子

五兩

黑豆

五升

右藥依前方修合

梅肉丸

治小兒諸疳煩渴飲水不止

艸龍膽

定粉

烏梅肉

炒

黃連

蒸各等分

右爲末煉蜜丸黍米大每二十九溫水送下

嬰童百問卷之八