

廣

瘟

疫

論

廣瘟疫論卷之三

裏證

煩躁

煩乃心煩。情思不定。神不安而形如故。躁則形復揚手擲足。形不寧而神復亂。煩輕而躁重也。在他證有謂煩屬心躁屬腎者。煩屬陽躁屬陰者。在時疫總屬慘熱。熱淺在上。則見煩躁之形。熱深在下。則漸近昏沉而不煩躁。是時疫初起可卽煩躁之輕重。辨病勢傳變之輕重。不煩躁則非時疫。設氣色神脉舌苔。有時疫確據。亦屬但表不裏之輕証。凡初起憎寒發熱而煩躁者邪。在半表半裏。三消飲九

味差活湯六神通解散選用。隆冬寒甚汗難出者。大青龍湯或藜湯可借用。舌苔已黃渴而喜飲身熱汗出而煩躁者邪入於胃也。白虎黃芩三承氣小陷胸三黃瀉心涼膈散選用。舌苔已黑煩躁漸近昏沉者邪入人心包也。犀角地黃湯加羚羊角黃連解毒湯選用。屢經汗下清涼表裏俱無阻滯而煩躁者陰液傷也。生脉散大味地黃湯吳氏諸養榮湯選用。或用汗解清利滋潤諸法不應而煩躁加甚者當細驗舌苔若黃黑苔中夾一塊白潤是爲夾水或平素胸有痰飲或未病之先曾飲冷物或初煩躁時過飲冷水急啜涼物或用清涼太早皆能停飲於胸膈胃脘之間。

其疫熱外不能達表。內不能傳胃。故煩躁轉甚。
驗舌之後。更細按胸脇滿痛而軟濿濿有聲。再細察其脉。
右寸關或絃緊或緩。皆停水確據。當以蒼朮半夏萊菔厚
朴先消其水氣。然後治其煩躁無不應者。不論舌苔有無
黃黑。但煩躁而兼小便不利者。雖無水氣在胸脇而少腹
略有滿痛處。卽當以導赤散。渴心湯。四苓湯。猪苓湯。益元散
利其小便。所謂心邪不從心。渴而從小腸。渴也。

嘔

吳又可曰。時疫有始終能食者邪。不傳胃也。慎勿絕其飲
食。此不嘔者也。愚嘗見時疫初起未發熱時。表證未見有

先作嘔數日者。此疫邪先犯太陰。當辨其口氣無臭氣而不粘者。屬太陰寒證。有臭氣粘厚者。屬太陰疫證。此爲先裏而後表。不可遽用清涼。閉遏邪氣。致使不能透達傳化。雖四肢有時厥逆。脉有時沉伏。亦不可用溫熱。致增嘔證。甚有舌紫昏沉者。惟當宣其胃氣。藿香正氣散最宜。若已發熱而嘔者。吳氏達原飲加半夏兼三陽表證。加羌活葛根柴胡。若嘔而煩渴。身熱而不惡寒者。邪在陽明也。白虎湯黃芩湯並加半夏。若嘔而舌黃。胸中有滿痛處。橘皮半夏湯加枳實山楂麥芽川貝。貝母力緩用至五錢或一兩。乃能舒懸散結。若嘔而舌黃心下脣上有滿痛拒按者。大

柴胡湯。若嘔而舌黃或黑。少腹有滿痛拒按。當視其前後。何部不利。大便不利。調胃爭氣湯。小便不利。四苓加木通。或益元散利之。則愈。寒熱已解。二便通利。胸腹無滯而嘔不止者。餘熱在胃也。竹葉石膏湯。屢經清下。嘔不止。而舌無苔。多汗心悸。瘦倦者。中氣傷也。大半夏湯或六君子湯。加白蔻。屢經清下。倦怠異常。四肢漸冷者。乃清下太過而中寒也。理中湯甚至加附子。然此爲治藥之法。非治疫之法也。宜詳察之。

欬

欬者。疫邪夾他邪于肺也。有初起在表夾風邪于肺者。脉

兼浮欬多痰沫必兼鼻鳴自汗灑淅惡寒於透表諸方中
加前胡桔梗蘇子杏仁淡豉有夾水干肺者不論表裏脉
必兼緩欬必多清痰兼舌白心悸胸滿或嘔或呞酸於表
裏藥中加柔皮半夏茯苓川貝母萊菔子有疫熱傳裏燥
火熏肺者脉必數欬必無痰有痰亦難出而咽痛於裏藥
中加花粉黃芩川貝龜仁有病後陰傷肺燥者脉必濶欬
必無力舌必赤而無苔吳氏清燥養榮湯加麥冬、元參知
母貝母有屢經汗下或平素陰虛腎氣上逆者欬必兼上
氣顸必時赤足膝必清瘦脉必散六味加枸杞五味牛膝。
疫邪兼欬者少卽有之亦非大有關係之證宜以病之表

裏大勢爲主。加泊欵藥於本方療之。

渴

渴乃熱象。時疫爲熱證而有不渴者。蓋初起溼熱相兼爲蒸氣熱未勝溼。則鬱悶心煩而不渴。熱已大盛。在經而在胃。則煩燥身熱而不渴。在下而不在上。則燥結而不渴。在血分不在氣分。則昏沉而不渴。疫邪初從太陰發者。胸腹滿嘔而不渴。此外無有不渴者矣。初起在表。發熱頭痛舌白而渴。厥必不浮不沉。而數六神通解散。加石膏葛根。或九味羌活湯。加石膏葛根。半表半裏。口苦咽乾。目脹而渴。厥必數小柴胡湯。加花粉知母。或亦加石膏。或達原飲。

加石膏葛根。邪已入胃作渴。身熱自汗。舌現黃苔。或晝色
或黑燥。當察其胸脇少腹。按之無痛處而渴者。爲有熱無
結。脉必洪。宜白虎湯。按之有痛處爲有熱有結。痛在心下。
脉必滑。大關上尤甚。小陷胸湯。在脣上及當肺關中。脉必
滑。大小承氣湯。在脣下。尺中脉必滑。大調胃承氣湯。心下
至少腹俱痛。寸關尺必皆滑。大承氣湯。痛在左脇不可
按。左關脉必弦。或滑或遲。桃仁承氣湯。痛在右脇不可按。
右關脉必數。或滑或遲。十稟湯。渴而小便不利。少腹不可
按。尺脉必數。四苓散。猪苓湯。大一散。汗下後身熱已除。而
渴不止。餘邪未盡也。宜將前所用藥。再作小劑以利之。屢

經汗下渴而舌上無苔。胸腹無滿痛。心悸而煩。脈虛細或浮散。或濶。陰也。六味合生脈爲主。渴與煩躁同机。而渴輕於躁。渴有喜飲。而又有喜熱冷飲之分。在他證不喜飲及喜熱飲。則爲真寒假熱。在時疫喜熱飲多發斑疹。不喜飲熱在血分。真假熱百不一見也。時疫初起。以渴爲机。括渴甚。則熱甚。渴微。則熱微。在末路。尤以渴爲有餘邪。不渴爲無餘邪也。

口苦

熱邪在中。上二焦則口苦。非特時疫爲然。卽感風寒口苦。亦屬少陽熱證。如時疫當惡寒發熱表證正盛時。一見口

苦卽於發表諸藥中倍加清熱之品輕則黃芩重則知母再重則石膏不但三陽表證如此卽三陰裏證手足冷惡寒嘔利胸腹滿不渴證狀似乎純冷無熱而一兼口苦卽當於溫燥藥中加利熱之品如用半夏蒼朮草果厚朴必加木通芩澤甚至加知母黃芩本吳氏達原之義口苦爲熱證的據每遇證狀模糊寒熱莫辨必借此以決之至舌苔黃黑乾燥煩躁熱渴閉結又清下之不可或緩者矣

口甘

口苦口甘同爲熱證苦爲燥熱在上中二焦多渴屬三陽甘爲溼熱在中下二焦多不渴屬三陰蓋脾胃屬土稼穡

作甘土邪。下涉腎位。水土相蒸。甘味上溢於口。多兼嘔吐。
人每誤認胃寒。而用溫中之劑。不知溼熱在於下焦。土能
克水。溫燥太過。腎水告竭。總不見熱渴諸證。惟目不見物。
漸至昏沉而死。口甘一證。在諸證初起。猶可用溫燥開導
之品。而亦不宜過劑。在肺痰。必以清熱爲主。消痰爲輔。或
胸中停飲。大加芩。亦不過加蒼术半夏而已。如二陳去甘草。
加薑汁炒山梔。薑汁炒黃連。竹茹。黃芩等類。爲口甘要藥。
烏梅。東妙酸能勝甘。蓋五行尅制自然之理也。或四苓散。
加山梔亦得。然必以時疫之大勢。爲用藥之權衡。斯可矣。

唇燥

唇燥者陽明熱也。時疫見此當辨其色深赤爲大熱宜清下。淡白爲少津液宜滋潤色如常爲津液不流通熱在經脉宜葛根。

齒燥

時疫齒燥有三輕淺者爲陽明經熱前板齒燥身熱目疼。鼻乾不得臥此將發斑疹及衄血之先兆葛根爲主黃芩知母石膏爲輔重者爲胃府燥熱通口皆燥甚則黑如煤炭三承氣三黃石膏選用至重者爲陰火煎熬凶血太甚腎水涸竭當峻補其陰知母黃柏生地元參天冬麥冬丹皮每味兩許大作湯液加童便金汁晝夜兼進若藥輕治

緩則不及矣

鼻孔乾

時疫鼻孔乾有四風。熱則鼻鳴。荆防葛根薄荷爲主。陽明經熱則煩躁。葛根石膏爲主。胃熱府證則大渴舌黃三黃石膏爲主。凸津液肺燥。麥冬生地五味爲主。大抵風熱經熱者十之五六。府熱凸液者十之二三。非謂熱深而鼻孔反不乾也。以煩渴大熱症見。則不覺鼻孔之乾與否耳。

耳聾

耳聾者少陽邪熱挾痰上壅也。時疫耳聾者多蓋邪之傳變。出表入裏必于少陽。又時疫屬熱。熱至上升。挾痰涎濁。

氣上。壅隧道。故耳聾也。治法以疫邪大勢爲主。見於初起傳表時。於表藥中加荆防川芎。見於入裏時。於裏藥中加黃芩知母。屢經汗下。耳聾不愈。不可急治。養陰調胃爲主。須待粥食如常。二便調勻。始由漸而愈也。

鼻如煙煤

時疫鼻如煙煤者。邪熱燼肺也。由鼻孔乾而來。急當清下。少緩則肺胃枯絕矣。三承氣合白虎。或三黃石膏加青黛。或小陷胸加犀角。或犀角大青湯。視其兼證擇而用之。

鼻孔扇張

鼻孔扇張有三。一。疾壅於肺。氣出入有聲。喘欬胸滿。不渴。

宜瓜蔞貝母桑皮陳子潤肺肺氣通自愈。方。鬱熱於肺氣出入多熱有微表束其鬱熱古人獨主趙婢湯蓋散其外束清其內鬱也用於時疫中以葛根易麻黃或葛根黃芩黃連湯亦可一腎氣虛而上逆氣出入皆微多死此證必得之屢經汗下或兼多汗心悸耳聾急宜大劑六味合生脈散加牛膝枸杞或可百救一二。

咽乾

咽乾者邪熱淫於膈上也在傷寒爲少陽熱證時疫亦然宜黃芩甚則佐以花粉知母。

咽痛

時疫咽痛爲熱淫於肺當視其咽中有結無結無結者微紅以桔梗花粉黃芩元參治之有結者紅腫當加牛蒡赤芍消其腫結甚則起紫泡白泡是爲乳蛾必以針刺去惡血再服清熱之藥方妙時疫中常有急喉風急喉痺二陰證旦發夕死不可不察也急喉風咽痛而喘乃痰邪夾熱上壅於肺古方用膽黎吐其痰涎惡血或皂角膏吐之治之稍緩則氣閉而死急喉痺卽乳蛾速長閉塞喉嚨亦以刺去惡血爲主甚或用刀大開其膿血此雖見於時疫中必其人平素食厚味多怒鬱肝火妄動有以致之也

舌燥

舌入心苗。胃竅通其本脾脉絡其下時疫舌燥白火炎土
燥中宮堵截。腎水不能上交心火。須察其苔之有無與色
之深淺施治。白苔而燥。疫邪在表。痰已結於肺上。吳氏達
原飲加石膏川貝。蔓仁大黃。此吳氏名白砂苔。熱極不變
黃色。下之則黃不可緩也。黃苔而燥。疫邪傳胃。小承氣小
陷胸。大柴胡選用。醬色苔而燥。疫邪入胃。深及中下。二焦
調胃承氣湯。黑苔而燥。疫邪入胃。至深傷及下焦。大承氣
湯。燥成塊裂。或生芒刺。熱更甚也。大承氣倍其分兩。大黃
須兩許。方妙。各燥苔下之漸減。不卽盡淨。爲藥已中病力
未到耳。當再下之。有不至三五次。十餘次而後愈者。若服

下而燥苔愈長不可更下當察其腹中若揉按作响者病水結於中焦脾胃受困津液不能上潮改用平胃二陳溫燥之劑卽愈又腎陰竭涸愈下愈凶其陰燥苔不同目無神耳聾心悸腰痠再下必死宜六味地黃湯合生脈散至無苔而燥須辨其色正赤或深紫熱歸心包血分熱極石膏知母黃連犀角羚羊角牛黃爲主鮮紅凶陰二冬生地元參知母阿膠人參爲主大抵舌無苔則胃無物可清潤不可攻下

舌強附舌瘦

時疫舌本強硬爲熱而兼痰宜清下無疑須加清痰之藥

兼白苔者。屬間。宋。其寒。而燥。佐以牛黃。大柴胡湯。
是也。兼黃苔者。已經煎。其痰漸燥。佐以川貝桔梗。陷
胸湯。是也。兼墨苔者。熱極。痰亦爲火。佐以牛黃方。效若無
痕。舌色正赤。深紫裂燥而强者。熱毒蘊於心包也。三黃石
膏湯加犀角牛黃。急清其熱。舌強雖與舌燥相類。而燥屬
胃主熱。強屬心主痰。又舌痿軟而枯小。與舌强硬而不縮
有異。乃虛脫已極。大補及滋潤。或百救一二。若屢經汗下。
清熱消痰而舌强者。又當與舌痿同治。

舌卷短

時疫之舌。一見黃苔便當下。失下則由黃而變醬色。變燥

變黑變生芒刺。再失下則變卷變短。爲下證至急之際。宜大下屢下分和緩則不救。

胸滿痛

時疫胸滿而不痛者。爲邪未結。爲無形之氣稀薄之痰。痛而不滿者。爲病在經絡。有虛有實。有虛實相兼。滿而痛者。爲邪已結。須分痰食血以施治。屬無形之氣者。按之不痛。時疫初起。邪在募原。多有此證。宜達原飲加枳桔木香大腹皮以開豁之屬。稀薄之痰者。時疫二三日。邪在半表半裏。多有此證。宜達原飲加半夏萊菔子。或小柴胡湯加萊菔子。而在經絡。而不滿者。初起屬實。於解表藥中。加廷

胡烏藥。歸氣。氣病久。屬經汗。或多虛於養氣血。
藥中倍當歸。更有虛中夾實者。於解表清裏藥中。加乳香
沒藥最妙。滿而痛不可按者。已納矣。痰結者。牽引申痛。兼
嘔。小陷胸湯。大柴胡湯。或二方合用。甚則大陷胸湯。大陷
胸圓食結者。硬痛成塊。不可按。多在心下。宜平胃散。加枳
實。蘇子。萊菔子。白芥子。亦有在膈上者。爲危證。當吐之。宜
瓜蒂散。此二者不可便下。須待其轉動。方可下之。蓋結在
上焦屬氣分。下之太急。則氣逆嘔吐。外用按揉之法爲妙。
血結者不可按。按之軟。肺芤瀆弱。宜於解表清裏藥中。加
桃仁。紅花。三七。歸尾。甚則桃仁承氣湯。時疫多實多熱。至

胸膈滿痛。又屬實邪。非虛證。惟是屬經攻下。胸痛更甚者。
乃脾胃兩虛。下氣上逆。宜溫理脾胃。以建中鎮安之。甚則
導火歸元。納氣歸腎皆可。然不多見。須消息斟酌。不可輕
試。

脇滿痛

脇滿痛與胸滿痛同。而微有不同者。胸滿痛有宿食爲病。
脇滿痛無宿食爲病。乃亦有因宿食在胸腹而滿痛及脇
者。時疫脇滿痛。是痰氣血三者爲病。其中亦有滿而不痛。
痛而不滿。滿痛並作之分。其滿而不痛者。募原之邪未經
傳變。宜達原飲。兼寒熱往來者。大柴胡湯。痛而不滿者。邪

分布於少陽之經。宜小柴胡湯。滿痛並作者。當分左右。左屬血。小柴胡去人參。加延胡歸尾紅花桃仁。甚者加莪术三錢。三七五靈脂。右屬痰與氣病。大柴胡倍半夏。加牡蠣。萊菔子。甚則白芥子。甘遂。大戟。芫花。氣加青皮。萊菔子未。香大腹皮。痰與氣痛皆無常所。而有聚散。痰散仍有所苦。氣散則無所苦。若屢經汗下清利。而腸痛更甚者。虛證也。氣虛必嘔利。養氣爲主。血虛必煩熱。養血爲主。此亦十中一二。腸痛與胸腹痛不同。胸腹臂之衝衝。塞不能久。腸則臂之僻巷。塞則難開。用藥須明此意。時疫肠痛。雖有痰氣血之殊。而總不離乎熱。黃芩是爲主藥。若別有熱證者。黃

連山梔又所必需。他病脇痛有寒有熱不在此例。

腹滿痛

時疫腹滿痛屬宿食爲邪熱所結者十之七八屬氣血痰水者十之二三蓋腹爲胃與小腸之正界非胸腸少腹之地可比。腹滿而不痛者屬邪在氣分屬水穀散漫而未燥結氣分脉多沉或弦水穀脉滑氣分通腹皆滿水穀滿有分界氣分者厚朴大腹皮青皮陳皮枳實桔爲主。水穀者半夏山楂麥芽神曲萊菔子枳實爲主。時疫爲熱證腹滿亦當清熱兼以順氣消食可也若舌多黃苔雖滿而不痛爲邪已傳胃宜小承氣湯下之。滿而不滿者屬邪在血分屬

熱結他病或有屬冷者。時疫經屬熱者。不可用。而無硬處者。於清裏方中加赤芍。不可按。而有硬處者。調胃承氣湯。滿痛兼作。爲痞滿。在氣燥實。在血大實。大熱之證。大承氣湯。諸病腹滿痛。或兼自利。當責之寒。冷時疫。自利屬熱。耗旁流下之則止。不可疑爲虛冷。若滿痛而喜燥喜溫。或惡寒手足冷。清利之益甚。或右關遲緊。此非本病。乃因煩渴飲冷太過。或用清涼太過。太早。之所致。又當以溫燥爲主。不可執一。然此亦治其弊。非治本病也。

少腹滿痛

時疫少腹滿痛爲邪。熱結於下焦。下焦乃大腸膀胱及厥

陰分界與中焦異亦有滿而不痛痛而不滿滿痛兼作之
不同初起滿而不痛者濕勝氣滯也枳榔厚朴蒼朮爲要
藥痛而不滿者手不可近熱傷厥陰血分也黃芩以清熱
赤芍歸尾以活血紫胡以升厥陰之氣若牽引陰器及兩
膀胱經者加秦艽卽愈滿痛兼作者不論初起末後當視
其前後在前小水不利當用通門苓猪苓益元等方選用
在後大便不利有燥矢也三子氣選用小便利而大便色
黑者畜血也抵當湯桃仁承氣湯選用以大小便之通塞
爲辨固矣亦當細察其滿痛而有硬塊不可按者屬燥矢
滿痛如鼓不可按而却無塊者屬淤畜肺中滿痛拒按而

較者屬奇。以此辨之。然矣。外有時疫。其人不癱。痛而不滿。喜溫喜抑者爲虛證。當細詢來路。若屢經清下。大過當消息溫補以培養陰陽。不可執時疫爲實邪熱證。而不變通也。然此亦十中一見耳。

右滿痛諸證。乃時疫裏證之大端。總屬熱邪內陷。在風寒暑溼諸門。則寒熱虛實俱有。在時疫已經傳變。見於煩渴燥熱既顯之後。其爲熱證易辨。若見於未經傳變之先。乃疫邪鬱而未發。多不渴。多不發熱。甚有手足反厥冷者。依風寒治則當溫。依時疫治則當清。毫釐千里。反掌生死。當於氣色神脈舌苔五者細察而詳辨之。

自利

時疫自利。皆熱證也。其所利之物。與內虛內冷者自別。冷利之色淡白。熱利之色正黃。是。有深黃。鬱色者。冷利稀薄。熱利稠枯。虛冷利散而不臭。熱利臭而多沫。虛冷易出熱。證。努。冷利緩。熱利暴。注下。迫而裏急。此辨時疫熱利與諸冷利之大槩也。時疫初起。有手足厥冷。惡寒。嘔吐。腹痛。自利者。生似太陰寒證。辨其爲疫。只在口中穢氣。作黏舌上。白苔粗厚。小便黃。神情煩躁。即可知其非寒中太陰。是時疫發於太陰也。煩躁輕則藿香正氣散。煩躁甚則用達原飲。一二服後。卽見三陽熱證矣。此時若用溫中藥。轉見

四肢逆冷。手足青紫而死。不可不細察也。時疫初起。頭疼
發熱而自利。九味羌活湯傳表。太陽少陽合病。身熱口苦。
咽乾目眩而自利者。黃芩湯兼溫加半夏傳裏舌黃讞安
而自利者。按其心下至少腹有硬痛處。與大承氣湯無硬
痛處。小承氣小陷胸大柴胡選用。此在下其熱不必以結
爲主。故雖無硬痛亦主大黃。時疫自利而小便不利。腹滿
而無硬塊。時作腸鳴者。熱在小腸膀胱而蓄水也。四苓散
猪苓湯益元散選用。時疫自利受補者少。至屢經清下。無
表裏證。自利漸至清穀。而脉微細者。則六君子湯補中益
氣湯理中湯。又所當酌用也。

便血

時疫便血。熱邪深入也。先當辨其血色。鮮紅者清熱爲主。
黃芩湯。三黃石膏湯。犀角地黃湯。血色紫黑成塊者逐
瘀爲主。桃仁承氣湯。抵當湯。須按腹。肠有痛處用之爲確。
時疫便血散晦夾涎水者。脾腎虛而臟府傷也。歸脾補中
八珍可借用。並加烏梅。時疫便血之後。多陰證。神昏耳
聾。舌無苔而燥。身痛不可轉側之類。皆是生脉六味加阿
膠峻補其陰。然多不救也。

便膿血

時疫便膿血。與便血有燥濕之分。便血屬燥熱。涼潤爲主。

便膿血屬溼熱清熱兼分利爲主。時疫初起頭痛發熱便
膿血者。自古所謂疫癆是也。不必治膿血。但解其表。表解
則便數自減。決不可早施清裏攻下之藥。卽分利清涼亦
所當慎。蓋邪方在表。清裏邪則內陷深。入後極難治。且時
疫一見便膿血。則煩渴之熱勢反緩。蓋熱隨利減也。所以
苦寒之品不可浪用。惟以倉廩湯爲主。詳見夾痢條下。時
疫傳變至半表半裏。便膿血者。柴葛解肌湯加芩澤木通
黃芩。時疫傳變入裏。煩渴譟。恐具而便膿血者。黃芩湯
葛根芩連湯選用。兼裏急後重腹中拒按者。加枳榔大黃。
時疫屢經攻下而便膿血滑利者。當以養中調氣養血爲

主清熱爲佐老人虛人亦倣此例

大便閉

時疫屬溼熱。大便閉者少。間有閉者。乃平素胃陽強盛。多燥氣也。夫本來陽盛。復受時疫。則溼熱皆變爲燥熱。雖兼表證。未得汗可下。以時疫與傷寒不同。傷寒邪從表入。有表證未得汗。必不可攻裏。時疫邪從內發。雖有表證。每每發表而不得汗。必待裏氣通而後表始得汗。所以時疫大便一閉。卽有表證。亦當下之。不可逡巡也。若初起未經表散。則當用三消飲下之爲當。有表證尚可下。則煩渴識妄。舌苔黃黑燥裂。卷短胸腹硬痛諸證備見。更當分別輕重。

下之無疑又有大便閉而屢下不通者則必有夾邪當審
之有夾水者水在腸中則不下而自利水在胃脘以上則
豚多弦多緩往往上嘔而不下利且舌白而心下按之作
嘔雖用承氣不能下行故下之不過當先用半夏茯苓蒼
朮消其水而後之亦有可用大陷胸湯者必胸上痛而
手不可近方爲藥與邪敵有夾氣者氣滯於胸膈之間主
上逆而不下降胸腹串痛而豚沉當先以蘇子萊菔子木
香換擗順其氣而後之有氣虛而屢下不通者屬老人
虛人其豚必兼無力其色必悴其肌肉必緩其神必散若
下證全具當與大承氣加人參一服而宿垢頓下或嗣氏

黃龍湯或麻仁丸參湯下。酌其裏證之多寡用之。有血虛而屢下不通者。屬婦人產後癰疽潰後。或平素陰虛及血其脉必兼濇。四物六味生脈及吳氏諸養榮方。麻仁丸選用。仍須蜜煎猪膽汁導之。大凡時疫大便一閉。卽當下之。然須詢其有無所苦。若無所苦。下尚可緩。有所苦而下之不通。又須察有無火邪及虛也。當下者十之五。可緩者十之三。火邪者十之一耳。時疫如此。他病則不然。古語云傷寒下不厭遲。時疫下不厭早。誠哉斯言也。

小便不利

時疫初起在表時。頭痛發熱。小便不利者。熱入膀胱也。益

元散主之。四苓散。猪苓湯。皆可用。東垣云。小便不利而渴者。熱在上焦。法當淡滲。小便不利而不渴者。熱在下焦。法當苦寒。此可爲據。時疫傳裏。大便閉而小便不利者。當先通大便。大便通。小便自利。此惟暑疫爲然。他病則否。時疫屢經汗下。小便不利者。陰竭也。爲難治。知母黃柏生地麥冬之類治之。或生脉六味皆可。然多至少腹如鼓而不救也。凡小便不利日久。下關不通。必反於上。往往有嘔吐呃逆。涓滴不能下咽。至湯藥不進者。當用敷臍法。大田螺一枚。搗爛入麝香三釐。敷臍上。帛束之。卽通。一見點滴。卽受湯藥。古法有用葱熨及井底泥敷少腹者。俱可參用。但不

宜於陰竭之虛人耳。

小便黃赤黑

時疫未傳變時。小便多如常熱。一傳入裏。則黃熱甚。則赤熱入血分。畜血則黑。小便可驗裏熱之有無。深淺多寡。但不可以作專證。疫邪在表。小便黃。卽於解表中加清涼藥。邪入裏。小便黃赤。雖手足逆冷。亦當攻裏。逐熱疫亦已退。表裏俱和。小便黃赤未退。仍當清利餘邪。惟小便黑者。當逐瘀。清熱爲主。犀角地黃湯加大黃等類。有屬經汗下。清涼太過。表裏俱無熱邪。而有濁腹痛。小便黃赤者。當理脾升陽爲主。亦治藥非治病也。

小便多

時疫爲溼熱。小便多者甚少。傳裏之後。或有小便多者。乃胃土變爲燥熱也。急下之。屢經下後。小便多者氣虛也。益氣升陽爲主。亦有腎虛而小便多者。大味地黃湯加五味子。大抵末下之先。小便多者屬燥熱。小便必微黃。必煩熱渴。而喜飲。既下之後。小便多者屬虛氣虛。則不喜飲。而寸脈不及。尺浮不及。沉陰虛。則喜飲。而寸脉不及。寸沉不及。浮失治日久。則變消渴。時疫小便多者如此。若夫風寒小便多。則屬陽虛。不在此例。

遺尿

時疫初起遺尿者多屬三陽合病。蓋邪入於陽則陽實而陰虛。盛於表裏爲之不守。又神昏於上不自知其下部之出入故遺尿也。合之腹滿身重口不仁而面垢譏語仲景獨主白虎湯。此證不可下以邪全盛在表在經下之則表邪內陷故額上生汗手足逆冷尤不可汗以邪本屬熱汗之則愈增其熱故心憤憤反作譏語惟以白虎湯清其浮越之熱若別兼燥結硬痛者可於本湯內加大黃下之。

囊縮

時疫囊縮乃熱入於厥陰也有結有熱則下有熱無結則清熱退而囊自縱矣。陰證囊縮與時疫頗相類以陰證囊

縮必身冷厥逆脈沉時疫囊縮亦身冷厥逆脈沉也然一
寒一熱自有不同陰證囊縮陰莖痿縮或全縮入腹有如
婦人時疫熱厥囊縮陰莖如常再以兼證辨之陰證囊縮
小便清少腹牽引作痛而不喜溫按多自私神清不煩
時疫囊縮小便赤少腹滿而硬痛拒按大便秘煩而神昏

多言

時疫多言者譏語之漸也疫熱蒸心之所以治同譏語

譏語

譏語者熱蒸心也時疫一見譏語卽當清熱然有經熱蒸
心而譏語者邪在三陽表證多有之脉浮大頭痛發熱舌

白者是吳氏三消飲最當六神通解散九味羌活湯防風通聖散白虎湯梔子豉湯皆可選用有胸熱蒸心而譏語者脈洪身熱汗出不惡寒反惡熱胸中無結者是白虎湯黃芩湯選用有痰涎搏結其熱聚於中上二焦而譏語者脉弦滑胸痛及心下痛拒按者是小陷胸湯大柴胡湯選用有胃熱蒸心而譏語者脈滑質大舌黃及黑及燥及苔刺腹滿拒按者是三承氣湯選用輕堵只用平胃散加山楂麥芽蘿蔔子卽效有熱入血分而畜血血熱蒸心而譏語者脈沉結或濇心下至少腹凡有痛處拒按而軟者是犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯選用有熱入小腸膀胱

奇水之熱上蒸心而譫語者。肺浮數少腹滿小便不利者。
是四苓散。猪苓湯益元散選用。以上皆實證譫語也。至若
屢經汗下清理。二便已清利。胸腹無阻滯。六脉虛散。結代
微弱而譫語者。陰陽兩虛神無所倚也。虛在上焦必心悸。
神倦。生脈散加棗仁。天王補心丹。虛在中焦必面色痿黃。
四肢倦怠歸脾湯。虛在下焦必耳聾目直視。六味地黃湯。
加遠志五味龍骨茯神。

狂

時疫發狂者。譫語之甚者也。亦疫熱蒸心之所致。治同譫
語。

善忘

時疫善忘者畜血之所致也畜血在上焦其脉芤胸前及心下必痛必拒按而軟犀角地黃湯主之畜血在中焦其脉或芤或弦或濤兩腸及臍上必有痛處拒按而軟桃仁承氣湯主之畜血在下焦其脉多沉結臍下必有痛處拒按而軟抵當湯主之善忘雖爲畜血主證然必驗之大小便風雖輕大便反易其色必黑小便自利方爲畜血之的證否則仍當察之多言譏狂諸法治之

昏沉

時疫昏沉熱入至深極險證也蓋熱初蒸及心之經則心

神不安多夢囉醒時自清蒸心之經漸深則心神漸煩多言所言皆日用常行之事無糊塗語蒸及心包則精神間有昏處多言間有糊塗語猶清白語居多迨蒸心包漸深則心神昏處居多言多妄見妄聞甚至疑鬼疑神非人所見聞者猶省人語也至熱直入心臟則沉昏不省人事次此熱入淺深之次第見證輕重之辨也所以多言讞語熱之浮淺者梔芩知膏可解發狂熱之深結者硝黃可解至沉昏雖係熱深更有夾痰氣夾胃結夾血結之分胸滿吞白係次痰氣當加川貝瓜蔞半夏萊菔子於犀連諸藥中

舌黃及燥黑腹滿硬痛者當加犀連於三承氣湯中痛而軟者畜血加桃仁丹皮赤芍於犀連藥中治昏沉之大法備矣以上皆實證更有虛證亦所當知屢經汗下清利之後表裏無熱胸腹無阻二便自利而神情困倦而漸昏由昏而漸沉乃大虛之危證大劑生脈散加桂附芪术芩芍急救其陰陽亦不逮矣

循衣摸床撮空

時疫循衣摸床撮空者熱盛神昏而四肢實也當察其舌舌苔白或無苔有熱無結也犀角黃連石膏爲主舌有燥苔或黃黑燥裂芒刺有熱有結也大黃芒硝爲主屢經汗

下後胸脇仍有拒痛者邪未盡也。仍宜清利無拒痛者陰虛而陽亢也。生地麥冬棗仁茯神安神爲主。

多睡

時疫初起多睡兼身重者。熱邪。阴滯其經脉也。有汗白虎湯。無汗或加麻黃。屢經汗下後。表裏熱愈甚。二便俱利而身痛多睡者。陰傷也。四物六味生脈三方合用。大劑養陰方。效失治卽危。服此數劑。身痛已和。表裏熱退。而仍多睡者。於三方中加生棗仁卽愈。若夫平素脾虛多睡多痰嗜睡者。一受疫謹必更嗜睡。當於時疫藥中參之。以理脾消痰之品。

身冷

諸病身冷皆屬陰證。在時疫多屬熱證。須從氣色神脈舌苔中辨其端倪。果係時疫。則當分初中末以治之。不可紊也。時疫初起。往往有身冷自利腹痛作嘔。全似陰證者。若舌有厚白苔。身有穢氣。心煩多汗。面色油垢。小便黃短數。有一二證現便是疫邪直入太陰。先裏後表。非真陰寒證。兼嘔利霍香正氣散。四苓散。無嘔利。達原飲。服一二劑後。即發熱矣。時疫傳變發熱之後。譏妄昏沉。舌燥腹滿。便秘而身冷者。先表後裏證。三承氣大柴胡選用。無結證者。白虎湯。時疫未路。屢經汗下。表裏無邪。腑腹無滯。二便自和。

而身冷者當以脈爲主。脈虛細不振者用藥太過而成脫證也。急宜溫補少緩卽死。生脈散加芪术苓芍平補陰陽。冷甚者加熟附子。時疫身冷一證最難下手。初起時若寒熱不辨。且勿妄投湯劑。當少待之。多則一二日少則半日。多有自行傳變。卽發熱煩渴者此時則易於用藥。若已經發熱傳變之後。變爲身冷。則自有口燥舌乾不得臥諸證。在此時藥不可緩。緩則熱深厥深。雖下後厥回。往往凶陰而死。身冷與惡寒不同。而病機頗同。當與惡寒條叅看。

呃逆

時疫呃逆與傷寒不同。傷寒呃逆虛實寒熱俱有。時疫呃

廣雅醫經 卷之三 二十一
逆。惟。熱。結。下。焦。而。已。凡。見。呃。逆。卽。當。下。之。不。止。按。其。
臍。腹。有。硬。痛。拒。接。處。仍。當。下。之。有。下。至。十。數。次。方。止。者。繼。
之。逐。盡。結。熱。腸。胃。通。達。其。呃。自。止。慎。不。可。用。丁。香。柿。蒂。湯。
治。呃。而。遺。結。熱。致。成。危。證。也。

吐 虬

傷。寒。吐。蟄。多。寒。熱。錯。雜。時。疫。吐。蟄。則。有。熱。無。寒。治。此。證。之。
當。汗。當。清。當。下。一。以。傳。變。之。大。勢。爲。主。惟。加。烏。梅。黃。連。以。
安。之。慎。勿。用。烏。梅。圓。中。諸。辛。熱。藥。致。成。危。篤。也。

廣瘟疫論卷之四

汗法

時疫貴解其邪熱而邪熱必有着落方着落在肌表時非汗則邪無出路故汗法爲治時疫之一大法也但風寒汗不厭早時疫汗不厭遲風寒發汗必兼辛溫辛熱以宣陽時疫發汗必兼辛涼辛寒以散陰風寒發汗治表不犯裏時疫發汗治表必通裏其不同有如此故方疫邪傳變出表時輕者亦可得表藥而汗散若重者雖大劑麻黃羌葛亦無汗也以伏邪發而未盡之故亦有不用表藥而自汗淋漓邪終不解者蓋自汗緣裏熱鬱蒸而出乃邪汗非正

汗也。必待伏邪盡。發表裏全徹。然後或戰汗。或狂汗而解。所謂汗不厭遲者此也。辛涼發汗。則人參敗毒散。荆防敗毒散之類是。辛寒發汗。則大青龍。九味羌活。大羌活之類是。發表兼通裏。則吳氏三消飲。六神通解散。防風通聖散之類是。更有不求汗而自汗解者。如裏熱閉甚。用大承氣以通其裏。一不已而再。再不已而三。直待裏邪逐盡。表裏自和。多有戰汗而解。此不求汗而自汗解者。一又如裏熱燥甚。病者思得涼水久而不得。忽得痛飲。飲盞落枕而汗大出。汗出卽解。此不求汗而自汗解者。二又如平素氣虛。屢用汗藥。不得汗。後加人參於諸解表藥中。覆盃立汗。此

不求汗而自汗解者三。又如陰虛及奪血枯竭之極用表藥全然無汗。用大滋陰潤燥生津藥數劑而汗出如水。此不求汗而自汗解者四。總之疫邪汗法不專在乎升表而在乎通其鬱閉。和其陰陽鬱閉在表。辛涼辛寒以通之。鬱閉在裏苦寒攻利以通之。陽亢者飲水以濟其陰。陰竭者滋潤以回其燥氣。滯者開導。血凝者消瘀。必察其表裏無一毫阻滯。乃汗法之萬全。此時疫汗法理不同於風寒。謹據諸汗症詳列於左。

發熱 惡寒 無汗 頭項痛 背痛 腰痛 肩背痛

下法

時疫下法與傷寒不同。傷寒下不厭遲。時疫下不厭早。傷寒在下其燥結時疫在下其慄熱傷寒裏證當下必待表證全罷。時疫不論表邪罷與不罷但兼裏證即下。傷寒上焦有邪不可下必待結在中下二焦方可下。時疫上焦有邪亦可下。若必待結至中下二焦始下則有下之不逆而死者。傷寒一下卽已。仲景承氣諸方多不過三劑。時疫用下藥至少三劑。多則有一二十劑者。時疫下法有六。結邪在腳上。貝母下之。貝母本非下藥用至兩許卽解。結邪在胸及心。下小陷胸下之。結邪在胸脇連心下。大柴胡湯下。

之結邪。在臍上。小承氣湯下之結邪。在當臍及臍下。調胃
承氣湯下之痞滿燥實。三焦俱結。大承氣湯下之。此外又
有本質素虛。或老人久病。或屬汗屢下後。下證雖具。而不
任峻攻者。則麻仁丸蜜煎導法。猪膽導法爲妙。下法之輕
重緩急。總以見證爲主。詳列於後。

急下證

舌乾 舌卷 舌短 舌生芒刺 舌黑 齒燥 亂
如烟煤 胸腹滿痛 狂 沉昏 發熱汗多 身冷
呃逆

當下證

舌黃 譏語 善忘 多言 協熱利 頭脹痛 頗

躁

緩下證

舌淡黃苔 微渴 大便閉 小便黃赤 潮熱 齒
燥

以上諸證緩下者不下。則必漸重而爲當下。證當下者緩下。則必加重而爲急下。證急下者失下。則雖下之多不通。而致結熱自下逆上。脹滿直至心下。又逆上透過膈膜。有至胸滿如石。咽喉銳醫。目直視反白。或睛盲。瞤散耳聾。九竅不通。雖有神丹莫之能救矣。外更有畜血。

蓄水諸下法前已散見諸條茲再詳列以便繙閱。

蓄水證

小便不利 大便微利

畜血證

小便自利 大便黑 他若蓄水畜血在胸膈不當下者此不贊

清法

時疫爲熱證未有不當清者。其在表宜汗。使熱從汗洩。汗法亦清法也。在裏宜下。使熱從下洩。下法亦清法也。若在表已得汗而熱不退。在裏已下而熱不解。或本來有熱。

無結則惟以寒涼直折以清其熱而已故清法可濟汗下之不逮三者之用可合而亦可分時疫當清者十之六七則清法不可不細講也凡清熱之要在視熱邪之淺深熱之淺者在營衛以石膏黃芩爲主柴胡葛根爲輔熱之深者在胸膈花粉知母麥仁梔子豆豉爲主熱在腸胃者當用下法不用清法或下滯兼清亦可熱入心包者黃連犀角羚羊角爲主熱直入心臟則難救矣用牛黃酒可十中救一須用至錢許少則無濟非若小兒驚風諸方每用分許即可有效當清諸證詳列於左

熱在營衛證

身熱汗自出

不惡寒反惡熱

身重

頭面項紅暉

周身紅腫

斑疹

鼻孔乾

唇燥

煩躁

舌苔白

熱在胸膈證

身熱反減

渴

嘔

欬

咽乾

讖語

多言

前紅腫

舌苔厚白

熱在腸胃證

便血

便膿血

餘悉見下證條中

熱在心包及心證

狂

沉昏

多睡

舌黑

和法

寒熱並用之謂和。補瀉合劑之謂和。表裏雙解之謂和平。其亢厲之謂和。所謂寒熱並用者。因時疫之熱來。有他邪之寒。故用此法以和之也。凡方中有黃連與生薑同用。黃芩與半夏同用。石膏與蒼朮同用。知母與草果同用者。皆是所謂補瀉合用者。因時疫之邪氣實人之正氣虛。故用此法以和之。凡方中有參芪歸芍。與硝黃枳朴同用者。是所謂表裏雙解者。因疫邪既有表證。復有裏證。故用此法合用者。是所謂平其亢厲者。因時疫之大勢已去。而餘邪以和之。凡方中有麻葛羌防柴前。與硝黃梔芩苓澤枳朴。

未解故用此法以和之。或用下法而不其劑料緩其時也。
或用清法而變其湯劑易爲丸散者皆是。凡此和法雖名
爲和實寓有汗下清補之意。疫邪尤有宜和者。凡熱不清。
用清涼藥不效。卽當察其熱之所附麗。蓋無所附麗之熱。
爲虛而無形之氣。如盛夏炎蒸遇風雨卽解。故人身之熱。
氣清卽退。有所附麗之熱爲質而有物。如洪爐柴炭。雖沃
以水。尤有沸騰之憂。必撤去柴炭而熱始退。凡熱之所附
麗。非痰即滯。非滯卽血。徑清其熱不去其物。未能有效。必
視其附麗何物。於清熱諸方加入何藥。效始能捷。此和法
之精微神變者也。宜和之證詳列於左。

寒熱往來

盜汗

口苦

咽乾

頭眩

舌強

渴

胸脇滿

耳聾

小便黃

嘔吐下利而心下痛

口乾舌燥而惡寒

大小便閉而寒熱

痞滿而悸

二便自利而舌苦

形體瘦損而舌苔

凡此表裏虛

實寒熱相兼者不可枚舉引此數端可以類推其有似和而實非和證者詳後辨似條

補法

時疫本不當補而有屢經汗下清解不退者必待補而愈此爲病藥所傷當消息其所傷在陰在陽以施補陰補陽之法。疫邪狂熱證傷陰者多然亦有用藥太過而傷陽者。

則袖陰補陽。又當酌其輕重。不可偏廢。凡。廢經汗。清利而煩熱加甚者。當補陰以濟陽。所謂寒之不寒。責其無水者。是六味四物生脈養榮諸方酌用。廢經汗下。清利熱退而昏倦嗜利不止者。當補陽所謂養正以却邪者。是四君異功生脉六君理中建中附子等方酌用。諸證詳後。

當補陰證

舌乾無苔。舌黑無苔。耳聾。目直視。目不明。服清涼藥渴不止。服清涼藥煩熱加甚。服攻下藥舌苔愈長。服攻下藥舌苔剥落燥裂愈甚。服清涼藥身熱愈甚。身體枯瘦。用利水藥小便愈不通。

腰膝痠軟。周身骨節痛不可移動。多睡。

當補陽證

多冷汗。汗出身冷經日不回。小便清而多。大便利。清漱。嘔吐用清熱開導藥愈甚。自利用清下二
愈甚。痞滿。

外此更有四損四不足三復證當補詳見後

四損

大勞大慾大病久病後爲四損氣血兩虛陰陽並竭復受
疫邪。正虛則邪入。愈深邪深則傳化難。出汗下傷正而正
脫。補助鬱邪而邪綑多不可治。然補渴兼施間有愈者。有

補瀉合用之法。有先補後瀉之法。有先瀉後補之法。凡人參敗毒散。人參白虎湯。黃龍湯。竹葉石膏湯。皆補瀉合用之法也。先用補劑。後施汗下。先補後瀉之法也。先用汗下。後施補劑。先瀉後補之法也。當詢病之來路。斟酌施治。尤當審現在之證。若純見實證。亦不可以疑似之見誤人。大凡周身俱見大實大熱之證。而一二處微見虛象。則吃緊照顧其虛。周身俱見虛象。而一二處獨見實證。則吃緊斡旋其質。此治病之權衡也。若夫汗之而表證愈增。如頭痛身痛更甚之類。清下而裏證愈增。如煩渴痞滿更甚之類。則大虛有盛候也。急宜補之。毋疑。既辨其證。尤當細辨其

脉。凡遇脉之浮候盛者。須謹察其沉候有無力處。六部脉皆盛者。須謹察其一部有獨無力處。果得其一部一候之真。無加便可畧其諸部諸候之假。有餘從而施治。有獨見若神之妙。夫既詢得其來路之大槩。又察得其輕重之確憑。再加之脉理精詳。則燭照無遺矣。其損證之狀甚多。當參後四不足條看。

四不足

四損由人事。四不足由天稟。四損在暫時。四不足在平素。然四不足亦有由四損而來者。不可以四損之外便無不足。四不足者。氣血陰陽也。氣不足者。少氣不足以息語言。

難出也。感邪雖重，反不成虛滿症塞。凡遇此症，從宜宣化，必以養氣爲主。血不足者，面色痿黃，唇口刮白也。感邪雖重，面目反無陽色。縱宜攻利，必以養血爲主。陽不足者，或四肢厥逆，或肌體惡寒，恒多泄濶，至夜益甚。或口鼻冷氣受邪，雖重反無發熱苔刺燥渴。凡遇此等證，縱欲攻利清熱，必先之以溫補。待其虛圓實證全見，然後以治實之法治之。陰不足者，自然五液枯乾，肌膚則錯。感邪雖重，應汗無汗，應厥不厥，遇此等證，縱宜攻利，必先之以養陰。待其氣化津回，邪多不治自退。設有未退，酌用清利攻利。若早其病益甚，以上四不足合前條四損總不可正治其邪，必

以養正爲要。先服養正藥。待其實證悉見。方可攻邪。若服攻邪藥。虛證復見。仍當調補其虛。養正以和邪。祛邪以安正。互相加減。迭爲進退。直待邪盡去。而正不傷。方爲善治。

三復

三復者。勞復食復自復也。勞復者。大病後因勞碌而復也。不必大費氣力。卽梳洗沐浴亦能致復。復則復熱。諸證復起。惟脉不沉實爲辨輕者。靜養自愈。重者必大補。以調其營衛。和其臟腑。待其表裏融和。方忘誤用攻下清涼。必致不救。安神養血湯主之。若因飯食過多而復者。舌苔必復黃。輕則損穀。自愈重則消導。始愈。若無故自復者。乃伏邪。

未盡也。當問從前所見何證服何藥而解。今仍用前藥以滌其餘邪則愈。時疫復證有復至再三者。屢復之後必兼四損四不足證。宜參前條加減進退之法治之。

辨似

凡病皆以虛實寒熱四字爲大綱。時疫何獨不然。但虛實寒熱之真者易辨。似者難辨。前所列時疫表裏諸證。皆實邪熱邪。而實熱中亦有虛寒。四損四不足皆虛邪寒邪。而虛寒中亦有實熱。余於逐條下已細辨之矣。然有實證似虛。虛證似實。熱證似寒。寒證似熱。尤不可不細辨。故復通論而詳述之。所謂實證似虛者。卽以表證論之。頭痛發熱。

邪在表也。其脉當浮。證當無汗而反自汗。脈無力。用發表藥。而身反疼痛。則似虛矣。故人惑於多自汗。而誤用桂枝湯者有之。惑於脈無力。而引仲景太陽篇。發熱惡寒。脈微弱。爲無陽。而誤用建中湯者有之。惑於身疼痛。而引仲景若不瘥身體疼痛。當溫其裏。誤用四逆湯者有之。不知此等證。在時疫中。皆在表實證之似虛者也。其自汗者。疫熱自裏蒸出。非表虛也。其脉無力者。熱主散漫。散漫則脉軟。非比寒主收斂而脉緊也。身體反疼痛者。伏邪自裏而漸出於表。非比陽虛不任發表也。此表證之實證似虛者也。又以半表半裏論之。寒熱往來。胸脇滿邪。在半表半裏。

也。其脉當弦。其口當渴。而有脉反沉。口不渴者。則似寒。故人惑於脉沉。而以胸脇滿爲太陰。口不渴爲內寒。而誤用理中者有之。不知此證在時疫中。皆半表半裏熱證之似寒者也。其脉沉者邪伏在裏。原而未出表。故脉不浮。非陽虛也。其不渴者邪未傳變。未入胃府。故不能消水。非內寒也。此半表半裏之似寒者也。又以裏證論之。口燥咽乾。不得卧。邪在裏也。其脉當滑。其身當熱。其便當結。按滑當云滑者陰氣有餘也。主痰飲宿食吐逆諸證。洪爲氣血鬨。結之候。主煩。主咽乾。表裏俱熱。二便滯。傷寒陽明經病。而脉反沉微濶弱。身反四逆厥冷。大便自利。則全似虛冷矣。人惑於脉之沉微弱濶。而用參芪者有之。惑於厥逆而

用桂附者有之惑於自利而用參术乾薑者有之不知此等證在時疫皆裏熱之似寒也裏實之似虛也其原沉微弱濇者乃邪熱結於腸胃氣不達於營衛也其身反厥冷者邪熱結於裏精於下氣不達於外通於上也其自利者乃熱結旁流也此裏證之實證似虛熱證似寒者也總之時疫爲熱。因與風寒之寒因大異故脉證雖有似虛似寒之時而一辨其爲時疫則屬邪自外至邪氣盛則實大都反見虛寒假象明眼人不當爲所惑也所謂虛證似實者卽以表證論之頭痛發熱身疼痛自汗脈浮大邪在表也而屢用表散清涼藥不懼不減其證轉甚者非藥力之不

到。乃正氣不能傳。藥力達表。陰液不能隨陽氣作汗也。此邪在表時虛證之假實者也。氣虛者加參芪於表藥卽汗。陰虛者加潤劑於表藥卽汗。若不知其氣血之兩虧而宣表不已。勢必暴厥而成脫證矣。更以半表半裏論之。胸脇痛耳聾嘔吐如瘧狀。脉弦邪在半表半裏也。而屢用和解消導藥。不惟不減其證。更加者非藥力之不到。乃中魚腥胃傷而氣不運。肝木傷而火燥逆也。此疫邪在半表半裏時虛證之假實者也。必合四君六君於和解藥中。合四物於清解藥中。始能戰汗而解。若更消導清解不已。必至胃氣絕而死。更以裏證論之。舌苔黃黑裂燥苔刺。胸腹脇脣

硬痛大小便閉六腑敗大邪在裏也而屢用攻利藥或總不得利或利後更甚非藥力之不峻乃正氣不能傳送腸胃血波不能滋潤腸胃也氣虛者助氣以資傳送血枯者養陰以藉濡滑氣行淨化方得通利此疫邪傳裏時虛證之似實者也若不知其虧竭而恣意攻利必昏沉痿頓而死總之藥不中病則傷正氣傷其下則正氣浮越而上逆傷其中則正氣解散而外張脉證雖有似實似熱之時而一詢其來路若治之太過則屬氣從內奪正氣奪則虛明眼人不當爲所惑也夫一證而虛實互異用藥稍訛而生死攸分將以何者爲辨證之把柄乎曰以開卷所列氣色

神脉舌苔辨其是疫與非疫以曾經誤治與未經誤治辨其時疫之爲實爲虛則得其大綱更細玩前所列各證條分縷析之詳則得其細目則似是而非之證斷不能惑矣余於前各條下每證已細辨其虛實而此復重言以通論之者正以前散見於諸條恐讀者畧過故復總論以提撕其爲吃緊處也至若寒證似熱則傷寒諸證有之時疫絕無故不論及云

遺證
湯病後不表裏證

發腫

時疫大勢已平寒熱已解而面目肢體浮腫有食滯中宮

水停心下氣復未歸三種當分別以施治。食滯中宮者乃病後脾胃大虛不能消穀。病者肓中枯燥偏欲多食。食停心下脣上則水不得上輸於肺。肺亦不能通調氣道下輸膀胱故溢於肢體而爲浮腫。其證以心下脣上有硬處按之則痛爲異。小便或利或不利。當用平胃散加枳實山楂麥芽萊菔子青皮神曲爲主。硬處消則腫自愈。或加苓澤兼利水亦可。水停心下者乃脾虛不能消水也。與食滯異者心腹無硬痛小便不利也。用苓澤車前木通之類利其小便而愈。氣復未歸者吳又可所謂病後氣復血未復氣無所歸故作腫也。不可治腫調其飲食節其勞役靜養自愈。

其異於停水食滯者。水停身重。小便不利。氣腫身輕。小便自利。食滯腹中有結氣。腫腹中自和也。

發頤

時疫愈後有發頤者。乃餘熱留於營血也。治以解毒清熱活血疎散爲主。誤則成膿不出。而牙關不開。咽喉不利。多不能食而死。毒內陷而復舌燥神昏亦死。出膿後氣虛血脫亦死。故宜早治也。古方以普濟消毒飲爲主。發在耳後。以柴胡川芎爲君。在項下以葛根爲君。在項後或顛頂。加羌防。此證不可輕補於未潰之先。補早必成膿。尤不可純用寒涼於將發之際。恐閉遏而毒不得發。故必兼疎散爲

廣雅醫書 卷之四
要外治以葱水時時浴之。

發瘡

時疫愈後發瘡者極多。熱在於肌肉也。多服清涼養氣血藥自愈。

發癩

時疫愈後四肢不能動移者。熱傷筋脉也。吳氏諸養榮湯酌用。輕者粥食調理自愈。

索澤

時疫愈後身體枯瘦皮膚甲錯者。熱傷其陰也。養陰爲主。吳氏諸養榮湯酌用。亦有粥食調理自回者。

發蒸

時疫愈後有發骨蒸如勞瘵者乃餘熱留於陰分也。不可以其羸瘦而遽用虛損門治法必察其六府有結邪則仍攻其邪爲主。次察其經絡有壅瘀則仍通其壅瘀爲主。次察其氣道有痰涎則仍利其痰涎爲主。數者俱無然後以清熱爲主。或無邪而陰傷方可純用養陰之藥或分其餘邪之輕重虧損之多少而兼用養陰清熱藥進退加減以和之更妙。

婦人

婦人時疫悉與男子同惟當經期則治法畧異以其關乎

血室也。凡遇感疫值經期者。治法必兼少陽。以少陽與厥陰爲表裏。厥陰爲血室。血室一動邪必乘虛而犯之。須分適來因受病而止。適來受病而自行。適斷而受病。三種則虛實自見。凡經水適來而受疫氣。遽止者。必有瘀血。要再察其脇腰少腹有牽引作痛拒按者。必以清熱消淤爲主。小柴胡加赤芍。延胡桃仁歸尾丹皮。凡經水適來而受疫氣。疫病雖發。而經水照常自行者。不必治其經血。但治其疫邪而病自愈。蓋病本未犯血室。故經血自行如常也。仲景所謂勿犯胃氣及上二焦必自愈者。正指此。非謂總不用藥也。凡經水適斷而受邪者。經行已盡。則血海虛也。

必乘虛而陷入血海。若見腰脇及少腹滿痛者。大柴胡湯加桃仁赤芍逐其血室之邪。始愈。凡婦人受疫。但見晝日明了。至夜譏語。卽當詢其經期。以防熱入血室之漸。

妊娠

妊娠感時疫。須治之於早。則熱不深入。而傷胎。當汗。當清之證。當速治。不待言。當下之證尤不可遲。若因妊娠忌下。傷胎之說。因循畧遲。則胎受熱蒸。而反易墮。一見裏證。速下其熱。其胎反安。然無事。蓋有病則病受之。內經所謂有故無殞者。於此見之。此歷驗不誣者。妊娠受疫。當下失下。至於舌黑。腰痛。少腹下墜。至急。則其胎多死腹中。自欲隨。

廣雅醫論 卷之四
三不下則母無生理。胎亦不能獨存。同一墮胎而此善於彼。當明言於病家。而後施治。下藥雖三承氣皆可用。惟芒硝當慎。以其專主傷胎。非大實大熱大燥不可試也。

小兒

小兒受時疫悉與大人同。而墮見驚搐類於驚風。誤治多死。用大人治疫清解諸法減小劑料以治之。則愈。小兒不能言。濁。當下症。既不知其識。安復難驗其舌苔。則當驗其唇齒。赤而燥。卽是下證。此幼科之要訣也。

廣瘟疫論方目

大青龍湯

六神通解散

九味羌活湯

萎蕤湯

大羌活湯

人參敗毒散

吳氏達原飲

小柴胡湯

炙甘草湯

柴胡四物湯

參胡三白湯

清脾飲

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

人參白虎湯

黃龍湯

六味地黃湯

生脉散

四物湯

越婢湯

陽旦湯

黃芩湯

梔子豉湯

黃連解毒湯

小陷胸湯

導赤瀉心湯

猪苓湯

天水散益元散

柴葛解肌湯

吳氏三消飲

六君子湯

歸脾湯

清燥湯

大柴胡湯

吳氏清燥養榮湯

補中益氣湯

三黃石膏湯

防風通聖散

逍遙散

瓜蒂散

葛根葱白湯

平胃散

吳氏承氣養榮湯

涼膈散

四苓散

桃仁承氣湯

茵陳蒿湯

吳氏舉斑湯

犀角地黃湯

三黃瀉心湯

藿香正氣散

橘皮半夏湯

竹葉石膏湯

大半夏湯

理中湯

十全湯

二陳湯

白虎湯

白虎加蒼朮湯

白虎舉斑湯

大陷胸湯

大陷胸圓

抵當湯

八珍湯

葛根芩連湯

麻仁丸

天王補心丹

荆防敗毒散

倉廩湯

四君子湯

異功散

附子湯

吳氏安神養血湯

建中湯

普濟消毒飲

吳氏蘿貝養榮湯

吳氏柴胡養榮湯

吳氏柴胡清燥湯

吳氏人參養榮湯

吳氏參附養榮湯

犀角大青湯

柴葛五苓散

附方

升麻葛根湯 治寒暳多時多疾疫

以麻葛根 朱芷 芫荽 加玄参

頭痛加芍藥白芷 身痛者桂枝蜜酒治風

胡黃芩治風 番荔枝石膏

頭面腫如火風者連翹白芍

芍藥石膏 咽痛加桔梗

斑癩不退紫蘋半錢

細頭加人參

廣瘟疫論方

大青龍湯

治麻疹寒熱發作，身疼發癟，頭痛者主之。汗出惡風者不
可服。三二兩服，並加桂枝一錢，大毒益之。每七粒者可服三
次。

麻黃

桂枝

杏仁

石膏

甘草炙

加葛棗煎

此辛寒清火之
涼解之法

六神通解散

一法有川連羌活細辛
治疫毒寒熱煩躁多汗等症

麻黃一錢

甘草一錢

黃芩二錢

蒼朮二錢

石膏一錢半

滑石一錢半

豆豉十粒

去核解之法

加葱薑煎

此發表兼通經之
涼解之法

九味羌活湯

治傷風寒濕熱，骨節疼痛，頭項瘡瘍，四肢痺強，腰背酸痛，
及汗出感冒，口干之氣疫癘瘍者。

羌活一錢半 防風一錢半 細辛五分 蒿木二錢半

白芷一錢 川芎一錢 黃芩一錢 生地一錢

甘草一錢

加生薑葱白煎

萎蕤湯

方有乾葛無菊花

涼解三分之法

姜蕤二錢半 麻黃五分 白薇五分 青木香五分

羌活五分 杏仁五分 川芎五分 甘草五分

石膏一錢半 菊花一錢半

白水煎

大羌活湯 涼解三分之法

羌活

防風

細辛

蒼朮

白术

川芎

黃芩

生地

甘草

防已

知母

獨活

黃連

白水煎

人參敗毒散

涼解之法

人參

茯苓

甘草

枳壳

桔梗

柴胡

前胡

羌活

獨活

川芎

薄荷

口乾舌燥加黃芩
膚痒加荆芥

加生薑煎

此方涼者汗之

吳氏達原飲

初起相煎

梔榔二錢

厚朴一錢

草果仁五分知母一錢

黃芩一錢

芍藥一錢

甘草五分

白水煎

小柴胡湯

柴胡桂枝

柴胡

黃芩

人參

半夏

甘草

加生薑大棗

炙甘草湯

考正佐即

人參

甘草炙

桂枝

阿膠蛤粉炒一

麥冬

生地

大麻仁

加生薑大棗水酒各半煎

柴胡四物湯

姜止咳利

柴胡

半夏

人參

黃芩

甘草

當歸

川芎

白芍

生地

加薑棗煎

參胡三白湯

姜止咳利

人參

一錢半

白朮

一錢半

柴胡

二錢

白芍

一錢半

白朮苓

半錢

白水煎若脉微弱口渴心煩加麥冬五味子若煩口
苦心下痞加黃連枳實若不眠加竹茹

清脾飲

青皮

柴胡

厚朴

黃芩

半夏

甘草

茯苓

白朮

草果

加生薑煎

大承氣湯

大黃酒洗一錢

芒硝二錢

厚朴二錢

枳實一錢

白水煎

小承氣湯

大黃

四錢

厚朴一錢

枳實一錢

白水煎

調胃承氣湯

大黃

三錢酒

芒硝二錢

甘草一錢

白水煎

人參白虎湯

石膏

知母

甘草

人參

加粳米煎

黃龍湯

大黃三錢

芒硝二錢

厚朴一錢半枳實一錢

甘草一錢

人參一錢半當歸二錢

加生薑五片大棗一枚煎

六味地黃湯

熟地

山藥

山萸肉

茯苓

丹皮

澤瀉

新汲井水煎

生脉散

人參

麥冬

五味子

白朮煎

四物湯

川芎

當歸

白芍

熟地

新汲井水煎

越婢湯

麻黃

石膏

甘草

加生薑大棗煎

鴟目湯

桂枝

芍藥

甘草

加生薑大棗煎

黃芩湯

芍藥

黃芩

黃芩湯

芍藥

黃芩

黃芩

芍藥

甘草

加大黃煎

梔子豉湯

梔子

香豉

先煮梔子後入香豉白水煎

黃連解毒湯

黃連

黃柏

黃芩

梔子等分

白水煎

小陷胸湯

黃連

半夏

栝蒌實

先煎桔梗實後內二味白水煎

導赤瀉心湯

黃連

酒洗

黃芩

酒洗

山梔

蓋汁炒滑石飛

知母

鹽酒拌

犀角銹

甘草生

人參

麥冬去心

茯苓各一錢

加燈心生薑大棗煎

豬苓湯

豬苓

茯苓

澤瀉

阿膠

滑石各一兩

桂枝

白水煎

天水散加硃砂名益元散

滑石六錢 甘草一錢

研細末并水或燈心湯調

柴葛解肌湯慢活加石膏一錢

柴胡

葛根

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

加薑棗前

吳氏三消飲

枳榔

厚朴

草果

知母

葛根

芍藥

甘草

羌活

黃芩

柴胡

大黃

加葛根煎

此名葛根煎也

六君子湯

人參

白朮

茯苓

炙草

陳皮

半夏

加葛根煎

歸脾湯

一方無白朮

人參

白朮

黃芪

茯神

棗仁

遠志

永香

當歸

白芍

炙甘草

卷之四
加桂圓肉蓮棗煎

清燥湯

蒼朮一錢炒白朮五分炒黃芪一錢半人參三分

茯苓三分黃連一分炒黃柏二分酒甘草二分

陳皮五分猪苓二分澤瀉五分炒升麻二分

柴胡一分五味子九枚神曲一分炒麥冬二分

當歸二分酒洗生地黃二分

白水煎

大柴胡湯

大柴胡一錢大黃二錢枳實一錢黃芩一錢

半夏

一錢

白芍

一錢

加生薑三錢大棗一錢前

吳氏清燥養榮湯

知母

天花粉

當歸身

白芍

甘草

生地汁

陳皮

加燈心煎

補中益氣湯

人參

白朮

黃芪蜜炙

炙草

陳皮

當歸

升麻蜜炙

柴胡少

加葛根煎

三黃石膏湯

黃柏

黃芩

黃連

梔子

淡豆豉

麻黃

石膏

加生薑大棗細茶煎熱服

又名雙解散

防風通聖散

又名雙解散

防風

大黃

當歸

芍藥

芒硝

荆芥

麻黃

梔子

連翹

甘草

桔梗

石膏

滑石

薄荷

黃芩

白朮

川芎

加生薑葱白煎 壮羸表裏通利之

逍遙散

柴胡

當歸

白芍

白朮

茯苓

甘草

薄荷

加煨薑煎

瓜蒂散

甜瓜蒂炒黃赤小豆

共爲末熟水或鹽水調量虛實服或用搗鼻

葛根葱白湯

葛根

芍藥

知母

川芎

加葱白生薑煎

平胃散

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

加薑蜜煎

吳氏承氣養榮湯

知母

當歸

芍藥

生地黃

大黃

枳實

厚朴

加薑煎

涼膈散

芒硝

大黃酒浸

山梔

連翹

黃芩

酒炒

甘草

薄荷

加竹葉蜜煎

四芩散

吳氏有陳皮無白朮亦名四芩散

茯苓

猪苓

澤瀉

白朮

白水煎

桃仁承氣湯

大黃

芒硝

甘草

桃仁

桂枝

白水煎

茵陳蒿湯

廣陳

大黃

梔子

白水煎

吳氏舉斑湯

白芍

一錢

當歸

一錢

升麻

五分

白芷

七分

柴胡

七分

穿山甲

二錢
炙黃

加薑煎

犀角地黃湯

犀角

生地

丹皮

芍藥

白水煎

三黃湯

黃芩湯
濃苦有黃芩

保命集有甘草

大黃

川黃連

以麻沸湯漬之須臾絞去滓溫服

藿香正氣散

大腹皮

紫蘇

藿香

甘草

桔梗

陳皮

茯苓

蒼朮

厚朴

半夏麴

白芷

加薑棗

橘皮半夏湯

陳皮

半夏

加生薑煎

竹葉石膏湯

人參

半夏

麥冬

甘草

竹葉

石膏

加粳米生薑煎

大半夏湯

半夏

人參

白蜜

以水和藥蜜揚之二百四十遍再煎

理中湯

人參

白术

炒乾薑

炙甘草

白水煎

十棗湯

芫花熬

甘遂

大戟等分

大棗十枚煮湯內藥末強人服一錢七

二陳湯

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白虎湯

石膏

知母

甘草

加粳米

白虎加蒼朮湯

卽白虎湯加蒼朮

白虎舉斑湯

石膏

知母

甘草

人參

白水煎

大陷胸湯

大黃二兩 芒硝一升 甘遂一錢爲末

先煮大黃去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服

大陷胸圓

大黃八兩

芒硝

葶苈炒

杏仁

去皮尖各半升

合研取彈大一丸別搗甘遂末一錢自蜜二合煮服

通串法言

水蛭

三十猪脂熬黑，去足翅桃仁三十去皮尖研，大黄役

白水煎

八珍湯

人參

茯苓

當歸

熟地

白芍

甘草

白芍

川芎

加薑棗煎

葛根芩連湯

葛根

黃連

黃芩

甘草

白水煎

麻仁丸

麻仁二升

芍藥半斤

大黃一斤

去皮

枳實一斤

厚朴一尺去皮

去尖熬別作脂一升去皮尖熬別作脂

煉蜜丸

天王補心丹

一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草

生地

四兩酒

人參五錢

元參五錢炒

丹參五錢炒

茯神

五錢

桔梗五錢

遠志五錢去心炒

去皮

棗仁一兩炒

五味子

一兩

天冬

一兩去心炒

麥冬

一兩去心炒

當歸

一兩洗

柏子仁

一兩去油炒

蜜丸殊可爲衣燈心湯下

荆芥

防風

柴胡

羌活

獨活

前胡

川芎

枳殼

人參

甘草

桔梗

茯苓等分

加薄荷葉煎

此辛涼茶行之

傖廩湯

疫癆

人參

茯苓

甘草

前胡

柴胡

羌活

獨活

桔梗

枳殼

川芎

加陳倉米生薑煎

四君子湯

周易經傳
卷之四
人參

白朮

茯苓

炙甘草

加薑棗煎

異功散

八參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

加薑棗煎

附子湯

附子

白朮

白茯苓

白芍

人參

白水煎

吳氏安神養血湯

茯神

棗仁

當歸

遠志

桔梗

芍藥

地黃

甘草

加龍眼肉煎

建中湯

此小建中湯

桂枝

芍藥

甘草

加生薑大棗鴨糖煎

普濟消毒飲

黃芩

黃連

人參

橘紅

元參

生甘草

桔梗

柴胡

薄荷

連翹

風鈎子

板藍根

馬屁勃

白蘆薈

升麻

白水煎

吳氏蔓貞養榮湯

知母

花粉

貝母

桔梗實

橘紅

白芍

當歸

白水煎

吳氏柴胡養榮湯

柴胡

黃芩

陳皮

甘草

花粉

當歸

白芍

生地

知母

加生薑大棗煎

吳氏柴胡清燥湯

柴胡

黃芩

陳皮

甘草

花粉

知母

加生薑大棗煎

吳氏人參養榮湯

人參

麥冬

遼五味

地黃

歸身

白芍

知母

陳皮

甘草

白水煎

吳氏參附養榮湯

當歸一錢

白芍一錢

生地三錢

人參一錢

附子七分炮

乾薑一錢

白水煎

犀角大青湯

犀角上

大青中

元參中

甘草下

升麻中

黃連中

黃芩中

黃柏下

山梔中

水二鍾煎一鍾

柴葛五苓散

時疫並癆見少陽明經者宜之

柴胡

葛根

茯苓

澤潤

猪苓

白术

桂枝

金匱竹葉湯

原治產後中風，數熱面赤喘而頭痛。

竹葉

葛根

防風

桔梗

桂枝

人參

甘草

炮附

生薑

紅棗

臣加半夏

此方用竹葉葛根桂枝防風桔梗解外之風熱之火，
附子固表三昧，甘草姜半夏以調陰陽之氣而使其平。乃
表裡並濟之法。凡風熱外淫而表之氣不固者，宜用此

制之原虚用之多效

葛根升麻湯 治酒行瘧疾

葛根前胡黃芩升麻葛根芍药荆芥去芍药加桔梗

半神湯

葛根當歸湯水草升麻葛根赤芍升麻黃芩白芍加葛根

大辛神木散 治風瘧久日瘧氣得止此藥而除大瘧瘧時毒

葛根升麻湯水草升麻黃芩白芍加葛根