

新編醫學正傳

醫學正傳卷之八目錄

小兒科

論 又箋蒸論

小兒脉法總論 三關脉法形狀

湯氏察形色總斷

面上諸候形證歌 九七首

內八段錦 凡四首

外八段錦 凡十首

急慢驚門 論 脉法

丹溪方法 凡二條

東垣治驚風論 東垣黃芪湯

東垣益黃

錢氏安神丸 錢氏白朮散

又治驚風方

急慢驚風方 又急慢驚風方

又治慢驚風方

鎮驚丸 奪命丹

利驚丹

馮仁丸 抱龍丸

千金龍磨湯

宣風散 五福化毒丹

金鉞

鈞藤飲

溫白丸

涼驚

發搐門二

男發搐

女發搐

早晨發搐

日午發搐

日晚發搐

夜間發搐

傷風發搐

傷食發搐

百日內發搐

補腎地黄丸

瀉青丸

導赤散

涼驚丸

益黃散

大青膏

牛黃膏

甘露飲

白餅子

塗頤法

浴體法

五癩門三

論五癩形証

五色丸

諸疳門四

論

地黄丸

安神丸

益黃散 又名補脾散

木香丸

胡黃連丸

蘭香散

白粉散

如聖丸

香蟾丸

蘆薈丸

治疳積腹大方

又治小兒疳方

祖傳經驗秘方

吐瀉門五

論

錢氏方法

木瓜丸

兒生三日內吐

兒生三日甚至十日吐瀉

五月二十五日已後吐瀉

玉露散

六月十五日已後吐瀉

七月七日已後吐瀉

八月十五日已後吐瀉

吐瀉泄黃傷熱乳病

溫中丸

虛弱脾胃不和

吐瀉調脾胃散

治吐瀉黃疸方

夏月吐瀉用益元散極效說

附証

腹脹論

腹脹塌氣丸

小兒腹虛脹方

又治腹脹方

腹痛傷食法

不腹痛方法

白餅子

白木散

心腹痛方法

安虫散

集効丸

又治虫痛方

治蚊虫痛方

小兒吃棕腹痛方

又治小兒腹痛

小兒夜啼方

治夜啼花火膏

治小兒驚啼方

小兒風痰壅盛

小兒痰熱骨蒸方

又治前証方

小兒解顛方法

小兒吃坭方法

小兒脫囊方

小兒脫肛方

又治脫肛方

又治前証方

小兒赤瘤方法

白玉散

臍中汁出方

小兒癩頭方

又治癩頭方

丹溪醫按一條

小兒尾間骨痛

小兒弄舌

馮黃散

小兒龜胸

馮白散

龜背

重舌木舌

又治前証方

又治木舌方

小兒口瘡方

鴉口瘡方

又治驚口瘡方 又治小兒口瘡方 又口瘡方

小兒額上生瘡 小兒走馬牙疳 又治牙疳方

小兒臍風撮口方

痘疹門六 論 丹溪方法總論

丹溪方法 九三十二條

痘瘡初登伍巖形証一 痘瘡五巖形色二

斑痘所發之源三

○辨內外因四

王氏惺惺散 升麻葛根湯 木香三蘇

四君子湯 和中散 紫霜丸

○辨形氣病

補肺散 解毒防風湯 當歸丸

十奇散

○辨三陰三陽經候六

荊芥甘草防風湯

連翹防風湯

升麻湯

理中湯

木香散

異功散

○辨三陽証治七

連翹升麻湯

犀角地黄湯

解毒丸

宣風散

百祥丸

龐氏地黄膏

黃栢膏

玉露散

甘露飲子

猪心龍腦膏

○辨三陰証治法八

調中丸

○辨形氣不足九

芍歸湯

○辨表裏虛實十

消毒飲

葛根升加芍藥湯

活血散

勻氣散

二物湯

百袍膏

○平治諸方十一

三豈湯

油飲子

鳳龍膏

四物解肌湯

○瘡出不快十二

活血散加防風

龐氏紅花湯

紫草湯

四聖散

樺皮飲子

五積散

正氣散

調解散

辰砂五苓散

肉苳菟丸

絲瓜湯

阮氏萬全散

湯氏安班湯

透肌散

如聖湯

○辨外証送順十三

○辨初末形証十四

○辨不藥而愈十五



○辨五不治証 十六

○辨疹陰陽証 十七

○傷寒時氣錢班附十八 玄參升麻湯

荆防敗毒散

化斑湯

龐氏石膏湯

陽毒升麻湯

○辨瘡後餘毒 十九

消毒飲

十六味流氣飲

必勝膏

蜆子水

五福化毒丹

如聖湯

雄黃解毒丸

黃連阿膠丸

駐車丸

決明散

密蒙花散

撥雲散

蛤粉散

祖傳經驗秘方

又痘後不大便方

○古人拯治痘瘡要法方論 二十

隨伏倒靨黑陷証

不換金正氣散

辟穢丹

再甦散

傳風膏

白龍散

敗草散

馮氏天花散

單胎散

獨聖散

安胎散

醫學正傳卷之八目錄終

花溪恒德老人虞壽天氏編集

姪孫虞守憲惟明校

小兒科

論

嘗聞小方脉科古人謂之啞科最費調治誠哉是言也蓋以  
嬰之流難問証難察脉耳抑且臟腑脆嫩而孟浪之劑與夫峻  
寒峻熱之藥俱不可輕用試詳論之夫孺子之在襁褓中也肉  
無七情六慾之交戰外無大風大寒之相侵奚其幼科之疾若  
是之繁且甚與抑考其証太半胎毒而少半傷食也其外感風  
寒之証什一而已曰變蒸曰痘疹曰班爛曰驚悸曰風痲曰發  
搐曰痰雍曰赤瘤曰白禿曰解顛曰重舌木舌已上諸証豈非

孕婦不謹胎毒之所致與夫小兒之在胎也母飢亦飢母飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或多食煎燻或恣味辛酸或嗜慾無節或喜怒不常皆能令子受患其爲母者胎前旣不能謹節產後又不能調護是以惟務姑息不能防微杜漸或未滿百晷而遂與鹹酸之味或未穀週歲而輒與肥甘之物百病由是而生焉曰吐瀉曰黃疸曰五疳曰腹脹曰腹痛曰水腫曰瘰曰痢曰痰喘豈非吃食過傷調養失宜之所致與先正所謂古者婦人妊子寢不側座不邊立不蹕不食邪味等語厥有旨哉其餘飲食男女養胎幼幼之法必深得造化生生不息之意故古人多壽考兒以夭折者即此之由也嘗見今有稟性溫良之婦有娠不嗜慾從口生子少病而痘疹亦稀亦可以爲師法矣爲兒醫者臨證之際宜察色觀容不可鹵莽假如額赤知爲

心熱鼻紅知爲脾熱左腮青知爲肝有餘右頤白知爲肺不足  
頰白知爲腎虛之類更參之以虎口三關之脉其少兒之病情  
斯過半矣傳曰幼吾幼以及人之幼仁人之心斯言其可忽諸  
又論變蒸

夫小兒之物生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變  
蒸之後每三十二日一發熱或吐或汗或呻吟不食此爲長血  
脉全智意之常候不須治而自愈按諸家所論皆謂乃小兒長  
骨脉藏府與神志也自生之日始每三十二日一變凡人有三  
百六十五骨除手足四十五碎骨外正有三百二十骨自生下  
骨而上一日十骨三十二日乃爲一變骨氣始全一變生一藏  
或一府十變則藏府始足每變發爲虛熱諸證亦有胎氣任實  
胎變而無發熱証者此骨節藏府由變而全胎毒亦因變而散

也爲兒醫者可不審乎

脈法總論

按古法曰凡小兒證候難以手太陰尺寸脈診如一歲至六歲曰嬰孩惟以男左女右手次指三關之脈以爲驗病輕重死生之訣第一節名風關無脈則無病有脈則病輕第二節名氣關脈見則病重尚可以藥治而已第三節名命關脈見則病劇乃九死一生之惡候也多不可治七歲八歲曰亂九歲十歲曰鬚始可以一指探掌後尺寸三部之脈而以一息七八至爲無病之常脈十一歲至十肆歲曰童水而以一息五六至爲常脈也數則爲熱遲則爲寒浮則爲虛爲風沉則爲實爲積爲痛浮而數者爲乳癩驚悸虛而軟者爲慢驚痰痰緊而實者爲風癇牢而革者爲便秘沉而弦者爲食積爲腹痛緊而弦者爲氣急爲

風寒共數者爲熱伏結爲傷食軟細者爲虫痺若氣促脉代散  
乱無倫次者死在須臾而不治也業幼科者其可不及心於此  
今將手指三關之脉繪面分注開列于後



一風關易治

二氣關病重

三命關死候

三關青是四足驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚  
如有此三關通度脉候是極重之証必死餘並可治

風關青如魚刺易治乃初驚之候也黑色難治

氣關青如魚刺主痺勞身熱易治

命關青如魚刺主匿風邪傳脾難治

風關青黑色如懸針主水驚易治



氣關赤色如懸針主痺病熱肺藏積熱尤爲可治  
命關九有此脉不問五色皆是死候

又三關通度如懸針者主慢驚風難治

水風關如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣關如水字主驚風極夾驚候不拘五色三關通度者不治

乙風關如乙字主肺藏驚風易治

氣關如乙字主驚風病重

命關如乙字青黑色主慢驚風難治

風關如曲虫主痺病積聚前如橫排筭子肚皮如吹胖猪脰

氣關如曲虫主大腸有穢積

命關如曲虫主心痛傳肝難治

風關如環主肝藏有疳積積聚

氣閉如環主痺入胃吐逆不治

命關如環候惡不治

此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治

此紋若在手或面上或左右腋脇上

脈曲向裏者是氣痺

脈曲向外者是風痺

脈邪向右者是傷寒身熱不食無汗

脈斜向左者是風傷身熱不食有汗

雙鈞脈者是傷寒

三曲如長虫者是傷硬物

兩曲如鈞者是傷冷物

一頭如環有獨脚者是傷冷

面上有此點子必是再發之候

又凡頭面上或肚腹上有大脉併青筋如此者並是食毒物反

醫積難治

發赤如亂虫是常疳亦有虫疳此疳食積之疳皆可治

凡脉微細不足者並是風氣俱宜消疳然後取虫積肥孩兒是良法也

附湯氏察小兒神色總斷

○凡看小兒病宜先觀形証神色然後察脉假如肝之爲病則面青心之爲病則面毒脾之爲病則面黃肺之爲病則面白腎之爲病則面黑先要分別五藏形証次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

面上諸候形証歌 五言

○痢疾眉頭陂驚風面頰紅渴來唇帶赤毒熱眼朦朧

又一首

○山根若見脉橫青此病明知兩度驚赤黑困疲特吐瀉色紅  
啼夜不曾停

又

○青脉生於左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微燥熱黑青  
知是乳多傷

又

○右邊青脉不須多有則頻驚恐奈何紅赤爲風抽眼目黑青  
三日見閻羅

又

○指甲青兼黑暗多唇青惡逆病將瘥忽作鴉声心氣急此時

端的命難過

又

○蛇虫出口有三般口鼻中來大不堪如或白虫兼黑色灵丹  
縱眼病難安

又

○四肢疼痛不爲祥下氣冲心兼滑腸氣喘汗流身不熱手拿  
腎脾定遭殃

內八段錦

○紅淨爲安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青尤甚取下  
風痰病立輕

○赤色輕微是外驚譬如米粒勢難輕紅散多因乘怒亂更加  
搐弱實難平

○小兒初誕月腹痛兩眉顛號盤腸氣疔啼哭又呻

如反目抑視者天馬風也

○小兒初誕月飢體瘦庭麻髮禿毛稀少元因鬼王胎

外八段錦

○先望孩兒眼色青次看皆上冷如水陽男搐左無妨事搐右  
令人甚可驚女搐右邊猶可治若逢搐左疾非輕歪斜口  
眼終爲害縱有仙丹也莫平

○眼中赤脉實難量大數元來一不祥最怕乱文鋪目下更嫌  
赤脉貫瞳光

○額門腫起定爲風此候應知最是凶忽陷成坑如盞足未過  
七日命湏終

○鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋俱惡候更嫌

腰有直身紋

○忽見面黃紫帶青看來立便見風生青紅碎雜風將起必見

斑駁滿氣形

○亂效不錯紫燠青急急求醫免命傾盛紫再加身體熱瀕死

臧府惡風生

○紫小紅多六畜驚紫紅相等即疳成紫点有形如米粒傷寒

夾食証堪評

○紫散風傳脾臧聞紫青口渴是風爛紫隱深沈難治癆風痰

祛散命須還

○黑輕可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風邪証青黑

脾風作慢故馬

○紅亦連兮赤必輕必然乳母不相應兩手忽然無脉見定知

衝惡犯神靈



怠慢驚風一

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純陽蓋其真水未耗心火已炎故肺金受制而無以平木故肝木常有餘而脾土常不足也為父母者而有失於保養其或衣服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食之飢飽失節以致中氣損傷是故怠慢驚風之候作矣夫惟怠驚屬肝木風邪有餘之証治宜清涼苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候治宜中和甘溫補中之劑若夫怠驚之候因聞不常之聲或遇駢馬禽獸之唬以致面青口噤或嘔嘶而厥發過則容色如故良久復作其身熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃赤色惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳宜用錢氏利驚丸瀉青丸抱龍丸

宣風散伍福化毒丹等藥慢驚之証多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘳癱筋脉拘牽蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天弔風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安神丸之類錢氏謂驚為無陰之証因心經實熱而因不能以配陽是為陽盛陰虛之候也謂慢驚為無陽之証因脾土虛甚而陽不能以勝陰是為陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之証其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗醫多不諳此理混為一途而治誤人多矣業幼科者宜推幼幼及人之心為心庶免斯世無夭枉之赤子矣幸甚

脉訣

並見前摠章

方法

冊溪方法  
九二條

冊溪曰錢氏方乃小兒科之祖其立例極妙若能增損而用之無不驗也

又曰驚風有二漫驚屬脾虛所主多死宜溫補一云當養脾用參朮煎湯下安神丸○急驚屬痰熱宜涼瀉一云用養血藥作湯下降火清痰九子托龍丸之類世以一藥通治二証甚謬

○東垣治驚論曰外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之氣大禁涼驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木關孝忠編集錢氏方以益黃補士誤矣其

藥有丁香辛熱取火火旺土愈虛矣青摘皮瀉肺丁香熱  
大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火  
重虛其土殺人無疑矣其風木旺証右關脉洪大掌中熱  
腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹  
痛瀉痢青白益黃散聖藥也今立一方先瀉火補金大補  
其土是為神治之法

○黃芪湯

治慢驚風之神藥也

黃芪

二錢

人參

一錢

炙甘草

半錢

加白芍藥

一錢

右細切作一服水一大碗煎至半盞去粗食遠服

上三味皆甘溫能助元氣其能瀉火內經云熱淫于內以  
甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而  
大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木可由而來尅

土然後瀉風之邪。○文曰夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕天盛神品之藥也若得脾胃中伏熱勞役不足之証及服熱藥已重之類致胃虛而虛勞之証用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌活膏療慢驚風誤矣脾胃虛者由火邪乘其土位故曰從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故來剋土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸涼使脾土中金旺火衰風木自虛矣損食多進藥愈上藥是也

○益黃散治胃中風熱

黃芪

二錢

陳皮

去白

人參

各一錢

白芍藥

七分

生甘草

炙甘草

各五分

黃連

小許

右為細末分三服每服用水一盞煎至半盞食煎服

○錢氏安神丸治邪熱驚啼心疳面黃頰赤壯熱

麥門東去心馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草各半兩

硃砂一兩

龍腦一字

右為末細煉密為丸如芡實大每服半丸砂糖水磨化下  
慢驚用參朮煎濃汁化下

○錢氏白朮散治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將欲成慢驚風者服之訣効

人參

白朮

木香

白茯苓去皮

甘草各

麝香錢各一

乾葛

二錢

右細切分二服每服水一中煎至半盞溫服○卅溪加山

藥白扁豆

肉豆蔻

煨各一錢

用姜一片煎

○若慢驚已

作加細辛天麻各一錢全蝎三枚去稍毒白附子八分

同煎服不拘時候

○方治驚風用母丁香一粒細嚼人中白小許以其母中指取

血調擦牙上即甦

○急慢驚發熱口瘡手心伏熱痰熱痰嗽痰喘並用湧法重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末以酸薑汁調服吐之吐後稍定更用防風通聖散為末密丸服之間以桑羊乾為末米飲調服以平其風氣

○又方治急慢驚風

薄荷葉

寒水石各半兩青代

白僵蚕

硃砂各一錢

全蝎二枚炒

猪牙皂角槐角各半錢

右為細末灯草湯和乳汁調時時灌之

○又方治慢驚風子母俱服

人參

白朮各一錢 茯苓

陳皮各半錢

甘草

薄荷各二分 半夏

天麻各七分

田辛

金竭去毒炒一錢

右細切作一服加姜三片水一盞煎至七分服

○藥爲九鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止咳

珍珠一錢 琥珀

天竺黃

雄黃各三錢

金鉞十片 膽星五錢 牛黃二錢

射香半錢

硃砂三錢半

右爲細麥麵糊爲丸如梧桐子大每服五六丸薄荷姜蜜

湯化下

○奪命用治急驚不省人事目定直視牙關不開唇白或黑者



南星

半夏

各四錢 爲末 以生薑汁 和作餅子 焙乾 亦珠 新白 二錢

巴豆

去油淨 錢

硃砂

四錢

金鈞

銀鈞 各十片

輕粉

射香 各半錢

右爲細末麵糊丸如黍米大每歲兒一九燈心湯化下

○利驚丸治急驚風神效

天竺黃

二錢

青黛

各一錢 黑丑 頭末半 飛生用

右研勻煉蜜丸如梧桐子大一歲兒一九三歲兒二九五

歲兒三九溫薄荷水下食後服

○瀉青丸

又名瀉 肝丸

治肝熱急驚搐搦等証

羌活

川大黃

溫帝暴畏一 本無大黃

川芎

梔子仁

草龍膽

當歸

防風 祛風 各

右爲細末煉蜜丸如芡實大每服半丸至一丸煎淡竹葉

湯同砂糖溫水化下

○抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅救又治驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實少兒宜時喚服之則免痰熱驚悸之証

雄黃

二錢半

辰砂

研

天竺黃

一兩

天南星

焙為末臘月蝮牛膽中陰乾百日取研和四兩如無只將生乾者去皮膈炒熟用熱不及膈星

射香

半兩別研恐大

右為末煑甘草湯丸如皂子大溫水化下百日兒每丸分作三服一歲兒半丸五歲兒二丸童叟三五丸室女白帶伏暑用益小許細嚼一二丸新汲水送下臘月用雪水煮甘草和丸尤佳一法用漿水或新水浸南星三日煮三五沸去皮取白肉切焙炒黃色為末每八兩以甘草二兩半

拍破用水二碗慢火煎至半碗去粗旋旋洒入南星末徐  
徐研之令甘草水淨入餘藥

○千金龍膽湯治嬰兒出腹血脉實感寒熱交作四肢驚掣併  
諸疳驚等証

草龍胆

釣鈎藤

柴胡

黃芩

桂枝

芍藥

伏神

甘草

錢三

燉娘七枚

大黃五錢

右細切用水一升煮至伍合徐徐服之

○宣風散治急驚風搐搦不定

檳榔二枚

陳皮

甘草

錢五

黑丑四兩

半生

半炒

右爲細末二三歲兒密湯調下半錢已上一錢食前服

○五福化毒丹治急驚風痰熱搐搦等証

桔梗

微炒

玄參

洗焙各

青代

研

牙硝

各

人參

去芦

茯苓

去皮五兩

甘草

炙一兩

銀鈞

入耕

金鈞

入片

射香

半錢

右爲細末入研藥拌勻煉蜜丸每兩分作拾貳丸一歲兒每丸分四服用薄荷水化下瘡疹餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化一丸以鷄翎刮口內

○金鈞丸治急慢驚風痰涎壅盛

半夏

湯泡七次

天南星

煨裂

白附子

炮

防風

去若去

半兩

桂黃

珠砂

各半

生犀末

一錢

牛黃

龍腦

射香

各半

金鈞

二十片

右爲細末姜汁調麵打糊爲丸如麻子大每服三五丸至一二十九人參湯下慢驚去龍腦

○釣藤飲治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤

半錢

防風

去若

人參

麻黃

去節

白僵蚕炒

天麻

蝎尾

去毒炒 各二分

甘草

川芎

各半

右為細切作一服水一盞煎至六分溫服量入大小加減  
分數與之虛寒者加附子末半分

○溫白丸治小兒脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷痺洞泄及吐瀉久病  
轉成慢驚身冷瘈瘲等証

天麻半兩

白僵蚕炒

白附子生

全蝎去毒炒

天南星

湯泡七次焙 各二錢五分

右為細末湯浸寒食麵為丸如棗豈大每服五七丸至二  
三十九空心安米湯下

○涼驚丸治驚疳

草龍膽

防風去芦

青代各三錢

鈎藤二錢

黃連

一兩二錢 龍腦一錢

牛黃

射香各一字

右為細麥麵糊丸如黍米大每服三五丸至一二十丸煎  
金銀湯送下

發搐

男發搐目左視無聲右視有聲

女發搐目右視無聲左視有聲

相勝故也更看所發時候

○早晨發搐因寅卯辰時潮熱口上視手足動搖口流涎  
頸筋急此肝木太旺當補腎抑肝補腎地黃丸抑肝瀉青  
丸主之

○日午發搐因巳未時潮熱心神驚悸目上視白睛赤色牙關  
緊急口流涎手足動搖此心火太旺也當補肝瀉心補肝  
地黃丸瀉心導赤散涼驚丸主之

○日晚發搐因申酉時潮熱搐而喘目微斜視睡則露睛足手

冷大便下薄淡黃水此是肺病當補脾而益心肝補脾益黃散抑心導赤散抑肝瀉青丸主之

○夜間發搐因亥子丑時潮熱不堪搐而卧不穩身體濕無壯熱目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不醒當補脾抑心補益黃散抑心導赤散涼驚丸主之

○傷風發搐口中氣出熱呵欠頓悶手足動搥當發散大青膏主之小兒稟賦素怯者多病此

○傷食發搐身體溫多睡多唾或吐不飲食而搐當先定搐搥退用白餅子後服安神丸

○百日内發搐有真假二証真者不過三二次必死假者發頻不為重真者内生驚癇假者外傷風冷益血氣未實不能勝邪乃發搐也奚知假者口中氣出熱也治之宜發散大

青膏主之及用塗頤法與沐体法

○補腎地黄丸

見痺病門 瀉青丸 見前驚風門

○導赤散治心熱

生乾地黄

木通

甘草 炙各等分

右細切每服三錢水一盞入淡竹葉七片同煎至半盞食

後溫服

一本無其  
草瀉黃芩

○涼驚丸

方見前 益黃散 方見痺病門

○大青膏治小兒傷風吐瀉心溫乍涼乍熱

天麻

青代 各一錢 白附子 一錢半 蝎尾 去毒

烏蛇肉

酒洗  
焙乾

硃砂

天竺黃

射香 各一字

右為細末生密和成膏每服半皂子大或一皂子大月中

兒便水大司半黃青丸傳行水七一匙服之五歲已上同



甘露飲服

此本有天麻無大青按  
此如開孝忠加或方也

○牛黃膏治熱及傷風吐熱引飲

雄黃

甘草

甜硝

寒水石

生各二錢

蔚金

一錢

藜蘆粉

五錢

腦子

一錢

右為細末和勻密和成膏薄許水化下半皂子大食後服

○吐露飲治心胃熱咽痛口舌生瘡併瘡疹已發未發皆可服

又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搵含嗽併服方見痘疹門

○子三歲已上

治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生痰

滑石

輕粉

半夏

湯丸七次

南星各一錢

巴豆二十四粒去皮膜用水一升  
煑水及為度一作水三升

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如菜豈大捏作餅

子三歲已上兒三五餅已下一二餅煎薄許湯下臨卧服

○塗頤法

射香

蜈蚣末

牛黃末

青代末各一字

蝎尾

去毒末半錢薄苧葉半錢

右同為細末研勻熟棗肉劑為膏新綿上塗勻貼頤上四方可出一指許火上炙手頤慰百日裏外兒可用芫浴法

○浴体法治肥胎併胎怯胎熱

烏蛇肉

酒浸焙為末

白礬

青代各二錢

天麻二錢

蝎尾

夫毒為末

硃砂各半錢射香一字

右同研為細末每服用三錢水三碗帶葉挑枝一握同煎至十數沸濕熱浴之勿浴背

○伍疔三

九疔小兒五疔皆當隨歲治之每疔各有一獸所屬如犬

癩反折上窺犬叫肝也○牛癩目直視腹滿牛叫脾也  
鷄癩驚跳反折手攣鷄叫肺也○猪癩如尸吐沫猪叫腎  
也○羊癩目瞪吐舌羊叫心也○伍癩重者死病後甚者  
亦死治法並用五色丸主之

○五色丸

硃砂另研

珍珠末

各五錢

水銀

二錢半  
一作二兩

雄黃

一兩一  
作三兩

黑鉛

二兩同水熬○按用黑鉛二兩  
水銀當作二兩者爲是無疑矣

右煉密丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

諸疳証四

論

內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也父母不能調相惟務姑息舐犢之愛遂令恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝餐暮食漸成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋虫痛瀉利而諸疳之証作矣錢仲陽曰小兒病疳多因大病後或吐瀉後以藥下之致脾胃虛損亡津液而成蓋此証實由愚醫之所害耳斯言也特一端耳未可悉以為然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致與夫仲陽為兒醫之祖豈有誤耶其所論諸疳形証治法班班可攷學者不可不審如疳在肝則膜遮睛

法當補肝地黃丸主之痺在心則面頰赤身體壯熱法當補心  
安神元主之痺在脾則體黃腹大好食泥土法當補脾益黃散  
主之痺在肺則氣喘口鼻生瘡亦當補脾益黃散主之此虛者  
補其母也痺在腎則極瘦而身生瘡亦法當補腎地黃丸主之  
筋痺則瀉血而瘦當服補肝地黃丸骨痺喜卧冷地當服補腎  
地黃丸內痺則目腫腹脹利色無常或沫青白漸而瘦弱此冷  
証也宜服木香丸外痺鼻下赤爛自揉鼻頭有瘡不結如透目  
而生當用治瘡爛爛香散白粉散等藥法曰諸痺皆依本藏而  
補其母則子自安假令日中潮熱是心經虛熱也肝為心之母  
宜先補肝之實而後瀉心、得母氣則內平而潮熱愈矣餘皆  
做此大抵痺病當辨冷熱肥瘦而治其初病者為肥熱痺久病  
者為瘦冷痺冷則用木香丸熱則當用胡黃連丸冷熱痺並宜

用聖丸之類惟小兒之府藏柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳証為兒醫者常當以幼幼之心為心而善調之母緩巨膽妄為施治以絕人之嗣續幸甚

脈法

並見前總章

方法

○黃丸

補肝腎盪

治肝痺白膜遮睛筋痺瀉血腎痺身瘦瘡疥

骨痺喜臥冷地又治胃法不言解頤小兒年長不能行者專服神効

熟地黄

酒洗

山茱萸

乾山藥

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三錢

右為細末煉密為丸如梧桐子大三歲以下塊三九至五

九熱水空心化下年長者量增丸數

○安神丸治邪熱驚啼心疳面黃頰赤壯熱方見驚風門

○益黃散又名補脾散治小兒脾胃虛寒脾疳體黃腹大好食

泥土肺疳氣喘口鼻生瘡等証

陳皮一錢

青皮

訶子皮

甘草

長各半錢

丁香二分

右作一服細切水一盞煎至六分溫服

愚每於本方加參木各一錢効

○木香丸治瘦冷疳

木香

青皮

枳榔

肉豆蔻

各二錢半

射香

一錢另研

續隨子

一兩去油

煅礬

大壯者一名礬石俗名風鶴

二箇燒存性

右為細末煉密丸如棗豈大每服三五丸至一二十丸薄

苛湯送下

○胡黃連丸治肥熱疳

胡黃連

宣黃連

各半兩

硃砂

二錢半  
另研

右爲細末和勻填入獐猪膽內用淡漿煮以杖子如桃子  
上用線鈎之勿着底候一條時取出研入荈蒼射香各一  
分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十丸米飲下○一  
方是蝦蟇半兩焙乾不燒

○蘭香散治外痔鼻下赤爛

蘭香葉

各二錢  
洗淨性

銅青

輕粉

各半錢

右爲末細乾付之

○白粉散治疔瘡

烏賊魚骨末

七

白芨末

三七

輕粉

一七

右爲件和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

○如聖丸治冷熱痺瀉



史君子去壳

胡黃連

川黃連

白蕪荑去皮炒

射香

半錢 另研

乾蝦蟇

五介酒 煮成膏

右為細末以蝦蟇膏和丸如麻子大二三歲兒五七九已

上十九丸至十五九人參湯下不拘時服

○香蟾丸治疳消食積虫積肉積及治腹脹大

三棱

蓬義木

青皮

陳皮

神曲炒

麥蘖曲炒

草龍膽

檳榔各五錢

木香二錢

川練子去核

史君子

胡黃連

川黃連各四錢

白朮兩 乾蟾五箇

右以白朮以上藥俱研為細末以乾蟾用醋煮爛成膏和

藥如乾再加醋糊為丸如麻子大每服十五丸清米湯送

下

○芳薈丸治小兒疳氣腹脹骨熱

芫薺

木香

板柳各二錢半

蝦蟇酒浸炙黃去青

黃連

各一兩 蕪荑 去支

青皮

陳皮 各五錢

巴豆

三七粒 去壳同 上四味黃去豆

右為細末猪膽汁丸如小豆大三歲兒三十九粒米湯下

○又方治疳積腹大

胡黃連

去皮積一云 阿魏 醋浸去肉 射香 當門子

川黃連

炒去熱積 神麩 炒去食積 又去酒積 神麩 各二錢

右為細末猪膽汁和丸如麻子大每服三十丸白木湯送

下○一方有芫薺半錢

○又方治小兒疳病

黃連

白木

山查肉 各五錢

胡黃連

芫薺

各三錢 蕪荑 五分

神麩

右為細末猪膽汁為丸如麻子大量兒大小加減丸數與之

○祖傳經驗秘方換柳丸小兒疳積氣成塊腹大有虫等証

其只如神

換柳 一兩

三稜

切醋炒

蓬莪木

醋炒各半兩

青皮

去穢炒

陳皮

去白半兩

蕪荑

水洗淨二錢半

雷丸

去壳五錢

鶴虱

三錢炒

乾漆

五錢炒無煙

木香

三錢不見火

良姜

二錢陳壁土同炒

砂仁

一錢

麥蘖

五錢炒

胡黃連

三錢

甘草

三錢炙

神曲

五錢炒黃色

山查肉

五錢

右為細末醋糊為丸如葦豈大每服三伍十九空心淡姜

湯送下

吐瀉五

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱又曰濕勝則濡泄夫小兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食鬱則成熱熱鬱則成酸酸而成吐成瀉此必然之理也又曰食滯於胃口者爲吐食滯於大小腸者爲瀉有生下而遂吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃而爲吐也丹溪曰錢氏五補五瀉之法俱可選用謹遵而依法具錄如左

痢法

並見前摠章

方法

錢氏曰小兒初生下吐蓋拭掠兒口中穢惡不盡燕入喉中故

吐木瓜丸主之

凡生子於未發聲之先急取口中惡血以綿拭令淨後以黃連甘草二味等分煎汁灌

一二匙則無已上等病出痘疹亦稀少若牽  
聲一發則熱下矣亦當用黃連甘草汁飲之  
不可忽也

○木瓜丸

木瓜末

木香末

麝香末

膩粉

即輕粉也

換御末各一字

右再研勻麩糊爲丸如黍米大每服三二丸甘草湯送下  
○初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白色知  
是傷食當下之而後和胃不用白餅子和胃用益黃散

方俱見前

○初生三日已上至十日吐瀉身不熱或乍熱乍涼不思乳食  
大便青白色乳食不消此上實下虛也更有伍藏兼見証  
宜詳○肺病則唾天露睛喘氣○心則驚悸飲水○脾則

困倦饒睡○肝則呵欠頻悶○腎則不語畏明當先見兒

蕪藏補脾益黃散王之 此二証多病於夏秋也常先見兒蕪藏

其義未詳恐有脫簡以俟知者正之

○伍月二十五日以後夏至夜十日也吐瀉身壯熱此熱乃藏腑中十

分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色玉露散主之

○玉露散 一名甘露散

石膏 寒水石 各半兩 生甘草 二錢半

右為細末每服一字或半錢溫水調下

○六月十五日以後即後暑吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷

也嘔吐乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食食前少

服益黃散食後多服玉露散

按丹溪用去桂五苓散倍白朮加蒼朮甚者二朮炒用或入益元散和勻米湯調下甚効

○七月七日以後

立秋後七月也

吐瀉身溫涼

七分熱也七分冷

不能食乳多

似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦故大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散

○八月十五日以後

秋分後也

吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噦瀉

青褐水當脾補黃散主之不可下也

○吐瀉泄黃傷熱乳也吐瀉、青傷冷乳也皆當下白餅子主之傷熱乳者玉露散傷冷乳者益黃散溫中丸並於下後服之亦有不瀆下但服此藥愈者

○溫中丸

人參

甘草各

白朮各一兩

○腹痛多是飲食所傷

白木一錢半 陳皮去白

青皮去穢各二分

山楂去核

神效

麥芽

砂仁各一錢

甘草炙一錢

有寒加蘆薈吳茱萸

有熱加黃芩

右為細末，以服鹽茶七分清米飲或白湯調下。

○腹痛口吐氣溫面黃色目無精彩或白睛多及多睡畏食或

大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者用白餅子下之後和

胃用白木散

○白餅子方見發舊條下

○白木散方見驚風門

○消積丸

丁香九粒

砂仁十二箇

巴豆二箇去皮心



右為細末麩糊為丸如黍米大三歲已上三五丸已下  
二丸溫水下

○心腹痛面饒白口中沃沫及清水出發痛有時當作蛇虫治  
又曰凡積痛食痛寒痛虫痛大同小異惟虫痛者當口淡  
而沫自出小兒本怯故胃寒冷故虫動而心頭痛與癩畧  
相似但目不料而手不搐耳安虫散主之

○安虫散

賈誼用木朔為丸名安虫丸

黃粉

炒黃色

檳榔

川練子

去核

鶴虱

各二兩

白礬

二錢半火枯

右為細末每服一字大者半錢或壹錢溫水飲下臨痛時  
服

○集効丸

治虫痛

木香

鷓鴣

其樹

訶子錢上抄

蕪荑

附子

去皮

乾姜

二

大黃兩半

烏梅

去核二錢半

右為細末煉密丸陳皮湯下或醋湯下一方加黃芩黃連

○一方治虫用鷄子炒白蠟麝酒糊丸服

一云治寸白虫

○一方治蛭虫作痛用二陳湯加香練根煎服或只以香練根

向東南生不出土者刮去塵皮取白皮細切濃煎汁一盞

徐徐飲之不可飲多先以糖密或炒肉食之引虫頭向上

然後服之看兒大小斟酌與之

○小兒吃粽腹痛用白酒藥加黃連末合研湯調服之即愈

○一方治小兒腹痛

甘草

炙

乾姜

各二錢

伏龍肝

一兩

人參

茯苓

百草霜

白朮

各包錢

右為末粥丸梧桐子大每服三五丸陳皮湯下

○小兒夜啼作心經有熱有虛治

人參

黃連

姜汁炒

甘草

五分

竹葉

二十片

右為細切分作二帖每貼加生姜一片水煎服一本無人

○錢氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也當以溫中藥之宜益黃

散及以法穰之花火膏之類愚按上二說不同一日心熱主脾寒末知孰是

○花火膏

燈花

三顆

以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

○治驚啼邪熱乘心也安神丸主之方見前

○小兒風痰壅盛用

南星

下錢切片

以白礬湯泡晒乾

白附子

二兩

方二件共末爲麩糊爲丸如芡實六每服

一九姜蜜薑苜湯化下

○小兒痰熱骨蒸用

二陳湯

半兩

加升麻

二錢

葛根

白芍藥各半

人參一錢

五味子

三十粒

右細切分三貼加姜棗水煎服

○又方治前証用

胡黃連

檳榔

各一錢

陳皮

雷丸

各一錢半

神麩

半夏麩

史君子

白花蓼

各二錢

右爲細末麩糊爲丸如黍米大每服三五丸白湯下

○小兒解顛

顛頭

不合也因母氣虛與熱多也錢氏曰主下而顛不

合腎氣未成也雖長必少笑更有目白睛多面眊自色瘦

者多愁少喜也卅溪用四君子湯合四物湯有熱加黃連  
酒炒煎服更以帛緊束及以白歛未付之

○小兒吃泥胃氣熱也用軟石膏黃芩陳皮茯苓白朮煎服歸

小兒脫囊

也必有囊皮脫囊者

木通甘草黃連當歸黃芩

煎服囊爛者以野紫蘇葉面青背紅者是為末香油調付皮脫兩

丸露者外以青荷葉包之付藥後自生皮

○脫肛

肛門脫下也

用東壁土泡湯先薰後洗

○又方治前証用五倍子為細末付而頻托入之

○又方治前証用驚頭燒存性香油調付薰之良又自收

○小兒瘰癧各名赤時風也此蓋熱毒氣容於腠理搏於血氣發於皮

外赤如用也用

生地黃

木通

荆芥一本有芍藥莢仁

若寒帶表之藥外以芒硝泡湯洗之又以芭蕉油塗之錢氏用白玉散付之皆効

○白玉散

白堊即白善土也寒水石一兩

右為細末米醋或汲水調

○小兒臍中汁出併痛用白礬火煨枯乾付或用黃栢末付之

○願頭用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再以酒拌焙

乾每服一錢水煎服外以白炭燒紅淬入水中乘熱洗之

更以胡妥子伏龍肝懸龍尾黃連白礬為末油調付之

○又方治願頭以松樹厚皮燒存性二兩黃丹火飛一兩白礬

火枯黃連大黃各伍錢白膠香火飛傾石上一兩輕粉四

盞共為末熱香油調付

○丹溪治一小兒二歲滿頭生瘡一日瘡忽自平遂患痰喘知其為胎毒也詢其母孕時多食辛熱物遂以人三連翹黃連并厚朴皮川芎芍藥木通濃煎入竹瀝與之數日而安

○尾骨痛屬陰虛有痰

陰虛用四物湯加炒黃柏酒知母小用桂為引或以前胡木香為引如痛不止加乳香末藥○痰用二陳湯加知母黃柏澤瀉必用前胡木香為引蓋陰虛故痰盛也如痛不止亦加乳香沒藥○二法必先以玉燭散或通經散痰小胃丹大下後用之或神祐丸十棗湯皆可與治帶同

小兒弄舌因脾藏有微熱令舌絡微緊時時虛舌舐之勿用冷藥及下之少與瀉黃散徐徐服之有欲飲水者非熱也脾胃中津液少也不可下若大病後弄舌者凶

○瀉黃散

藿香葉 七分

梔子 一錢

石膏 半錢

甘草 七分半

防風

去芦四分

右細切作一服用密酒炒香熱以水一盞煎至半盞去粗時時與之

○龜膏乃肺熱脹滿攻於膏膈即成龜膏又乳母多食五辛熱物亦成此証宜瀉白散加黃芩

瀉白散

桑白皮

蜜水拌炒黃色一錢

地骨皮 一錢

甘草 炙半錢

加黃芩 一錢

右作一服水煎

○龜背兎生下客風入脊遂於骨髓即成龜背治之以龜尿點骨節即平○取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出



○重舌木舌乃小兒舌下生舌也

用三稜針於舌下紫脉刺之出惡血即愈

○又方用竹經調蒲黃末付舌上神効

○又方治小兒木舌塞口欬滿者用紫雪二錢竹瀝半合細研

和均類付口即愈

○治小兒口瘡用鹽白梅燒存性

紅棗連核燒存性

鉛丹火飛

人中白火飛龍腦火許

共爲細末服之神効

○治小兒鵝口瘡因白屑滿舌及兩脣故名鵝口用髮纏指頭

蘸井花水拭口令淨文用濃煮粟米汁以綿纏筋頭拭之

更以煨過黃丹搽之即愈

○又方治鵝口瘡不能食乳用地鷄搗水塗瘡即愈地鷄即醫家

傳石下多有之

○治小兒口瘡瀉心湯用黃連爲細末容水調服

○治小兒口瘡用黃柏細辛各等分爲細末付之

○治小兒頰上生瘡痛痒難忍用白楊木枝燒於刀上出溼付

之及治賊口瘡神効

○治小兒走馬牙疳方其効如神

白礬

粘 黃丹飛

京棗健核鹿 存性

共爲末付之

又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過爲末付之

治小兒臍風撮口因臍斷傷風或尿在胞中遂成臍風發熱

面赤啼聲不出名曰撮口風

赤脚金頭蜈蚣一條 瞿麥半錢 蝎稍四箇

蠶蚕七箇

右末絨毛管吹些少入鼻中如噴嚏叫聲可治後用薄荷  
汁調與服之

痘疹六

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火夫小兒痘疹之證最為酷疾不日之間死生反掌蓋因胎毒藏於命門遇歲火太過熱毒流行之年則痘毒因之而發作矣一發則出於心肝脾肺四藏而腎無留邪者為吉若物發便作腰痛見點則紫黑者多死蓋毒氣留於腎間而不發越故耳錢氏須有百祥九大下之法然活者十無一二大抵痘瘡之法多歸重於脾肺二經蓋脾主肌肉而肺主皮毛故遍身為之班爛也其為証也宜發越不宜鬱滯宜紅活凸綻不宜紫黑陷伏瘡出之後鑿者當察色詳証以辨表裏虛實用藥其吐瀉不能食為裏虛不吐瀉能食為裏實灰白色陷頂多汗為表虛紅活凸綻無汗為表實又諸痛為實諸痒

爲虛外快內痛爲內實外虛外痛內快爲內虛外實裏實而補  
則結痲毒裏實而後用實表之藥則潰爛不結痂也如表虛者  
瘡易出而難醫裏實者瘡難出而易收裏實則出快而輕裏虛  
則發遲而重表實裏虛則陷伏倒靨裏實表虛則發慢收遲治  
之之發三日已前未見紅點必用升麻湯三蘇飲之類以發其  
表務令微汗爲度若未汗如表猶未解雖暑見紅點隱約於肌  
肉間而升散開發之劑尚未可除凡見出遲發慢者根窠欠紅  
活者便當憂慮調攝切勿袖手待斃夫古人用藥寒熱迥別主  
意不同鑿者再宜臆度寒暄推詳運氣而治如陳文中之木香  
散異功散用丁附姜桂等峻熱之藥而與內經病機不合丹溪  
苗發彈其誤亦有用得其當者屢獲捷効若劉河間張子和輩  
悉用芩連大黃等寒涼之劑丹溪亦曰酒炒芩連各解痘毒依

法用之而獲安者亦不少也。今之醫者，性性不同，依陳氏而行者，多用熱藥；宗劉張而治者，多用涼劑。是故不偏於熱，則偏於寒。此刻舟求劍之道也。愚按內經有曰：寒者熱之，熱者寒之。微者逆之，甚者從之。又曰：逆者正治，從者反治。從少從多，觀其事也。陳氏用從治之法，權也。劉張用正治之法，常也。然皆不外乎參朮芪草芎歸茯苓芍藥等補氣血藥為主治焉。亦當看時令寒熱緩急施治，固不執一見也。楊氏曰：痘瘡發於肌肉，陽明胃氣主之，脾土一溫，胃氣隨暢，決無陷伏之患。湯氏曰：如庖人籠蒸之法，但欲其鬆耳。滄淵翁呂復拆衷衆說，看方立論，適中用藥，寒熱攻補斟酌時宜，未嘗執一治也。學者能遵守其法而行之，庶無一偏之患矣。

○丹溪治小兒痘疹方法九十三條

夫小兒痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因傷風傷寒而得有時氣傳染而得有因傷食發熱嘔吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或爲目窺驚搐如風之証或口舌咽喉肚腹疼痛或煩躁狂悶昏睡或自汗或下利或發熱或不發熱証候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷臉之蓋瘍疹屬陽腎藏無証其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脉赤縷爲之真如此可以稽驗矣治療之法首尾俱不可妄下但溫之劑兼而濟之解毒和中安表而已虛者益之實者損之寒者溫之熱者清之是爲權度昔人昔喻云於庖人籠蒸之法但欲其鬆耳蓋毒發於表如有妄汗則榮衛益虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間變証者多矣毒根如裏如有妄下則內氣益虛毒

不能出而返入焉由是土不勝水變黑歸腎身体振寒耳死返熱眼合肚脹其瘡黑陷十無一生汗下二說古人深戒以此觀瘡疹証狀雖與傷寒相似而其治法實異傷寒從表入裏瘡疹從裏出表故也解肌之法葛根升麻紫蘇之類可也其或氣實煩躁熱熾大便秘結則與犀角地黄湯或人參敗毒散又或紫草飲多服亦能利之故雖云大便不通者少與大黃尤宜仔細斟酌不可妄用猛浪如小便赤澀者分利小便則熱氣有所滲而出九熱不可驟過但輕解之若無熱則瘡又不能發也

○九痘疹春夏為順秋冬為逆

○九痘疹分人清濁就形氣上取勇怯

○九瘡疹但覺身熱証似傷寒疑似未明便當先與惺惺散

或參蘇飲熱甚者升麻葛根湯人參散毒散若見紅點便



忌葛根湯恐發得表虛也

○凡痘瘡初出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘之候便宜服升麻葛根湯加山查大力子其瘡出必稀少而易愈

○凡痘瘡初出時或未出時宜服後藥多者可少少者可無重者可令輕也方以絲瓜俗名天蘿近葉三寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃入硃砂尤妙○又方以硃砂一味為細末

看兒大小或半錢或一錢密水調服亦云多者可少者無

○凡痘瘡發熱之時更以惡實子為末密調貼額門上免眼瘡更  
○凡痘瘡初出之際須看膏前若稠密急宜服消毒飲加山查黃芩酒紫草減食者加人參

○凡瘡痘初出之時色白者便當大補氣血參朮芪芍升麻乾

葛甘草木香丁香酒當歸白芍藥如大便泄加訶子肉桂  
○九痘瘡初起發時自汗不妨蓋濕熱薰蒸故也甚者當以參  
芪等實表之藥以防其難靨也

○九痘瘡初起發時煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不  
齊急以涼藥解其標如益元散之類

○九痘瘡已出可以與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲  
子紫草木香湯快斑湯絲瓜湯之類

○九痘瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地黄湯

○九痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒苓連  
之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

○九痘瘡灰色白淨者作寒紫黑色者齊湧者煩躁者作熱  
者黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外

白起得遲者則相煎而治

○九疔瘡當分表裏虛實吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲裏實裏實而補則結雍毒陷伏倒靨灰白色者爲表虛紅活四綻者爲表實表實而復實其表則潰爛不結痂也表虛不起發者或用燒人屎驗

○九疔瘡須分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白朮加解毒藥

血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連各解毒藥蓋芩連爲毒家之要藥加以酒炒以制其峻寒之性獨在清涼解毒之能是故疔瘡之症當用以殺其毒耳

○九疔瘡雖分氣血虛實人抵多屬氣血不足然當於不足中以別其優劣而以補氣血藥中分輕重爲用以平爲期耳有挾外邪而實者少加防風等藥

○大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑煎而治之此

平治之法也。溫如黃芪、當歸、木香、葶藶，如前胡、乾葛、升麻、  
葷佐之，以川芎、白芍藥、枳殼、桔梗、菴活、木通、紫草之屬，則  
可以調適矣。

○黑陷二種，因氣虛而毒氣不能盡出者，酒炒黃芪、紫草、人參  
等藥。

○凡黑陷甚者，亦用燒人屎，別用無病小兒糞，燒存性，密水調  
服。一方用人狗猪犬四糞，於臘月燒灰，名萬金散。

○庠塌者，於形色脉上分虛實。實則脉有力，氣壯虛則脉無力。  
氣法痒以實表之劑加涼血藥，實痒如大便不通者，以大  
黃等寒涼之藥少與之，下其結糞，氣怯輕者用淡密水調  
滑石末以麝翎刷瘡上潤之。

○瘡乾者宜退火，止用輕清之劑，荆芥、薄荷、升麻、乾葛之類。

○瘡濕者肌表間有濕氣也宜瀉濕藥白芷防風之類蓋風藥

能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○渴者甘草散烏梅湯

○利者木香理中湯

○顏色正者以前法平治則安將散成就脚色淡者宜助血藥

用當歸川芎酒芍藥之類或加紅花以潤血色將成就

之際脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根湯炒茶連

及連翹之類其若必用犀角蓋犀角大解痘毒

○汗靨時金白色如痘壳者蓋因初起時飲水多其靨不齊名

曰倒靨不好宜服實表之藥及消息大小便何如大便秘

秘

宜利大便小便秘宜利小便如小便赤澀者大連翹湯并  
露飲大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最穩當或  
小服四順清涼飲子

○夫瘡疹用藥固宜權度大小二便不可不通其大便者所下  
黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但小用化毒湯可也  
或不用亦可若大小二便一有秘結則腸胃壅遏脈結氣  
滯毒氣無從發泄目閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而變矣陷  
入者加味四聖散更以故安酒薄付其身厚付其足噴其  
床帳衣被併以厚綿衣蓋之若未起獨聖散入木香煎服  
若其瘡已黑乃可用宣風散加青皮錢氏云黑陷青紫者  
百祥丸下之不黑者慎勿下余知其所下者瀉膀胱之邪  
也又云下後身執氣溫飲水者可治水穀不消或寒戰

者為逆余知其脾強者土可以制水也百祥丸恐太峻  
以宣化散代之馮後溫脾則用人參茯苓白朮等分厚朴  
木香甘草各減半為妙蓋瘡發肌肉陽明王之脾土一濕  
胃氣隨暢獨不可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘  
止也

○其懷瘡者一曰內虛泄瀉二曰外傷風寒三曰變黑歸腎

○近時治瘡者悉宗陳文中木香散異功散殊不知彼立方  
之時必運氣在寒水司天之令及值嚴冬大寒為因氣鬱  
遏瘡瘡不得起發紅統故用辛熱之劑發之其宜也今人  
不分時令寒熱一槩施治誤人多矣或有雖值溫熱之時  
山野農家貧賤之人其或偶中一二不可以為常法也

○愚按陳氏木香散異功散二方乃素問從治之法又謂之熱

火熨于子母之分不傷皮毛彰君之德也成云瘡發激腫於外者爲少陽三焦火也謂之斑色小紅而行于皮膚中出者爲少陰君火也謂之疹楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨腸土可勝水決無陷伏之患

辯內外因

九瘡歆出而未出因發播者是外感風寒之邪而內發心熱也宜王氏惺惺散或升麻葛根湯木香參蘇飲 九瘡歆出未出而吐利者是中焦停寒或挾宿食也宜四君子湯加砂仁陳皮或和中散如挾宿食者用紫霜丸

王氏惺惺散

白木

以

桔梗

法

細辛

人參

茯苓

甘草

括萎根

各三分



右細切作一服入薄荷葉三片水一盞煎七分時時與之

升麻葛根湯

葛根

升麻

芍藥

甘草

炙各一錢

右細切作一服水盞盞煎七分溫服無時

木香參蘇飲

人參 三分

蘇葉

桔梗

乾葛

前胡 各四分 陳皮

茯苓

各半錢

枳殼

炒三分

木香 一分半 半夏

右細切作一服加生姜三片水一盞煎七分溫服

四君子湯

人參

白朮

茯苓

各一錢

甘草

半錢

右細切水一盞煎六分食前溫服加宿砂陳皮名蒼子湯

因熱用者也。蓋痘瘡熱毒拂鬱于內而不得起發，故用丁附木香桂心豈菟等辛散劫鬱之劑。一二服劫而開之，使鄉之鬱于內者，悉因藥氣而發越于外，故痘子陷伏灰白色者，皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣。切勿過劑，如一二服後劫不起者，亦不可多與，多則反即其毒轉增黑爛咽閉，聲沉而死。近世儒醫悉引內經病機諸痛痒瘡瘍皆屬心火之語，以正陳氏之失。此知常而不知權之論也。故使後學狐疑不決，當用而不敢用，是以袖手待斃，哀哉。

痘瘡初發時五藏形証一

面及腮頰赤噴嚏屬肺 呵欠煩悶屬肝 時發驚悸

痘瘡五藏形色二

肝藏發水疱

色微青以液為淚故  
疱色如水其形小

肺藏發膿疱

膿稠屬如涕其形大

脾藏發疹

或如糖漿其形小如黃

心藏發斑

其形小次於水疱

腎藏居下獨不受穢毒故無候但耳尻冷耳若豈瘡黑陷耳及尻反熱者為逆

○斑痘所發之源參

夫嬰兒之胚胚暉也必資胎養以長其形焉緣母失節慎縱欲恣食感其穢毒之氣藏之藏府近自孩提遠至童非值寒暄不常之候瘡疹由是而發因其所受淺深而為稀稠焉其原實系於心一云相火之氣所為故入於肺則成膿胞俗名疏豈亦名麻豈以相火秉金故破眊也入于肺則成水疹俗名楚瘡入于脾則成癰疹入于心則成斑以

和中散

厚朴

姜汁煮  
以一錢

白木

半錢

乾姜

炮

甘草

炙  
三分

右細切作一服加生姜一片水一盞煎六分稍熱服

○紫霜丸

杏仁

五十四  
去皮尖

赤石脂

一兩  
研

巴豆

三  
去膜

代赭石

一兩  
研

右各另研爲末和均湯浸蒸餅爲丸如黍米大三歲以下

丸二三丸八歲以上十數丸食前米飲或乳汁送下

○辯形氣病四

如瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲變者氣病也

宜補肺散加生黃芪○瘡出而聲不出者形氣俱病也形

病身溫者宜解毒防風湯大便閉者宜當歸丸○形氣俱

病小兒稟賦素弱者宜豫服十奇散倍歸散少木香煎服

病小兒稟賦素弱者宜豫服十奇散倍歸散少木香煎服

補肺散

阿膠

一錢半  
成沫

牛旁子

炒三分

馬兜鈴

半錢

甘草

二分半

杏仁

三錢  
去尖

糯米

一錢炒

加生黃芪

半錢

右為末分二服水一小盞煎六分食後時時與之

解毒防風湯

防風

一錢

地骨皮

生黃芪

芍藥

荆芥穗

鼠粘子

炒各半錢

右細切作一服煎或為細末溫水調服亦可

當歸丸

當歸

半兩

黃連

一錢半炒

大黃

二錢半

甘草

一兩炙

右先以當歸熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如

胡椒大三歲以下兒十九七八歲兒二十九食前清米飲

下漸加至以利爲度

○十奇散

即托裏十補散又和劑方

黃芪

人參

當歸各二錢

厚朴

姜制

桔梗

十片各一錢

桂心

三分

川芎

防風

去戶

甘草

白芷

各一錢

石爲細末每服一錢或二錢溫酒調下細切水煎亦可

○辯

三陰三陽經候五

太陽病寒身熱小便赤澀出不快宜荊芥甘草防風湯少

陽病乍寒乍熱出不快宜連翹防風湯

陽明病身熱目赤大便秘實瘡遍肌肉出不快宜升麻葛

根湯加紫草

太陰病自利四肢逆冷宜附子理中湯木香散

少陰痺瘡黑陷口舌燥宜四物湯加紫草紅花

厥陰病舌卷卵縮時發厥逆宜異功散

三陰病法當救裏故宜以溫劑助之

○荊芥甘草防風湯

荊芥

薄荷

牛旁子

防風

甘草各六分

右細切作一服水一盞煎六分食溫服

○連翹防風湯

連翹

防風

瞿麥

荊芥穗

木通

車錢子

當歸

柴胡

赤芍藥

白滑石

蟬蛻

黃芩

紫草耳各三分甘草

右細切作一服水一盞煎七分隨時大小量數輕重與之

大小便自利者不宜用

○升麻葛根湯

方見前條

每服加粳米五拾粒紫草半錢煎

○又一方升麻湯治斑在面

升麻一錢

犀角

射干

黃芩

酒浸焙乾

人參

甘草

各半錢

右細切作一服水一盞煎六分食前溫服

○理中湯

人參

甘草炙

白朮

乾姜炮各八分

右細切作一服如炮附子三分甚者五分量見大小加減

水煎食前稍熱服

○木香散

木香

大腹皮

酒洗淨

人參

桂心

青皮



赤茯苓

前胡

訶子

煨去核

半夏

姜制

丁香

甘草 各三分

右細切作一服加生姜三片棗一枚水煎量大小加減分數與之

○異功散

木香

當歸

酒洗去芦

桂心

白朮

麩炒

茯苓

陳皮

厚朴

姜制

人參

肉蓯蓉

煨

丁香

半夏

湯泡七次

附子

泡各三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○辯

三陽証治

時也古入治法與傷寒同

足脛熱

兩腮紅

大便秘

小便澀

渴不止

上氣急

脉紅數

已上七証不宜服熱藥

瘡疹一發便密如蚕種布或如糠粃者合清表宜連翹升麻湯或未出而先發搐是兼外感風寒之邪宜茶湯下解毒丸及犀角地黄湯瘡出不快清便自調知其表當微發散升麻葛根湯若瘡青乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內宜煎大黃湯下宣風散若表大熱者不可下黑陷甚者百祥丸○若瘡已發稠密微喘渴飲水宜微下之當歸丸及龐氏地黃膏外以黃栢膏塗面佳  
值盛夏暑熱正熾適瘡火發煩渴大便實者宜玉露散及甘露飲子或昏冒不知人時作搐搦瘡倒靨黑陷者宜豬

心龍腦膏

○連翹升麻湯

即升麻葛根湯加連翹一分是也

○犀角地黄湯

犀角 鎊

生地黃

牡丹皮

赤芍藥 各等分

右細切水煎服

○鮮毒丸

寒水石

研

石膏

研各一兩

青代

半兩

右以二石細研如粉入青代和均湯浸蒸餅爲丸如芡實大每服一九食後新汲水化下或細嚼姜水下亦可三歲兒服半丸量歲數加減服之

○宣風散

檳榔 二枚

陳皮

甘草

各半兩

黑丑

四兩枚頭未一兩

右爲末量兒大小以密湯調服

○百祥丸

紅牙大戟

不爲多少產乾際水炙極軟去骨日中曝乾復納汁中煮汁尽倍乾爲細末

右一味以湯浸蒸餅爲丸如粟米大每服三十九研赤芝  
麻湯下量兒大小加減丸數與之

○龐氏地黃膏

生地黃 四兩

豈豉 半升

雄黃 一錢

射香 半錢

右以猪膏一斤和均露一宿煎五六沸令三分去一絞去  
下椎黃射香攪均稍稍飲之毒從皮膚中出即愈

○黃栢膏

黃栢

一兩去粗皮酒拌炒

葦豈

去壳 甘草 四兩

右爲細末以生芝麻油調從耳前至眼眶並塗之日二  
二次如用早能令瘡不至面縱有亦稀少

○玉露散

玉海藏云非腎熱相火盛者不宜服此藥利北方

○耳露飲子

生地黃

熟地黃酒洗

天門冬

麥門冬

批把葉

後去積壳黃皮

黃芩

石斛去苗子

山茵陳

甘草

右細切作一服水一盞煎六分食後溫服

○猪心龍腦膏

梅花腦子一字研

右取新宰猪心血一箇為丸如芡實大每服一丸或半丸量兒大小與之紫蘇湯下或并花水化下亦可

○辯三陰証治九磨發於秋冬為送當純陰之時也

足胫冷

腹虛脹

糞青色

面皖白

嘔乳食

目睛青

脉沉微

已上七証不

宜服寒藥

痘瘡盛出四肢逆冷或自利係在太陰脾經宜急溫之用  
異功散附子理中湯調中丸○痘瘡平塌灰白色不澤此  
是正氣不足宜十補托裏散倍黃芪加熟附子○或四肢  
厥逆時作搐搦係在厥陰宜溫之異功散加防風青皮或  
和中散去乾葛藿香加附子肉桂心

○調中丸

白朮

炒半兩

人參

半兩

甘草

炙半兩

乾姜

炮四錢

右為細末煉蜜為丸如篆豈大每服多不過二十九溫水  
食前送下

辨形氣不足八

肺主氣氣不足則致後三証

自汗聲不出

瘡頂陷塌

不綻肥

並宜十奇散

自汗倍黃芪聲不出倍桔梗

心主血血不足則致後三証

灰白色

根窠不紅

不光澤

並宜芎歸湯加芍藥紫草紅花良驗

○芎歸湯

川歸

川芎各二錢半

右細切水煎服

辯表裏虛實九

表裏俱實其瘡難出而易靨

表裏俱虛其瘡易出而難靨

諸痛為實

內快外痛為外實內虛痛外快為內實外虛

諸寒為痛

九瘡發身痛不為外寒所折則肉腠厚密宜分而治之若紅點乃見為寒所折而肉體有熱宜

諸痒為疔  
木香參蘇飲輕者消毒飲或葛根升麻加芍藥湯肉麻者宜活血散併均氣散補血氣不足多痒此証所謂諸痒為疔也且十宜四君子湯加芍藥歸木香紫草煎散或患者不能忌口因食毒物兒作痒者二物湯百疔膏或四君子湯加解毒藥

○消毒飲

牛旁子

三錢炒一名鼠牯子一名大力子

荆芥 一錢

甘草 半錢 主用

防風

去芦半錢

右細切作一服水煎加生犀角尤妙

○葛根升麻加芍藥湯

升麻葛根湯倍芍藥是也

○活血散

白芍藥

右為細末每服一錢溫水調下止痛用酒調尤

驗王海藏云四肢出不快加防風一方用赤芍藥



○勻氣散

即齊生方八味散  
氣散加木香也

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮

烏藥

人參

甘草

木香

一分半

各半  
炙二分半

右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調亦可

○二物湯

蟬蛻

洗淨二枚

甘草

炙一兩

右爲末水煎時時服之

○百花膏

石密

不拘多少畧用湯和時時  
以麝翎刮之渣毒亦易落無痕

○平治諸方

以平爲期  
萬不失一

石壁胡氏曰小兒難任非常之熱亦不可任非常之冷如

熱藥太過經到吐利腹脹重則陷伏倒靨是宜溫涼適中

可也仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發史氏曰比之種痘值天時暄暖則易生

○九值天時不正鄉隣痘瘡盛發宜服禁方不出方

三豈湯

油飲子

鳳龍膏

○九初覺痘瘡發當先解利與傷寒相類疑似之間兼用解表胡氏云非微汗則表不解解表當於紅斑未見之時用

王氏惺惺散

錢氏惺惺散

張氏防風湯

升麻葛根湯

張氏四物解肌湯

參蘇飲

○三豈湯

赤豈

大黑豈

兼豈

各一升

甘草

三兩

又以三豈淘淨用水八升煮豈熟為度逐日空心任意豈飲汁七日末不出

○油飲子

真麻油一升

逐日飲盡求不出

已上二方出扁鵲 倉公方

○龍鳳膏

烏鷄卵箇一

地龍一條活者細小者

右以鷄卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其竅飲鍋上蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日食一枚終身不出痘瘡覺隣里有此誣流行時食一二枚亦好

○錢氏惺惺散

方見前條與王氏同但一方有防風川芎減半

○解毒防風湯

方見前

四物解肌湯

白芍藥

黃芩

升麻

葛根

各七分

右細切作一服水一盞煎六分溫服不拘時  
瘡出不快宜

○活血散加防風湯

○龐氏紅花湯

紅花子合 右以水半升煎百沸服之

○紫草湯治瘡出不快及大便自利一名紫草木香湯

紫草 木香 茯苓 白木 各一錢

甘草 半錢

右細切作一服入糯米一百粒水一盞煎六分食前服

○四聖散

紫草 木通 各一錢 甘草 枳殼破半錢

右細切作一服水一盞煎七分溫服不拘時

○樺皮飲子

樺木皮二兩 用水一升煮取半升時時細飲

凡痘瘡出不快者有五証臨病審見調之

一證天時嚴寒為寒所拆不能起發宜散寒溫表冬三月寒甚  
紅斑物見宜五積散正氣散參蘇飲揚氏調解散陳氏木香散

五積散

白芷

川芎各三分

桔梗去半

芍藥

茯苓

甘草炙

川歸

肉桂

去粗皮

半夏各二分

陳皮

去白

枳殼

去穢

麻黃

去根節各半錢

蒼木

米泔浸

甘姜

炮四

厚朴

姜制四分

右除肉桂枳殼二味別為鹿末外

十三味細切慢火炒

令轉色攤冷次入二味末令均作

服水一盞半入生薑

三片煎至一盞去粗稍熱服

正氣散

甘草

分三

陳皮

藿香

去梗

白朮

各半錢

厚朴

姜制

半夏

姜制各

一錢半

右細切作

一服加生姜三片大棗一枚水煎服

調解散

青皮

陳皮

枳殼

麩炒

桔梗

去芦

人參

半夏

塊七

川芎

木通

乾葛

各四分

甘草

紫蘇

各二分

右細切作

一服加生姜三片大棗一枚水煎服

一方加紫

一証炎暑隆感煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎生地黃

麥門冬調服身熱甚者小柴胡加生地黃煩渴而便實者

白虎加入參湯輕者人參竹葉湯加生地黃煎服

○辰砂五苓散

五苓散加辰砂細研為末是也

○小柴胡湯○人參白虎湯○人參竹葉湯

方病見傷寒門

一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中湯吐利甚者加附子或陳氏異功散木散豈寇丸

肉豈寇丸

木香

砂仁

白龍骨

訶子肉

各半兩

赤石脂

枯白礬

各七錢半

肉豈寇

半兩溫麪裹煨熟

右為細末麪糊為丸如黍米大每服三十九至五十九煎

異功散送下

一証或成血泡一半尚是紅點此毒氣發越不透必不能食大

便如常者宜三益裏半助養之劑用四聖散加減及紫草

木香湯絲瓜湯阮氏萬全散湯氏安班湯

○四聖散 紫草末香湯方面見前

○絲瓜湯

絲瓜

不拘

連皮子燒存性為末每服一抄時時用米湯調服  
此物發蓋瘡最妙或以紫草甘草煎湯調服尤佳

○阮氏萬全散治痘瘡出不紅潤

防風

人參

蟬蛻各等分

右細切每服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分溫服熱而  
實者加升麻

○湯氏安班湯



一証外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄因出不快宜消  
毒飲透肌散如大便秘實於消毒飲內加大黃枳子仁煎  
服悉出大稠宜犀角地黃湯張氏解毒防風湯血氣不足  
宜十奇散咽嗑不利宜如聖湯加薄荷枳殼口中氣熱咽  
痛口舌生瘡宜甘露飲子驚風搐搦宜抱龍丸煩渴宜獨  
參湯黃芪六一湯

○透肌散

紫草茸

綠升麻

粉甘草 各一錢

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

○如聖湯

桔梗二錢 甘草一錢 一方加牛旁子 麥門冬錢一

右細切水煎時時服之

○抱龍丸 北驚風門

辯外証逆順

身體溫煖者順 寒涼者逆

能食大便秘者順 不能食大便利者逆

辯外証輕重

輕者 作三次出 耳中無 大 不一 頭面 痛火

重者 一齊出 瀉利而渴 如 黍種布 天 目已 頭 溫足令

辯痘瘡初末形証

微者其邪在腑發為細疹狀如蚊琢所螫點點赤色俗名

麤瘡○甚者其邪在藏為痘瘡狀如碗豈根赤頭白穴出

濃水俗名痘瘡二三日始見微微欲出於粟如黍或如粟  
豈或如水珠光澤明淨者佳四日大小不等根窠紅光澤  
者輕如稠密陷頂併瀉者者重六日七日瘡形肥紅光澤  
者輕如身熱氣喘口乾腹脹足指冷者重八日九日長足  
紅滿瘡腐色者輕如寒戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者重  
之至也十日十一日瘡當結靨而欲落之時將愈十二  
三日當靨而不靨者為逆身稍利之以防其餘毒身不吐  
熱或腹脹或瀉渴用十二味異功散救之

辯不藥而愈

痘脚稀疎

根窠紅綻

不瀉不渴

乳食不減

四肢溫和

身無大熱

已上六証並不須服藥惟宜善加調護須使房室溫益屏

諸穢氣忌見外人毋犯房色及淫來婦人月水併腋臭者皆不可近惟宜燒大黃瘡木以辟惡氣勿宜燒沉檀降真乳香腦射蒲棗之內宜懸胡妥或以胡妥清酒噴床帳併燒木香為佳夫痘瘡之毒最怕穢惡之氣觸犯切不可信僧道看經符穢况無鐵毫之力而返恐被其穢惡之氣觸犯亦不可恃其能解而不預防戒之戒之

辛五不治証

痒穿乘較咬牙渴不止

痘紫黑色喘喝不寧

灰白色陷頂腹脹

頭溫足冷悶亂飲水

氣促世瀉渴

辨疹有陰陽二証

赤疹屬陽遇清涼而消

白疹屬陰遇溫煖而減

傷寒時氣發班附

溫毒發班宜玄參升麻湯重用荆防敗毒散

胃爛班因陰明胃實失下或下之太早所致宜化班湯龐氏石膏湯○時氣班宜石膏湯○陽毒班胃實之人誤服熱劑或加以風暑宜陽毒升麻湯

○玄參升麻湯

玄參

洗百

升麻

甘草

各一錢半

○荆防敗毒散

紫胡

甘草

人參

桔梗

川芎

茯苓

枳殼

前胡

姜活

獨活

荆苓穗

防風

各四分

右細切作一服水一盞煎七分溫服或加薄荷五葉

○化斑湯加白虎湯

○龐氏石膏湯

香豉合一

葱白錢五

石膏兩一

梔子錢一

生姜兩半

大青

升麻

芒硝錢各半

右細切作一服水升半煮取七合去粗下芒硝放溫徐徐

服之

○陽毒升麻湯

升麻

犀角錢

射干

黃芩

人參

甘草一各錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞食前溫服

辨毒後餘毒

一毒氣流於陰陽脾經則痲發四肢手腕併膝臍腫痛宜

消毒飲重者十六味流氣飲加附子或酒浸大黃煎服又  
必勝膏親手水等付之

○消毒飲

方見前

○十六味流氣飲

川芎

川歸

芍藥

防風

人參

木香

黃芪

桂心

桔梗

白芷

枳殼

厚朴

烏藥

甘草

紫蘇

枳殼

各四分

右細切作一服水一盞煎七分服氣血虛而自利者加熟  
附子大便實加大黃

○必勝膏

馬齒莧

并汁

豬膏脂

石密

右以三味共熬為膏塗腫處

○規子水

規子

不拘多少活者以水養五日旋取此水洗手面並生肉無痕

○一毒氣留于大陰肺經則臍內併手腕腫流為赤蠶毒宜消毒飲如聖湯五福化毒丹雄黃解毒丸利之氣血虛者十補湯加桔梗枳殼犀角煎服咽喉不利或腫痛宜薄荷如

聖湯

○五福化毒丹

方見諸風門

每兩分作十二丸一歲兒一丸分作四服用薄荷水化下  
瘡餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黄自然汁化一丸用

翎刷入口內

○如聖湯

方見前



○雄黃解毒丸

麝金

雄黃

研飛各一錢半

巴豆

去皮膜油四十粒

右為細末醋煑麪糊為丸如菘豈大每服二三丸熱茶清下豈兒大小與之

○一毒氣流入大腸則便膿血或下腸垢或大便板結宜犀角地黃湯身煩熱渴宜黃連解毒湯熱勢盛者小承氣湯下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐車丸

○黃連阿膠丸

黃連

二兩

阿膠

炒成珠子一兩

右以黃連茯苓同為細末水調阿膠末搜和為丸如梧桐子大每服二十九溫米飲送下

○駐車丸

阿膠

以成珠  
醋煮膏

當歸

去芦各  
一十五兩

黃連

三十兩

乾姜

炮十兩

右爲末以阿膠和成餌丸如梧桐子大每服二十九食前清米飲下日三服小兒丸如麻子大量兒大小加減

○一痘瘡入眼宜决明散密蒙花散撥雲散蛤粉散  
决明散

草决明

赤芍藥

天花粉

甘草

右各等分爲細末每服半錢匕食後茶清調下

○密蒙花散

密蒙花

青箱子

决明子

車前子

右各等分爲細末用羊肝一片破而爲三摻藥入肝內令均却仍舊合兒爲一以酒水濕布七重包裹於溘灰中煨熟勿令焦焙乾研末入射香少許每服二錢重食後米飲

調下

○撥雲散

姜活

防風

柴胡

甘草

各等分

右為細末服每二錢水一盞煎七分食後卧服薄苛汁茶清或菊花苗煎湯調皆可忌葷鹽酢醬濕麪炙燥炊氣及一切發風動火之物

○蛤粉散

穀精草

海蛤粉

各等分

右為細末每服二錢七用獾猪肝許以竹刀批開摻藥在內捲了外以青箭箬包裹麻線扎縛定用水一碗煮令熟入小口瓶內薰眼候溫取食之日一服不過十服遂退一熱毒流於三陽之後經則腮項結核腫痛宜荆防敗毒散

十補湯減桂煎消毒飲倍加忍冬藤煎服

○荆防敗毒散

十補托毒散即十奇散也消毒飲方並見前

祖傳經驗秘方九痘後不問癰毒發於何經初起紅腫時却用黑紫赤三豈以酸醋浸研漿時時以鵝翎刷之隨手退去其効如神

一小兒後痘二十日不大便其糞燥作痛垂死曾用大黃芒硝枳殼巴豆等藥及用密遵法及服香油一碗許俱不通愚令一婢以真麻舍口內用小竹筒一筒納穀道中吹油入腸內須臾即通真良法也

古人極治痘瘡要法

王氏指迷云痘瘡亦時氣之一端一人受正傳染其飲又

云瘡疹有熱則易出一出遍及於肌膚。張氏喚曰痘子  
氣均則出快蓋血隨氣竹氣逆則血滯。王氏疹者脾所  
生脾盛時旺藥之木能勝土熱動心神而生驚。錢氏曰  
肝風心火二藏交爭而致搐又曰痘症未形而先搐大忌  
涼心蓋瘡屬心心主血心寒則血不能行痘欲出而不可  
得也切須慎之大抵治驚推平肝利小便均氣最妙仁齋  
湯氏曰大熱當利小便宜五苓散導赤散小熱當解毒宜  
消毒飲四聖散

○陷伏倒靨黑陷

一証變壞歸腎黑陷宜錢氏百祥丸宣風散

一証外感風寒所致冬時宜五積散減麻黃加桂心紫草春  
時不換金正氣散加川芎白芷防風或風邪所襲宜消風

散加紫草蕪服

一証乳食所傷內氣壅遏宣揚氏調解散或四君子湯加縮砂木香川芎紫草大便自利宜附子理中湯

一証或因父母不謹犯房事月水及乳母膈氣穢濁諸忤所致宣阮氏辟穢丹焚而薰之仍以胡妥酒嚙帛帳及懸胡妥於床帳中甚者以胡妥湯化下蘇合香丸蕪塗薰亦效  
聖制再甦散神效

一証毒氣入裏黑陷宜猪尾膏神驗

○不換金正氣散

厚朴

姜制

藿香

去梗

甘草

半夏

湯沉七次

去皮略

蒼朮

半泔浸

陳皮

各半錢

右細切作一服加生姜三片棗二枚水一盞煎七分服

○辟穢丹

蒼木

北細辛

甘松

川芎

乳香研另

降真香

右為細末烈火焚之 今世俗例以黃茶燒烟薰之最好  
○再甦散治痘瘡觸毒氣入內

明白礬

地龍去土炒  
各一兩

右為末每服半錢用猪尾血一椽斗許用新汲水少許調  
下不拘時

○猪尾膏即前龍腦膏錢氏用小猪猪尾取血研用之

九痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難靨以致膿水粘衣着席  
温痛不能轉側宜白龍散敗草散等附之

○白龍散

黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者入文帛裹撲之

○敗草散

用蓋屋及墻背上遠年腐草洗淨焙乾為細末帛裹撲之  
及鋪床蓆上佳

○馮氏天花散治痘後失音

天花粉

桔梗

白茯苓

去皮

阿子肉

石菖蒲

甘草

各等分

右為末用水調半匙在碗內外以小竹七溼黃荆七條縛  
作一束點火在碗內煎臨臥服

凡孕婦身發痘瘡宜馮氏單胎散若胎動不安宜獨聖散安胎  
飲身熱甚宜木香參蘇飲或瘡獨窠宜十奇散倍芍藥當  
歸減桂加香附烏藥如胎已五月則半夏桂心之屬俱不



必禁

○單胎散

赤茯苓

白木

川歸

白芍藥

赤芍藥

北柴胡

乾葛

人參

桔梗

條苓

防風

陳皮

荆芥

枳殼

柴草

阿膠

糯米

白芷

甘草

川芎

縮砂

大熱加礬金

各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞乾柿蒂七箇野苧根七寸緝瓜蒂一箇用銀器煎以荷葉鮮定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散用連殼縮砂慢火炒去殼爲末每服半匙熱酒調下

胎動則服服後覺胎熱則安矣

○安胎散

大腹皮

酒洗  
用烏豆汁洗

人參

陳皮

白朮

白芍藥

川歸

川芎

香附米

童子  
尿浸

砂仁

紫蘇

茯苓

甘草

各半錢

右細切作一服水一盞半燈草七莖糯米一撮煎一盞食

前溫服

滄洲翁先生跋云凡乳嬰之與童非當岐烏兩途以治之乳嬰當兼治乳母俾其氣血清和飲食有節投以調氣通榮之劑以饜其乳使兒飲之則其瘡心肥滿光澤無陷伏之憂童非之子必當備切其脉審其表裏虛實以汗下之苟不實不虛

則但保其中和使脾氣流暢則肺金籍母之助易如灌膿速於成痂無倒塌之患或至壯盛而膚腠厚密尤須預爲汗解或大便結與溲澁者尤宜下之利之庶無患也餘証則當於藥內倍其分兩百無一失學者宜致思焉

醫學正傳後叙

恒德老人虞公天民侍御虞君惟明之 叙祖  
也幼有大志弗售于時尋以醫名昭著書若  
千卷門分彙別其言多出於金匱玉函岐伯華  
陀百家咀其英而合于一也侍御君屬予叙予  
從而識其後曰醫之為道若是矣乎若是矣乎  
舉其一則功及於一人惠沉於一物而已克其極博

其傳則所謂排沴戾完軀殼酌四時攝元氣  
有贊化之一焉醫若是其弗可易講也審藥餌  
之投辨陰陽之性則陽可不亢陰可不涸可解沉  
痼可伐宿癥可以輕身可以延年否則吾未見  
不顛沛而墮越也醫若是其弗可不精也今夫  
持一方以療一病者病之淺者也醫終一身而  
或有未諳之病者醫之淺者也醫莫精於王

叔和王惠孫思邈之流而其方亦有所未備  
窮崖邃谷之僻或有口耳之秘而可以授數  
年弗瘳之痛者此則病無定名藥無定餌  
醫若是其弗可不學學若是其弗可不博也  
老人之書上自黃帝內經下逮呂復宋彥修  
之流莫不品題而次第之苟非有得於松湫  
之余尔安能如珠之貫宛然如呈諸左也若

是其博矣三焦回診六門之說表裏陰陽  
浮沉之辨既詳且悉至於急流順流千里半  
天春雨秋露之水性各別此則醫家之所罕  
言者也若是其精矣病有總論有條目藥或  
具數方方或採數書書非出於一日功殆收之  
垂白則其學之之初又若是其難也功歲而業  
精業精而名著名著而書出書出而業傳

不有聞其名未獲其人而顧拜其書者乎書得  
矣不有徒其書而求其術者乎術得矣不有  
試其術而顧齊其名者乎予曰術得矣術不  
可不慎也書得徒書不可不曲而暢之旁而通  
之也病有類燥而濕藥有藏陰於陽者術不可  
不慎也不求其術可也求其心而已矣藥可以  
主可以伐生有可以害人者或可以弭害也神而



明之存乎其人書不可不曲而暢之旁而通之也苟  
置其書可也求諸吾心而已矣以吾之心求老人之  
心也老人之心與吾之心一也老人之心與王叔和王  
肅孫思邈之流之心一也醫之道本諸心醫之  
道若是其未可以易言也醫之道其若可以心得也

嘉靖辛卯仲春之吉吳郡蔣詒識

辛丑  
集本

醫學正傳後再叙

天有六氣曰陰曰陽曰風曰雨曰晦曰明淫則  
爲蓄有寒疾熱疾末疾腹疾惑疾心疾而人之  
氣血流注有循有經有至有抵有會有過有行  
有達而又有所謂三百六十有五之絲絡六百  
四十有七之隧六醫非淺於其學者之所能盡  
其秘也今天下之言醫者衆矣安得有如至靈  
默契陰陽之太少明決六脉二經之周流變化

者而與之論素問諸經方藥之宜攻補之功虛實之變鍼灸之法耶蓋嘗思其人不可作矣以醫名多以名醫名少也醫學正傳侍御東崖虞公叔祖恒德老人所著也觀其書可以知其人矣東崖即其書校之侍御枳田蔣公序之予喜其書而閱之以爲得其人矣閱之且久以爲非恒德老人所著也老人之志欲自附於名家之後故其書集諸家之成而會之一者也夫天下

之事皆可以試其能而醫則有不可以自用其  
明者自義農至今不知歷幾千百代及幾人之  
手而其書始大行皆相祖述傳習增減異同殆  
未有自售其能者故曰醫不三世不服其藥是  
書也使其盡出於恒德老人之手則發揮出於  
膏憶湯液持以已見予未敢以爲盡然也惟其  
參之諸家之秘而斷之以聰明之真則所以握  
氣機佐陰陽疏脉絡者皆有所受而立言垂後

可與諸經並傳無疑也醫學正傳予固喜其學之博而擇之精也學之博則有所據擇之精則有所見有所據則方藥必求其當有所見則攻療必速其功天下之病率不能出其範圍之內而世之習其書傳其方者未有不收十全之功矣則是書可以傳矣東崖屬予言予爲之書其槩以質于今之醫之名者

嘉靖辛卯仲春之吉莆田史梧識