

本草求真

本草求真卷五 第一

江西撫州府府志卷五 藥考

渴劑

下氣

渴濕

渴水

降痰

渴火

渴熱

滲濕病之切於人身者非其大之有餘卽其水之
火偏盛者補水配火不必去火水偏多者補火配
水不必去水譬之天平此重彼輕其重於一邊者
勿補則祇補足輕者之一邊也決不盤去而馬齒
是則凡水人偏勝并成外邪內入阻遏生機如
果體素厚臟氣偏勝并成外邪內入阻遏生機如
濕氣流行土受水制在初濕氣內盛能毋滲而泄
乎久而水氣橫逆泛流莫禦能無決而去乎此水
之宜滲宜渴者然也火氣內熾一水緊動求火濟

起衝射搏擊其可名狀此火之不得不真陰立稿此
氣內蒸水受黃葵荷不乘勢即解則真陰結而爲痰
又熱之不得不洩者也至於或熱或火結而爲痰
或熱或火盈而爲痰也至微者或從滲漏濕之
藥以去苦使痰甚而洩宜用苦寒若鹹之藥以降
氣之微者或用苦寒若少之藥以投下其有稟受素
氣甚則止酌以平劑以投下其有稟受素氣
氣有損又按溫爲陰邪凡人坐臥卑地或受濕蒸
及或好食生冷其元陽薄而爲熱在初受邪未
淫不必竟用重劑惟取輕淡甘平以滲然亦須
分其臟腑如福豆山藥陳倉米茯苓浮萍通草鴨
肉鱖魚鯉魚澤蘭是滲脾胃之溫者也但茯苓則
兼肺腎以同治通草則止合腎以理通魚則止
合腎以理滲故暑濕蒸三焦泥亂宜用福豆以
除之胃氣不煩渴不止宜用倉米以止之脾虛
熱泄宜用山藥以滲之水腫不消宜用浮萍以利
之淋閉不通宜用通草以開之腸風下血腸氣吐

通草

蔓草 言其蔓草

食宜用鰵魚以理之。陳氣不化，宜用澤蘭以去之。虛癆嗽，腫宜用鴨肉以平之。腫嗽，津潤宜用茯苓。以利之。水腫，脾氣宜用鯉魚以治之。又如榆白皮。冬葵子，神麴，石鍾乳，是滲腸胃之濕者也。故五淋腫滿，胎前產後，下宜用榆白皮。冬葵子，以服之。乳汁不通，宜用石鍾乳以通之。又如扶神，萱草，是滲心經之濕者也。故驚悸健忘，水濕內寒，宜用扶神以利之。消渴心煩，宜用萱草以釋之。他如腎有邪濕，症見心氣不交，則有桑螵蛸以治之。症見楊梅瘡，結則有土茯苓以導之。但土茯苓則兼諸臟之濕，同理。肺有邪濕，汗閉不泄，則有薛皮以鬆之。肺氣不降，則有通草以通之。肝有邪濕，而見子腫風癆，則用天仙應以治之。至於濕熱精勝，藥非輕劑，可治。則又另有潤劑，而非斯藥所能盡者也。

通草 味甘淡，性輕，色白，有類燈心，有細孔，

兩頰皆通故名通草。即今所謂木通也。今之通草乃古之通脫木也。頌曰：古方所用通者，今之木通其通脫木功同入肺引熱下降及利小便通淋治稀有用者。功同入肺引熱下降及利小便通淋治腫。景曰：通草潤肺利小便，甘平，以緩然燈心，質小氣寒，則兼降心火。此則兼入胃通氣上達而下乳汁之爲異耳。時珍曰：通草色白而光，此體大氣輕，滲淡殆甚，能升能降，既可入肺而清熱，復能上行而通胃。東垣用此以治五種水腫癰閉，非取氣寒能降味淡能升之意乎？仲景用此合當歸芍藥桂枝細辛大黃甘草名爲當歸四逆湯以治傷寒邪。

人厥陰非取通草以通營衛之意乎但孕婦勿服

土茯苓

又名菰苢

土茯苓

治人腎肝

甘淡氣平功有等於草解治能

除濕消水去清分濁然此尤解楊梅瘡毒益楊梅

瘡多由寒瘴薰蒸與濕穢濕熱之邪交互而成時

日楊梅瘡古方不載亦無病者近時也於微表傳

及四方若揭衣風土卑寒風瘴薰蒸候咳辛熱男

女諸般濕熱之邪蓄積既深經絡由寒凝致互相

傳染自南而北通及海宇然皆濕邪之人病之

其症多屬陽明胃厥陰肝而兼及他經若相火寄

於厥陰肌肉屈於陽明故也如兼少陰太陰則發

於咽喉兼太陽少陽發於兩角若用輕粉劫劑

氣竅入經絡筋骨莫之能出變為筋骨攣拘發為

結痛遂成痼疾時珍曰水銀性走而不守加以

痰涎涎升門之液此物人門氣歸陽服故涎被劫

隨火上升從喉咽不得法則毒氣入經絡筋骨之

間莫之能出痰涎既去而液耗竭筋骨失其所養

營衛不從筋骨掣痛發為癰疽疔漏須用此一

外川金銀花防風木通木瓜白蘗皮各五分皂莢

子四分人參當歸各七分日服三劑時珍曰用此

風濕脾胃健則營衛健風濕去則筋骨利故諸症

多愈又云此名搜風解毒湯犯輕粉病深者月餘

月名牛仰愈忌飲茶酒肉麪鹽醋并戒房勞百日渴飲

土茯苓湯半月方愈取其濕熱斯除而濁陰得解

夾白者良忌茶

茯苓言其寓木

茯苓端入脾胃色白入肺味甘入脾味淡滲濕按

書皆藏上滲脾肺之濕下伐肝腎之邪其氣先升

清肺後降下降凡入病因水濕而見氣逆煩滿心

下結痛呃逆嘔吐口苦舌乾水腫淋結憂悲驚恐

及小便或澀或多者諸病皆從水而生而言服此皆能有效

故治亦從水濕生義故入四君則佐參朮以滲脾家之濕入六味則使澤瀉以行腎邪之餘最爲利水除濕要藥書曰健脾卽水去而脾自健之謂也又曰定魄脾藏卽水去而魄自安之意也且水旣去則小便自開安有癰閉之慮乎水去則內濕已消安有小便多見之謂乎故水去則胸膈自寬而結滯煩滿不作水去則津液自生而口苦舌乾悉去故效亦從水濕旣去而見惟水衰精滑小便不禁非由水濕致者切忌恐其走表洩氣故耳苓有赤白之外赤入小腸白

入膀胱白微有補赤則止瀉濕熱一氣一血自不

容混如此至皮專治水腫膚脹以皮行皮之義

而煩渴便閉溺赤屬陽水有五皮散疏鑿飲不煩

渴人便溺小便數不赤澁屬陰水宜實脾飲疏氣

飲腰以上腫宜汗腰以下腫者宜利小便以大塊堅白者良

扶神音某寓木

扶神音某入功與扶苓無異但神抱心以生苓則不

從心抱故苓則能入脾與腎而神則多入心耳書

曰服此開心益智安魂肝藏魂定魄肺藏魄無非入心

導其痰濕故能使心與腎交通之謂耳

解心木

苦

名黃松節味苦性溫能治諸筋攣縮偏風喎斜心

掣健忘

汪昂曰方用心木一兩乳香一錢石器炒研名松節散每服二錢木瓜湯下第一切

筋攣疼痛

乳香能伸筋木瓜能舒筋也

亦是入血滲濕之意取苓有

心者是

汪昂曰以其抱心故能治心也

去皮及中木用

鯉魚

三世人魚

鯉魚

歸人脾

氣味甘平每於急流之水跳躍而下是

鯉已布治水之功且甘能入脾故書載能下氣利

水凡因水氣內停而見欬氣上逆黃疸水腫脚氣

利水消

等症服此則能以消河澗云鯉之治水因其氣以

相感

猶鷺之治水

是以外臺秘要用赤小豆一升水二

升煮作三升餘搗去渣頓盡服利利盡即愈又治

孕婦水腫亦效然性寒六陰陽氣初生

故為陰中之陽故

多食則能動風發熱也鯉鱗燒灰存性可治產後

血滯鯉骨燒灰可療魚骨哽

本草求真卷五

第一冊終

濕腸胃

濕

濕心

濕水

濕

濕

濕

伏熱鬼症，備極熱毒，白礬則能酸收，漏吐逐熱去
赤寒水石，則能解熱利水之有別耳。如濕在於胃，
胃不消，宜用扁薤薑陳苦參，刺蝟皮之類，但薤薑
苦參，則除濕熱殺蠱，蠱陳苦參，刺蝟皮之類，但薤薑
蝟皮，則治噎膈反胃之不同耳。如濕在心，不化，宜
用燈草黃連木通，連翹黃連，則治赤淋結，珍珠濕蒸，木通則治心
熱水閉，連翹則治赤淋結，珍珠濕蒸，木通則治心
水脹不消，苦練子則治熱鬱，紅燥痼瘕，蠱毒之有
分耳。若在腸胃，則治赤淋，閉莖痛，則有海金沙
以除之。若在小腸，則治赤淋，閉莖痛，則有海金沙
則有赤淋，閉莖痛，則有海金沙
有防己，以導之，膀胱濕閉，而見水腫，風腫，則
類數，則地膚子以濕內閉，則有猪苓以宣之，小便
治之，實熱熾甚，則有黃蘗以瀉之，暑熱濕利，則有
滑石以分之，他如腎有邪濕，症見血瘀，溺閉，則有
宜於琥珀海石矣。症見水氣浮腫，則有宜於海蛤
矣。症見疔漏淋渴，則有宜於文蛤矣。而寒水石苦

參之能入腎除濕。又自可見。肝有邪濕。症見驚悸。疫癘。則有宜於龍膽矣。症見風濕內乘。小便痛閉。則有宜於草薢矣。而連翹珍珠琥珀之能入肝除濕。又自可推。凡此皆屬瀉濕之劑也。至於水勢湧。在似不必於此瑣贅云。

澤瀉

香荒水草

澤瀉

耑入膀胱腎

甘淡微寒。能入膀胱氣分。以瀉腎經

火邪。功耑利水除濕。故五苓散用此。以除濕熱。張

景治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散。輩皆用澤瀉。行

利停水。為最要藥。又治水蓄渴煩。小便不利。或吐

或瀉。五苓散主之。方用八味丸用此。以瀉腎經濕

澤瀉。故知長於行水。八味丸用此。以瀉腎經濕

火。時珍曰。地黃丸用茯苓澤瀉者。乃取其瀉膀胱

之邪氣。非接引也。古人用補藥。必兼瀉邪。邪去

則補藥得力。安國曰：此乃五妙後人不知此理。當一於補所以久服必有偏勝之害矣。汪昂曰：六味丸有熟地之溫，川芎之燥，山藥之滑，茯苓之瀉，相和相濟以成平補之功。乃平淡之神奇，所以為古今不易之良劑也。即有加減或加一二味，極具或五味，麥冬、杜仲、牛膝之類，不過一二味，極四味而止。今人或疑澤瀉之瀉而戒之多，揀本草補藥之意，加人，有補無瀉，且客倍於主，實成不專而六味之功反退，虛位失製，方之本意矣。此近世庸師，俾其補不偏勝，則補始無碍耳。豈曰澤瀉之誤也。

瀉補陰功同於地黃之列哉。第其濕熱不除，則病症莫測。故有消渴、嘔吐、痰飲、腫脹、腳氣、陰汗、尿血、洩精、種種等症。諸症皆因用此甘淡微鹹以為滲

泄情洩安可滲利因於濕則濁氣既降而清氣上

示故有耳聰所謂一除而百病與之俱除也但小

便過利則腎水愈虛而目必昏易老云腎伏水去

利腎氣虛故曰昏此一定之理耳鹽水炒或酒拌忌錢

木通

言子
蔓草

木通

篇入心兼人小腸古名通草甘淡輕虛據書

開載治效甚多然究不外清火通竅利水數端而

已緣人一身上下外無風寒暑濕六淫鬱而爲熱

內無火氣薰蒸則水道順暢一身安養上自咽喉

以迄心胸下自大腹以迄二便而無膈結不通之

弊矣東垣曰凡入肺受熱邪津液氣化之源絕肺

源則泉水斷流源絕則膀胱受濕熱癰閉約束則

小便不通為濕熱朱二尤曰火在上則口燥眼赤鼻

乾在中則心煩嘔噦在下則淋閉足腫木通筋細

有北而頭皆通體輕質浮味淡氣滲能瀉君火火

退則小便自利心與小腸相表裏便利則諸經火邪皆從

心水而下降矣是以行經下乳火不內亢則經調乳通破血

除瘀熱除則血破止煩住痛心熱清則煩除痛止排膿生肌

必熱除。則氣血開。關利節。心竅通。則經絡流。并凡得養而肌肉生。開關利節。行。故關節亦通。因於濕熱而成者。無不藉此以爲開導。此雖類澤瀉。同爲滲利。但君火動。則宜木通相火動。則宜澤瀉也。惟神氣虧損。汗多外出。及虛弱孕婦者。切忌以性通利故耳。

車前子

言三
濕草

車前子

言人
肝肺

甘鹹性寒。據書皆載能治膀胱濕熱。

以通水道。然余謂膀胱之清。由於肝肺之肅。凡人濕利暴作。小水不通。並濕痺五淋。暑熱瀉痢。難產。

清肝肺
風熱以
連腹旺
水和

目赤雖有膀胱水涸不能化陽然亦有由肝肺成

受風熱以致水不克生故須用此以清肝肺兼鹹

下降以清水道聖惠方風熱目暗用車前子宣州黃連各一錢爲末食後溫服效又

景駐九治肝腎俱虛眼目昏花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增口力車前子熟地黃酒蒸三兩

荒絳子酒浸五兩蜜九時珍曰服此治目須佐他藥如六味地黃丸之川澤瀉也若單用則走泄太

過恐非久服之物又歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈方叩其方則

市前子一味爲末飲服二錢七云此藥利水是以而不動氣水道利則清濁分各藏自止矣

五子衍宗丸同此以爲四子之佐五子衍宗丸枸杞菟絲各八兩

五味覆盆各四兩車前二兩金匱腎氣丸用此以

蜜丸遠洩者車前易道子

爲諸藥之助。且此肝肺既清。風熱悉去。則肺不受熱。而化源有自。肝不被風。而疎泄如常。精與溺二竅。本不相兼。水得氣而通。精得火而泄。故水去而火益盛。精盛而氣益固。所謂服此令人有子。明腎云。服此精藥日久。及溲利而不走氣。西此張氏服此。行房即有子。及溲利而不走氣。利勝於水。寒而不及。命門精衰。故溲陰去。與茯苓同功者。正而真愈固。熱去而目自明也。謂此也。但氣虛下陷。腎氣虛脫。切勿服耳。酒蒸搗餅焙研用。

燈草

三

以水

燈草

心入

味淡

而寒

體小

氣微

諸書

皆稱

能降

心

火

以其

心治

心也

心火

清則

肺金

肅

故書曰

心與

小

腸相

表裏

則熱

盡從

小便

而出

矣且

熱去

而血

亦

寒故

能止

血通

淋洩

上焦

伏熱

五淋

之聖

藥也

五淋

有氣

血

癰可

治喉

痺

一方

燭心

灰二錢

蓬沙

青礬

石之

分

癰可

治喉

痺

未一錢

吹一

方

燭心

草紅

花

燒

灰

酒

原

及

以

灰

塗

氣

虛

小

便

不

禁

者

忌

服

扁

草

言三

草

厚音藟音入味苦氣平功器利水清熱除濕殺蠱是

以小兒蚊病女子陰蝕浸淫癰瘰疔諸病無不

藉此以爲主治耳海上方云心頭急痛不能常我

刺便玄漢以其味苦則熱泄味苦則蟲伏但此止

屑標治不能益人勿常用也葉細如竹筴莖引

促節有棘三月開細紅花

草薺音薺

草薺音入味苦氣平功器祛風除濕固腎凡人大

便燥結小便頻數并於便時痛不可忍者此必大

便熱閉積熱腐瘰等物同液乘虛流入小腸故於
便時卽作痛也楊子建萬金匱命方云凡大小便
忍者此疾必先大腸秘熱不通本被只就小腸大
痛也此疾水因貪酒色積有餘毒腐物瘀血之類
而痛與此症相似而痛者不同也宜用草薢一兩
水炒爲末每服二錢使水道轉入大腸仍以葱湯
小便數及痛自減也且水通不清則濕熱不除
而肝火愈熾筋骨愈痠草薢氣味苦平既能入肝
祛風之功長於去風濕所以能治痿痺遺精
惡瘡諸病之復能引水歸入大腸以通殺道卽水
屬風濕者

液澄清而無痛苦之患矣。又安有痺痛腰冷膀胱

宿水與陰痿失溺痔漏惡瘡之累乎。昔人云既有

逐水之功。復有攝精之力。

濕熱除則精自不流。

洵不誣耳。

按藥土茯苓與車蘼

下

相類。

而功用不遠。白虛軟

者。良莖苳爲使。畏大黃。紫胡。前胡。忌茗。醋。

市蘇根細長淺

白接莖根作塊亦黃

海金沙

音荒菴草

海金沙

音入小腸

味甘而淡。氣寒無毒。爲主。通利小腸。

血分要藥。凡小腸熱閉。而見五淋疼痛不止者。服

之使熱盡從小便而出且於傷寒熱閉而見腹滿
狂燥則當於此加梔子朴硝蓬砂投治俾熱亦從
小便而出此壯裏抽薪之一義也但腎臟真陽不
足切忌溺淨取浮者晒乾燃之不沾指者真忌火

防已

音云
蔓草

防已

端入
勝脈

辛苦大寒性險而健善走下行長於除

濕通竅利道能瀉下焦血分濕熱及療風水要藥

景曰本草十劑云通可去滯通草防已之屬是也

夫防已大苦寒能瀉血中濕熱通其滯塞亦能瀉

六便補陰瀉陽比之於人則險而健者也幸與故

藥相能首為亂階然普用之亦可救兇穴險

凡木濕喘嗽熱氣諸痛濕痹
濕熱下腫風腫癰腫
惡瘰及濕熱流入十二經以致二陰不通者皆可
用此調治若屬脚氣腫痛
濕熱則腫如濕則加蒼朮
薏苡木瓜熱加黃芩黃蘗風加羌活草薢痰加竹
瀝南星痛加香附木香血虛加四物大便秘加桃
仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈
仙痛連脇加薤草隨症通活斯爲善矣但此氣味
苦寒藥力猛迅若非下焦血分實熱實濕
木通甘寒海山分濕熱及非二便果不通利妄用此藥投

治其失匪輕不可不知此雖有類黃蘗地膚子但
黃蘗之瀉膀胱濕熱則并入腎瀉火味苦而不辛
此則辛苦兼見性險而健故於風水脚氣等症兼
理地膚子之瀉膀胱濕熱味苦而甘力稍遜於黃
蘗此則健險異常有幸無甘而爲亂階之首也其
一瀉熱與濕而氣味治功各別如此已有二種曰
漢曰木治風須用木防已治水須用漢防已漢已
根大而虛通心有花紋色黃木已黑點黃腥木強
恒洗用惡細辛畏葶藶

茵陳

茵陳蒿草

茵陳

茵陳蒿草入勝

味苦微寒諸書皆言濕熱伏於陽明

胃用此以人太陽膀胱發汗利水俾太陽陽明濕

熱之邪盡得於藥而解矣且治傷寒時疫狂熱瘧

疾頭痛頭旋女人疝瘕亦是濕熱爲病但黃原有

陰陽寒熱之分陽黃者由熱蘊於脾上如茵蘊於

大旱則苗必燥而黃是苗因燥而黃者也太陽則

苗必濕而黃是苗因濕而黃者也熱爲陽藥爲陰

故黃亦以陰陽分之陽黃身如橘色汗如柏汁是

茵陳

以仲景立有茵陳蒿湯、梔子蘘皮湯、麻黃連翹赤
小豆湯以治陽黃之症。又立茵陳附子湯以治陰
黃之症。茵陳治黃，通劑在人審其所因而附治耳。
若蓄血發黃則治不在茵陳之列。以茵陳本屬氣
分藥也。於血則不能治矣。茵陳本有二種，葉細而
青蒿者可用。若生子如鈴則爲山茵陳矣。尚於殺
蟲及治口瘡。

地膚子

言天
麻草

地膚子

品人
膀胱

治淋利水清熱功頗類於黃蘗但量

藥性論
藥性論
藥性論

藥其味苦烈此則味苦而甘黃蘗大渴膀胱濕熱
此則其力稍遜凡小便因熱而見頻數及或不禁
用此苦以大陰寒以勝熱而使濕熱盡從小便而
去也頻數既潮之熱則不禁當不得以熱名然不
禁亦自因於膀胱邪火妄動而致者但頻數
不熱出於膀胱則為陽水倘陽用以實治則可出
於陰主則雖有邪火內熾亦恐無陽不足當為
慎但虛火偏旺而熱得陰固常用以清利若不佐
以補味同大則小水既利而血益虛血虛則熱益
生熱生而淋其益甚矣故宜佐以牡蠣山藥五味
牧瀉之劑俾清者清補者補通者通滑者滑滋潤

條達而無偏勝爲害之弊矣且能以治因熱癰疽
並煎湯以治瘡疥至書所謂益精強陰非是其有
補益之能不過因其熱陰而卽具有堅強之意耳
類蠟沙隱鱗蛇起於虛處而多熱者加地膚子甘草

白鮮皮

苦三山草

白鮮皮

苦人脾胃

味苦與鹹性寒無毒益陽明胃土喜

燥惡濕一有邪人則陽被鬱不伸而熱生矣有熱
自必有濕濕淫則熱益盛而風更乘熱至相依爲
害以致關節不通九竅不利見爲風瘡疥癬毛脫

疽黃濕痺便結溺閉陰腫或逆狂或飲水種種等
症諸症皆就治宜用此苦泄寒鹹之味以爲開關
通竅俾水行熱除風息而症自克平肘後治鼠瘻已破出膿血
用白蘚皮黃汁服一升常此若鼠子也又陳延之治產後中風人虛不可服此藥者一劑白蘚皮湯
而奈世不察猥以此爲瘡瘍之外用其亦未達本
經主治之意耳然此止可施於脾胃堅實之人若
使素屬虛寒切勿妄用根黃白而心實者反取皮
用惡桑螵蛸扶苓栝樓草薤

苦參

言卑
山草

苦參

人解胃

味苦至極古書有云雖在五參之

外

人參沙參紫參升參玄參

云參亦屬有補然究止屬除濕

熱之品於補其要

補按五參除人參外以用

味惟甘爲正惟溫爲補苦參味等黃蘗寒類大黃

陰似朴硝

的

號爲極苦極寒用此殺蟲除風逐水

去疔掃疥治癰開通通清剽解表或云有益若

謂於腎有補縱書立有是說亦不過從濕除熱祛

之後而言豈真補陰益腎之謂哉况有用此擦牙

而更見有腰痛傷腎之症其可謂之補腎者乎

云五味入胃各歸其所藏攻久而增氣。物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註云。人肝爲溫。人心爲熱。入肺爲清。入腎爲寒。人脾爲至陰。而兼四氣。皆爲膚其味而益其氣。各從其性。不以其氣故以服。就其性參而反藥者。此其類也。氣清不以則脾氣有。因勝。歸勝。則臟有偏絕。故有氣大是以藥不其五。味不偏。四氣而久服之。雖且復勝。久必變。六但人疎忽。不能精候。可張從正云。此藥皆平也。避日。苦寒不可不調之。藥久服則五味皆歸其臟。必有偏勝。氣增之患。諸藥皆然。厚者當起。起而攻之。可也。至脾胃虛寒尤爲切忌。附按去腥氣。蒸用玄參。

爲使惡貝母菟絲子漏蘆反藜蘆

琥珀

音同
高木

琥珀

入小腸腎

甘淡性平

成於陽應所生於陰而

而成。按昔雖曰：脂入土而成寶，合以鎮墜等藥，則能安魂定魄，色亦能入心肝二經，血分合以辛溫等藥，則能消痰破癥，生肌合口。其味甘淡上行，合以滲利等藥，則能治淋通便，燥脾補土。經曰：飲食精氣上輸於脾，脾氣散精上歸於肺，通調且能明水道，下輸膀胱。凡滲藥皆上行而後下降，且能明目退翳。即退翳之效。逐鬼殺魅。即安魂之效。謂是水去熱除安鎮之意。但此性屬消磨，則於真氣無補，氣屬滲利，則於本源有耗。此惟水盛火衰者用之得宜，若使火盛水涸，用之不能無虛。血衰而小便不利者，宜用血少而小便利。

指反致燥 急之者 松脂入土年久結成或楓脂結成以摩

熱拾芥者與市人多煮雞子及青魚胆偶之用相

子仁末入瓦鍋同煮半日搗末用

猪苓

言四
高木

猪苓 味甘淡微苦性平無毒得楓根之餘氣

以虛形如猪屎故以猪名凡四苓五苓等方並皆

用此 仲景用茯苓澤瀉白朮與桂名五苓散為治

氣以化則能出肉桂辛熱所以化其氣也除

後名四苓散李東垣曰無惡寒症不可用特用楓

則茯苓甘草為渴而小便不利者設若不渴性雖有

論房脫
與勞熱

類澤瀉同入膀胱腎經解熱除濕行聚利水然水
消則脾必燥水盡則氣必走澤瀉雖同利水性亦
類燥然鹹性居多尚有潤存澤雖治火性亦損氣
然潤能滋陰尚有補在故諸必合澤瀉以同用則
潤燥適均而無偏勝之患矣至於茯苓雖屬滲劑
有濕自可以去然茯苓入氣而上行此則入血而
下降且與降濕利水消腫治癰止痢等藥審屬暑
邪濕熱內閉無不藉此以爲宣導之需病多由暑
必成瘧
古人已云清利小便無若此訣以故除陰藥中止

有澤潤而不川及猪苓正謂此耳六味丸有但
此專司引水津液易耗久服多致損目凡服利水
藥而明目
水藥而失明者因其走泄真氣也白而實者良去
皮用

赤小豆

二百四十三

赤小豆

人甘

酸色赤心之穀也其性下行入陰

通小腸

而利有形之病故與桑白皮同為利水除

濕之劑

十劑曰利水之劑是也

是以水氣內停而

見滿閉腹腫

手足身重皆腫瘡疽非此莫治

朱氏藥驗

方書朱仁余在東宮時感疾命道士醫治之
取小豆七七粒爲末敷之而愈中貴人任永亮宿
後遇唐近死尚書郎陳永授以藥立愈叩其方未
小豆也予苦腦病以至五服醫以藥治之甚驗未
亮曰得非亦小豆耶醫謂曰其用此活三十口屬
勿復言有僧髮髻如爛爪如索乳神用此治之如
神但其性最粘敷毒乾則難揭且能止漏解酒通
人苦根末卽不粘此法尤佳胎下乳陳自明予婦食素產后七日乳麻不行服
胎下乳藥無效偶用亦小豆一升煮粥食之當夜
遂至十劑取此爲燥亦以水行而燥自生之意並
非因其藥性本燥而言也故書又戒多服則令人
津液枯槁而燥取緊小而赤黯色者良若牛馬半
子非赤小豆也

滑石

音圖石

滑石

諸人膀胱

何以滑名因其性滑而名之也滑石

甘氣寒色白服則能以清熱降火通竅利便生津

止渴爲足太陽膀胱經藥故凡中暑積熱嘔吐煩

渴黃疸水腫脚氣淋閉水熱瀉痢吐血衄血諸症

癰毒乳汁不通胎產難下服此皆能蕩熱除濕通

汁滑胎

同甘草爲六一散

然其開竅利濕不獨盡由小便

而下蓋能上開腠理而發表

腠理爲肺所生

是除上中之

濕熱下利便溺而行是除中下之濕熱熱去則三

淨市
下藥

焦寧而表裏安濕去則關門通而陰陽利矣

益元散

六一散或加辰砂

用此通治上下表裏諸病其益

在此滑石既屬滲利如何又言止渴因其濕熱既

滲則脾胃中和而渴自止耳故書又載能理脾胃

義亦由此白而潤者良石韋爲使宜甘草

江易云凡走

之劑宜用甘草以佐

石燕

言聖石

石燕

苗入脾胃

味甘氣寒出於祈陽西北江畔

上其形似蚪而小與堅不同功皆利竅除濕解熱

難產

故凡口緊不開熱淋不利婦人難產等症治當用

此無有不效

必審諸病果因濕熱而成方用

但書所云難產令婦

兩手各握一枚其胎即下合之於理似屬誼矣未

可盡信磨汁服

書言門雷兩自石穴中出胎兩飛陷者詳

刺蝟皮

音興鼠

刺蝟皮

屬胃入

其皮如刺因以刺名其獸屬胃而入

胃因以刺號

宗或曰蝟皮治胃逆開胃氣有功其字從蟲從胃深有理焉

何書

載治五痔陰蝕

以其濕熱下注得此味辛入腸金

屬大腸故能以破其血耳

何書又載能治腫膈反

胃普濟反胃用蚘皮燒灰酒以蠅屬兼味生
葶故能散邪泄熱使其胃氣調和而不上逆故耳
但食肉切宜除骨若誤食則令人瘦劣節節漸小
也似鼠而圓火稱色攢毛外刺如栗房煨黑存性
用

本草求真卷五 第三冊

江西撫州府江縣縣志卷之五

江縣縣志卷之五

濕水 濕水者因其水勢急迫有非甘淡所可療苦
辛燥片極鹹極寒極陰之品以爲次清則水始死
此濕水之說所由起也然水在人臟腑本自有分
卽人用藥以治水勢之急亦自有別如大戟荒花
甘遂同爲治水之藥然大戟則濕熱水濕水濕荒
花則通裏外水道荒花則濕裏外水濕水濕荒
經隆水濕也草歷白前同爲人肺治水劑矣然葶
藶則合肺中水氣以爲治白前則搜肺中風水以
爲治也商陸入脾行水功用不減大戟故仲景杜
熱散結軟堅故療癰疽疔腫道閉塞具必用之蟻

蛇性急而毒故能情水拔毒田螺性寒至陰故能
利水以消脹積隨子有下氣之速凡積聚脹滿諸
滑服之立皆有効紫貝有和利水道通泰之能故於
水居虛身日弱用之自屬有功至於積聚為心石
草前肺雖非利水最峻然體虛氣弱用亦增
害本可視為利水淺劑而不審實以為用也

大戟

赤草

大戟

苗入肺腎

氣味苦寒性寒純陽峻利居首上

瀉肺氣

下泄腎水兼因味辛勞行經脈無處不到

浸水色綠

又入肝膽故書皆載能治十二水毒患

結腹滿急痛等症

奸古曰大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝者皆燥除之也

時珍云凡痰涎為物隨氣升降無處不到入於心

則迷竅而頸痛入於肺則痰塞而成欬唾稠粘喘
急背冷入於肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱
往來入於經絡則癱痺疼痛入於筋骨則頸項
背腰脇手足牽引隱痛三因並以控涎丹主之蓋
有大戟能泄臟腑之水濕甘遂能行經隧之水濕
白芥子能散皮裏膜外之痰氣要必實証實熱實
脈方可以用非實否則傷肺傷腎害人不淺幸時
愚按白芥子用大戟一味百祥獨濕腫正實則渴
其子也腎邪實而渴其肝也澤石老人治痘變黑
歸腎症用宜風散代百祥亦非甘遂之意蓋毒
勝火熾則水益潤風挾火發則止受虧故津血內

錫不能化膿而成黃黑乾陷之症。若中其毒者，惟
其共風火之毒，所以救腎扶脾也。若中其毒者，惟
菖蒲可解。杭產色紫者，良。北產色白者，不堪入藥。
木槲煮去骨，用得大棗，則不損脾。畏菖蒲及甘草。
苗名澤漆，亦行水道，主治畧同。

芫花

音四八
毒草

芫花

歸入脾
肺腎

味辛而苦，氣溫有毒。亦反甘草，注消。

頗與大戟甘遂皆能達水，似藥毒隱僻之處。然此
味苦而辛，苦則內泄，辛則外搜。故凡水飲痰癖，皮
屑脹滿，喘急，痛引胸脇，咳嗽脹痛，裏外水閉，危迫。

殆甚者用此。毒性至緊，無不立應。飲有痰飲，懸飲、之異。李時珍云：夫飲有五，皆由內。嘔水漿，外受濕氣，鬱蓄而爲留飲，流於胸，則爲支飲，令人喘咳寒熱，吐沫背寒，流於肺，則爲懸飲，令人咳嗽，引飲盆兩脇，流於心下，則爲伏飲，令人胸滿嘔吐，寒熱脈運，流於腸胃，則爲痰飲，令人腹鳴吐水，膈脇支滿，或作泄瀉，忽肥忽瘦，流於經絡，則爲溢飲，令人沉重，注痛，或作水氣，胕腫，又水有風水、皮水、正水、黃汗之別。如水積胞中，堅滿如石，則爲石水，汗如栝汁炙黃，名曰黃汗，久而不愈，則爲癰膿，又水在肺，則咳在胃，則嘔，在頭則眩，在心則悸，在背則冷，在脇不似甘遂苦寒止泄，經隧水濕大戟苦寒止泄。臟腑水濕芫花與此氣味雖屬相同而性較此多寒之有異耳。此雖取效甚捷，悞用多致天拆不

芫花根

芫花葉

可不慎根多蜀桑止可敷瘡毒魚及搗汁浸線繫
落痔瘡腫不宜用葉似柳花紫碧色葉生花落陳
久者良醋煮過水浸暴用反甘草葉可搗屑赤廔作傷

芫花

音四元
莠草

芫花

端人
腸胃

雖與芫花形色相同而究絕不相似蓋

芫花葉尖如柳花紫似荆芫花苗莖無刺花細色

黃至其性味芫花辛苦而溫此則辛苦而寒若論

主治則芫花辛溫多有達表行水之力此則氣寒

多有人裏走泄之效故書載能治利

宗真曰張仲
景傷寒論以

堯花性利取其行水也水去則利止其意如此
今用之當斟酌不可過使恐不及也須有是症乃
用然要皆屬破結逐水之品未可分途而別視也
但藥肆混收亦可見效以其主治差同故耳

苦甘遂

言辛
辨草

甘遂

端入脾胃
肺腎膀胱

皮赤肉白味苦氣寒有毒其性純

陰故書皆職能於腎經及或隊道水氣所結之處

奔湧宜決使之盡從穀道而出爲下水濕第一要

藥

元素曰水結胸中非此不能除故仲
景大陷胸湯用之但有毒不可輕用喻嘉言曰

胃爲水穀之海五臟六腑之源脾不散胃之水精

於肺而病於中。肺不能通胃之水道於膀胱而病
 於上。腎不能司胃之關。時其蓄泄而病於下。以致
 積水浸淫。無所底止。水腫有風水皮水正水石水
氣短。卧不克安。水鬱於肺。則虛滿喘咳。水鬱於肝
則脇下痞滿。痛引少腹。水鬱於脾。則四肢煩悒。體
重。不能衣。水鬱於腎。則腹病引背。央央腰解痛楚。
水腫與氣腫不同。水腫其色明潤。其皮光澤。其腫
不速。每自下而上。按肉如泥。腫有分界。氣則色蒼
黃。其皮不薄。其腫暴起。浮腫或腫自上下。或通
其痛。或及臍腹。或倏如浮腫。或腫自下及上。或通
身。蓋腫按則隨起。但仲景所論小腫多以外邪為
主。而內傷兼及。究之水為至陰。其本在腎。腎氣既
虛。則水無所主。而妄行使不溫。腎滿。但以外邪為
利。水終引水歸腎之理。猶為陽和。自得萬物生長
必得和風。煖日。則濕氣蒸為陽和。自得萬物生長

矣。故凡因實邪元氣壯實。

用必壯實方可。以甘遂。

而致隧迫。

阻塞。見爲水腫。盛脹。痼瘕。腹痛。無不仗此。迅利。以爲開決水道之首。如仲景大陷胸湯之類。然非症屬有餘。祇因中氣衰弱。小便不通。水液妄行。脾莫能制。誤用泄之之品。益虛其虛。水雖暫去。大命必隨。甘草書言。與此相反。何以二物同用。而功偏見。亦以甘行而下。益急。又按劉河間云。凡水腫脹藥。臍令滿。內服甘草水。其腫便去。二物相反。而感應如此。非深於斯道者。未易語此。皮赤肉白。根作連珠。重實者。良麴。裂煨熟用。

用甘草、薤白、汁浸三日，其水如墨，以清爲度，再煎，其水瓜蒂爲使，惡遠志。

商陸

二百五
毒草

一商陸

喘入

辛、酸、苦、寒，有毒。功喘入脾行水，其性下。

一行最峻

有排山倒海之治，功與大戟、芫花、甘遂相

同，故凡水腫、水脹、癰疽、癰腫、喉痺不通、濕熱、蠱毒

惡瘡等症

服此卽能見效。喻嘉言曰：從來腫脹通

若只單腹脹

則難治，遍身俱腫，脹者五臟六腑各

有見直

故難治，遍身俱腫，脹者五臟六腑各

時，單腹脹

久積而消者不升，濁者不降，互相結

聚，牢不可破

實因胃之衰微所致，而瀉脾之藥

安敢用乎

明乎此，則有培養一法，補元氣是也。則

有招納一法

宜布五臟是也。則有解散一法，開鬼

赤脈

門結淨府是也。凡肺傷脾則脾必失矣。傷腎則足底
必平。傷肺則背脊疼痛。傷肝則眉黑。皮膚傷則心則缺
盆必平。及咳嗽失音。凡腫先起於腹者必死。如仲景
因敗者可治。先起四肢後歸於腹者必死。如仲景
牡礪澤瀉散之用商陸以治大病後腰以下腫用
此急迫以散之也。若脾虛水腫因服輕劑未愈遂
用苦劣有毒純陰之藥迅迫效雖稍見未幾即發
決不可救。取花白者良。赤者只堪貼臍。人膺三分
利則腫消。蓋讀曰古讀云其味酸辛其形黑豆湯
煎人癰水腫用其效如神。斯言盡之矣。黑豆湯
浸蒸川得蒜夏

海藻

音五
水草

海藻

前人書載性反甘草能治項頸一切瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧

九腹痛日痛及痰飲脚氣水腫等症其故

似蓋緣苦能洩結寒能除熱鹹能軟堅海藻氣味

俱備與甘草本屬不合凡其水因熱成而致隧道

閉塞小便不通硬結不解者用此堅軟結泄邪退

熱解使熱盡從小便而出而病自無不愈也

丹溪治瘰癧

治瘰癧

氣初起用海藻一兩黃連二兩

為末時時飲咽先斷一切厚味至有病非實結最

不宜用非獨海藻為然即凡海中諸藥無不如是

海帶似海藻而粗柔勒而長主治無異昆布亦

同海藻海帶俱性帶滑且雄凡瘰癧堅如石者非此
不除且其下氣最速久服多令人瘦至云海島人
常食以其水土不同故耳皆反甘草畧洗去鹹水
用偏有同甘草以治瘰癧
益漱之以消其堅耳

葶藶

言五
葶藶

葶藶

前人入肺
兼人胃

辛苦大寒性急不減硝黃大瀉肺中

水氣肺急下行勝肺故凡積聚癥結伏留熱氣水

腫痰壅嗽喘經閉便塞至極等症

諸症皆就水
氣停肺而言

無

不當用此訓昔本草十劑篇云洩可去閉葶藶大

黃之屬。但大黃則瀉脾胃。陰分血閉。芩蘆則瀉肺
輕陽分氣。閉鬱蘆有苦有甜甜者性緩。雖濕而不
傷苦者性急。無瀉肺而復傷胃。故必用以大寒補
土以制水。但水去則止。不可過劑。觀金匱所云用
葶藶以治喘。藥氣入胸殺人。其意大可知矣。子
如黍米微長色黃糯米微炒用。得酒良。榆皮爲使。

榆皮性
亦利水

白前

三白前
山草

白前

喘入

甘辛微溫爲降氣祛風除痰要藥。緣人

氣實則痰壅痰壅則氣作風與痰氣膠固則肺固
而不寧而有喘嗽喘促腫脹之病矣非不用此以
泄肺中實痰風邪則氣曷降而嗽曷止是以金匱
用以治咳嗽脉沉深師自前湯用此以治久咳上
氣寒師方體腫短氣脹滿者夜倚壁不得卧常作
水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半斤夏各
三兩大戟七合炙取渴服禁食牛肉餒飢皆取降肺除痰之意非若白
微氣味鹹寒溫泄肺胃燥熱細辛辛熱散發腎中
寒邪也此惟實者用之虛者不宜用耳似牛膝粗
長堅氣易斷者良若短小柔軟能彎者是白微去

頭鬚甘草水浸一晝夜焙用忌羊肉白前出延前

同類以
此辨之

續隨子

二言委
蘇草

續隨子

謂人

卽然所召千金子者是也味辛氣溫

有毒諸書皆載下氣最速時珍曰續隨與大戟

長於利水惟在用之凡積聚脹滿痰飲諸滯等症
得法亦皆要藥也

服之最宜以其以毒攻毒故也氣味形質功用類

有類於大戟澤漆言遂故書亦載此屬尅伐之味

若脾胃虛寒泄瀉服之必死黑子癰贅用此搗爛

時塗之自落。或以黃線繫病時時塗之漸脫去。取
色白。歷去油用。

羅麥

音美
溫草

羅麥人小腸味苦性寒。功滑渴心利水。故書載。

利小便。決腫。去瘀。用。拔肉。刺下胎產。除目翳。然
其氣稟純陽。必其小腸氣厚。服此。疏泄之味。病始

克除。淋症有虛有實。如淋果屬熱致其莖痛不可
忍。手按熱如火。熱血出鮮紅。不照。淋出如沙。

如石。脂下妨悶。煩燥熱渴。六脈沉緩有力。而為屬
熱。如其莖中不痛。痛喜手按。或於弱後。痛稍久
則止。或短。尿小便清痛。大便赤痛。而色瘦。或飲
食少思。語音懶怯。六脈虛浮無力。是為屬虛。若

使小腸虛經云心屬有熱不惟其熱不除則虛而益虛必致變生他症矣娠產後小便不利及脾虛水腫均並禁焉惡燥蚘

石韋

音老
石草

石韋

喘入

苦甘微寒功滑清肺行水凡水道不行

化源不清以致水道益閉

化源不清則水道自閉

石韋莫延

石上生葉如皮味苦氣寒苦則氣行而金肅寒則熱除而水利是以勞力傷津伏有熱邪而見小便不通及忠背凝等症治當用此調治俾肺肅而水

星

利水通
道
下血

通亦淋除而毒去矣去梗及黃毛微炙用生於左
上各无草亦治淋

紫貝

音次
蚌

紫貝

謂人
肝

即貝子之色赤者也味鹹氣平其物出

於雲南白入氣紫入血

紫所而
骨白

功苗利水通道逐

蠱下血凡人症患脚氣小兒斑疹日歸五癰水腫

癰毒鬼魅用此的能解除蓋因鹹有軟堅之力脚

症濕熱用此得以透骨逐邪

貝骨堅硬
故能透骨

和以諸藥

使其蒸蒸作汗次第而解也日窮用此粉點亦以

能除濕熱而使血得上營但與貝子相類甚多如
研蘇之類皆能和滋分別用之項曰貝類極多古
貝尤貴後世不用貝
然而藥中亦希使之背上深紫有黑點者良生研
細末用

田螺

古先
蚌蛤

田螺

端入勝
腸胃

味甘大寒產於水田性寒至陰故能

引熱下行凡人目患赤痛只取田螺以珍珠末黃
連末納入良久取汁點目神效以寒能除熱也且
治噤口痢疾用活大田螺二枚搗爛入麝香三分

作餅烘熱貼臍間半日熱氣下行卽思食矣至治
熊彥 小便腹脹如鼓只取田螺一枚鹽匙速殼搗
碎敷臍下一寸三分卽通并能止渴醒酒以除餘
熱此雖止屬外治亦見其性引下行之力耳

蝮蛇

化生

蝮蛇

入氣

味寒

鹹

土性

甚奇

特書

旨將

此分

爲上下左右四截若以上截治臍則腫卽見上消

下截治臍則腫卽見下消左截治臍則腫卽見左

消右截治臍則腫卽見右消又截自腰以上以治

則能拔水上行而使二便皆滴自腰以下以治其

能使便立下

弘景曰自腰以下甚痛能止大小便

人難產亦可照此以治而產即解癰腫瘰癧瘰癧肉刺

若生搗汁以塗則刺與腫皆治骨硬入喉不下末

吹即能見愈外此箭簇入肉用此塗貼患處則箭

即克見拔

又牙齒疼痛用土狗一個齊補裏定

其治效總因性善攻穴其性急迫故能如此取效

地

新日今方家治石淋導水用螻蛄七個鹽二兩

味鹹氣寒作名土狗凡用此藥宜審其體質方可

切取者使體虛氣薄但見書載治功任意妄施其
不傷人性命者鮮矣朱震亨曰燒蝕治水甚此與
草藨子等藥同爲一類用時須當細審取雄或云
燒地赤並燒於上任其去翅足炒用
跌死覆者雄仰者雌也

本草求真卷五 第四冊

江蘇蘇州府宜興縣衛生堂校訂

江蘇蘇州府宜興縣衛生堂校訂

降痰之見病甚多痰之立治不少如痰之在於
經者宜散宜升痰之在於上者宜涌宜吐痰
之在中在膈不能以散不能以吐者宜降宜下此
降之注所由起也第降有在於肺以爲治者如
蓰貝母生白朮杏仁土貝母訶子之屬是也
胸膈以爲治者如礞砂礞石兒茶之屬是也
心肝以爲治者如牛黃之屬是也
治者如全胡鶴虱之屬是也
治者如竹瀝之屬是也
治者如白礬之屬是也
之屬是也
脾以爲理皆屬清火情熱降氣下行惟白礬則收

逐熱涎或從上涌或自下泄各隨其便至於對症
熱成宜溫宜燥宜收宜引則又在入隨症活潑也
自拘也

括蕤仁

言三
蔓草

括蕤仁

崑入肺兼
入脾胃

氣味甘寒

成無已乃謂味
苦其說甚非

功

降火下氣墜痰緣肺受火逼則水必停而痰生痰

生則肺失養而氣壅故有喘急胸滿咳嗽咽閉口

渴之病矣括蕤性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈

鬱結痰氣使之入腸胃而下降

震亨曰括蕤實治
肺痺者以其味甘

性潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火
逼失其降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降

入肺除
痰清火
降氣

首其爲治嗽之要藥也。且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱爲治消渴之神藥。故仲景小陷胸湯用此以治邪結在胸。又以小柴胡湯用此。易半夏以治少陽症。見口渴等症。然大要取其有清降之力。故能使之下行也。若謂此能補氣。正未必然。虛寒瀉利者忌。其熱利最宜。取其以寒降火。實圓長如熟柿子。扁多脂。去油用。枸杞爲使。畏牛膝乾漆。惡乾薑。反烏頭。

天花粉

音三蔓草

天花粉

音人肺

卽括蕒根也。味酸而甘。微苦微寒。亦

入肺除
痰消火
苦

同括萆能降膈上熱痰兼因味酸又能生津止渴
故凡口燥唇乾腫赤癰乳疔漏時熱狂燥便數等

症服之立能解除

時珍曰括萆味甘微苦酸其生

能止渴潤枯微苦降火甘不傷胃昔人言其苦寒似未深察但此較之括萆其

性稍平不似萆性急迫而有推牆倒壁之功也至

經有言安中絕續似非正說不過云其熱除自安

之意痰色清稀者忌服澄粉食大宜水衰有熱人

畏惡反同括萆

貝母

言空
山草

貝母前入心辛苦微寒世多用爲治痰之藥殊不知

知痰有因燥因濕之不同痰痰有風痰寒痰濕痰火燥痰虛痰熱痰之別

須在臨症細分如果肺因火形水飲不化憊而爲痰此痰

因於燥者也脾胃虛寒水飲停積窒而不通此痰

因於濕者也因以燥者非用苦以瀉火辛以散鬱

寒以折熱莫治因以濕者非用辛以散寒溫以燥

濕莫投貝母味苦而辛其性微寒止於心肺燥熱

痰食壅盛及虛勞煩熱肺痿肺癰喉痺咯血吐血

火刑目眩淋瀝火移癰瘰乳閉難產惡露不飲等

症服之卒能有效。承曰貝母能散心胸鬱之氣故

以不得志而言今用治心中不快多愁鬱者珠有

功信矣又唐人記其事云江左常有商人左膊上

有瘡如人面亦無他苦商人戲以酒滴口中其面

赤色以物食之亦能食彘則肉內服起或不食則

一臂痺焉有各降教其歷試諸藥金石草木之類

悉無所苦至貝母乃聚屑閉目商人喜乃以小華

荷毀其口灌之數日成瘡若使因於脾虛而見咳

遂愈然不知其何疾也

嗽不寧混以貝母妄代其失遠矣蓋一宜半夏一

宜貝母况半夏兼治脾肺貝母獨清肺金半夏用

其毫貝母用其苦半夏用其溫貝母用其涼半夏

性速貝母性緩半夏散寒貝母清熱氣味陰陽大

性速貝母性緩半夏散寒貝母清熱氣味陰陽大

有不同

江昂云故凡風寒濕食諸疾貝母非所宜也

彼此誤授爲害不

淺大者爲土貝母大苦大寒

如浙江貝母之類

清解之功

居多小者川貝母味甘微寒滋潤勝於清解不可辨川產開辦者良獨辦不堪入藥去心米拌炒用厚朴白微爲使具秦艽反烏頭

竹瀝

言齒也木

竹瀝

齒入經絡皮裏膜外

甘寒而滑治諸消風降火潤燥行

痰養血滋陰凡小兒天吊驚癇陰虛發熱口噤胎產血暈痰在經絡四肢皮裏膜外者服之立能見

效。蓋瀝之出於竹。由血之出於人也。極能補陰。長
於清火。補陰亦由火清而致。性滑流利。走竅逐痰。故爲中風
要藥。以中風莫不由於陰虛。火旺煎熬津液。成痰
壅塞。氣道不得升降。服此流利經絡。使痰熱去。氣
道通。而外症愈矣。故火爆熱者宜之。時珍曰。竹瀝性寒而滑。大
抵因火爆熱而有痰者宜之。苦寒瀝胃虛腸滑之
人服之。則反傷腸胃。養性滑利。多食渴人。僧家謂
之。列腸。即此義。朱氏謂大寒言其功不若脾胃
言其氣。殊特於理。謂太寒爲氣。何啻於功。若脾胃
腸滑。寒痰濕痰。食積生痰。不可用也。荆瀝性味相
近。但氣寒。多用。荆氣虛熱。多用。竹丹溪止言虛痰。

藥

薑汁爲使

姜公服竹瀝以桂得長生蓋竹瀝性寒以桂濟之亦用姜汁佐竹瀝之意相

同。但竹類甚多，惟取竹之薄節用之。據曰：將竹截作

磚兩片對立，架竹於上，以火炙出其瀝，以盤承取，笋尖發痘瘡。

白菓

言空山菓

白菓苗入肺

雖屬一物而生，氣攸分，不可不辨。如生

食，則能降痰解酒，消毒殺蟲，以漿塗鼻，固手足，則

去破胞點點，油膩及同汞浣衣，則死蟲。其花夜

得見，性陰有小毒，何其力銳，氣勝而能使痰與垢

之悉除也。至其熟用，則竟不相同，如稍食，則可再

食則令人氣壅，多食則即令人臃脹昏悶，昔已有服此過多而竟服悶欲死者。食千枚者死。然究其實則生苦，未經入華而性得肆其才而不室，熟則經火煨制而氣因爾不伸，要皆各有至理，並非空爲妄談已也。

礞石

言矣石

礞石

肝端入

礞石中剛猛之性，沉墜下降，味辛而鹹。

色青，氣平，功能入肝平木，下氣爲治驚利痰要藥。

喻嘉言曰：驚風二字，乃古人妄點空談，不知小兒初生以及童幼肌肉筋骨臟腑血脈俱未克長，陽

陰肝屬
上焦

則有餘陰則不足故易於生熱然甚則生風生驚
亦所恒有後人不足解遂以爲奇特之病且謂此病
有入候以其搖頭手動也而立曰斜亂搐搦之名以其卒
口噤脚蹙急也而曰立曰斜亂搐搦之名以其卒
背反也而曰角弓反張之名相傳既久不知妄造
遇此等症無不以爲奇特而不知小兒腠理不密
易於感冒風寒病則筋脈牽強因筋脈牽強生出
抽搐搦搦角弓反張種種不通名色而用金石等
藥鎮壓外邪深入臟腑千中千死問有體堅症輕
得愈者又詭爲再造奇功遂致名守諸門雖曰殺
數兒而不蓋風木太過脾土受制氣不運化積氣
知其罪矣
生痰壅塞膈上變生風熱治宜用此重墜下泄則
風木氣平而痰積自除今人以王隱君滾痰丸內
用礞石通治諸般痰怪症殊爲未是滾痰丸礞石

煨研水飛淨一兩大黃酒蒸八兩黃
芩酒洗八兩沉香五錢爲末水丸
盛風木挾熱而脾不運故爾痰積如膠如漆用此
誠爲合劑如其脾胃虛弱食少便澀服此泄利不
止小兒服之多成慢症以致束手待斃可不慎歟
硝煨水飛研用

白礬

三石

白礬

人

氣味酸寒則其清熱收熱可知何書又

言燥痰若於寒字相悖言言能治風痰若於收字
濇字相殊不知書之所云能燥痰者非其氣味溫

下焦

熱而可以燥而卽化。實以收其燥濕初起。使之下
墜。不使留滯而不解也。是收卽且其酸而兼鹹則收
滯之中尚有追涎逐降之力。非卽不燥之燥乎。所
謂能治風痰者。其酸苦涌泄。兼因風邪初客。合以
皂莢等味。研服。則能使之上涌。豈其風熱。歷久深
入不解。而卽可以上涌乎。是以風痰泄利。崩帶。用
此以收。卽愈。收諸血脫肛陰挺。肝崩帶。風眼痰飲。
瘖瘡。川此以滯。卽效。滯喉痺癰疽蛇傷癰毒。用此
賊寒以解。卽除。賊治雖有四。然總取其酸滯寒鹹。

爲功。以爲逐熱去涎之味。但暫用則可。久服則於

精血有損。宗稟曰。損心肺却水故也。水化膏紙上。

方云。凡人病毒。道發背。不問老少。皆宜服黃耆

丸。服至一兩以上。無不作效。最止疼痛。不動膿。肺

活。人不可勝數。用明亮白礬一兩。生研。以好黃蠟

七錢。溶化。和丸。梧子大。每服十九。漸加至二十九。

熱水送下。如未被破。則內消已破。即便合。古言服損

心。肺傷。丹義根於是。豈正本求源之治歟。取紫白

光瑩者。佳。火煨用。以火煨地。酒水於上。布地以盤

上。掃收之。爲蠟精。未盡者。更如前法。再以甘草爲

陳苦酒化之。名蠟華。七日可用。百日更佳。甘草爲

使。畏麻黃。惡牡蠣。

蓬砂 夏六

逢砂

附人

又名鵬砂辛甘微鹹氣溫色白質輕功

市人上除熱故云能除胸膈熱痰也是以痰嗽喉

痺噎膈積聚骨硬結核眼目翳障口齒諸病凡在

胸膈以上者無不可以投治頌曰今醫家川礪砂

真曰含化明津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治

不能成喚癢時珍曰礪砂味甘微鹹而氣涼色白

而質輕故能去胸膈上焦之熱素問云熱淫於內

治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去步

臑故治噎膈積聚骨硬結核惡肉陰瘻用之者取

其柔物也治痰熱眼目障翳用之者取其去垢也

况性能消金豈有垢膩塊積而不可以消導乎第

常審實而治。勿輕投也。出西唐者白如明礬出南
唐者黃如桃膠。甘草湯煮化微火炒鬆用。

牛黃

音充

牛黃

牛入肝

味苦性涼。古人用此解心經熱邪及平

肝木。通竅利痰。定驚及痰涎上壅。中風不語等症。

中風須辨真偽。真則外有表症。可察。偽則內有虛

症。可尋。真則表症見而神志無恙。偽則表症既無

而精氣全失。真則本氣或虧。木血或損。加以外邪

內乘。而成偏廢。偽則真陰既耗。真陽既耗。迫其將

絕。不固。而見厥仆。真則新邪復喚。舊邪而致新舊

交感。偽則裏虛既甚。而更增虛益危。真則面赤唇

焦。牙關緊閉。上視。強直。抽搐。煩渴。偽則面青或白

與黑。痰喘。昏亂。脈多汗。甚則手足厥逆。脫症全

其真則陽浮而數除滿而弱及或浮滑沉滑微虛
移數偽則兩尺沉滑微細虛散欲絕及或寸關搏
指弦滑洪數又中風閉口則心經手撮則脾絕眠
合則肝絕遺尿則腎絕氣喘而黑鼻屎則肺絕用
藥始宜辛熱以祛外邪細緣牛有黃牛之病也牛
宜辛潤甘潤以固血脈黃在於心肝膽之間凝結成黃故還以治心肝膽
之病取其長於清心化熱故爾用此以除驚痰之
根耳至於中風不語必其邪已入臟九竅多滯緣
便閉舌短短方可援服若使中腑而見四肢不着
鼻息寒目翳方中經而見口眼喎斜不爲開痰順氣養血活血使
用此藥投治引邪深入如油入麵莫之能出小兒

純陽病多胎熱痰熱偶於心肝二經之病命在須臾者用此多有回生之力。兒初生未食乳用三五厘之惟脾胃虛寒者其切忌之取磨指甲者真牛最佳有黃必多吮吸以盆水承之同其吐出迫喝卽墮水名生黃如鷄子黃大重盂可揭殺死自角中得者名角黃心中得者名心黃肝膽中者名肝膽黃成粒須防墮脫黃以亂得牡丹菖蒲良人參爲使要龍骨

龍膽地黃常山

本草求真卷五 第四冊終