

松

峰

說

疫

松峯說疫卷之三

諸城劉奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福出劉嗣宗南溪叅閱

表李逢皮謹菴錄

雜疫

葡萄疫

小兒多患此症以受四時不正之氣鬱於皮膚結成大小青紫斑點色若葡萄發在遍體頭面乃爲腑症邪毒傳胃牙根出血久則必至虧損初起宜服羚羊角散清熱涼血久則胃脾湯滋益其內又有牙根腐爛者人中曰散

加羚羊角散 此方銀花羌活殭蚕生地等皆可酌入

羚羊角 未

防風

麥冬 去心

元參

知母 酒炒

黃芩

牛旁子

炒研

甘草節

金銀花

淡竹葉十餘片煎服

胃脾湯

此湯必實有不足之症方可用初起切勿輕投

白朮

土炒

茯神

陳皮

遠志 去心

麥冬 去心

沙參

五味子 研

甘草節

虛弱自汗者去沙參加參芪

人中白散

治小兒走馬牙疳牙齦腐爛黑臭

人中白

尿壺中白城煨一兩

兒茶

五錢

黃柏

薄荷

青黛

各三錢

冰片

二分五厘

共爲細末先用溫湯漱淨次

藥于疔上日六七次吹藥延從外流者吉內收者凶

捻頸瘟

其症喉痺失音頸大腹脹如蝦蟇者是也宜荆防敗毒散  
荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

枳殼

麩炒

川芎

酒洗

茯苓

人參

甘草

姜葱煎食遠服發冷倍用葱

蝦蟇瘟

其症咽喉腫痛涕唾稠粘甚則往來寒熱身痛拘急大便

秘結有類傷寒亦與捻頸瘟相似但以不腹脹爲異治法  
涼散和解攻下敗毒隨症施治無不獲愈方俱散見各醫  
書本門不多贅其治瘡捷法於初起時用手在病人兩臂  
自肩項極力將其中凝滯癘氣惡血趕至手腕數次用帶  
子將手腕札住不令惡血走散用針刺少商穴并十指近  
甲蓋薄肉正中處捻出惡血則愈少商穴在大指外邊爪面靠  
甲角處摸有穴者便是

又法將脖項患處口啣鹽水用力吮啞俟其皮色紅紫成

片則愈或用針將項下一挑手捻針孔出血密七挑捻愈

大頭瘟

外科門亦  
名時毒

此症有陰陽有可汗不可汗者

其 頭上并後項腮頰與目赤腫而痛發熱症似  
傷寒治療散見各醫書本門茲不多贅用前刺法亦妙

大力子丸 兼治啞痺

元參

連翹 去隔

甘草

桔梗

川大黃

生熱  
酌用

石膏

煨研

川連

酒炒

黃芩

酒炒

荆芥

防風

羌活

大力子

炒研

爲末作丸或姜煎服亦可

又方

蠶蚕

二兩  
浸

大黃

二兩

姜汁丸彈子大蜜水服一丸

又方

普濟消毒飲

見醫方集解專治大頭瘟初起

又方

大頭瘟生疔瘡及喉閉並將疔瘡刺出血卽愈

獸音羊反  
中寔

瓜瓠瘰

其症胃高脇起嘔汁如血宜生犀飲

生犀飲

黃土五錢

犀角二錢

蒼朮油炒

川連

芥山茶一撮

鎊音傍削也  
界音介山名

流水煎入金汁和服日三夜二虛加人參鹽水炒

大便結加大黃 渴加花粉 表熱去蒼朮黃土加桂

枝性熱似不宜當酌加別解表藥 便膿血去蒼朮倍黃土加黃柏使便

滑人中黃代金汁

楊梅瘰 形似楊梅

其症遍身紫靨忽發出微蒼者是也用清熱解毒湯下人

中黃丸并刺魄出血

穢音枚物  
着濕變色

清熱解毒湯

川沛

酒洗

黃芩

酒洗

生地

白芍

酒炒

石羔

煨研

知母

鹽酒炒

人參

甘草

升麻

葛根

羌活

日三服夜二服姜煎

人中黃丸

大黃

三兩  
尿浸

蒼朮

油炒

桔梗

滑石

各二兩

人參

川連

酒洗

防風

各五錢

香附

兩半  
姜汁浸生用

人中黃

二兩如無  
坑垢代之

神麴糊爲丸清熱解毒湯送 如氣虛用四君子湯送  
如血虛四物湯送 痰甚二陳湯送 熱甚童便送

錦按二方用參非取其補取其鼓舞之以祛和也

### 疔瘡疽

其症發痲如瘤遍身流走且發夕死三稜針刺入委中三分  
分出血並服人中黃散 委中穴在兩腿屈盤當中前對膝蓋

### 人中黃散

人中黃 一兩 明雄

硃砂 各一兩 共爲末 薄荷 桔梗  
湯下二錢 日三夜二

消毒丸 治時疫疔瘡惡症

大黃

牡蠣煨

僵蚕

泡去涎炒

各一兩

共爲末煉蜜丸彈于大新汲水化下一丸無時

軟腳瘧

其症便清泄白足瘧難移

卽濕瘧

宜蒼朮白虎湯

卽白虎湯加蒼朮

絞腸瘧

一名痧

其症腸鳴乾嘔或水瀉氣不通則探吐之宜及解散有陰

陽二症

陰痧 腹痛手足冷身上有紅點用燈草蘸油點着將痧

痺之 陽痧 腸痛手足暖以針刺少商穴並十指尖近

痧音聲處也

用處 刺法見前此刺法治諸中霍亂咽喉痔病俱效

陰陽水方

滾水

一盞

冷水

一盞

對服立愈或加炒鹽少許妙

觀音救苦丹

磨點眼角二三次兼治咽喉諸症陰毒大一魂化燻一切腫毒惡瘡蛇蝎傷津研茶患處

火硝

一兩

白礬

四兩

黃丹

二兩

硃砂

明雄

各五分

治陰陽二疔

硝凡多而雄硃太少益五不訛作五分即

共細研勻化開候稍冷搓成小錠磁器收貯所用

母出氣

地漿 于南牆背陰處掘一坑入凉水一確繳之再候澄

清取飲

又方

生明丸

未二錢

冷水滾水各半盞調服

又方

菜豆

一二升

水二三桶熬湯以甕貯之令病人澆洗

稍冷全身入甕中泡透或稍愈且毋遽出效

雙解散

即防風通聖散

洩瀉去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎嗽加姜製半夏

防風

荆芥

薄荷

麻黃

白朮

上炒  
泔浸

川芎

酒洗

當歸

酒洗

白芍

酒炒

連翹

去隔

山梔

炒

黃芩

石膏

煨

桔梗

甘草

滑石

末

芒硝

大黃

生熟  
酌用

醫方集解之雙解散減去硝黃

引用生姜葱煎 以上四方專治陽痧

鷓鴣瘟、

其症兩腮腫脹增寒惡熱 外用赤小豆柏葉共搗爛水

醋調敷內服薄荷濃煎湯服之

龍鬚瘟

其症喉硬舌強並牽耳中急以針刺喉上橫七針豎七針

硃砂

不拘多少研

蜜

一匙

入燒酒和勻灌之

芋頭瘟

其症昏沉不食用芋頭燒灰存性研黃酒送下

蠟子瘟

其症喉痛發熱惡心痛連腮煩頭亦痛喉旁有疙瘩四散  
紅如蠟爪壓舌針挑之要挑爪不可挑頂每爪上挑一

針令血出旋以硃砂末搽之再哈咽醋少許卽愈如刺當  
中頂卽爲傷蟬蓋必出膿不食而危。

版腸瘟

刮出紫疔瘡六個卽難治。

其症初發如傷寒熱病三四日小腹脹滿

不治數日卽死

用麻一

縷

如指粗

先自兩肩頭刮至手腕刮出紫疔瘡針刺破擄去

惡血又自兩大腿跟刮至兩足跟有紫疔瘡刺破去惡血

俱男先右女先左

又自咽喉刮至臍下刺法如前卽時汗愈

脇痛瘟

一名結肋瘟甚惡不治數日卽斃

其症但脇肋痛羅白切片蘸麩酒刮痛處出痧卽愈未愈

用豆油一大盞銅杓熬三分之一服之愈又法青布包黑  
凡蘸燒酒刮痧又法烙香油厚餅碗口大乘熱熨痛處冷  
卽易可用三四餅餅棄勿食忌生冷

刺蝥瘟痧

〔註〕青亦俗  
作班貓

其症壯熱煩悶遍身痛如蝥刺所傷俗名蝥刺瘟以痧治  
之林月溪患時疫壯熱口渴胸腹迷悶手摩之如蝥刺傷  
痛遍體皆然因放腿灣痧甘餘針毒血成流用山甲天虫  
角刺加活血順氣藥稍飲之而痊

地葡萄瘟痧

〔註〕即  
六五即蠶

七五

此症見下  
那沙

暑熱時疫惡毒之氣攻於裡則爲痰喘爲血瘀昏迷沉重  
不省人事若元氣壯實內不受邪不入于裡卽散其毒于

肌膚血肉之表爲腫爲脹忌飲熱湯熱酒刺腿灣痧筋並

十指尖出毒血內服寶花散治痧仙劑薛金一錢細辛三錢降香三錢

荆芥四錢共爲細末清茶調三匙冷服○桃仁紅花湯治血疑結

桃仁去皮紅花蘇木各一錢青皮八分烏藥四分獨活六分白茯苓

去刺搗末水煎服○紫朴湯治痧有食氣壅盛者厚朴姜汁炒山查煎

子研三稜莪朮枳實炒連翹去青皮陳皮細辛分水煎冷

服

手足麻瘋

其症先少腹痛作羊毛疔挑之無血隨作紫疔瘡手足麻

麻至不知人而死急令人以足躡病者手之三關脉上

男

左手女

用力躡勿放直待四支不麻病人自覺心頭發火

方放之自愈若放之早雖愈後亦纏滯三關脉即兩手寸

口診脉處

扣頸瘋

此症仕宦僕友不可不知倘遇患此死者而  
顧執言爲人所逼勒可乎可補洗冤錄一則

聞之老醫臧枚吉云余髫時聞先祖言凡人無故自縊者

爲中頸盧伊時未解詳問及後遍閱方書並無此說辛巳

年一人來言其鄉有一婦人平日家道充裕子女成立夫婦和偕忽一日無故自縊幾死救之始免詢之毫無所爲惟日鬱鬱不樂藏緝袖中無人處卽自縊羅守月餘飲食言動如常迹此求治余因憶少時所聞細釋其或是血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏不結于脇下而結于手足厥陰及手太陰之三藏合病者內經曰膈中者臣使之官喜樂出焉今病則憂戚可知刺瘡論曰厥陰之瘡意恐懼腹中悒悒又肝瘡者善太息其狀若死又肺瘡者善噦如有所見瘡如此疫可類推因處一方用香附鬱金雄

黃爲九氣湯開膈中之鬱再加二陳以開膈中之痰更加

羌活細辛溫肝逐風鬼箭羽丹參赤小豆以通心包兼泄

火邪生姜煎服服後竟頭痛發熱身痛瘟疫症志具自出

其袖中之繩云誰納我乎告以自縊茫不記憶寢疾七日

又服發汗藥而解始知此症亦係疫癘或百合病之類乎

按旣云疫癘之疾何不投火赴水則顧而必欲自縊

乎意或太陰邪氣傳厥陰而風木太過者故不思金

火水而獨喜木也緣肺金藏魄肝木藏魂脾土藏意

智而心君藏神爲一身之主包絡實爲臣使代心君

行令而主喜樂今手厥陰包絡先病臣使失其喜樂  
之職以擾心君之神明君火不生土傳足太陰脾而  
意智不清土不生金因傳手太陰肺而悲憂金不平  
本因傳足厥陰肝而鬱怒肺金承所不勝而木寡于  
畏故風木太過且肝之魂挾肺之魄不安其舍出而  
爲祟故喜木而自溢也非有崇憑之乃魂魄意智作  
厲也或蘇合丸牛黃清心丸當亦可用惜未診其脉  
色何如也此症原名扣頸傷寒然與寒疾太無涉故  
改名瘟疫而名實俱當也

狼拍翻有二種

其初喉痛旋氣不通殺人甚速對直虎耳尖照耳輪邊用  
磁鋒刺出血卽愈

徐樂然傳

又一種心中不安旋不能言牙關緊閉不醒人事身冷出  
涼汗以手試其兩頰下有斜出一硬物碍手便是竹著搖  
開口入指探喉兩旁有物如麥大有單有雙並指破出血  
初病血鮮久病血紫立愈指頂先用搵擦

虫涎翻小兒多患此

兩日紅腫鼻流涕日夜啼號以針密刺太陽穴

兩肩尖後如指

用大一塊立愈刺後以芋頭搗爛敷印堂至山根

椅子翻

不語不食形如呆疑用椅子圈平拿處削下木片煎服愈

扁担翻

發卽兩肋撐脹難忍用扁担肩挑處削下木片煎服愈

王瓜翻

兩脇形如王瓜脹痛用針自咽喉挑起從上而下密挑至  
廣上橫挑兩朋挑至腰脊骨而止隨挑隨愈初挑無血漸  
就卽有血挑至腰脊對頭卽愈不然再發不救

馬道人傳

白眼翻

其症唯翻白眼頂門灸三艾如不愈再灸三艾即愈

遶臍翻 一名沙莒父岳廷臣傳

其症先遶臍痛漸痛至滿腹旋氣塞胃脇兩肋脹滿冲四  
喉氣不通不省人事不急治即死先以針挑兩耳尖次挑  
結喉下咽窩兩骨尖次挑背後肩脾骨下兩骨尖並令出  
血立愈

疔瘡翻

其症先寒後熱渾身發疔瘡赤紫黑色漸至大惡寒發熱

不治卽死宜參連散

參連散

人參

黃連

共爲細末等分

麝香

冰片

各少許

四味再共

研黃酒調服外以透骨草黃龍尾

俗名黃連一草

煎水洗之

松峯曰一名紫疔瘡與前疔瘡溫症治迥異

麻雀掙

其症眉背腫痛小腹脹滿見食卽嘔心中開躍挑兩天眼  
服見血卽愈

鴉子掙

其症服腫渾身青紫兩脅攻心

句似有落宗

大小便不通男挑

龜頭女挑雞冠

陰戶

出血卽愈

烏沙掙

其症兩腕脹胃口痛甚隨將病者手腕趕稔視有紫疙瘡者卽此症也治用大針將手腕重刺十針起針時若見紫血噴出沙脹隨消忌冷白飯菜豆

黃鷹掙

其症肚腹攪痛翻上翻下治法從臑膊上起下內相氣血用帶子將兩手腕扎住各指稍抱甲肉上當中刺一木可

出惡血卽愈

羊手掙

一法用青布蘸燒酒遍身擦黃蒿水薰洗亦可  
泝又法用手推背上二筋撮以出紫時許

其症發熱無汗心內發燒口乾嘔吐前後心毛孔周圍高

阜

句疑有  
錯誤字

紫色三四處卽此症也治用針挑前後心挑患

處將羊毛剔淨蒙被出汗卽愈如不應再用沙糖少許生

薑三片武夷茶一撮同煎服忌腥冷月餘無不效

鷓鴣掙

其症渾身發燒解裡衣體熱不可當心口一塊滾上滾下  
挑肚臍並兩乳卽愈

烏鴉掙

猗掙同此治法

其症頭痛頭沉頭揚惡心眼黑發搐指甲先青然後遍體皆青上吐下瀉不能言小腹痛甚至無脈身涼如不急治傾刻殞命牙關如閉速用箸搖開口令病人捲舌視之根下如有青紅紫泡急用針刺泡見血用雄黃末點之滾水和雄黃末飲之或炮藥點之亦好上蓋頭出汗卽愈忌風三日

鬼兒掙

其症直走曠野趕跳不寧急用涼水和炮藥灌之只許走

治不許坐治或有用濕土埋其頭使聞土氣卽愈者

長蛇拵

其症腹痛打滾先挑肚腹三針次頭頂一針脚心三針卽愈

纏絲拵

其症腹脹頭痛心翻一作煩前後心或有紫黃眼子針破

以醋擦之如遍體麻木無此痕者亦是此症將臍臍腕腕書

筋針出紫血用炒鹽調滾水灌之卽愈水入姜三片亦可

啞以拵

其症不能言用鞋底蘸涼水打頭頂門如孕婦患此將頂

門髮分開以手蘸涼水輕輕拍之即愈

母猪痒

其症以頭拱地打滾先針舌根次將兩手除大指不針其餘八指將包甲薄肉每刺一針捻出惡血再用猪槽水注手腕即愈

老鼠痒

其症唇黑紫腫咽喉腫痛或胃膈膨脹挑眉鬚角鬚疑作鬚見血即愈或再挑兩眉中心包疑有錯誤

蝦蟆痒

其症腹脹滿或疼痛將肚臍周圍挑之又挑小腹三四針  
卽愈

海青掙

其症頭痛攔頭打滾用帶子札住頭然後將肩際眼根咽  
窩頂心各處挑之卽愈忌風三日 眼根卽大眼角

眠羊掙

其症似睡眉眼不開轉身疼痛發脹喝氣疼痛治法挑尾  
把骨根出血卽愈

野雀掙

其症渾身發紅或前後心有紅黑紫眼頭痛脇脈挑腋下  
六針髮一針而愈髮字上下疑有落字用莧菜種煮水洗  
浴甚良

狐狸掙

其症頭痛或乾嘔發嘔不思飲食頭仰渾身出汗張口亂  
呼諾語用針挑咽窩並前後心則愈

猿猴掙

其症坐臥不寧心窩脹滿口舌發青指甲青小腹疼挑陰  
囊線即愈

尋牛掙

其症肚脇脹痛心痛翻起唇來挑裡邊挑唇上牙花卽愈  
鷹嘴掙

其症肚脹疼頭暈眼黑心內脹用白升水灌之再挑後心  
及耳稍卽愈

又方州椒七粒生姜七片陳麥糠一撮同研  
明酒煎去渣調同錢服

松峯按諸掙挑刺隨卽將惡血捻出爲妙有病深重  
者挑刺無血必用手極力捻之見血卽愈 諸掙過  
有口噤不開者用烏梅指擦牙眼涎出卽開蓋酸先  
入筋木能尅土使牙門酸軟則開矣若用鉄器等攪

之恐傷其齒

右諸掙症治余得之岱宗石壁間錄而藏諸篋笥遇患是疾者如法施治歷有奇效後余遊秦晉於太行道中亦見粘一紙於壁前所見者大同小異俱變掙爲翻蓋因其方言各異耳而症治則無殊也因取而對較增訂之以廣爲流布至其命名亦各有義意甚毋以其涉俗而忽之松峯再誌

赤膈類傷寒

松峯曰是皆疫症實非傷寒也

凡胸膈赤種疼痛頭痛身痛發熱惡寒名赤膈傷寒宜荆

防敗毒散

見檢  
頸瘟

加萎仁

去  
油

黃連黃芩紫金皮元參赤芍升

麻白芷如症有表復有裡而胸膈赤腫疼痛者雙解散

見  
絞

勝

加蕁仁黃連紫金皮如表症已退大便燥實胸膈腫痛

者涼膈解毒加蕁仁枳殼桔梗紫金皮赤芍又宜絞針刺  
腫處出血如半表半裡胸膈腫痛者小柴胡湯加桔梗蕁  
仁紫金皮赤芍

涼膈散

連翹

去隔

大黃

酒浸

甘草

梔子

炒黑

黃芩

酒炒

薄荷 加竹葉生蜜煎

黃耳頰傷寒

凡耳中策刺痛者是風入腎經也久則變惡寒發熱脊強  
背直如痙之狀曰黃耳頰傷寒宜小續命湯加殭蚕炮天麻  
酒羌獨穴用荊防敗毒散加細辛白芷蟬腿去足黃芩赤  
芍紫金皮

小續命

防風

桂枝

麻黃

杏仁

泡去皮  
尖研

川芎

酒洗

白芍

酒炒

人參

甘草

黃芩

酒炒

防已

附子

制

防已

附子少用

俗言物之  
稀而溼散  
爲痰涎  
如此二字  
之訛

解亦類傷寒

按素問尺脈緩澁謂解休音亦與此處所講不同

解者肌肉解散休者筋不束骨其症似寒非寒似熱非熱  
四體骨節解散懈惰倦怠煩痛飲食不美食不知味俗呼  
爲砂病內經名爲解休原其因或傷酒中濕感冒風寒房  
過多婦人或經水不調血氣不和皆能爲此似砂病實  
非砂病也治宜先醮熱水打其臂膊裡面或以麻醮之刮  
之刮自背后節骨至篤脉為度更宜針刺十宣委中二穴  
出血當服蘇合香丸

蘇合香丸

山菇

沉香

丁香

檀香

白者香附

藁撥

白木

訶子

煨去皮

硃砂

青木香

烏犀角

各二錢

薰陸香

龍腦

各一錢

安息香

二錢爲末用無灰酒

熬蘇合油

入息香內二錢

共爲細末

用安息膏並煉蜜丸如

彈子蠟包用時溫水化服一丸

丸角蠟包不出氣爲妙

砂病類傷寒

南閩廣間溪毒砂風水弩射工蝮短狐暇鬚之類俱能

含砂射人受其毒則憎寒壯熱百體分解似傷寒初發土

人治法以手摩痛處用角筒入肉以口吸出其砂毒外用

大蒜煨搗膏封貼瘡口卽愈諸虫唯鰕鬚最毒其毒深入於骨若鰕鬚之狀其瘡類疔腫不治必死彼地有鴻鵠鷓鴣等鳥專食以上諸虫故以此烏毛糞服之及籠此鳥于身畔吸之其砂聞氣自出而愈

喉管傷寒

其症喉中作痒難過 吃茶酒湯水便不可救

薄荷二分 麝香一分 爲細末吹喉待氣通吐涎碗許

然後吃陳米湯半碗卽愈

松峯按此雖名傷寒實疫厲之類夫曰喉癢似病之

輕者曰難過則痒不可當矣雖然何至吃茶水便不可救乎觀其待氣通三字則痒時其氣已有大不通者在矣味其言吐涎碗許則氣之所以不通涎爲之也此症甚惡亦世之所不輕見者

### 油痧瘴

其症兩脇脹滿築心疼痛或腹內攪腸作痛頭暈眼黑或大小便閉塞氣不通嗚命在且夕將綿花子油與吃試之食之香甜不油氣者卽是此症速將綿子油令病人吃足或用至四五兩半斤一斤立愈仍將油吐出不少奇方也



棗一枚煎服效

鎖喉黃

其症面黑目黃舌白語澁牙關緊閉胸痛緩不過二三日  
卽死人皆錯以烏痧瘴治之多致悞命如遇此症將牙關  
攪開用藍布擦去舌白次以錢醯盪水刮兩太陽穴

穴在  
胃利

眼角之際試  
有坑窠便是出紫點泡針刺出血見黃水爲度脖項兩側

亦如此治後用生大黃三錢硫黃一錢共搗粗末水二盅煎

一盅溫服立愈

摩脖子猴

摩忍平聲卽用手摩物摩字

其症咽喉暴腫而痛痰涎壅盛水漿難入甚則脖項亦腫  
寒熱交作頭面烘熱或四肢厥逆氣息不順用真阿魏分三

麝香

分三

巴豆

一個去油

杏仁

一個去皮尖

紅棗

一枚去核

共搗爛

丸梧子

大銀朱爲衣綿帛包一層用時將紙撕去按男左女右塞

鼻孔汗出卽愈避風忌口二三日

所忌不言何物止食粥飯小菜便無不是

松峯按此係執毒而用巴豆者亦執因執用以毒攻  
毒之意此與前症雖俱係咽喉之病而症治各有不

同

谷眼 谷亦作骨

其病初覺時頭暈心亂煩躁不寧漸而心腹疼痛卽是此症有緊慢之分緊者立刻殞命急以銀針針大眼角內白

皮

如無銀針想  
鐵針亦可

及兩耳稍鼻尖臆門太陽穴

前見血卽愈

皆針挑破皮  
捻血非直刺

凡有心腹疼痛吐瀉俱是此症俱宜挑初起

先挑鼻尖後挑別處挑後用陳醋半碗

無味用新

入銀子少許

共入砂鍋燉三四滾臨服時再入銀子入醋內研攪溫服立刻回生若治遲危急看舌根下有紫泡挑破搥擦卽愈

天行曾瘡

建武中南陽擊德言所得故名

其症發斑疹頭面及身須臾周而狀如火瘡或戴白漿隨

夫隨上下

此句費解

此毒惡之極

忌治取好蜜通摩瘡上以

蜜煎升麻敷七拭之

疫厥

亦名瘟疫暴亡

凡人感瘟疫視其症脈尚不至殞命不救而突然無氣身  
直甚至無脈且不可驚詭視爲告終此疫厥也急用臘月  
雄狐胆溫水研灌卽活若牙閉已緊卽攪開灌之雄狐胆  
必臘月預爲搆收爲妙松皐曰如得此症不論有無狐胆  
總宜先針少商穴並十指甲上薄肉穴道針攝出惡血並  
法見前  
用好猪牙皂末吹鼻或用京中靈寶如意丹十餘粒吹鼻

可治

羊毛疔

與前瘟疫兼炒並羊毛揀大同小異三症治各不同故並有之

萬歷間金臺有婦人以羊毛遍鬻於市忽不見繼而都人身生泡瘤漸大痛死者甚衆瘤內唯有羊毛有道人傳一方以黑豆菽麥末塗之毛落而愈菽音喬疑即北方之蕎麥

纏喉風

其症咽塞水谷不下牙關緊急不省人事楊氏一字散

雄黃

水洗

蝟稍

枯礬

藜蘆

牙皂

炙焦各等分

右共爲細末用一豆大納鼻中搐之立效

赤瞻

其症兩目突然紅腫疼痛此亦時疫也救苦湯治之

桂枝

連翹

去隔

紅花

細辛

歸尾

甘草

各一錢五

蒼木

甘浸

胆草

各七分

羌活

黃芩

麻黃

柴胡

防風

藁本

黃柏

各一錢

黃連

五分

生地

知母

炒各一錢

白芍

二錢

食遠服

神鬼箭打

其症身痛有青筋以亂髮擦痛處髮捲成團而硬者方是此症用金銀花濃煎湯飲之不愈再加甘草髮不捲不硬

者非此症不必服另察脉與兼症治之

發痧氣

其症心煩少氣頭痛項急起則自眩欲倒身微熱戰掉不

自安時復憎寒心中欲吐吐時無物

新猶糞

不拘多少

入上

好黃酒中攪開用細白絹濾出青汁頗熱服之盡劑鋪厚  
上蓋暖覆臥取汗天寒房内生炭常令煖毋寒寒則不汗  
如汗出候乾乃起慎風冷兼治瘧及風勞瘧母

化金痰

松峯曰上  
突下尚令  
人不可思  
意僅五減

其症初覺卽昏不知人不治卽死急以生豆令嚼甘美不

校得所傳也云治之  
摩有奇效

一云蔽骨  
端用針挑  
開皮肉內  
有紅絲用  
針斜挑斷

稻米  
食

腥卽是以幕上有河字錢一文放入喉中卽化有化至三  
四枚而愈者

### 抱心疔

其症肚痛連心兩脇脹滿脊背痛上連頭痛痛極溲身強  
直昏暈欲死視其臍上必有紅絲一條照心口蔽骨下二  
指挑斷其絲又於兩肋骨端亦挑兩處如前法又於脊上  
對臍腎俞穴上下各指半再挑二處如前法皆將盤絲挑  
盡斷皆以皂凡末納挑眼內令滿以手揉之卽愈忌腥令  
豆腐諸豆并一切蔓生之物三日後食發物發所挑瘡口

瘰癧

其症惡寒發熱或腹痛似瘧非瘧氣急喘逆頭面腫脹胸腹飽悶脹滿或泄瀉下痢膿血輕者牽連亦月重者危急一時治宜放痧消食積爲主俟痧毒已洩然後和解清理以寒熱從脾養血補其中虛

宜識瘰癧

九痧有蕈筋紫筋或現於數處或現于一處必用針去其毒血然後提症用藥按輕者針卽見效不用服藥

放痧十則

一在頭項心百會穴 一在兩眉中間印堂 一在兩眉

稍窪陷處太陽穴 一在結喉兩旁 一在舌底下筋之

兩旁 一在雙乳 以上俱  
針挑 一在兩手背十指尖當中近

甲薄肉 一在兩臂灣 一在兩足背十指尖當中近甲

薄肉 一在兩腿灣 以上俱  
直刺

放痧法 原作刺痧今故作放字兼挑與刺二字言之

腿濟上下有細筋深青色或紫色或深紅色者便是 皮白  
嫩者

方子乃 刺之則有紫無毒血腿上大筋不可刺刺亦無毒

血反令人心煩兩腿遺硬筋上筋不可刺 硬筋腿之大粗  
筋其上筋乃指

麋皮之  
小筋言

刺之恐令人筋吊

也

手管筋色亦如此辨之至于

宜針挑者惟取挑被皮畧見血

如無血  
手擠之

至于指尖刺之大

近指甲令人頭肚凡刺不可太深銀針方佳銹性有毒

錫

按兩腿帶兩臂灣止此二處宜尋痧筋刺之餘處

亦不言痧筋是無痧筋也只按穴放之可耳法有直

刺斜挑之異故以放字該之至于挑法亦當有隨症

施治者如頭痛則挑印堂及大陽穴胃痛則挑心窩

腹痛則達臍挑之脇痛則密挑兩肋以及挑肩井穴

挑背挑項挑耳失耳輪挑暑挑軟肋

數處皆諸痧  
必挑之穴 街

用針斜挑皮擠血至于少商穴及兩手足指末乃係  
直刺如無血亦須擠之

刮痧法

背脊頸骨上下及胸脇兩肩背臂之痧用錢蘸香油刮之  
頭額腿上痧用棉紗線或蒜麻蘸香油刮之大小腹軟肉  
內痧用食鹽以手捺之

新  
定刮痧法

額項後當中渾處刮一道治額項後兩旁左右大筋上各  
刮一道 前身副肩下脇上軟肉經中各斜刮一道 兩

脇肋軟縫中左右各刮三道 左右肩靠着肩并軟肉處  
各刮一道 背脊骨兩旁豎刮自項下至腰各刮一道  
背後脇肋軟縫中左右各刮三道以上皆用錢蘸鹽水刮  
之 兩臂內用蘇麻一縷撚鬆繩蘸水刮之但要出痧紅  
紫爲度諸穴並治一切痧症唯蘇麻刮臂灣專治眩暈  
心痰若作病症刮之亦不紅紫

松峯日前刮痧法出痧脹玉衡書新定刮痧法乃且  
用而屢效者并錄之以備擇用

治痧三法

肌膚疹用油鹽水刮之則毒不內攻血肉痧看青紫筋刺  
之則毒有所洩內形痧須辨經絡臟腑在氣在血則可消  
散而絕其根

此段言  
當用藥

治痧分經絡症候

足太陽膀胱痧

腰背顛頂連風府脹痛難忍

足陽明胃經痧

面目紅赤如桃唇乾鼻燥腹中絞痛

足少陽胆經痧

脇肋腫脹痛連兩耳

足大陰脾經痧

腹脹取痛且不能屈伸四支無力瀉不止

足厥陰肝經痧

心胃串痛身重難移作腫作逆作脹  
腹恍

足少陰腎經痧 痛連腰腎心腹脹硬

手太陽小腸經痧 孕身疼痛麻木不仁左足不愈屈伸

手陽明大腸經痧 半身脹痛俯仰俱癱右足不能屈伸

手少陽三焦經痧 胸腹熱脹揭去衣發脹燥無極

手太陰肺經痧 咳嗽聲啞氣逆發痧

手厥陰心絡痧 或醒或寐或獨語一二句

手少陰心經痧 病重沉沉昏迷不醒或無言

用藥大法

痧症藥宜冷服蓋昏迷不醒乃痧之熱毒術心故心不能

自主而昏迷冷藥入口從膈間順流而下則熱毒在胸臆者隨藥而消故旋清醒卽尚昏迷必有食積血痰阻塞再按厥症用藥開導攻下未有不醒者茲特舉用藥之一隅以俟神而明之者用荆防之類從表而散用青陳二皮從中而消用枳實大黃之類從大便而下用木通澤瀉之類從小便而行用查菴荀子之類所以其食之阻用銀花紅花之類所以治其血之壅

銀花治血未解

用枳榔蓮朮之類所以

治其積之滯

痧前禁忌

忌熱湯熱酒粥湯米食諸物犯之輕者必重重者立斃

### 痧後禁忌

痧後畧鬆覺餓驟進飲食卽復忍耐一二日乃可萬全

痧脹至衡書言治痧甚精詳第其中儘有過拘泥之處卽如風勞臍膈等雜症皆以痧論則所見無非痧者有是理乎茲特擇其中大綱緊要數條詮次而註釋之而治痧之大法亦盡于此矣錦再誌

### 撲搗痧

其症痰涎壅盛氣急發喘喉聲如鋸痛似喉鵝但喉鵝喉

內腫脹此則無之又形似急喉風但喉風痛而不移此則痛無定處且喉鵝無痧筋解見前此有痧筋依前刺法刺之服吹方開後擇用之

水礪散 治痧症咽喉腫痛

天竺黃

礪砂 各二分

硃砂

水片 各二分

元明粉 八分

共爲細末磁瓶貯蠟封口出氣難用患者吹喉中

救若丹 治痧氣鬱悶之劑

枳實

蘿蔔子

各一兩

烏藥

連翹

各八錢

鬱金

二錢

共末清茶稍冷下

荆芥銀花湯 此治血滯之劑

荆芥 銀花 紅花 茜草 丹皮

赤芍

各一錢

白茯苓

去刺研末八分

烏藥

五分

香附

三分

水二盅煎七分微溫服

附治諸痧痛方

井水河水

各半和服

泥漿水

澄清服

白糖和

梅水服

晚蚕砂

未白滾湯候冷調服

以上治痧症無食積阻滯者

吐法

治新食阻作痧毒

明凡

四分

白湯一碗候冷化服

又芳食

塩一撮白湯一碗候冷和服 二方必多飲方吐少則

不效按自凡稍多些亦可

青筋

此症因氣逆而血不行併惡血上攻于心也多由怒氣相  
沖或憂鬱氣結不散或惱怒復傷生冷或房勞後受寒濕  
以致精神恍惚心慌氣喘噎塞上壅嘔噦惡心頭目昏眩  
胸膈痞滿心腹刺痛脇肋腰背痛頭痛腦痛口苦舌乾面  
青唇黑四肢沉困百節酸痛或憎寒壯熱遍身麻痺手足  
厥冷顫掉默默不語不思飲食等症皆惡血攻心所致古  
無治法惟刺兩手曲池上青筋出瘀血可愈或屢患屢刺  
莫之能除夫人以氣血爲主故丹溪曰氣血和百疾不生

原文先復  
于風驚前  
言病因生  
冷寒濕而  
此又言因  
風非唯白  
相尋皆且  
又說向一  
偏茲以一  
外字似屬  
贅括

此病先傷于外而復損其血茲製一方名曰虎丸白虎西  
方肺金之謂青筋乃東方肝木之象以白虎而治青筋金  
能平木有至理存焉能代針砭之若且免後之復發兼治  
男子久痢便血婦人崩漏帶下并一切打撲內損血不能  
散心腹痛欲死者服之神效

白虎丸

千年石灰

不拘多少刮外雜  
色泥土研細水飛

糊丸如梧子大

每用燒酒送五十丸看輕重加減

初覺一劑取效過三  
五日病已老宜多服

松峯按原方下注云此藥能順氣散血化痰消滯則

凡霍亂痧換皆可以通融治之喉燒酒送獨于青筋

爲宜葢青筋多生冷寒濕所致至熱症或用冷水冷  
茶送氣滯用陳皮食積用麥芽水送隨症變通可耳。

痰疫

秉錦補

患此病者初得之亦並不顯尋常瘟疫應有等症不過頭  
微痛身微覺拘急寒熱心腹微覺疼痛脹滿三兩日內抖  
然妄見鬼神狂言直視口吐涎沫鼻中流涕手足躁擾奔  
走狂叫脉沉緊而數身體不熱亦有熱者却與邪入陽明  
胃腑發狂迥異此感疫癘之氣風火痰三者合而成病不  
急治三二日卽難宜先針少商穴并十指刺法見前急服竹瀝

解疫煎一二劑神效此亦世所罕有之症曾有患此者余  
深覺叱異因思暴病皆屬於火怪病皆屬於痰以意爲之  
先用刺法後用藥餌輒效一時患者數人方知其爲疫也  
治之應手而愈遂定其名曰痰疫筆之以備採擇焉

竹瀝解疫煎 自定新方

黃連

黃芩

梔子

胆草

殭蚕

泡焙

胆星

藁仁

去油  
研

川貝

去心  
研

橘紅

半夏

製

流水煎熟用竹瀝薑汁兌服總以竹瀝爲君 多則一盅  
少亦半盅

右七十二疫症或謂命名多不雅馴言之不女似未  
足以行遠也余應之曰此真所謂少所見則多所怪  
也余周行海內越歷已深其症大概北省恒多而南  
國恒少飢饉之歲常多而豐樂之年頗少且其命名  
也皆出自經史子集名山石室并良醫口授試之而  
歷有竒效方敢筆之于書洵非無稽之談索隱鄙倍  
者之可同日而語也試觀古今來醫書中字句之欠  
通歌辭之鄙俚平仄乖違而讀不上口者未可更僕  
以視余之說疫中而敢有是乎以上不遇數症命名

仍其方言土語耳而說者輒目之爲涉俗獨不聞古  
聖人於邇言猶必察焉耶吾願世之大方家閱是書  
者不鄙薄焉而以爲芻蕘之尙堪詢也則厚幸矣松

峯再誌