

松

峰

說

疫

松峯說疫卷之二

諸城劉 奎松峯著輯

男秉錦灌西述較

福山劉嗣宗南瑛叅閱

表姪李逢虔譚叢錄

論治

瘟疫名義論

古人言諸瘟病者多作溫熱之溫夫言溫而不言瘟似爲二症第所言與瘟病相同則溫病爲一病也明矣後人加以疔字變溫爲瘡是就病之名目而言豈可以溫瘡爲兩症乎其曰春溫夏溫秋溫冬溫總屬強立名色其實皆因

四時感瘟氣而成病耳。其曰風溫濕溫溫瘧溫暑者卽瘟病而兼風濕暑瘧也。其曰瘟毒者言瘟病之甚者也。曰熱病者就瘟病之發於夏者而言耳。至千晚發之說更屬不經。夫冬天寒厲之氣感之卽病那容藏于肌膚半年無恙至來歲春夏而始發者乎。此必無之理也。而顧可習而不察歟。至於疫字傳以民皆疾解之以其爲病延門閉戶皆同如徭役然去行而加亥不近取其與疾字相關耳。是則瘟疫二字乃串講之辭。若曰瘟病之爲厲疫如是也須知疫病所該甚廣。瘟字原對疫字不過瘟疫者不過疫中之

二。症耳始終感溫熱之厲氣而發故以瘟疫別之此外尚有寒疫雜疫之殊而瘟疫書中却遺此二條竟將瘟疫二字平看故強分瘟病疫病又各立方施治及細較之其方論又譏無差別殊少情理斷不可從也吁瘟疫二字尚不明其義意又奚以治瘟疫哉

### 疫病有三種論

傳曰疫者民皆疾也又曰疫厲也中夫人如磨厲傷物也夫曰民皆疾而不言何疾則疾之所該也廣矣蓋受天地之厲氣城市鄉井以及山陬海澨所患皆同如徭役之役

故以疫名耳其病千變萬化約言之則有三焉。一曰瘟疫夫瘟者熱之始熱者溫之終始終屬熱症初得之卽發熱自汗而渴不惡寒其表裡分傳也。在表則現三陽經症入裡則現三陰經症入腑則有應下之症其愈也總以汗解而患者多在熱時其與傷寒不同者初不因感寒而得厲氣自口鼻人始終一於爲熱熱者溫之終故名之曰瘟疫耳二曰寒疫不論春夏秋冬天氣忽熱衆人毛竅方開倏而暴寒被冷氣所逼卽頭痛身熱脊強感于風者有汗感于寒者無汗此病亦與太陽傷寒傷風相似但係天作之

蓋衆人所病皆同且間有冬月而發疹者故亦得以疫稱  
其治法則有發散解肌之殊其輕者或喘嗽氣壅或鼻  
塞聲重雖不治亦自愈又有病發于夏秋之間其症亦與  
瘟疫相似而不受涼藥未能一汗卽解纏綿多日而始愈  
者此皆所謂寒疫也三日雜疫其症則千奇百怪其病則  
寒熱皆有除諸瘧諸掙諸痧瘴等暴怪之病外如瘧痢泄  
瀉脹滿嘔吐喘嗽厥瘻諸痛諸見血諸癰腫淋濁霍亂等  
疾衆人所患皆同者皆有厲氣以行乎其間故往往有以  
平素治法治之不應必洞悉三才之蘊而深究脈症之微

者細心入理一一體察方能奏效較之瘟疫更難揣摩蓋治瘟疫尚有一定之法而治雜疫竟無一定之方也且其病有寒者有熱者有上寒而下熱者有上熱而下寒者有表寒而裡熱者有表熱而裡寒者種種變態不可枚舉世有瘟疫之名而未解其義亦知寒疫之說而未得其情至於雜疫往往皆視為本病而不知為疫者多矣故特表而出之

用黨參宜求真者論

疫病所用補藥總以人參為最以其能大補元氣加入解

表藥中而汗易出加入攻裡藥中而陰不亡而芪术不能也則年高虛怯而患疾者有賴于人參爲孔亟矣第參非素豐家莫能致無已則以黨參代之夫古之所謂人參卽今之所謂黨參也故古有上黨人參之號上黨者何卽山西之潞安府也今日上黨所出者力雖薄弱而參性自在其質堅硬而不甚粗大味之甘與苦俱而頗有參意第較之遼參色白耳憶四十年前此物盛行價亦不昂一兩不過價銀二錢厥後有防黨把黨者出止二錢一斤而藥肆利於其價之廉隨專一售此而真黨參總捨而不行久之

且并不知真者爲何物而直以把黨防黨爲黨參矣豈知今之所謂把黨防黨者

把故以把名以其形類防風故以防名也將此物加入瘟疫藥中又焉能扶正而除邪也哉用黨參者必當向潞安求其真者而用之方能奏效但真者不行已久聞之濟寧藥肆中尚有而他處則鮮矣此外又有明黨洋參二種明黨形類天冬而兩頭俱銳洋參形似白蔴而其性頗涼總不知其爲何物皆不敢用至于藥肆中又有所謂廣黨者因出自廣東夫黨者地名也不曰廣參而曰廣黨其命名

先已不通又安敢服食歟真可發一笑也余閱本草云歲  
兼可代人參又閱醫書云少用無濟吾鄉山中頗有此物  
因擗取如法炮製而重用之冀其補益不意竟爲其所誤  
服之頭痛惡心尚意其偶然非藥之故後竟屬用皆然因  
知可代人參之說斷不足信也

治瘟疫慎用古方大寒劑論

夫古之黃連解毒三黃涼膈湯心等劑非古人之好用涼  
藥也以其所秉者厚故用之無寒中之患而獲敗火之功  
今人所秉者薄既不逮古而又兼之以鑿喪若用大苦大

寒之劑其何以當之。凡瘟疫之火因邪而生邪散而火自退矣。若用大寒之劑直折其火未有驅邪之能而先受寒涼之禍受寒則表裡凝滯欲求其邪之解也難矣。總之如黃連黃柏龍胆草苦參大苦大寒等藥皆當慎用以有生地二冬元參丹皮梔子黃芩銀花犀角茅根竹瀝童便葛根石羔人中黃輩加減出入足以瀉火而有餘矣。如果有真知灼見非黃連等藥不可少者分計多者錢計而止不可多用。

用大黃石膏芒硝論

或曰大若大寒之劑既在禁例而治瘟疫頗用三承氣自虎何也答曰石膏雖大寒但陰中有陽其性雖涼而能散辛能出汗解肌最逐溫暑煩熱生津止渴甘能緩脾善祛肺與正者之火而尤爲陽明經之要藥凡陽狂班黃火遍血升熱深便秘等症皆其所宜唯當或緩或生視病之輕重而用之耳大黃雖大寒有毒然能推陳致新走而不守瘟疫陽狂班黃譖語燥結血鬱非此不除生恐峻猛熱用爲佳至于芒硝雖屬劫劑但本草尚稱其有却熱疫之長而軟堅破結非此不可但較諸石膏大黃用之便當審慎

矣夫以大黃石膏之功能彰彰若是較之只有寒涼凝滯之性者其宜否不大相逕庭也哉此治瘟疫者之所不可闕也歟

立方用藥論

雜病用藥品過多或無大害卽如健脾者多用曰木固已再加山藥可也再加扁豆亦可也再加蓮肉棗肉亦無不可也卽如補腎者多用熟地固已再加枸杞可也再加菟絲亦可也再加茯苓首烏在實杜仲亦無不可也補藥固不厭多卽雜症藥品過格勿爲害尚淺覺其不善速爲減

去或可挽回而瘟疫不能也。卽如葛根治瘟疫藥中至和  
平之品，若邪在太陽，加之太早，反足以引邪入陽明矣。又  
如葛根與白芷均屬陽明散劑，而白芷溫散葛根涼散，白  
芷散陽風寒之邪，葛根散陽明溫熱之邪。若溫邪之在  
陽明，用葛根而再用白芷，必然掣肘。恐不似他症用藥繁  
多之帖然無事矣。所以瘟疫用藥，按其脈症，真知其邪在  
某經，或表或裡，併病合病，單刀直入，批隙導窪，毫不過五  
六味而已。至于分兩之重輕，則在臨時看其人之老少虛  
實，病之淺深，進退而酌用之。之所以書內記載之方，大半止

有炮製而無分兩欲以變通者俟諸人耳。

疫症繁多論

余於疫症既分三種曰瘟疫曰寒疫曰雜疫三者具而疫症全矣然猶未也憶某年一冬無雪天氣溫和至春不雨人夏大旱春杪卽疫厲盛行正瘟疫殊少而雜疫頗多有小兒發疹者有大人發疹者有小兒疹後而患痢患洩瀉者有大人患痢患洩瀉者有先瀉而後痢者有先痢而後瀉者有瀉痢而兼腹脹痛者有脹痛而不瀉痢者有瀉痢既愈遲之又久而復作者有瘟症既愈遲之又久而

復作者有復作而與前不同者有腹脹而不痛者有痛而不脹者有不思飲食者有單發熱者有先瘟症而後不語者有腫頭向者有週身長癩者有長疥者有霍亂者有身癢者有患瘟症而兼泄瀉者城市鄉井緣門閭戶皆同此豈達原飲一方所能療歟其治法亦與平常患瀉痢脹痛等疾亦異此皆雜疫之類也要之雜疫無病不有唯無噴膈夾遺之爲疫病者耳

### 治疫症最宜變通論

世之重疾無逾風勞鼓膈而四者之治總有蹊徑可尋如

風症止真中類中二條真中殊少治法無多止有類中亦不過氣血虧損而已故張景岳恐人認作風治特立非風一門究其治法唯大補氣血而止勞症卽云難治亦不過陰陽水火氣血先天後天視其何者虧損而補益之發脹有驅水理氣之殊噎膈止潤燥養血之法唯至千疫變化莫測爲症多端如神龍之不可方物臨症施治者最不宜忽也溫疫尚好治療識其表裡已得大綱卽有變現雜症如班汗發黃之類皆易捉摸卽雜疫如所謂諸溫諸瘧諸掙等症各具療法亦易施治唯乙巳年民之所患并非奇

疾怪症不過病疾洩濁肚腹脹痛等病有何難療孰意用  
平日治此疾法治之半皆不應或二三人同患一症而治  
法各異者施之此人而效施之彼人而又不效矣或有一  
人患是症而愈而復作者其治法又異施之首此而效施  
之後此而又不效矣若非具慧眼卓識而窺見垣一方者  
豈能人人而濟之乎蓋必深明乎司天在泉之歲正氣客  
氣之殊五運六氣之微陰陽四時之異或亢旱而燥熱煩  
灼或霖雨而寒濕鬱結或忽寒而忽煖或倏晴而倏陰或  
七情之有偏注或六慾之有慝情或老少強弱之異實或

富貴貧賤之殊途細心入理再加以望聞問切一一詳悉  
庶病無遁情而矢無妄發至于治法千變萬化隨宜用藥  
莫可名言故仲景曰瘟疫不可先定方。瘟疫之來無方也  
旨哉斯言疫病一門又豈一百一十三方所能盡哉是在  
留心此道者神而明之可耳

抄復論

凡治傷寒瘟疫醫者最重初次得疾至于抄復謂死者蓋  
寡每視爲最輕而謾不經意焉蓋謂抄復之病人身之經  
絡臟腑皆前次瘟邪所曾經傳遍之所則此番不過由熟

路而行故邪氣易出也古人原有此論豈知此第語其常  
也獨瘟疫盛行之時則不然蓋是時疫氣所積者厚卽無  
氣食勞損之因尚有重感厲氣而復者更有前番餘邪捎  
有未淨再醞釀滋蔓而抖然自復者是天地之邪與人之  
氣血膠固充塞鬱勃糾紛故復至三四次尚有隕命者矣  
慎毋以其復也而忽之

僅讀傷寒書不足以治瘟疫不讀傷寒書亦不足以

### 治瘟疫論

傷寒者爲寒所傷其來也有因故初感總以汗散爲主若

瘟疫並非因寒而得不可以治傷寒之法治之非唯麻桂不用。卽羌活十神等湯亦非對症之藥所謂讀傷寒書不足以治瘟疫者此也。至於瘟疫變現雜症之多幾與傷寒等吳又可瘟疫論中僅有班黃汗狂等數條。至於傷寒中之諸汙諸痛諸血症以及譫狂渴煩惕瞶瘛不語搖頭大小便等症之方論。瘟疫中可以裁取而用之者正復不少也。然必斟酌盡善而後可是。總在人之學力見解而非口說之所能盡矣。所謂不讀傷寒書不足以治瘟疫者如此。

讀傷寒書當先觀陽症論

傷寒書率皆將陰陽二症參錯並舉倏言陽症而用硝黃  
又倏言陰症而用桂附推作者之意雖相提并論而其中  
分析原自了然若曰陽症若此而陰症則如彼也讀者不  
善體會隨將陰陽二症攬作一團故有謂一人之病有忽  
陰而忽陽者有謂病在陽經爲陽症傳入陰經爲陰症者  
有謂陰陽錯雜而難分者物種支離不可枚舉卽不出乎此  
亦視陰症爲世所長有與陽症參半故臨症每將陰陽二  
字交戰於心而迄無定見無怪乎用藥差錯而悞人性命

也欲除此弊莫若分讀先習傳經之陽症將直中陰經之  
陰症暫行緩看蓋陽症明而習陰症自易易耳何者陽症  
頭緒繁多變現百出至于陰症並無傳變治法無多易學  
易療當點之雜症門中與暑濕霍亂諸中等疾爲一類則  
自無陰陽誤治之弊

舍病泊因論

吳又可書中有舍病泊藥之論此第知其一耳而抑知痼  
疫之有所因者更非一說之所能盡也蓋有因食因酒因  
痰因驚因鬱因氣因思水不與因飲水過多因過服涼藥

因誤服溫補因服諸藥錯誤因信巫祝擔擋種種因由未  
可更僕皆當暫舍其所患之癥而求其弊以治其因也食  
宜消之酒宜解之痰宜化之驚宜鎮之鬱宜開之氣宜順  
之水宜行之寒宜溫之熱宜涼之再佐以治瘟疫之藥始  
得非全拋而舍之之謂也更有兼食兼飲兼痰兼水等症  
而卒難得汗者治法畧同但又當以治瘟疫爲主而治兼  
之藥佐之矣總之務要寒熱溫涼之不差臟腑經絡之不  
感方可以起死人而肉白骨也是亦在乎神而明之者

瘟疫統治八法

解毒

凡自古飢饉之後或兵氣師旅之餘及五運之害制六氣之乖違兩間癘氣與人事交并而瘟疫始成焉人觸之輒病症候相同而飢寒辛苦之輩感者居多年高虛怯之人感之偏重是皆有毒氣以行乎間此毒又非方書所載陽毒陰毒之謂未病之先已中毒氣第伏而不覺既病之時毒氣勃發故有變現諸惡候汙下之後餘毒往往未盡故有自復之患是毒氣與瘟疫相爲終始者也茲定金豆解

毒煎以解其毒勢且能清熱並不用芩連梔柏而熱已殺  
殺音矣。

金豆解毒煎

自定新方

金銀花

三錢

菜豆皮

三錢

生甘草

一錢

陳皮

一錢

蟬退

去足起八分

井花

水

清晨煎首汲

或再加僵蚕

侵去一錢

銀花能清熱解毒療風止渴菜荳甘寒亦清熱解毒之  
品兼行十二經祛逐疫毒無微不入甘草解一切毒入  
涼劑則能清熱亦能通行十二經以爲銀花菜荳之佐  
陳皮調中理氣使營衛無所凝滯蟬退取其性之善退  
而熱毒愈甚  
煩燥愈甚  
而熱毒愈甚  
風寒羌防  
風寒溫君  
之禹溫君  
散結獐收  
去痘退熱  
僵蚕勝風

械大若兼  
大頭發頭  
咽喉諸症  
更宜加入  
鹽水

輕浮易透肌膚可散風熱開肌滑竅使毒氣潛消也此方於瘟疫十傳中皆可加減消息用之

菜糖飲目定新方

五谷皆可入藥如白虎湯之用粳米白朮散之用薏仁牡蠣散之用浮小麥疏鑿飲之用赤豆阿膠散之用糯米以及麥芽黃卷飴等項靡不各効其能以見於世甚至於麵合麵則稱之曰神黍製酒則推之曰聖取精用宏未可更僕數矣獨菜豆之功能世鮮有知者何菜豆之蹇於遇平菜豆性雖清涼而不寒苦且善於解毒

退熱除煩止渴利小水獨於治瘟疫爲尤宜焉張景岳  
有菜豆飲載在新方寒陣中雖極贊其妙但惜加入食  
鹽以之治瘟反益發渴而菜豆之功能隱矣今易以洋  
糖則既解毒且兼涼散瘟疫初終俱可服食乃平易  
中之最佳最捷方也至於窮鄉僻壤農家者流以及寒  
土征人倉卒苦無醫藥用此亦可漸次汗解卽服藥者  
兼服此飲更能添助藥力以成厥功經症未明者服之  
亦總不犯禁忌誠治瘟疫之良劑幸毋以平淺而忽之  
也

菜豆不拘多少白糖酌加

菜豆功全在皮毋去之

將菜豆煮釀湯取出加洋糖與飲冷熱隨病者之便以此代茶渴即與飲飢則拌糖並食其豆

針刮

針法有二用針直入肉中曰刺將針尖斜入皮膚向上一撥隨以手攝出惡血曰挑刮法有四有用蛤壳者有用磁  
盅者有用蒜芥者雅刮有用銅錢者凡刮或蘸清水或蓋  
水或香油余見刮痘疫者則用小棗蘸燒酒刮之瘡出紫  
疙瘩如熟椹隨用針斜挑破攝出血再另刮出疙瘩挑之  
刮畢挑止原其用棗蘸酒之意取其以火攻火固已不如  
易以草藤油蘸刮如無用麻汁搗草藤仁稍加水取濃汁更捷余見刮  
挑者往往待瘧邪入裡現譖狂等症方用之初感卽用此

方當更善也。至於瘧疾或有咽喉諸症則刺少商穴刺法  
並見下。或體厥脈靡疎刺少商穴並十指上薄肉穴道  
蝦蟆瘡甲蟲當中刺之血出如血不出可攝出之皆效  
一茎葉當中刺之血出如血不出可攝出之皆效  
覓處

刮針穴道 頸項後當中刮一道兩旁左右大筋上各

刮一道 左右兩肩軟肉處

靠肩井

各刮一道

兩肩下

脊背上軟肉處各刮一道

脊骨兩旁豎刮

自膀胱至腰

各

兩道

背後脇間肋縫中軟肉處左右各刮數道 前

夾傍軟肉處斜刮各一道 前脇間肋縫中軟肉處左

右各刮數道

每處如刮出紫泥瘀隨用針挑破搗血

涌吐

吐法近今多不講而抑知實有奇效也吳又可止言邪在胸膈欲吐不吐者方用此方而抑知瘟疫不論日數忽得大吐甚是吉兆將欲汗解也吳太史德菴宿病胃痛已極則吐偶感瘟症十餘日正危急間又犯宿疾胃口大痛移時繼以嘔吐困頓不支衆皆惶遽莫措求余診視余曰無妨可勿藥有萬不久當汗解矣衆以余言始走至夜果大汗而愈益吐中卽有發散之意彼觸動沉疴而吐者尚能發瘟疫之淫則涌吐之功又安可沒也耶

仙傳吐法

治一切瘟疫傷寒  
傷風傷酒傷食

飲百沸湯半碗以手揉肚再

飲再揉直至腹無所容用雞翎探吐吐後煎葱湯飲之

覆衣取汗甚捷初得病用之更宜

蘿蔔子湯位法

凡邪實上焦或痰食氣逆不通  
等症皆可吐可代瓜蒂三星散

蘿蔔子搗

碎溫湯和攪徐飲之少頃卽吐或吐不盡必從下行

又法

食盐少許炒紅入滾水寧稍淡勿過鹹取半碗漸次  
加增飲自然發吐以去病爲度治食傷痞悶膈痛手

足逆冷尺脉全無兼治冷氣鬼氣蠱毒又法  
燒鹽對熱童便三飲而三吐之治乾霍

又法

治積食胸悶  
不直汗下者

淡豉

食鹽

水煎服取吐

卷熨

景岳全書中有罨法止治傷寒結胸一症而抑知此法不第治結胸爲然凡瘟疫用藥後弗卽汗解俟六七日應汗不汗覽心腹中稍有悶痛等症用罨熨之法往往大汗而愈是亦一瘟疫取汗之良方也蓋內通而外未有不解者且不特此也舉凡瘟疫傷寒諸結胸痞氣支結臟結其有中氣虛弱不任用藥攻擊者以此法治之則滯行邪散其效如神並治雜症不論寒熱胸脇心腹脹痛版悶皆效

罨熨法

生葱

生薑

生蘿蔔

如無以子代之

歸原方云葱薑各數兩蘿蔔倍之愚意不如隨症  
加減更妙如有表邪或氣滯者生葱爲君寒多者生  
姜爲君燥食滯者蘿蔔爲君泛用各半分或葱多些  
亦可右用各數兩共搗微爛過爛則成水難仍入  
鍋炒熟住火用布包出一半熨患處冷則將鍋中熱  
者再包出熨之輪流更換覺透爲度無不開通汗出  
而愈

助汗

古有汗吐下三法而汗居其首者以邪之中人非汗莫解也吐雖有散意尚待汗以成厥功下之有急時因難汗而始用此是不諭傷寒瘟疫而汗之之功爲甚巨矣瘟疫雖不宜強發其汗但有時伏邪中潰欲作汗解或其人秉賦充盛陽氣冲激不能頓開者得取汗之方以接治之則汗易出而邪易散矣茲謹擇和平無碍數方以備以倘瘟疫之輕者初覺卽取而試之又安知不一汗而解乎

薑梨飲 治久汗不出

大梨一箇 生薑一塊 同搗汁入童便一盅重湯頻

服

取汗方

用新青布一塊冷水或黃連水浸過略擠乾置胸上良久布熱即易之須臾當汗出或作戰汗而解夏月極熱用此法他時斟酌用之

凡症熱在上中焦皆可用之清熱解毒邪解而汗出并能發

汗也

又取汗方

蕷朮 羞活 白朮 等分生薑汁爲丸彈子

大每用一丸男左女右緊擦對前陰處再乞勿葱湯取汗  
點眼取汗方

冰片一分 枯礬一錢 粉草一錢 共爲細末蘸無根水點

眼角先飲百沸水一二碗點後兩手緊撮兩肩屈膝片時卽汗二三次汗透卽愈

塞鼻手搘出汗方 譖語循衣摸床形如醉人且如猴像  
呃逆目赤俗云猴症實陽毒也

麝香 黃連 珠砂各三分 班毛一分

共爲細末棗肉爲丸銀珠三分爲衣作二丸用絹包一

塞鼻內

吳左女右

一搘手中出汗卽愈

松峯按此卽俗云猴藥也然此名不見經傳細參其方亦未可厚非故亦能取效麝香以開竅黃連以清熱硃砂以逐邪用班毛之毒以攻疫毒棗以和營衝銀珠以發散頗有至理存焉

葱頭梗米粥 治時瘧取汗

白粳米一碗

連根

甘根

加水煮粥煮一滾滾服取汗曾出汗者不用

洋糖百解飲 治痘瘡並傷寒

共研極細未收磁瓶內無令出氣遇時疫男左女右眼  
大眼角蓋破卽出汗

普救五瘟丹 專點傷寒瘟疫用水蘸藥點兩眼角一次  
不汗再點必汗出

冰片六分 牛黃一錢 麻黃二錢 琥珀一錢 生甘草三分  
共爲細末磁瓶收貯

又發汗方 瘟疫始得一二日頭痛壯熱脉盛 破砂  
水三盞煎一盞去砂飲之蓋被取汗忌生血物  
又方 破砂末酒調遍身塗之向火坐得汗卽愈

又方 頭痛壯熱脉盛 乾艾葉水煎

又方 生牛蒡根升空腹服訖取桑葉一把煎水煎服  
無葉用枝

又方 頭痛壯熱 生葛根汁一錢水一盞共煎一盞服  
如心煩熱加梔子一二錢

又方 頭痛煩熱 皂角燒新汲水一盞各少許研姜汁盞共和  
皂角末二錢服先以熱水浴淋次服藥取汗

止汗法癲病如大汗不止將髮入水盆中足露於外宜少益用炒匙濡米粉龍骨牡蠣殼共爲細末和匀周身撲之汗自止免致亡陽之患

療癩神應丹

發癩汗  
最速

肚年人身汙泥丸菜豆十七粒姜二

片黃葛心七个水一碗煎送

說男病用女女病用男  
說純用男人存參

除穢

凡瘟疫之流行皆有穢惡之氣以鼓鑄其間試觀入瘟疫之鄉是處動有青蠅千百爲群夫青蠅乃离穢之物且其鼻最靈人所不聞而蠅先聞之故人糞一拋而青蠅頓集以是知青蠅所聚之處皆疫邪穢氣之所鍾也更兼人之穢氣又有與之相濟而行者凡凶年飢歲廬戶遍野臭氣鶩空人受耳薰觸已莫能堪又兼之扶侍病疾歟哩道殣則其氣之穢又洋洋而莫可禦矣夫人而日與此二氣相習又焉得不病者乎使不思所以除之縱服藥亦不靈卽

靈矣幸愈此一二大而穢氣之彌淪布濩者且方興而未有艾也可不大畏乎茲定數方開列於左倘瘟疫之鄉果能焚燒佩帶則不覺穢氣之潛消而沉疴之頓起矣。

除穢靖瘟丹

自定新方  
太少閨家分帶時時聞臭已病易愈未病不染

蒼术 降真香 川芎

大黃

各二錢  
斧頭骨

細辛

斧頭木

係斧柄人  
斧頭之木

鬼箭羽 桃梔

小挑乾  
在困者

白芷 白檀香

羊躑躅

羌活

甘草

草烏

藁本

白芷 荆芥

乾葛

蝟皮

山甲

羚羊角

紅棗

乾姜 桂枝

附子

鋸灰 川椒

三奈

甘松

排草 桂

皮各一錢共明雄二錢殊砂二錢乳香一錢沒藥一錢四味一  
爲粗末另研共和

芩降反魂香

自蒼术

降真香

各芽分共未採入艾葉內編綃捲筒燒之除穢祛疫

### 宜忌

治瘟疫雖以用藥爲尚而宜忌尤不可以不講也不知所宜不能以速愈不知所忌更足以益疾茲特取所宜所忌者如于條開列於左俾病家醫者有所持循遵守庶投劑有靈而養病無弊矣

房中不可燒諸香祇宜焚降真

諸香燥烈降香除邪

不宜見日光

太陽真火

不宜見燈光

總以火故

臥須就地南方卽在地塘版

上布簾臥亦就陰遼熟之意衣被不可太暖寧可稍薄唯足宜

對症妙藥不必垂簾密室病者言不欲見風避之可也

風有應避不應避風能解熱清涼有滌疫之功正復家

常暖不必帶帽風有應避不應避風能解熱清涼有滌疫之功正復家

病時病後不可惱怒病時病後俱宜戒

食莫

過飽病時病後忌房事病後忌勞心力

病後忌房事病後忌勞心力

病後忌房事病後忌勞心力

蜜潤利之

愈後半月不可食葷

食節戒

忌飲

燒酒陸路不可坐車

震動之病增劇不救當宜靜不宜動

愈後浴冷水

慎心包

符呪

蓋聞河洛開靈符之源詛祝寄神呪之意載在經典炳若日星至於釋氏仙翁則更以符咒爲宗要神而明之可以飛升况以之却病乎茲取試之有效者敬錄數則以佐藥餌所不及皆出自佛經道藏並非邪說之可同日而語也

赤靈符

抱朴子曰五日朱書赤靈符着心前祛癰去百病正月元日佩

赤靈



符式

卷之三  
三  
避瘟神咒

唵嘛呢吽

音  
吽  
吽  
叱  
叱

遇疫癘盛行時用硃書黃紙土帶在身邊再不時須此  
神咒可避邪疫患瘟疫者汙後如見鬼神妄言不寐  
用硃書此呪佩之神效

禦瘟符咒

太上淨明禦瘟經畧曰天地無私陶鑄萬物本無善惡世  
人自私故生災禍飲食不忌服鍊不時善既無聞過則  
可述司罰之神得而窺測布此毒氣一及成疾不悟愆

尤不能保護反怨道咎師其疾愈甚大凡四時調養務  
在得中服藥吐納以生正氣我有神符使其佩服合免  
斯難兼有秘呪每日能齋而誦之神將日夜護衛竊蠹  
百神皆知其爲太上弟子畏而敬之誦至百遍百鬼頭

破腦裂而散咒曰唵𠙴

音訥

暮祇泥吽

音馬

囉

音朱


九天高明大使神功妙濟真君驅瘟遣痘消灾真符

二十字作一句讀

書符以朱書黃素左手五雷訣右手舉筆呪口洞天赤  
文丹靈耀虛驅瘟攝毒奉命天書金籙玉簡鬼鬼悉驅

太上有勑元君安居急急如太虛紫清律令勑

辟瘟符式



送瘟疫時灾吉凶詩

甲子送神神便去 乙丑若送損人凶

丙寅宜向南方送 送瘟之後主興隆

丁卯戊辰送必凶 己巳南方千里通

庚午辛未傷人命

壬申癸酉不回踪

甲戌須教大難當

乙亥丙子送西方

丁丑戊寅千里外

己卯直去不回房

庚辰辛巳送大吉

壬午癸未送西安

甲申乙酉與丙戌

送瘟去後不回還

丁亥送神仍舊病

戊子己丑宜西行

庚寅辛卯壬辰日

送瘟反見不安寧

癸巳之神病不愈

甲午損人不須詳

乙未丙申并丁酉

此三日送仍還鄉

戊戌己亥主半去

庚子辛丑西不歸

壬寅送神神不去

癸卯亦吉永無危

甲辰乙巳三口虧

丙午丁未南行利

戊申送神神又轉

己酉庚戌去無疑

辛亥壬子并癸丑

甲寅乙卯病依舊

丙辰丁巳不回還

戊午送來病相守

己未送瘟損人口

莫用庚申并辛酉

壬戌癸亥總不宜

仙人口訣當遵守

凡感瘟疫之家按花甲宜送之日有方向者照方向用

香楮送之無方向者隨便送之大吉

善後

瘟疫愈後調養之方往往不講而抑知此乃後一段工夫所閑甚巨也即如過飽者曰食復惱怒者曰氣復疲於筋力者曰勞復傷於色慾者曰女勞復載在經書世皆知之尚有時而觸犯此外人所最易忽者猶有三焉不在諸復之條者也雖亡愈多日而氣血苟不充足犯之隨有釀成經身之患者焉一口潘憲凡人房事必攝周身之精華以洩氣血未充七日未能來復慾事頻數勢必積損成劳虛

蘭損尊一日勞頓或遠行或作苦疲憊筋力當時不覺將來支體解体未老先衰其苦有莫可名言者一日忍饑愈後凡有覺餓必得稍食萬母強耐過時反不欲食強無亦不能化是飢時既傷於前強食又傷於後中州敗而肺金損則勞嗽脾胃之病成矣至者人多忽之故不可不謹

瘟疫六經治法

太陽經 頭痛熱渴

太陽以寒水主令手太陽以丙火而化氣於寒水陰勝則壬水司氣而化寒陽勝則丙火違令而化熱故太陽以寒水之經而易於病熱冬不藏精相火升泄傷其寒水閉封之氣火旺水虧已久及春夏感病衛門營導寒水愈虧故受病卽發熱作渴而不惡寒也太陽在六經之表是以感則先病其經自頭下項行身之背故頭項痛而腰脊強肺主衛肝主營而總統於太陽太陽之經在皮毛之部營衛

者皆皮毛之所統轄。痼病衛閉而營鬱滯，當清營熱而泄衛。歸治宜涼，金補水而開皮毛。元霜丹主之。

元霜丹 治太陽頭項痛，腰脊強，發熱作渴。

浮萍

三錢

麥冬

二錢

元參

二錢

丹皮

二錢酒洗

芍藥

一錢

甘草

一錢

生姜

三錢切去心

大棗

二枚劈

水煎熱服。覆衣取少汗。

一方去元參、麥冬，治同。

身痛、脈緊、煩躁無汗。

癰疽在太陽，脉浮，頭痛發熱，汗出以風強而氣不能閉也。若脉浮而緊，發熱惡寒，身痛，腰疼，煩燥無汗，而喘促者，是

寒束而邪不能泄也。蓋溫疫有汗，寒疫無汗，以風性躁泄而寒性閉藏，衛陽過閉，邪不能泄，營鬱莫達，則煩燥喘促與傷寒同治，宜以浮萍黃芩清散經絡之熱也。

### 浮萍黃芩湯

浮萍三錢 黃芩一錢 杏仁二錢泡去皮尖 甘草二錢炙 生薑三錢

大棗二枚

流水煎大半盃，溫服，覆衣。

煩熱燥渴

煩熱燥渴與前發熱作渴不同，故用白虎而不用元霜矣。

病在太陽，經未入陽明之府，不至遽生煩渴。若陽明燥盛之人，經熱外遏，燥氣內應，則見煩渴。陽明從燥金化氣，府

燥發作故有煩熱便難之證今府燥未作胸燥先動是以  
煩渴生焉其太陽表症未解宜浮萍石膏湯清金而解表  
絕其燥熱入府之源表症已解第以白虎加元麥湯清燥  
生津氣虛者加人參以益氣因表解而陽虛恐燥去而陽  
亡也

白虎加元麥湯 治太陽經罷煩熱燥渴

石膏三錢  
知母一錢  
甘草乙錢  
梗米一撮  
元參二錢

麥冬三錢  
去心一錢  
流水煎至米熟取大半盃熱服

人參白虎加元麥湯 治太陽經罷氣虛煩渴

石膏

三錢  
煅

知母

錢半  
酒炒

炙草

一錢  
去心

粳米

一錢  
撮

人參

一錢  
錢

元參

二錢

麥冬

三錢  
去心

流水煎

至米熟取大半盃熟服

陽明經

目痛鼻耳

陽明以燥金主令足陽明以戊土而化氣於燥金太陰勝則陽明化氣而爲濕陽明勝則太陰化氣而爲燥故陽明之經易于病燥冬水失藏相火升胃津槁脾精亦亡太陰之濕久化陽明之燥春夏感病衛陽遏閉營熱鬱發土焦金燥氣愈盛其經挾臭絡目行身之前故目痛鼻乾而身熱不卧陽莫勝于陽明燥熱在經不得泄越遲則胃府

積熱藏陰漸祐便伏異日危機於其麻熱未動之時涼泄經絡以清其熱則後患絕矣素雪丹主之

素雪丹 治陽明身熱目痛鼻乾不卧胸煩口渴

浮萍

三錢

石膏

二錢

研

麥冬

二錢

元參

二錢

葛根

二錢

丹皮

二錢  
酒洗

白芍

一錢

生姜

三錢

甘草

一錢

流水三盃粳米一撮煎大半盃去渣熱服覆衣取少汗  
嘔者加製半夏二錢

瘟病方傳陽明之經府熱未作法宜清熱而發表熱甚者必傷肺氣當用人參自虎湯清金泄熱益氣生津乃爲妙

善人參白虎湯見前

目痛鼻乾嘔吐泄利

三陽之經陽明爲盛足陽明從燥金化氣太陽表邪不解  
經熱內傳火性就燥必入陽明陰盛于裡而陽盛于表府  
燥未作經燥先動胆木逆行而賊胃土胃氣壅遏不能容  
受故嘔吐而泄利緣經邪鬱迫其周氣淡也

浮萍葛根湯 治陽明經證目痛鼻乾煩渴不卧

浮萍三錢 葛根二錢 石膏煅二錢 元參二錢 甘草一錢

生薑三錢 流水煎大半盃熱服

浮萍葛根芍藥湯 治陽明經泄瀉

浮萍三錢 葛根三錢 石膏乙錢  
煅 元參二錢 甘草一錢

芍藥二錢 流水煎大半盃熱服

浮萍葛根半夏湯 治陽明經嘔吐

浮萍三錢 葛根二錢 石膏二錢  
煅 元參一錢 芍藥一錢

生薑三錢 半夏二錢  
製 甘草五分 流水煎大半盃熱服

陽明府證 汗出潮熱譫語腹滿便秘

病傳陽明經不得汗解府陽素旺之人以經熱鬱蒸而府熱內作開其皮毛則見大汗淋漓第汗愈泄而土愈焦燥

愈增而熱愈盛每申酉之交應時發熱如潮次不爽是謂  
潮熱燥土消燥心液故譖語燥矢壅遏腑氣故滿痛遲則  
藏陰耗亡營氣鬱陷生死攸關不可不急下也泄以大小  
承氣而加養陰涼血之味臟陰續復營鬱外達矣。

調胃承氣加芍藥地黃湯

大黃二錢甘草一錢芒硝一錢芍藥二錢生地五錢

流水煎一盃去渣入芒硝火化溫服

小承氣加芍藥地黃湯

大黃二錢厚朴錢半枳實一錢炒芍藥二錢生地六錢

流水煎一盃溫服

大承氣加芍藥地黃湯

大黃二錢芒硝一錢厚朴錢半炒松實一錢芍藥二錢

生地六錢

流水煎一盃去渣入芒硝火化溫服不下再服

少陽經 腸痛耳聾

少陽經以相火主今足少陽以甲木而化氣於相火順則下蟄而溫腎水逆則上炎而刑肺金故少陽經最易病火痘病寒水失藏相火炎蒸已旺於衰廢之時春夏感病衛

閉營鬱熱盛火發勢富得令之候愈極重赫彼少陽傷寒  
二陽在表三陰在裏陽盛則熱陰盛則寒少陽居表裏之  
半是以徃來寒熱至於瘟病三陰經氣從陽化熱故但熱  
而無寒也其經自頭下項絡耳循腸行身之則故胸脇痛  
而耳聾火曰炎上炎上作苦故咽乾而口苦相火內鬱則  
刑肺金甲本內鬱則克胃土外無泄路勢必焦土流金而  
入陽明當以清涼和解之法散其炎烈紅雨丹主之

紅雨丹 治少陽胸脇疼耳聾口苦咽乾

柴胡二錢 黃芩一錢 芍藥一錢

甘草一錢

丹皮一錢元參一錢半生薑二錢流水煎大半盃熱服復衣取微汗

三陽經絡皆受其病而未入於府者法應汗之但瘟病災傷寒傷風寒濕異氣不宜麻桂辛溫滋以清潤之劑涼泄經絡燥熱方是瘟病汗法其傷在衛氣而病在營血營鬱熱發故用丹皮芍藥泄熱而涼營也

目眩耳聾口苦咽乾胸痛脹痞嘔吐泄利

瘟疫陽明經熱不解則入少陽之經少陽在二陽之裏三陰之表陰盛則傳太陰之藏陽盛則傳陽明之府少陽者

人府入藏之門戶。瘟疫營鬱熱盛，火旺木枯故。但傳胃府而鮮入脾藏。傳胃則木邪逼土府，氣鬱遏而生吐利。是宜清散邪，杜其入府之路也。<sup>理</sup>

小柴胡加花粉芍藥湯 治少陽經日眩耳聾口苦咽乾

胸痛

柴胡三錢 黃芩二錢 半夏一錢 錢半 甘草一錢 生薑二錢

芍藥二錢 天花粉二錢 流水煎大半盃熟

服覆不於微汗

大柴胡加元參地黃湯 治少陽經傳陽明胃府嘔吐泄

和

柴胡三錢 黃芩一錢 半夏二錢 鐘藥二錢 枳實一錢  
大黃二錢 生薑二錢 大棗二枚 元參一錢 生地二錢  
炒

淹水煎大半盃溫服

三陽博胃

瘟病經熱不解外泄無路斷無但在經絡不傳胃腑之理此自然之層次則宜用攻泄益胃土燥熱必燥藏陰其肺脾肝腎精液久爲相火煎熬益以燥熱燔蒸藏陰必至枯竭是當滋其藏陰泄其府熱勿令陽亢而陰亡也白英丹

主之

白英丹 治陽明府病。譫語腹滿潮熱作渴。

大黃三錢 芒硝一錢 瓜草一錢 枳實一錢 厚朴一錢 牛姜炒

元參二錢 麥冬四錢 去心 丹皮二錢 芍藥二錢 生地三錢

流水煎大半盃熟服

陽明戊土位居三陽之長陽盛之極必皆歸宿陽明而人胃府瘟疫三陰藏病悉以胃熱爲之根本雖曰五藏六府皆受病而陽明胃府實其綱領也其裏熱發作不拘在何藏府總以泄胃爲主而兼清本部但腸胃未至

燥結則第滋藏陰不須承氣卽燥結未甚亦當傷之經盡之後府邪內實始用泄熱滋陰之法一下而清矣若燥熱隆盛則不抑日數俱可泄下是當用傷寒急下之法不可循傷寒緩攻之條以其內熱鬱伏原與傷寒不同也

三陽傳胃發班

瘟疫三陽經病營蘭熱盛勢必內傳胃府胃陽素旺燥熱感發經府同氣表裏俱病府熱內逼而藏陰消爍過經不解則危瘟疫所最忌者營熱不能外泄蓋以衛盛而營衰

脾陰虛而胃陽旺也若脾陰不衰胃陽不旺六經既遍邪  
欲內傳而藏氣扞格外禦經邪熱無內陷之隙則蒸泄皮  
毛發爲班點而病輕矣若一入胃府府陽日盛則藏陰日  
枯不得不用泄法緩則泄於經盡之後急則泄於經盡之  
前府熱一清則經熱外達而紅班發矣

太陰經 腹滿嗌乾

太陰以濕土主令手太陰以辛金而化氣於濕土陽明盛  
則太陰化氣而爲燥太陰盛則陽明化氣而爲濕故百病  
之在太陰皆是濕而惟溫病之在太陰則化濕爲燥以其

冬水失藏相火泄而脾陰燥春夏感病營鬱熱旺渴氣自當愈耗其經自足走胸行身之前布胃絡嗌故病傳太陰則腹滿而嗌乾太陰之濕奪於陽明之燥燥亢濕祐必死是宜清散皮毛泄陽明之燥而滋太陰之濕此黃芩丹主之黃芩丹 治太陰腹滿嗌乾發熱作渴

浮萍三錢生地四錢芍草一錢丹皮二錢芍藥二錢

酒洗

生薑三錢流水煎大半盃熱服 一方去芍藥加棗名浮萍地黃湯治同

少陰經 乾燥發渴

少陰以君火主令足少陰以癸水而化氣於君火陽盛則丁火司權而化熱陰盛則癸水違令而生寒故百病之在少陰多是寒而惟溫病之在少陰則化寒爲熱以其冬不藏精水虧火泄春夏感病更值火旺水虛之候其經貫腎絡肺而繫舌本故口燥舌乾而渴腎者主水人身水火對列水枯而火亢則人亡矣是宜消散皮毛泄君火之亢而益腎水之枯也紫玉丹主之

紫玉丹 治少陰口燥舌乾發熱作渴

浮萍三錢生地四錢知母二錢元參三錢冬草一錢酒洗

天冬二錢去心 生姜三錢

流水煎大半盃熱服覆衣一

方加丹皮花粉去知母甘草名浮萍天冬湯治同

厥陰經 順滿農縮

厥陰以風木主令手厥陰以相火而化氣於風木治則木達而化溫病則火鬱而生熱以厥陰乙木原胎丁火故厥陰之經最易病熱瘟病衛閉而遏營血營鬱是以發熱而營藏於肝方隆冬火泄營血已傷騰沸春夏感病衛閉營過血熱更刷其經自足走胸行身之側循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮手厥陰之火扇以足厥陰之風風烈火炎

煎迫營血枯槁命頹是宜清散皮毛泄相火之炎而滋風木之燥也  
蒼霖丹王之

蒼霖丹 治厥陰煩滿裏縮發熱作渴

浮萍二錢

生地四錢

芍藥二錢

當歸二錢

丹皮二錢

甘草錢五

生姜一錢

流水煎大半盃

熱服覆衣取汗

厥陰發班

虛病傳至厥陰邪熱甚若木榮血暢經藏潤澤營熱不能內傳六經既徧別無出路則鬱極外發而見紅班若營虛不能透發過時班見而色帶紫黑營血敗傷多至不救

是宜解表涼血使其營熱發達亦藜蘆丹主之

吳又可用達原飲治瘟疫善矣但瘟之愈終由汗解往往有下後而仍自解以汗者是瘟疫之需汗也恐急矣回思能發瘟疫之汗者莫過於浮萍其性涼散入肺經達皮膚發汗甚於麻黃本草載之詳矣間嘗以之治瘧癭輒效後又質諸北海老醫黃王楸頗與余意合用之數年歷有成效始敢筆之於書并添三陰經治法以補又可之所未及第醫者意也茲不過規矩馬已耳但有是方未必有是病神而明之則又在存乎其人矣

瘟疫雜症治畧

蓋聞祖舉其凡曰畧瘟疫中雜症亦復不少而畧之可  
乎是未有說焉吳又可瘟疫論中已言者不載傷寒雜  
症門中治法可以裁取通融者不載未曾經驗與勦襲  
他人者不載除此四者雖欲不畧而不能矣蓋未敢師  
心也無庸多贅也若諱言畧而詳之是爲畫蛇添足

衄血

衄血症治多端傷寒書中亦詳哉其言之矣瘟疫衄血治  
法凡可以取用傷寒門者皆不採入茲第論汗散二條仲

景治太陽風寒在表而致衄者用麻桂以汗之然又論曰  
衄家不可發汗二者似乎相反而晦藏解之則謂衄家不  
可發汗者蓋爲脉微也若脉不微而浮緊浮緩者又當發  
散之矣蓋衄家之發散其經中之邪使不得擁盛於經  
迫而妄行是麻桂原非止衄之藥而其邪得散則不治衄  
而衄自止矣至於瘧邪在表而致衄者不唯麻桂不可服  
卽蘇芷防風亦無所可用差柴性升衄時似亦不宜唯服  
菜糖飲見前往往取效或加鮮薑數片紅棗數枚更妙蓋  
菜豆清涼而非苦寒之品洋糖發散而無升舉之虞再加

姜棗以調和營衛而表豈有不解者哉且散而不升而亦  
豈有稍于劙者哉或服不卽汗于煮豆時再加浮萍三錢

吐血

血出于肺行清道吐出於胃行濁道衄血之熱在經主表  
吐血之熱在腑主裡血之存於胃中者爲守營之血守而  
不走諸陽受熱當汗不汗熱毒深入於中其血爲火所逼  
而上逼於肺妄出於咽而爲吐矣亦有蓄血上焦而吐  
者血凝也此始終一於爲熱實者犀角地黃湯稍虛者黃  
芩芍藥等湯加減出入便可奏效仲景治壞病篇麻黃升

芝青文有  
文彩

麻湯雖治陰陽錯雜之唾血但不善用之反致害事至金匱之升麻鱗甲湯雖李文云此方治疫癘時症但亦用升麻似非吐血者所宜愚意凡吐衄等症藥性之升者總在所禁也

蓄血

血症應分爲三等衄唾吐嘔爲上部血結胸爲中部蓄血下焦爲下部夫血何以能蓄也吳氏曰病在太陽當汗不出則淤血在裡必血結也活人云失汗而熱蓄在裡熱化爲血其人善忘而如狂血上逆則善忘血下蓄則內急吳言未安此段決曰化爲血其

劉南瑛曰  
據字乃顛  
半之訛  
同硬坊本  
往往作  
數字非是

又可曰瘧疫失下邪熱久羈不泄血爲執搏留於經絡敗  
爲紫血溢於腸胃腐爲黑血便色如漆大便反易合此三  
說而蓄血之義始盡蓋病在太陽失汗熱蘊于中血爲熱  
所掠始留經絡繼溢腸胃則當下矣斯時又失于下邪熱  
久羈不泄瘀于下焦故少腹鞶滿急脹皮見青紫筋則蓄  
血之症成矣其兒症則有喜忘如狂發狂小便自利

大便色黑譫妄燥渴脉沉實結皆蓄血之侯醫者診視便  
當揣其少腹鞶滿而痛卽問其小便若小便不利是津液  
留結可利小便此属倍若小便自利者卽是蓄血矣若太陽

病有熱結膀胱太陽本經而如狂者症之輕者也宜桃仁承氣湯此增又略若陽明病有蓄血而喜忘者病之甚者也抵當湯難用可代以承氣之類加桃仁紅花歸尾等破血之物或兼虛者以玉燭散之類下之則蓄血去而病痊矣。

上所言者道其常也余有一孫名河方十四五歲感瘟疫廿餘日不解診其脉空虛而弱不任尋按亦并無喜忘如狂等症但終日昏睡不清醒按其腹雖覺微痛亦無鞭滿急脹等候醫有議補者余力持其不可伊時余方料理兒病未暇及孫亦未服藥靜俟數日突欲大便墮下紫血數

斗頓然清醒此時方知其爲蓄血若當時一用補劑則立斃矣足見治瘟疫者只知其常而不知其變猶作文看書之死於句下也可不慎哉筆之以俟高明者

班疹

班疹二字非以色言以形言也故發班有紅紫黑色之殊而皆以班名點與皮平絕不高起其曰蚊迹者狀紅班之成點者也曰錦紋者狀紅班之成片者也疹則其形高出皮膚之上大者若北方之高粱米小者若小米亦有紅紫二色而黑者殊少較之發班稍輕又有白疹發於衛分形如草種色自破之中有清水凡發此者最吉是邪從疹散也班疹形色已盡於斯先以班論總因邪毒不解留於血分所致如當汗不汗則表邪不解當下不下則裡邪不解

下之早則邪陷不解當清不清則火盛不解當補不補則無力不解

瘟疫少見

或陽症而誤溫補則陽亢不解陰症而誤

寒涼則陰凝不解

瘟疫無此

不解則直入陰分鬱而成熱以致

液涸血枯而發乃營衛俱虧之症凡汎下溫清俱不解及

足冷耳聾煩悶欬嘔者便是發班之候鮮紅者吉紫者五

死一生黑則十死一生並忌稠密成片凡班既出脈洪數

有力身溫足暖者易治脈沉小足冷元氣弱者難治凡已

出未出時切忌矣投寒劑并忌飲食恐傷胃氣作嘔吐又

已著臭薰觸又不可妄發汗妄攻下虛其表裡之氣其害

此段言用  
手太陰肺經  
之氣治外感病

尤甚若脈弱者或先有房事要在審問之凡治痘斑必細審人之虛實症之表裡脉之有神無神爲要異又可發班條祇有下之一法奚足以盡其變哉 成氏言發班者戒發汗而張景岳則以邪自外入者仍自內出凡脉數無汗表症俱在者必須仍從汗解以犀角地黃湯爲治班要藥而以成氏不可汗之說爲非愚意成氏之所謂不可汗者指麻桂紫蘇而言非指犀角地黃湯也

發黃

痘疫發黃唯陽明與太陰兩經有之黃者土之正色二經

但屬土故發黃蓋外不能汙內不得小便脾胃之土爲熱所蒸如合麵然故發外爲黃若小便利則熱不內蓄故不能變黃其有別經發黃者亦由脾胃之土受邪也但黃色不一寒濕之黃身如董黃色暗而不明熱盛之黃如橘色黃枯而明汙出染衣此其辨也而其致黃之由亦不一有蓄血在下焦發黃者有濕熱鬱積於內發黃者有因寒濕發黃者有因下之太過變成陰黃者有不因下而太陰經中聲<sub>寒</sub>之陰黃者唯瘟疫之黃止濕熱蓄血兩條瘀熱發黃原浮滑堅數其症則頭汗際頸而還腹微滿小便不利

而渴者是也。瘀血發黃脉微而沉或結其人如狂。小腹急  
結。腰游小便自利大便黑者是也。至於發黃而體如薰直  
視搖頭鼻出冷氣壞口齶黑者不治。

班黃並發

凡傷寒濕疫變現諸症相兼者多唯班黃二症少見同時而發者

從兄秉欽病發

黃旋卽發班余往診視甚骨骸異以其素虛隨用托理舉班湯茵陳五苓散二方中採擇加減服之班黃並發可奏效服一劑次早戰汗後班黃並退其病豁然隨名其方曰班黃雙解散慈緣於左以備採擇固擴而充之或班甚而黃輕者則以治黃爲重而以治班爲輕或黃甚而班輕者則以治黃爲重而以治班爲輕又或有先班而後黃者

有先黃而後班者。有發黃而兼發疹者。班黃之症不一巧。妙之治各殊叅伍以盡其變錯綜以盡其神。左右逢源。是在業醫者因時以制宜耳。

班黃雙解散  
自定新方

茵陳      猪苓      茯苓      澤瀉鹽水炒洗培炒梔  
生地      甘草      白芍      當歸酒洗

善怒

凡病人恒多焦躁此其常也。唯瘟疫之怒與凡病之焦躁不同其症或因人語言之稍有拂逆或細事之偶然不皆

在平時可以嬉笑處之而茲則入耳便怒不可解心中暗  
惱不休至昏贖時返將所怒之事從謠語說出而弗自覺  
也又或有靡所觸忤偶憶往事可惱者亦時時發怒能令  
心腹鬱悶脹塞與懊憹相似而實不同蓋懊憹方書中解  
之謂鬱鬱然不舒憤憤然無奈何之煩悶而甚者大也係  
下後之症且無所忤而自生者茲善怒則不論曾否汗下  
日日如斯甚有瘟病已愈而此症仍在者必俟能起坐如  
平時方止將謂此症不由肝胆而肝胆實司怒之經將謂  
其怒盡由肝胆而肝胆不任其疚何者肝胆之瘟邪退而

其怒仍在也唯投以理氣之劑而鬱悶稍舒然雖舒或有所觸而其病復發矣有似於陽厥而又非也書言陽厥怒病發狂者因陽氣暴折而難決故善怒病名陽厥蓋陽氣暴折故鬱而多怒治以鐵落飲加辰砂少許取金能生水之意且鐵性沉重最能墜熱開經五天曰陽厥者必有四肢厥逆之病方可以厥名曰怒病發狂者是狂而不肇於怒矣而茲則不厥不狂心中暗惱而不自禁也因名之曰善怒雖心腹鬱結難支然未見有以此殞命者唯專治其瘧瘧愈而怒自己矣或投以鐵落飲視其兼症而加減出入之庶可奏效也

狂

狂之爲病有三而陰症不與焉經曰重陽則狂又曰邪人於陰則狂諸經之狂總陽盛也一曰發狂蓋陽明多氣多血陽邪入胃府執結不解因而發狂其症則妄起行妄笑語登高而歌棄衣而走踰垣上屋呼號罵詈不避親疎數日不食皆因陽明邪熱上乘心肺故令神志昏亂如此是爲邪熱已極非峻逐火邪不能自己故但察其面赤咽痛潮熱噎氣五心煩熱唇腫口噦發黃脉實形如醉人大便梗結或腹滿而堅有可攻等症則宜以大承氣六一順氣

等湯涼膈散消息出入下之再甚則爲陽毒斟酌施治如無脹滿實堅等症而惟胃火致然則但以白虎湯抽薪飲等泄去火邪自愈。一曰如狂或當不汗或覆蓋不週而不汗大陽之邪無從而出故隨經入府小腹鞭滿小便自利下焦畜血經所謂熱結膀胱其人如狂是持如狂而未至於狂耳宜桃仁承氣下之則愈。一曰火邪驚狂其或薰熨迫汗灼艾燒針等治不如法令人煩燥起卧不安是也此傷寒中事瘟疫門原無薰灼治法故無此變症至於狂亂而兼小便自遺直視汗出輒復熱不能食舌捲囊縮皆

莊台

抽薪飲

黃芩

石斛

木通

炒梔

黃柏

枳壳

麸炒澤鴨鹽水炒

甘草

水煎

冷服

熱在經絡

者加連翹花粉在血分大小腸者加槐花黃連在陽明頭面或煩躁便實者加石膏在下焦加銀草單煎在陰分津液少者加之以生地白芍便結加硝黃

循衣摸床

瘟疫而至循摸勢亦危矣而治之得法亦有生者其一由

陽明裡熱之極者蓋陽明胃也肝有邪熱而移于胃故現此症胃主四支而風木乃動搖之象是循摸乃肝與胃虛邪熱所致也脈清者生適者死如有下症宜用承氣等湯其一由用火刦汗而然者小便利者生不利者死利則肺膀胱猶能化氣而腎水未枯也余曾見一人患瘧疫不時循摸詢之謂曾用火罐將胃口亂拔與其作汗變現此症遂用寒涼和解之藥而愈益未現下症第因火刦所致清之卽愈亦有不因火刦不因吐下後而有是症者總宜清涼和解傷寒書中亦有指循摸乃虛極而用微補峻補者瘧疫未曾經過

譖語譏語

傷寒譖語譏語解者紛紛考其字義譖語者不論寤寐亂言獨語如見鬼狀因胃熱上乘入於心爲熱冒肺神識昏亂錯妄如此俗謂之說糊話者是也熟之輕者也甚則狂語不休罵詈喊叫昏不識人而熟則深矣譏語者乃合目自言寤而自止較之譖語則更輕矣此譖譏二字之分也譖語向入陽明門以余之所閱歷三陽皆有而陽明居多耳亦有初得病而卽譖語者更兼昏不識人及不能食其心重若無此症或睡則譏語而寤則清醒或寤時偶爲

證語而有時止歇其病則輕矣。謚藏之日又自不同。有邪在表者，有邪入裡者，有邪在半表半裡者。有表虛裡實者，有汗後者，有下後者，有首血者，有燥屎者，有邪入心經者，有合病併病者，有過經者，有亡陽者。當察其兼症與脉與色與聲，與人之虛實始相其病情也。此專講邪熱之症，亦間有汗下後用補者而陰寒不在此例也。脉和易，愈短則死。身微熱，脈浮大洪者生，逆令脉沉微弱細急者死。或氣上逆而喘滿，或氣下奪而自利，皆爲逆後。

二便不通

二便雖出于二腸莫非皆腎之開竅也有因熱結大小腸以致津液不行熱無以泄者由此而譥妄發狂發黃發班等症隨焉宜苦寒下之有因過汗亡陰熱耗津液以致小便祕澀而大便燥結者宜潤劑通之若止小便閉者行大便則小便通徒利小便無益再者痘癰利小水與邪熱由之而泄但利之太過反致大便燥結者有之不可不知

休息瀉

自古病以休息名罕聞瀉而休息者也有之自余閱歷始此則不係之以瘟而係之以疫矣蓋因發時無少長皆同

也其病自長夏至秋皆有且有自夏徂秋而不愈者始終并無瘟疫表裡等症有兼脹者有不脹者食則不減而最惡飲水意其爲濕也而其時甚旱經歲不雨不知濕從何來渴時日數十行不治終不遽止長夏炎熱燥石流金投以健脾溫補之藥始痊閱數日而復作矣間或痊可再閱數日而又作矣纏綿不已有至數月者詢其復作之由半因吃生冷與飽食所致戒以只食七八分同煎藥月餘則不復作患此絕少不起者然病體支離莫

不利 即泄泻

瘧疫而見下利病亦不輕矣人抵屬寒者三熱者七濕其僅見者也而吳又可瘧疫論中協熱下利等說單以上論不亦偏乎第瘟病下利之屬寒者輕淺自不得與冬日感寒與直中陰經者同日而語也其屬寒者有三一則感原無大熱之瘟病而過用涼藥因致瘟不除而瀉又作此時宜舍病治藥只得先溫其裡裡溫瀉止而瘟病不除也再解其表瘟病原無汗法斯時仍用和解疏利觀其邪在某經細心施治治之而邪仍不解必其先此下利時有傷元氣陰虧營枯不能作汎此時又宜平補滋陰用熟地當

卷之三  
三  
歸白芍芍草再佐以曰术山藥蓮肉氣滯者加陳皮有寒  
者加煨薑不寐者加製半夏茯苓神嘔惡者加藿香調理施  
治則自然汗解而愈矣或見其大便不實忍下利復作於  
前藥中再重用茯苓製首烏白扁豆等藥消息施治無不  
獲效一則因大下後而泄瀉者亦因元氣虧損氣血傷敗  
或宜健脾或宜補腎或宜補氣血或宜淡滲或宜固澑視  
其病之輕重人之虛實而調治之一則有不因服涼藥與  
攻下而自利者或因歲氣之偏時氣之戾司天在泉之殊  
致飢餓旱澇之觸忤感而成病初覺亦頭痛身痛身熱發

熱自汗微惡寒繼則突然泄瀉却無譴語鄭聲脣冒舌胎  
燥渴斑黃等症其脉既不洪數亦不細微投以達原飲而  
利益甚投以元霜素膏等丹而利不除此症原無大熱乃  
瘟疫中之變局問其渴則惡飲水視其舌并無黃胎知其  
非熱利無疑總以健脾補腎爲主而以利水佐之此之補  
腎却不用熱地又恐其滑腸尤忌當歸唯用大茴烏菟絲  
出葵茯苓白术蒼术白扁豆人參陳皮炙草等藥消息施  
治此時反以下利爲本而痘疫爲標蓋泄瀉不止則元氣  
日虧表邪益不能解若下利止縱有表邪再於補藥中帶

和解施治况經此大泄瘟邪亦不能逗留矣再者下利雖有表症不可發汗恐走津液而胃益虛必成脹滿當先治利利止內實正氣復邪自解得微汗而愈蓋下利爲內虛若發其汗則內外皆虛變症出矣仲景傷寒論三陽合病皆能自利有發表和解攻裡之殊瘟病原無發表之說至於攻裡則用涼藥夫涼所以除熱也則試言下利之屬熱者熱下利必有兼症或有口苦咽乾唇焦舌燥謔語煩渴尿赤目赤潮熱等症則或用寒涼或用攻下通因通用在所必施摠之下利不過寒熱而端視其兼症皎若列眉

其因於寒者口無燥渴甚則惡飲水惡寒小便清白脣下多寒身雖熱手足逆冷此症寒熱背有糞色白或淡黃完谷不化

有如鶩溏澄澈清冷腥臭脈不洪硬且無力至於蹉卧閉

目向壁卧引衣自蓋出言微細不欲見明面如刀刮等症

則係冬月發寒直中陰經之候瘟疫下利雖寒亦無此矣

其因於熱者發熱煩躁欲飲口水燥渴小便黃亦寒症更

兼澀而不利寒症更脣下熱泄出作聲所下如垢膩奇臭其

色青黃赤醬色黑色後重得涼藥則止得熱藥則增其脉

則洪數浮滑弦大盛弱以此辨寒熱萬不失一治各不同

醫者宜審

頭汗

頭汗總爲邪熱上壅而陽氣內脫者間或有之頭爲諸陽之會三陰經不上頭故無頭汗所以頭汗屬陽經凡遍身有汗謂之熱越若熱不得越而上蒸陽分陽氣上冲津液上湊故但頭汗出也其兼症如太陽之熱結在裡陽明之被火灼與邪在半表半裡之往來寒熱及熱入血室與虛煩水結胸發黃蓄血等症但是熱不得越治法或散或和解或清或下除其邪而病自愈至氣脫頭汗則多以妄下傷陰或耗伐大過或泄瀉不止以致陰竭于下陽脫于上

小水不通而上見頭汗則大危矣○活人以頭汗出者慎  
下而張景岳治頭汗條有用承氣者始閱之疑其相背細  
看始知其皆是也活人之慎下指五臟乾枯胞中空虛津  
液少者而言景岳則以便結腹脹痛而頭汗者宜承氣以  
下之也視頭汗之兼症而下與否殊施耳至于有表邪脈  
緊數而頭汗當散者宜小柴胡及諸柴胡飲見景岳全書  
新方散陣中  
有火邪脉洪滑內多煩熱而頭汗當清者宜白虎湯益元  
散之類此治頭汗之大概也

盜汗

睡則衛氣行於裡內有伏熱其在表之陽氣不密故浮注  
得泄熱蒸于外腠裡開而盜汗出醒則氣行于表而盜汗  
止矣雜病盜汗責在陰虛瘟疫盜汗總邪在三陽所致三  
陽經俱有盜汗而邪在半表半裡者居多故總以和解爲  
治觀仲景論三陽合病之盜汗而歸重于但欲眠睡熱在  
胆經可知矣小柴胡湯主之

自汗

衛氣護衛皮毛禁固津液不得妄泄邪氣干之則不能固  
衛于外由是津液妄泄而自汗出焉瘟疫之自汗與他症

異多有感而卽患自汗者則自汗竟屬瘟疫中常事較之  
頭汗盜汗等反輕矣當專治瘟邪邪退而汗自止但亦有  
表裡虛實之異有邪在經而汗在皮毛者非真汗也有汗  
後邪雖稍減猶未盡痊者又未可因汗而謂其必無表邪  
也須因脉症而詳察之其在表者當于達原飲中加三陽  
經表藥以疎利和解之在裡者下之渴之清之至于雜症  
亦多有自汗者各有本門茲不贅汗下後虛極表邪盡去  
而自汗者方可用補稍有表邪輒誤補則大害

無聲

秉綱

方書多將失音與不能言合爲一症豈知失音者舌仍能轉運而喉中則寂然無聲也不能言者或舌強不能轉運或喉中格格難出而其聲自在也余以無聲解之自難與不能言者混呼矣瘟病無聲十不救一所謂此病喑啞不言三四日不得汗出者死也此症總由瘟邪入臟熱氣衝塞瘡灼以致然析之仍有數條有因邪熱衝心心氣耗損而然者宜清心降火用生地麥冬川貝花粉連翹竹瀝天竹黃竹葉黃連犀角之屬有因火燦肺金不能宣布者宜

清肺降火用黃芩、川貝、牛子、梔子、柿霜之屬有因熱痰壅塞而氣閉者宜清痰降火清痰則川貝、葉仁、胆星之屬降火則診視其火在何經擇用本經涼藥并加二片經化痰之品而兼用枳壳陳皮橘紅佛手中枯花之劑

有因失去此散邪伏肺中者當解散之蓋

肺形如鐘懸而叩之則嗚吟之聲言實以泥土斷無鳴理則之窒塞亦猶是枳火竈既散問亦靈而響發矣宜前胡防風水萍蒜葉桑白不得皮炎皮生至京日之屬

此症係大人之

此皆失音之類也。至於不能言亦有數條。有因風熱嘯  
盛。咳嗽聲啞者。以消風降痰之劑。躬之用前胡防風陳皮  
梵鈴薑蟲之屬。此症之最輕者。又有太陽發汗。身中灼  
熱。名風在肝。寸尺其浮。自汗。身重。多眠。鼻塞。語言難於宣  
藜蕤湯。又有狐惑症。唇上生瘡。咽乾聲啞者。又有大寒症。  
咽中生瘡者。又極症。口噤不能言者。當於傷寒與前症門  
中求之。是皆不能言之類也。又經曰。人之猝有暴亡而言  
無音者。何道之故。曰。會厭者。音聲之戶也。水厭乃氣喉之  
氣喉。不以掩飲食使

入寒氣客於厭。則厭不能發。發不能下。至其開闔不

花華詩集 卷之三  
致故無音云云此又以寒客經絡而致不語者亦無灼人  
經絡亦或有此理然不經見姑筆之以俟高明者

## 二瀝湯

竹瀝 荆瀝 梨汁

如無梨汁卽以西瓜汁代之如無荆瀝止用之以葛者  
等分和匀病急不拘時服此治瘧後失亦匀有理言取

之總訣

## 囊縮

囊縮爲足肥陰肝經受病因熱極筋枯而燥縮也以皆其

大小便結發熱引飲者急用大承氣下之若無下症而脈浮者宜汗緩者宜和六七日脉微浮微緩是有胃氣胃不受邪將作寒熱則大汗解矣陰症而裏縮者不在此例

結胸

吳又可瘟疫論中止有胸脇腹滿一症而抑知結胸痞氣瘟疫中皆有之且不因誤下而成者更多也論曰太陽癆表未解醫反下之膈內拒痛心下因鞭則爲結胸又曰從心下至少腹鞭滿而痛不可近爲結胸皆大陷胸湯主之夫曰胸內拒痛是胸脇間事曰心下鞭則兼胃之上脘而

言也曰從心下至少腹則又兼滿腹而言矣蓋表邪傳裡必漸而傳至心腹耳第大結胸最重小結胸次之痞氣則又其次矣經又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞而成因釋曰發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰夫無熱無寒似指寒邪直中陰經之症隨來陶張二氏之駁駁之誠是也而陰陽二字總未得真解故有謂傷風屬陽而傷寒屬陰者有謂在表屬陽在裡屬陰者紛紛聚訟隨成千古之疑愚意以爲何必儘推敲陰陽二字於閒處錯意不論大結胸以及痞氣支結

皆屬於鬱鬱而未有不結者總開鬱爲主而痞結自散矣又當審其兼證診其脈理氣暑順之調之血鬱者行之破之痰鬱者化之山之表鬱自散之和之裡鬱者攻之下之熱鬱者清之寒鬱者溫之

過疫無寒或過服  
寒涼藥或汗下後食鬱者

消之水鬱者利之而治痞結之肥事盡矣至於仲景用大陷胸湯治誤下之結胸想古人所秉者厚故誤下而復用陷胸不至爲害至陶氏則心知其未穩故有上焦乃清道至高之分過下則傷元氣之論然尚未敢深駁唯張景岳則云傷寒本病有不因誤下而實邪傳裡心下鞭滿痛連

益句作  
氣頭

少腹而不可近者此大陷胸湯所宜也至於太陽少陽表邪未解因下早而成結胸者若再用大陷胸是既因誤下而復下之可乎不若以痞滿門諸法酌輕重而從雙解或用葱熨法以解散胸中實邪此余屢用而屢效等語雖大翻仲景之案然明白洞達有至理存焉真長沙之功臣結胸之實筏最穩最捷者也且外熨法不特治結胸爲然遇瘟疫用藥弗效俟六七日應汗不汗之期覺心腹稍有痞悶疼痛用葱熨法見前往往大汗而解至于隔胸等湯一概不錄

呃逆

瘟疫呃逆不止者大是凶候余在長安治賀水部蓮友患  
瘧發黃而兼呃逆用承氣輩加茵陳與服大便行而黃漸  
退唯呃逆不止更兼喘而痰壅衆皆謂不治適得鮮花粉  
數枚大如臂搗爛少加水濾汁數碗外用前胡枳壳橘紅  
香圓柿蒂煎出兌花粉汁頻服一晝夜服盡呃逆稍止瞬  
息復作又令其仍將前藥再作一劑入碗內用箸一雙十  
字加於碗上令病者自持碗于箸之四空處每空吸藥一  
口圓轉疾次吸之持碗不得換手一順吸去此泛常飲水  
治呃良方以

以之服藥與其復效服後覺漸輕然時作止又遲二三日始愈若設之不治不幾誤人性命乎再者瘟疫打呃皆熱症丁香四逆輩斷不可用。

### 搖頭

頭爲諸陽之會陽脉有乘則頭爲之動搖經曰諸風掉眩皆屬肝木多因風火土乘所致風木動搖之象也古人治此有灸百會風府等穴者吾終不以爲然頭之所以搖以熱極生風故耳清其邪熱其搖自定何必用火攻耶又有心絕而搖頭者心絕則神去而陰竭陽獨無根不能自主

所以搖頭

瘛瘲

音熾縱癲與瘓字異瘓  
首記狂也瘋苟日瘓猶

筋急而縮爲瘛筋緩而伸爲瘲或縮或伸而不止者爲瘛  
瘲與小兒之發搐相似亦有嘴眼歪邪角弓反張有類於  
發瘲與中風者皆瘛瘲之類此症多屬於風風主動搐也  
而致此之由不一有瘟病熱極而生風者有其人本虛因  
汗不後血虛而然者有因汗後冒風而然者有汗下後因  
驚惱而然者有風溫被火而然者此症絕少大抵此症熱極生  
風只一條而虛者有數端虛者役以寒劑立見危殆若未

經汗下只因風火相扇者當平肝木降心火佐以和血之藥益心屬火主脉肝屬木主筋火爲熱木生風故耳藥則用羌活防風全蝎殼桑柴胡天麻生地麥冬白芍丹皮當歸川芎之類如熟甚黃連梔子胆草黃芩俱可酌用有痰者加黃仁胆星竹瀝若汗下後稍涉虛弱或冒風或因驚因氣惱而率從者斷不可用寒劑養血祛風湯主之至於汗下後多日傳變而爲癰瘍以及出汗露風汗出不透與被火刦等癥瘍俱載傷寒門中茲不贅

養血祛風湯

自定方

熟地

當歸 酒洗 白芍 酒炒 川芎 酒洗 半夏 煥

殼亟

泡去涎培 天麻 酒蒸

生薑大棗爲引

若虛甚者加入參有風者酌加羌活白芷柴胡防風

渴

瘟疫鮮有不渴者故弗可以不講也邪在表則不渴在裡則渴三陽雖亦有渴症但不如三陰之甚也故太陰腹滿嗌乾少陰口躁舌乾而渴厥陰則消渴矣飲水多而小便少能清水故也瘟病之渴一曰爲熱初傳則熱微而渴微傳深則熱甚而渴甚但未有不見兼症而獨渴者施治當先問其所飮

欲冷。欲熱。欲多。欲寡。飲多欲令屬熱。更須審其表裡經臟曾否汗

令屬熱。

下。於瘟疫初起及十傳與六經治法中細尋症脈斟酌用藥。第治其瘟邪而渴自除矣。倘不應當於傷寒發渴條中採取施治所最要者飲水。常使不足。毋令有餘。不甚渴而多飲則悸動支結喘咳同噦。脹滿泄瀉。小便不利。諸症起矣。然又不可禁飲。凡瘟症有欲愈而思飲者。蓋得水則能和胃氣而汗解也。禁飲多致悶亂不救。

腹痛

瘟疫雖屬熱症而腹痛則有寒熱之殊。但熱則興常而寒

則其變也寒痛多有所因或服涼藥過多或不宜用涼藥而妄投或妄意大食生冷物或汗下後正氣虛而感寒皆能致痛或因病中惱怒氣滯積食者亦有之無故而痛者絕少卽有之亦必因腹素有積因瘟病而觸發之者也凡腹痛但將涼水與飲而試之若飲水涌稍可者屬熱痛劇者屬寒若繞脅輒痛大便結實煩滿而渴氣粗噎氣者皆屬燥屎與實熱痛也急用承氣等下之因食積痛者更有惡食惡心噫氣腐臭等症治亦同若小腹輒痛小水自利大便黑身日黃者屬蓄血亦用寒劑加行血藥下盡黑物

自愈凡實熱痛必脈來沉實有力若微弱者仍當詳審從緩治之若飲水愈痛或時綿綿微痛不甚亦不止重按則愈脅鳴泄利澄澈清冷口吐苦涎此爲寒痛當用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷嘔吐瀉利者急用熱藥杖之瘟病殊少此症如有必因過服涼藥生冷感寒但須詳脈之有力無力如腹痛而兼身大發熱惡飲水嘔惡脅鳴如流水聲此表熱邪內寒也先溫其裡次解其表

短氣

短氣者氣急短促不能相續似非喘似呻吟而無聲也

有實者虛者在表者在裡者水停心下者或失于汗下。或汗下後虛極皆能令人短氣補瀉誤用甚於操刀當謹察脉症而治之又有素虛人汗下後失于調補以致忽然似喘出言微弱少氣脈僅二三至沉細如髮甚至無脉此虛極短氣非真喘也急宜溫補緩則不救乍喘治必死汗下後過用利消之劑而見此者治亦同總之短氣者表裡虛實寒熱皆有但虛者較多當合脈與兼症而組之

瘧疫兼暑

瘟疫兼暑最難分晰蓋暑病之在表者有頭痛煩燥肌體

大熱脉浮氣喘口乾面垢自汗手足逆冷名暑厥摘攝名暑風昏不知人爲中暑其症最易與瘟疫表症相混暑病之在裏者有嘔逆泄瀉心腹痞悶或兼脹痛又最易與瘟疫之在裏者相混唯於少氣倦怠大渴三症辨其爲暑或爲瘟疫亦發渴但瘟症在表雖渴亦不甚必至傳裏方甚至暑症不論表裡皆渴而在表時其渴較瘟疫之表者更免猛殊甚也以此爲辨庶得其情如果係瘟兼暑症卽當用解瘟却暑之劑亦不必拘於日期見表治表見裡治裡又宜先治其瘟瘧解而暑亦從而退矣馬走行以五瘟丹

治瘧暑但中無治暑之劑不過涼散方亦未盡可用倘遇此症仍當於達原飲中將祛暑之藥加減出入之至於五

瘧丹每歲冬間預先修合備用亦可至法暑等方載在暑

門茲不贅

瘧症發熱無休時暑症發熱有作止以此爲辨  
告應與署系亦宜以此作準仍當詳察脈症

### 瘧疫兼濕

活人曰其人傷濕又中於暑名曰濕溫兩脛逆冷腹滿頭目痛妄言多汙其脉陽浮而弱陰小而急疾者白朮湯白虎加朮木湯切勿發汙汗之名中喝必死而吳氏引活人書曰宜术附湯加人參香薷扁豆之金鑑曰溫病復傷

於濕名曰濕溫其症兩脢逆冷妄言多汗頭痛身重胸滿  
宜白虎加蒼朮茯苓溫濕兩治若脈大有汗自汗煩渴者  
人參白虎湯加白朮主之輕者十味香薷飲清暑益氣湯  
增損用之按古人治法不過如斯但金鑑曰溫病復傷於  
濕曰濕溫而活人則曰傷濕而又中暑曰濕溫味其義意  
當遵金鑑爲是蓋傷濕而又傷暑只可謂之傷暑濕而不  
可謂之濕溫也夫曰濕溫者是濕而兼瘧也或先瘧而中  
濕或先濕而患瘧與暑何涉焉第瘧疫兼濕又最難辨

盡痛痛極且不能轉側惡飲湯水目中視物皆紅黃身日色微黃而無譙妄等症者辨之始得而濕症之中又有濕熱寒濕之分總宜白朮茯苓湯濕熱者小便赤澁如馬尿渾濁色白且有頑熱大便秘結諸症宜人參白虎湯加白朮主之或四苓散大小分清飲茵陳飲之煩皆可擇用若天久陰雨濕氣過勝其人藏腑虛大便滑小便清乃是寒濕宜采附湯但瘟疫發在熱時且兼濕熱者多而兼寒濕者少未附湯不可用若服茯苓白朮

等湯不應則用除濕達原飲分治瘟與濕誠一舉而兩得

也北方風高上燥患者少唯南方水鄉卑濕天氣炎熱  
患者恒多春冬感者恒少而夏秋患者恒多所宜隨其時  
地而變通之至於前所引活人云濕溫切勿發汗而金匱  
要略則云濕家身煩痛可與麻黃加白朮湯發其汗爲宜  
景岳全書又曰凡濕從外入者汗散之將謂止中濕者宜  
汗而兼溫者不宜汗何以準繩濕溫門中旣引活人云不  
宜汗又引金匱曰宜汗更引成氏云濕家發汗則愈是濕  
溫一門前後又自相矛盾殊不可解愚意濕症始終不宜  
發汗雖兼之中濕而尚有瘟疫作祟是又當以瘟疫爲重

而中濕爲輕自不宜發汗當用和解疎利之法先治其癰俟其自然汗出則濕隨其汗而與癰并解矣或癰解而濕仍在者當于濕證門中求之故治濕諸方俱不開列

除濕達原飲

自定新方

梔榔一錢草果仁研五分厚朴一錢薑白芍一錢  
甘草一錢梔子研五分黃柏汁去渣五分茯苓三錢  
酒炒

如兼三陽經症仍酌如柴葛姜活鹽而兼濕故去知母而換黃柏以燥濕且能救水而利膀胱去黃芩換梔子寫三焦火而下行利水加茯苓利小便而兼益脾胃三

者備而濕熱除矣再加羌活等藥風藥亦能勝濕溫陰  
散一舉兩得此方分兩不過大概臨症加減用之

石草散治濕瘟多汙妄言煩渴等石羔 煙炙草等共末漿水調服二錢

瘟疫兼痢

吳又可用梔芍湯係治瘟疫之裡症而兼痢者若有外症  
仍當解表必如喻嘉言分三次治法始足以盡其變至表  
裡俱病者又當表裡分治總宜治變不可膠執唯松花散  
治瘟毒熱痢頗著奇效未可以易而忽之又按傷寒便膿  
血有誤發淋家汗而然者用倍芩湯有病在少陰者治以

桃花湯諸說於痘痢總不宜用蓋痢由瘧而作者如終一  
於爲熱也唯雜疫中痢疾原無瘧疫之頭痛身熱發熱自  
汗以及心腹痞滿不食譫語等表裡諸症而沿門開戶止  
患痢疾者則有虛實寒熱之殊其治法亦因之各異矣凡  
病身熱脈大者難治身熱脈小者易治

松花散 治瘡毒熱痢

松花

二三錢

煎薄荷滾湯入蜜調服以愈爲度無不效者

取松花法於四月初看松梢所抽黃穗如麥穗者趁硬  
摘取攤在布被單上晒乾即有麪落下如蒲黃磁器收

貯伏天必晒否則穿發取黃穗不可早早則嫩而少黃  
麵又不可遲遲則花莊飛而穗成空壳矣看其穗硬而  
帶黃色大如稭粒則取之又松花和入米粉中入白糖  
可蒸糕食甚香美呼爲松花餅

大黃酒

使膿血硬急後重腹痛晝夜煩不止宿次日溫飲

大黃

五錢好黃酒一兩盅凌一宿次日溫飲

瘧瘧

凡瘧寒熱如期而發餘時脉靜身涼常也以瘧法治之設  
傳胃者必現裏症應下之症名爲瘧瘧以瘧法治者死當以瘧  
疫法治之此症下後裡症除寒熱獨存者是瘧減瘧在瘧

邪未去者宜疎清脾飲邪去而瘧勢在者宜截不二飲勢

在挾虛者宜補四君子湯三方見瘧門不附載

丹蒿散 治瘧瘧不止

黃丹

五錢炒

青蒿童便浸晒乾二兩爲末

每劑服二錢寒多酒服熱多茶服

鵝齡棗 治瘧疫邪瘧

取紅棗一枚咒曰華表柱一氣念七遍望西北方取氣

一口吹棗上令病者吃之

便蜜飲 治瘧諸瘧無問新久

童便一  
鹽白蜜二  
匙共攪去白沫頓服取吐碧綠痰出爲妙  
不然終不除

妊娠癥疫

吳又可治孕婦癥疫用三承氣與利除害於反掌之間固已但方中定當減去芒硝蓋芒硝乃軟堅之物用之能使胎化爲水倘暫清燥實堅皆俱極數用生大黃而止否則止用熟軍爲妥胎與腸胃絕不相關大黃蕩腸胃而破堅燥未聞能下胞孕者服之何害至云大黃爲安胎之聖藥建專爲裡症應下者言之若邪尚在表者當速散其表邪遂使內陷爲上乘也

單胎散 孕婦癥疫恐傷胎氣

嫩捲荷葉

晒乾宜平時收貯臨時急用則烘乾

五錢

蚌粉

二錢五分

右共爲末每用新汲水入蜜調服三錢再作一劑塗腹上

又方 井底泥塗足心治孕娠時症令子不安

又方 用竈底中對鍋臍土研細水調服仍塗臍乾再換

塗臍散 井底泥青黛伏龍肝共末調勻塗臍上乾再換

黃豆煎 大黃豆六粒水二盨煎一盨取沫病重再一服

妊娠熱病 車轄脂黃酒和服 青羊屎研爛塗臍安胎

又方 雞子一枚納井中令冷取出打破吞之令胎不動一

妊娠時行并感寒

大鯽魚

一尾燒黃酒冲服如無汙腹  
存性研

中熱痛醋和服取汙 热病

葛根汁頻服

小兒瘟疫

瘟疫盛行之時小兒如有發熱等症或可斷其爲疫倘瘟疫不行之年而小兒忽感瘟疫於何辨之哉亦辨之於採篤身熱而已第傷寒瘟疫皆身熱又當細問乳母曾否突然脫衣洗浴入水當風而寢等事果實無感冒方呼向瘧疾上找尋又必驗其有目赤便赤舌乾胎黃黑日晡潮熱諳語斑黃或大便秘結或挾熱下利赤膠等症方可斷其

爲痘疫若妄意雜症爲痘疫則又失之矣。吳又可專言俗醫妄意小兒痘疫爲雜症者是祇見一邊矣總之辨小兒痘疫是極難的事。

桃葉浴法 桃葉三四兩熬水日五六遍澆淋之再用雄鼠

屎微燒取二枚研水和服

二香散天行太熱分木香末三分檀香末三分清水和服仍用溫水調愈

痘疫雜症簡方

鼻衄

茅花湯 治衄不止茅花尖一把水三盅煎一盅服

無花根代

止血歌

石榴花瓣可以塞蘿白藕汁可以滴火煅龍骨

可以吹

龍骨能治九癥出血水煎茅花可以吃堵頭苔蘚可以塞

車前草汁可以滴火燒蓮房可以吹水調綢煤可以吃

熨法木治衄如湧泉用草紙疊十餘張井水濕透分開髮

貼項心熨之卽止

炒梔子吹鼻 山梔炒黑爲末吹鼻外用濕草紙搭於鼻上

卽止成流久不止者方可用此法如點滴不成流者其邪在經未除不必用之

又方 薑汁磨墨服並治吐衄

無華用根

愈後鼻衄不止 用青綿線將兩手中指第一節屈伸處緊扎再用綿紙剪成一二指許寬條疊數十層新汲水濕透搭於兩肩頭上熱則另換又用好黃酒四五盞令兩足浸其中立止

滑石丸 滑石未飯尤梧子大每取十九粒微嚼破新汲水送下立止此治衄通劑

齒衄

椒箬飲

川椒粒

四十九  
開巳少

許 酢煎服

吐血

生葛汁

取生葛根切碎搗爛少加水滯取汁頻頻飲之

治吐衄血神效並治陽明癰熱之毒大效不獨止吐衄

逐疫七寶丹

治時疫熱毒口鼻出血等症神效毋以其

易也而忽之兼治諸熱毒并衄毒

人糞尖

七枝約粟  
大燒紅色

取出卽入冷水中研細再頓服

蓄血

生地黃湯 抵當湯尤今總難用以此代之甚覺和平

生地二三錢 乾漆一錢炒 烟盡 生薑汁一小盅如無以大藍葉

薑一二錢代之

藍葉六分

錢半 大黃一二錢生 桃仁一錢去皮研 櫻尾二錢紅花酒洗

酒洗

水與藕汁同煎 原方水蛭蟲虫今改用歸尾紅花茜  
血有上中下之殊上焦脅中手不可近而痛者犀角地  
黃湯中腕手不可近桃仁承氣腑下小腹手不可近抵  
當嫌峻猛此湯主之或再加枳實蘇木用者酌之

發班

黑膏 治瘧毒發 如錦紋 生地配淡豆豉配 以猪

油半斤合煎之至濃汎次人堆黃末五分麝香六分丸  
彈子大白湯化一丸未見發再服

青黛一物湯 通治發斑 青黛水和服

歸葛飲 治陽明溫暑大熱渴 當歸 葛根即者  
更好 水

煎冷水浸涼徐服得汗即愈

又方 只用鮮葛根一味剉碎搗汁濾出任意飲大治陽  
明癥瘕

玉泉散 治陽明內熱煩渴頭痛二便閉結發斑發黃及  
熱痰喘嗽等症此益元散之變方也其功倍之

石膏六兩粉草一兩珠砂三錢共爲細末每酌服一二

生用

生用

錢

共爲細末每酌服一二

三錢新汲水對滾水服

治赤斑方 獨脚烏柏根 研酒服甚效

治出斑方 暑月昏沉未明症候恐是出丹以生黃豆數

顆食之如不覺腥卽以生黃豆泡研汁一小盅和水服

治發斑固篤 蟻蜍早地中去頭宜去皮與頭恐有酥生搗食

一二枚次如不效再帶皮與頭搗服

鮎魚頭骨灰散 治傷寒癰瘍癰瘍不能發服此卽發

鮎魚頭骨

燒灰

研細熱黃酒調服二三分

青木香煎

治發斑疹

青木香一兩水煎服效若脫滿

不得小便用雄黃細末蜜丸棗核大納澀孔中

發斑怪症 目赤鼻張大陽渾身出斑 毛髮如銅鏡乃熱

毒氣皆於下焦也

白芍

滑石各一兩

共末水三盅

煎減半不住服盡效

麥奴丸

麥奴李馳  
烏微也

治陽毒溫毒就極發斑爲救急良藥

麥奴

柴上塵

全底果

肚突墨

麻黃

黃芩

大黃

朴硝等分

爲末蜜丸彈子大每服一丸水下

發斑赤黑

青木香一兩水

三盃煎一盅服

斑疹出不快

鈎藤鈎

紫草茸等分末溫黃酒服一錢

發斑取汗

猪胆汁醋等分

雞子於合煎服汗出愈

不愈再服

### 發黃

生姜退黃法

生姜周身擦之即退

又茵陳羹

茵陳煮食生食亦可並治黃

黃芩江方

治發黃目不識人

生葱煨熟去粗皮用心

扭汁蘸香油點二目大小眥

劉尚書方

治濕熱發黃昏悶不省死在須臾一白毛鳥

骨鷄一隻乾持去毛破開去脢雜搗舖心頭少傾即活

治發黃法 用麻油半盅水半盅蛋可一枚攢和服

吹鼻法 瘧疫三日外心腹脹滿堅硬手心熱遍身發黃

苦瓜蒂七末以少許吹兩鼻令黃水出餘未水調服

蓼汁硝蜜飲 治發黃心狂煩熱 大括頭一箇黃的新汲水

淘浸取水入蜜半合朴硝八分和令匀存硝化薑服之

竹麥飲 治黃 竹葉小麥石膏分兩兩臨時酌定水煎細服盡劑

又方 醋浸瓣子數枚一宿去壳吞其清

又方 髮灰燒研水服口三

狂凡狂熱不可掩閉牀帳務揭開放入反氣病人如覺惡風則不必矣

三白飲 治熱極狂亂及熱不退

鷄子清

白蜜

大

者更良 芒硝酌用共和一處再用涼水和服如心不寧加

珍珠末五分

靛青飲 治天行瘟疫時氣熱毒煩躁狂言尚未至發狂

之甚者亦皆可服

靛青

一大匙

以新汲井水和服

獨參丸

治發狂不避水火

苦參

拘多 不拘爲末蜜丸梧子

大薄荷湯下二錢水亦可

治狂走

雞子壳

出過

小泡滾水服卽安

渾圓丸

治舌黃煩躁狂言發熱

庄鷄子吞一二枚

又方 蚝螂治瘟病大熱狂言蠅糞新汲水和服亦妙

鵝石散 治發狂踰牆上屋 黃連 寒水石 等分爲

末每服二錢濃煎甘草湯候冷調服

鐵胆飲 陽毒生臍譙妄走 鐵粉

一兩胆草五錢共未磨

刀水調服二錢小兒五分

元沙丹 治發狂 元明粉

二錢朱砂一錢

共未冷水服

又方

胆草

未二錢

雞子清

一錢

白蜜

一匙

涼水化服

黃雪膏

大黃不拘多少

炒黃

爲末雪水熬如膏冷水和服亦

治發黃

又方 狂走見鬼 蚯蚓數條去淨泥人尿煮汁飲或生絞汁亦可

又方 治狂走 瓜蒂末井水服一錢取吐卽愈

又方 人糞入罐內泥封煖半日蓋地下出火毒研新波  
水服三三錢未退再服

又方 大熱狂渴 乾陳人糞爲末於陰地淨黃土中作  
小坑將糞末入坑中新汲水和勻良久澄清細細與飲  
卽解

醋治狂法 陰狂陽狂皆治陰狂無 於病人室中生旺  
火一盆將好醋一大碗傾於火上病人聞之卽安兼燥

渴者人硝半斤於冷水內用青布一塊浸硝水中取出

搭胸上布熱再浸換如得睡汗出卽愈

一法用鏡按  
胸上亦得

兼舌出不收將麻黃水洗淨舌用冰片牛黃麝香研末

點舌卽收或止用冰  
片亦可

### 結胸

苦參飲

滿痛壯熱

苦參

一兩  
未

醋三盞煎一盞飲取吐

牽白飲

心腹硬痛

牽牛子

未  
錢

白糖湯調服

地龍飲

按之痛極或通而復結喘促狂亂

生地龍

四條

洗净胡  
如泥入生姜汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水調

卷之三  
服若熱熾加片腦少許服搽心下片時自然汗出而解  
不應再服神效

呃逆

枳香散 枳壳五錢木香一錢共末滾水調服一錢不應再服

又方 四花青皮全者滾白水服一二錢

又方

黃蠟

燒烟黃二  
三次卽止

痢

霜連散 治挾熱下利膿血 百草霜 川連等分共末

黃酒下二錢日三

連梅丸 慊口 川連五錢 烤烏梅肉三錢 共未蠟蜜丸桐子

大服二十九日三

連艾煎 治同上 川連一錢 熟艾二錢煎服

豉蘿湯 暴痢豉一  
兩 蘿白一  
根 捺冬水三盞者 繫納豉更煮  
色黑去豉分二服

龍骨湯 毒痢大煩渴作熱三焦瘡癰張口吐舌生瘡不  
識人目爛龍骨半升水一斗煮四升用器裝臘封固口沉非底過  
夜取出徐徐飲

又方 下痢欲死 龍骨半斤研水一斗煮取五升候冷稍飲得汗愈

煩躁

苦參散 治狂躁並結脅 苦參末黃酒調服二錢已汗未汗者皆可服

花粉煎 煩渴花粉煮濃汁飲先以竹瀝和水入銀同煮取水冷飲然後服花

又方 生藕汁一盅酌加生蜜和勻細飲

竹瀝飲 煩躁竹瀝微溫時時少飲厚益取汗

又方 治口乾生癧汙生地汁童便各等分和頻飲

浮腫

清康異人方

靖康二年京師大疫有異人書此方治瘟疫浮腫亦治大頭瘟

黑豆

二合炒熟

炙草

二寸水二盞時時呷之

錦按此卽甘草黑豆湯也古稱大豆解百藥毒甘草

亦解毒之品瘟疫乃毒氣所鍾故用此方取效方用炙草愚意不如易以生草更妙炙則帶補矣有一人吃菌垂死用生草半斤黑豆數把濃煎大灌得生足微其解毒之功大矣一云冷飲方效

頭面腫 銀花二兩 生甘草一兩 煎服少加入黃酒亦可。

青袋飲 治兩腮腫發願 青黛五分 甘草二錢 銀花五錢 爪莖  
箇水酒煎服

時疾陰腫 藥莖發熱 羊屎 黃柏煮水洗之

咽痛

干脂膏 喉閉腫痛 射干 猪脂各一兩合煎焦去渣  
冷噙化棗大

又方 熱病咽痛 含童便即止

嘔飲水多者

枇杷茅根煎

枇杷葉

去淨毛  
炙香

茅根

各五錢  
煎

前稍稍頻飲

腹脹陰陽不和者

桔梗半夏湯 桔梗 半夏

製

陳皮各等分姜煎

心悸脉結代

甘草湯

甘草

二兩  
生

水煎服

已汙不解

新生雞子五枚傾碗內

攬漚以水一升先燎

滾將子投入少納醫啜之汙出愈

熱病生齶下部有瘡

鹽熨 將鹽熬過候乾包熨三次即愈

天時熱毒攻手足腫痛欲斷

猪蹄湯 猪蹄一具去毛葱一握水煮汁入鹽少誅漬之

熱病餘毒

漬方 毒攻手足疼痛欲脫 稻楷

燒灰存性

煮水頻漬患處

豉酒 毒攻手足遍身虛腫 豉

一握微炒

入黃酒中同煎服

又方 治手足腫痛欲斷 挖坑深二尺燒熱灌以黃酒

有熱氣騰出速赤足穿木屐踏坑中坑口用衣密壅毋

令洩氣

又方治同前 黃柏數兩煮水漬之

又方 肢痛欲脫 羊屎燒水漬 痘乃止或和猪脂塗

諸復

勞復食復欲死 并以蘆根煮濃汁飲 人糞

燒  
火酒服

勞復 抱出雞卵壳炒黃爲未熟湯和服 取沃即愈

勞復 取頭垢棗核大哈之

又方 頭垢燒研丸桐子大水服一丸初愈預防勞復法

勞復食復危篤 蘇葉煎服入生姜淡豉亦可

女勞復卵腫或縮 白凡一硝三分大麥湯調日三服熱毒

從二便出

又方 腹痛卵腫 葱白

搗爛一盞

醋一盞

和服或酒

又方 卵腫股痛 竹皮

三錢

水煎服亦治勞復

又方 女勞復發動欲死不語

梔子

一二錢

煎服令微沃

亦治食復

又方 肚痛卵腫 葱白

搗爛

和熟黃酒服再以葱搗爛炒

熱入醋敷腎囊

陰陽易 少腹急痛 热酒吞豚卵二枚

又方 治小腸急痛腎縮面黑喘不救卽死 大葱

連根七枝

葱小  
加倍生姜二兩共切黃花煎服候炒葱熨火氣海穴母令令

又方 治熱氣上沖胸煩悶手足蠻搐搦如風者 花粉  
竹茹水煎調燒硯散服見傷

赤衣散 女勞陰陽易并治 室女經有燒氏有熟水煎  
服或分藥服

寒疫

世之言疫者將瘟疫二字讀渭隨曰疫止有瘟而無寒也  
豆知疫有三而瘟其一焉尚有寒疫雜疫二者而人自不  
體認耳茲專說寒疫吳又可言春夏秋三時偶感寒邪  
可謂感冒不當另立寒疫之名固已但感訓觸目訓犯係  
人不慎風寒自取之至於當天氣方溫熱之時而侵風苦  
雨驟至毛竅正開爲寒氣所束衆人同病乃天實爲之故  
亦得以疫名也其症則頭痛身痛身熱脊強惡寒拘急無  
汗感冒或則往來寒熱氣擁痰喘欬嗽胸痛鼻塞聲重涕

唾稠粘咽痛齒痛

俗云寒遍注人感冒所無

蘇羌飲主之

自定新方

蘇羌飲

治四時寒疫歷有奇效屢試屢驗并治傷寒傷風可代麻桂青龍羌活十神等傷試者踏之應兵也

紫蘇

三錢

羌活

二錢

防風

一錢

陳皮

一錢

淡豉

二錢

葱白

數段

水煎服不應再服初覺速服必愈遂則生變

此足太陽藥也紫蘇溫中達表解散風寒羌活直入

本經治太陽諸症淡豉解肌發汗兼治疫瘴防風能

防禦外風隨所引而至陳皮利氣而寒解易解姜可

驅邪葱能發汗輔佐諸藥以成厥功四時風寒皆能

治療甚母以藥味平淡而忽之唯不治瘟疫

如兼陽明症者加白芷一錢兼食積者加炒麥芽神  
麴各一錢內積者加山楂一錢風痰氣壅滯唾稠黏  
加前胡一二錢欬嗽喘急加杏仁一錢泡去皮大研心腹  
膨脹加姜炒厚朴一錢胃噫悶塞加炒枳壳五六分  
嘔逆惡心酌加藿香制半夏生姜一錢年高者虛怯  
者加人參十錢陰虛血虛者加熟地三錢當歸二錢  
脾虛者中氣不足者加參术各一錢此汗散之方故  
不入柴胡若現少陽症當另作主張用和解之劑錦

誌