

松

峰

說

疫

松峯說疫卷之四

諸城劉 奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福山劉嗣宗南瑛叅閱

至孫李逢處謹叢錄

辨疑

辨溫病陰暑

此事難知云冬行秋令當寒而溫火盛水虧云云推作瘟病之原固爲近理乃又云火土合德濕熱相助故爲溫病是溫病必原於濕熱將濕熱一門並可以不立矣須知濕熱乃夏時之正氣瘟疫乃天地之雜氣二者迥乎不同謂

瘟病而兼濕熱則有之未聞濕熱而爲濕病者也又云惟房室勞傷辛苦之人得之是省房室就安逸之人必無瘟病矣有是理乎每見瘟疫盛行之年節欲安逸之輩往往有無端而感者又何以稱焉又云多慾辛苦之人腎水內竭陽氣外泄生化之源旣絕身之所存獨熱云云謂瘟病中于此一種則可耳若云瘟病盡由乎此則萬無是理也至于暑字字彙解爲夏天氣熱則人之受是氣者斷無尚有屬陰之理其曰陰暑者祇因人畏暑納涼外受寒邪所致仍是感冐乃拋却現在之受寒而止泥前此之受暑故

以陰暑名之亦猶之曰陰熱也有是理乎知陰熱二字之  
不通則知暑之不可以陰言也明矣

辨夏涼冬煖不足致疾

吳又可瘟疫論中駁冬溫之說曰夏涼冬煖轉得  
春秋之和氣豈有因其和而反致疾者

四時之序應寒則寒應煖則煖所以人得天地之正氣不  
能爲病若夏宜熱而反涼冬宜寒而反煖未有不致疾者  
但夏過於涼其爲病也卽時而見惟冬令天氣過于和煦  
往往當時不能爲害至來歲春夏之間方大發瘟疫此余

屢經而屢耗者實非臆說也第夏應熱而反涼人感寒邪而閉塞腠理不能蹠泄其爲病也固無足異唯冬時有非節之煖當時不卽病必至來歲春夏間始作此誠不可解也人動曰冬傷于寒至春夏變爲溫暑病余則曰冬過于溫至春夏多發瘟疫病彼吳又可謂冬煖夏涼不足以致疾也吾卒不以爲然蓋以煖属于春涼属于秋煖與涼爲春秋之正氣謂之和也始宜若見于冬夏之令夏涼  
冬煖此爲非其時有其氣則不得謂之和矣不和卽爲反常之戾氣此夏涼冬煖之多致疾也又烏得言溫煖清涼之未必爲

病也哉

辨吳又可偏用大黃

瘟疫一症感邪厲之毒十之六感溫熱之毒十之四故用黃連解毒等湯不唯在表時服之寒凝血滯厥疾不瘳卽邪熱內傳應服涼藥余往往不用黃連不過生地丹皮二冬元參銀花童便極數用石羔梔子黃芩而止無不奏效故吳又可戒用寒劑而專用大黃亦未可爲非蓋大黃雖寒其性走而不守當瘟疫膠固之時得此一番推盪邪便解散較純用寒涼者固勝一籌但邪未入腑而輒用之旣

不能解在經之邪。徒受寒中。破腹之患。其害有不可勝言者。又可之用大黃。雖不孟浪。至是但宜下諸症。未免偏于攻撃。全忘下不厭遲之說。

篩又可而舉手卽用大黃。反引又可爲證。則又爲又可之罪人矣。

辨用老君神明散東坡聖散子

活人云。一歲之中病無長幼率相似。此則時行之氣。俗謂之天行是也。老君神明散。務成子。螢火丸。聖散子。敗毒散。不拘日數。淺深吐下隨症施行所。

以聖散子不問陰陽表裡也

語云用古方治今病譬如拆舊料蓋新房不再經匠氏之手豈可用乎旨哉斯言洵堪爲醫學用藥之準矣夫古今之元氣不同觀漢人之處方動以兩訣宋元而降不過錢計而已以漢人之方治今人之病吾知其過于峻毒以今人之方治漢人之病吾其不及病情此處方分兩之未可泥也至于用藥之權衡則又不得以漫投者蓋四方之風土不齊羣倫之老少各異天道之寒暄無定南北之燥濕頓殊人在氣交之中或偏于陽或偏于陰或有時而壯旺

或有時而虛怯卽一人之身。一日之際內傷七情外感六氣其病情之出沒隱現真有若雲龍之不可方物者。若心執一方以應無窮之變也有是理乎。活人以老君神明散東坡聖散子爲治疫癘之的方不拘日數之淺深病症之吐下亦不問陰陽表裡便率爾妄投其不殺人如麻者鮮矣。蓋二方中用烏附吳萸毒熱之品陰寒直中者服之庶或無過。若傷寒傳經熱症以及瘟疫瘟毒正宜用芩連大黃之時若投此湯入口必斃神明散用絹袋盛帶以此外治不服食尚不能爲害至千聖散子則煎服之藥是斷斷

平不可用者此方藥味亂雜卽真陰寒症用之亦恐未能  
獲効也後世因過信蘇長公隨奉爲良劑卽就死地噫抑  
何其爲東坡之名之所以以至於此哉以及神明散不過  
平人所製假以李蘇之名以眩人之耳目好異者遂深信  
而不疑若必曰是方出旨李蘇則張景岳新方八陣中王  
母挑一品豈真瑤池仙周之所垂乎吾願世之業醫者不  
可拘于一毫之末亦不可執其一偏之見變動不拘權衡  
有準則千岐黃一道時過半矣

辨暗賑散等方

者飲自己  
之尿取名

濕疫始生  
湯症病者  
之尿有熱  
辨斷不可  
服重便耳

二分晰義書中載暗則散一方用大黃爲君而以僵蚕婢  
蛻蠶黃佐之共爲夫蜜酒調服用治三十六般熱疫夫一

方而治多病者唯著應膏爲然除此則廣東蠅丸亦有此  
說然彼必有一單不症用某引和服是丸雖一方而引因  
病異則引之所開敢大視無引而一方兼治者不侔矣且

瘟疫更與雜症不同有表裡分傳之異經腑臟胃之殊者

少強弱之分天上風土之別焉能以一方而治三十六症

乎余始得此書血瘟疫盛行之年曾修和一料備用後偶

出門一女孫卑瘧疫家中人因取與服服之返泄湯醫

增劇筠谷兄修合此藥云乳蛾等疾病而有一面上不其故孫女服之增劇者以邪尚在表方內有人不宜平不受至于云治咽喉或于熱毒相宜豈三十六肝虫詎無一應者乎

中又有大小復甦飲子大小清涼滌

疫散清疫飲驅疫飲等方總以黃連爲君更雜錄諸寒若藥以佐之有至二十味之多者更斷斷不敢用也

### 辨張景岳言瘟疫

景岳全書各門中講解俱極精詳透門堆瘟疫

然緣其將傷寒瘟疫二症攬作一團未曾分晰

也其論瘟疫曰瘟疫本卽傷寒

無非外邪之病但染時氣而病無少長孳相似者是卽瘟疫之謂云云

第傷寒爲寒所傷

或涼雨所逼或風雪所激或失足落水或猝然脫衣或當風而寢以致頭痛憎寒皮膚壯熱脊強無汗方謂之傷寒此係自取之病病只一人而止而衆人不然也至于瘟疫絕無諸項感觸而抖然患症且非一人鄉邑閭里動皆相似其症雖有頭痛身熱不上而多汗始終一干爲熱

與傷寒迥乎不同治法亦異如何曰癰瘍本卽傷寒乎天旣曰本卽傷寒再立瘟疫一門豈非贅瘤且旣曰本卽傷寒而又曰染時氣而病吾不知先傷于寒而後爲時氣所染乎抑染于時氣而後爲寒所傷乎抑二者并集乎一人之身平總緣傷寒瘟疫原未嘗清猶倣帖括者認題不真下筆便錯雖詞藻絢爛而不中肯綮總屬陳飯土羹其何以言文哉

最不敢從者發汗峻補二條抑知瘟疫豈

強汗之所能解者乎。而峻補豈可施於熱毒之人乎。唯汗下後或顯虛症。或虛極久病之人。而感瘧者。用補法亦目不可少也。

嘔逆大聲  
真耳

辨嘔吐噦呃逆欬逆噫氣

丹溪書嘔吐門曰。有聲有物謂之嘔吐。是混嘔吐爲一張。景岳亦不以爲然而未嘗深辨。及觀李東垣則以嘔爲有聲有物。孫真人則以吐爲有物無聲。詳嘔吐字意。當以孫李爲是。字橐嘔亦同。謳大謳必有聲。而訥春謂氣逆則嘔。蓋氣一逆必作聲。遇擁所食之物而俱出矣。吐則較嘔所

病篇直作呃逆而河間海藏以噦爲乾嘔張景岳謂呃逆古無是名其在內經卽謂之噦是特古今之稱名不同

出更易開口便漾出又豈有聲哉至于噦之一症經中之病篇直作呃逆而河間海藏以噦爲乾嘔張景岳謂呃逆古無是名其在內經卽謂之噦是特古今之稱名不同而噦與呃逆斷不可混爲一症也噦雖以河間海藏說爲是而東垣十書肺洞集中則謂噦之聲濁惡長而有力直至氣盡而後止非如乾嘔之輕而不甚也是較之劉王所說則更明白曉暢矣至于呃逆卽東垣所謂吃忒者是此症稱名不一隨其方言而呼之有曰格得者有曰打呃者有曰打歌得者總與噦爲一症明係今之所謂打呃是也

八經卷之二  
辨疑

靈樞則謂之簡音所謂簡不得息者是也觀金鑑中以爲  
格格連聲氣從脣下來自衝脉出口作聲豈非善于形容  
者乎至于欬逆與呃逆則又不可相混有以欬逆爲呃逆  
者有以呃逆爲欬者是皆未詳味經文耳經本以欬噯氣  
逆爲言如氣交變大論曰歲金太過甚則喘咳逆氣又曰  
欬逆甚而血溢蓋以欬噯不止而血隨氣上耳未聞打呃  
而見血者也此欬逆之非呃逆亦甚明矣而欬逆之非噯  
又何待辨乎至噫氣之說靈樞云寒氣客於胃厥逆從下  
上散復出於胃故爲噫仲景謂上焦受中焦氣未和不能

消是故能噫據此則噫者卽嗳氣也亦卽俗之所謂拔無  
也此理甚明人所易曉總之有聲有物曰嘔氣方無及以  
吐有聲無物曰噦呃逆者卽打呃之謂欬逆者欬所謂拔  
以致氣逆上衝也噫者字彙解作飽食氣滿至有聲豈非  
所謂拔氣者乎症各不同斷難相混至於得病之也與火  
治法各有虛實寒熱之異散見諸門茲不贅

辨五疫治法

顏氏云春三月行青筋牽病夏三月行赤脉癢病秋風亦  
生於氣稟病冬三月行黑骨溫病四季月各餘十八日土  
行憤望梅

王用事行黃肉隨病後人又以木火金水土五疣投之治各有定法其中止有所謂五疫乃天地之厲氣入中之間各隨其臟氣以爲病之說尚屬近理如所謂青筋牽等名色矜奇立異無益症治其用方如春三月用羌活湯夏三月用雙解散等法亦見沾滯至秋三月天漸涼冷反用三黃石膏殊不近理至其所用藥俱係發散等劑亦非治瘟疫的方也

辨吳又可疫有九傳治法中先裡後表

吳又可九傳治法有先裡而後表者始則發熱漸加裡症

下之裡症除二三日內又發熱反加頭痛身痛脉浮者宜  
曰虎湯按其瘟疫初起治法云脉長洪而數大汗多渴此  
白虎湯症又云白虎治瘟疫脉長洪而數又云脉長洪而  
數白虎清涼解散服之或戰汗自汗而解是凡三言白虎  
症而絕無脉浮之說也至于發熱頭痛雖列于白虎湯之  
下而又無身痛前後多所滲漏不符看來頭身痛脉浮三  
症似宜小柴胡加羌防始與症對而乃用白虎何也

### 辨瘟邪止在三陽經

吳又可之瘟疫論世所盛行其中達原飲固爲治瘟疫之

至於第言瘟邪浮越於某經者卽加某經之藥止有三陽三衣治法至於邪之傳裡者僅有入陽明胃腑一條傳三陰則畧而不及夫云邪伏膜原自內達外不似傷寒之按次侍經則可若云邪總不入三陰是將臟腑經絡劃然如此而不及何是衛總杆格而不通矣此豈理也哉卽傷之何呂以見于之說識者猶或非之至於瘟疫之傳變且並府三陰而遺之何也每見患瘟疫者腹脹滿大便實或自利發黃以及四肢諸症非傳入足太陰經乎舌乾口燥咽痛但欲寐非傳入足少陰經乎煩滿囊縮以及善怒或自

軒逆動搖并脇肋諸症非傳入足厥陰經乎。且不特此也。  
患在皮毛氣分而哮喘咳嗽者知邪之入肺。患在神志昏  
冒而面赤喜笑者知邪之入心。是則五臟六腑癰邪之傳  
變無所不到。謂臟腑諸症不能一時皆現。則可謂瘟邪止  
在三陽經必無是理也。

### 辨內傷寒認作瘟疫

內傷寒之症。初起無熱不渴。止有胸膈脹滿悶面唇皆  
無光澤。或漚而胸腹急痛。手足冷。自覺不舒快少情緒。其  
脈沉細。此症總由過食生冷。傷於脾胃所致。故方書名之。

爲內傷寒而以治中湯溫散之此症多感於夏月而瘟疫盛行之時與瘟疫甫愈之後或感此症昧者誤認爲瘟疫而以疫法治之鮮有不敗事者其弊必至於卒不能食泄瀉不止而釀成大患唯用治中湯加減出入寒甚則加熟附食積則加麥芽神麃肉積則加山楂嘔惡則加藿香製半夏鮮薑砂仁兼濕則加茯苓蒼术胸脇痛悶則枳壳白芍柴胡若內既傷生冷而外復感風寒則用藿香正氣散或五積散平胃散等加減治之

治中湯 即理中湯加陳皮青皮

霍香正氣散

治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔

胸膈滿悶咳嗽氣喘及傷冷傷濕瘧暑霍亂吐瀉凡感

嵐瘴不正之氣者並增減用之

錦按疫初起用達原飲等不效者用此方加減治之

藿香

蘇葉

白芷

陳皮

半夏

製

茯苓

甘草

厚朴

姜汁炒

桔梗

白朮

滑浸土炒

大腹皮

洗極淨剉鳥好集其樹毛落皮上洗不淨殺人

蒼术

泔浸炒原方無今加入無汗者更宜

又一方加木瓜傷食加消導藥

姜棗煎

五積散 治外感風寒內傷生冷其曰五積者能散寒積

食積氣積血積痰積凡身熱無汗頭身項背疼痛拘急  
胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來並治

蒼术

消浸炒

厚朴

姜汁炒

陳皮

甘草

半夏

製炒

當歸

酒洗炒

川芎

酒洗炒

白芍

酒炒

茯苓

枳壳

炒

桔梗

白芷

蘇葉

改代麻黃

乾薑

表重用鮮

肉桂

表重者用枝

生葱薑煎

平胃散

治脾濕痰痞宿食滿悶嘔瀉及嵐瘴不服水土

蒼木

消浸炒

厚朴

姜汁炒

陳皮

炙草

姜棗煎

如傷食加神麴麥芽或枳實濕勝加五芩散痰多加製

如傷食加神麴麥芽或枳實濕勝加五芩散痰多加製

半夏脾倦不思食加參术痞悶加枳壳木香香附大便  
結閉加熱軍小便赤澁加芩澤風寒加葱豉蘇芷防風  
內傷寒發班

患內傷寒後又兼之寒熱間作鼻中微出血兩手脉沉滑  
皮膚按之殊無大熱身上有班三五點此內傷寒班也調  
中湯主之夾暑加香薷扁豆

調中湯

陳皮 半夏製 甘草 桔梗 蒼朮泔浸炒  
川芎酒洗白芍酒炒砂仁炒研藿香 羌活

白芷 麻黃或伐  
蘇葉桂枝

枳壳 生姜煎

### 內傷寒發黃

內傷寒發黃者其人脾胃素虛或食寒涼生冷之物以致  
寒實結搏停滯不散中州變寒而發黃色或嘔吐或腹滿  
自利小便短少者宜調中湯見痛加茵陳或理中湯加茵陳  
枳實草果手足逆冷脈沉者加附子

按內傷寒爲病本係雜症而採入瘟疫門中者因瘟  
疫愈後不戒生冷每患此症或再微發熱惡寒昧者  
不察往往誤認爲瘟病之復而以疫法治之寒涼清

解害人不淺故特爲拈出再者瘟疫之復不能吃煙內  
傷寒始終能吃煙以此爲辨綿誌

辨汗無太早下無太晚

此事難知云汗無太早非預早之早乃早晚之早  
謂當日午以前謂陽之分當發其汗午後陰之分  
不當發汗下無太晚非待入之晚乃當日之後爲  
陰之分也下之謂當已前爲陽之分也

凡人初感寒邪一覺憎寒頭痛身痛身熱脊強便宣用溫  
散之劑速發其汗斷無不愈之理雖年老及平素虛怯之  
人不易作汗者覺病即服汗劑其邪亦無不即當時解散  
者此余屢用而屢效者也遲則寒邪稽留傳變百出而班

黃狂躁等症作矣所以一覺感寒便宜速治若必如難知  
所說或曰午以後感寒必至明朝午前服汗劑不亦晚  
乎假如午後感寒此時雖屬陰分亦宜速服散劑且服之  
多未有當時卽汗者必俟次早藥力旣行又逢陽分出汗  
更易易耳所謂汗無太早者明係預早之早豈早晚之早  
乎傷寒如此瘟疫亦然瘟病之所謂不宜發汗者指麻桂  
紫蘇而言至於元霜素雪等丹豈非涼散之劑乎瘟疫初  
起當卽服藥亦不必拘以時日也至所謂太晚之說分明  
解作遲下非早辰夜晚第此言爲庸醫不應下而妄下之

者說法耳然其言不能無弊也若遇宜急下之症而必  
執下無太晚之說則陽明胃府勢必被邪火燒至燥裂而  
不可救矣下劑若必拘以時不亦謬哉早晚二字當易以  
遲速云活無太速下無太遲則不煩言而解矣

### 辨鄭聲

論曰實則譫語虛則鄭聲重平聲語也夫聲必有語語必有  
聲蓋言聲則鄭而語則重也人虛而精神衰乏不能自主  
語言重複絮聒而聲則有類於鄭耳鄭聲淫是狀其聲之  
呻吟唧唧頗似淫聲惟馮氏謂聲戰無力不能接續造字

出於喉中爲得解成氏亦謂鄭衛之聲而王氏駁之則非矣又有鮮鄭聲爲鄭重者夫曰鄭重其事則有矣曰鄭重分明則有矣以此解病人之聲得乎要之指鄭之淫聲取譬無疑也凡患此者其聲必低氣必短脉必無力色必萎悴其兼症則目無赤色舌無胎刺身無大熱口無煩渴小便清長大便滑潤或泄瀉凡自言自語喃喃不全者皆是也瘟疫始終一於爲熱罕見此症或汗多亡陽下多亡陰者有之若果虛最忌攻伐少有差謬無不卽死速宜察其精神辨其陰陽斟酌溫補以救其根本爲要若昏沉上氣

喘促發呃不止不省人事者危

辨褚氏春瘟夏疫

瘟疫之說前諸論中已詳哉其言之矣茲謹褚氏遺書審微篇有云春瘟夏疫丙症先出是將瘟疫二字拆開分配春夏總緣平看瘟疫二字且未悉其理解

須知諸凡雜症苟一時所患皆同者皆有疫氣以行乎其間如徭役之役故悉得以役名之而所該之病甚廣瘟疫不過疫中之一症耳乃串講之辭若曰瘟病之爲厲疫如是也若必如褚氏春瘟夏疫之說是將瘟疫二字

折開對待言之矣由此以推則世之稱傷寒者獨不可云  
秋爲傷而冬爲寒乎知分作傷病寒病之不通則知言春  
瘟夏疫者之未妥也明矣至於褚氏言男女異脉云女子  
陰逆自上生下故左寸爲受命之根萬物從土而出故左  
關爲脾生左尺肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心  
寸心

戴起宗曾非之今不

解毒人不發故特爲拈出再者瘟疫之復不能吃粒  
內傷寒始終能吃煙以此爲辨錦誌

松峯說疫卷之五

諸城劉 奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福山劉嗣宗南夷叅閱

表姪李逢虔謹卷錄

諸方

避瘟方

雄黃丸 治瘟不相染

明雄一兩研

丹參

赤小豆

炒熟鬼箭羽各二兩

共爲末蜜丸梧子大每日空心溫水下五丸

避瘟丹 燒之能避一切穢惡邪氣

本草綱目卷之三  
薯木 乳香 甘松 細辛 芸香

降真香等分

糊爲丸豆大每用一丸焚之良久又焚一丸畧有香氣即妙

福建香茶餅 能辟一切瘴氣瘟疫傷寒穢氣不時噙化

沉香 白檀各二兩 桉兒茶二兩 粉草五錢麝香五分

水片三分

共爲細末糯米湯調丸黍米大噙化

透頂清涼散 凡遇時令不正瘟疫流行人各帶之或嗅

鼻可免侵染

白芷

細辛

當歸

明雄

牙皂

等分

共爲細末磁瓶貯勿洩氣用時令病者噙水口內將藥  
噙鼻吐水取嚏不嚏再吹嚏方止已患未患者皆宜用

神聖辟瘟丹

蒼术

君倍

香附

羌活

獨活

甘松

三奈

白芷

赤箭

大黃

雄黃各等分

共爲末糊丸彈子大黃丹爲衣晒乾正月初一平旦燃

一炷辟除一歲瘟疫邪氣

老君神明散 避瘟疫

蒼术 一錢

桔梗 二錢

細辛 五分

附子 各一兩

炮去黑皮

烏頭 四兩

去皮尖

共爲細末帶於身邊可免瘟疫 不可服

藜蘆散 一名有散辟瘟疫

藜蘆

卿驪

乾姜 各一兩

丹皮

皂角 各一兩

六錢

細辛

十八銖

桂枝

一作附子  
桂心

硃砂

一作真珠另

研各六兩

共爲粗末絳囊係臂上男左女右覺病作取藥末少許納鼻中 嫌分兩多和時四分之一亦可後皆倣此

務成子螢火丸

主辟瘟疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠍諸

蟲

毒五兵白及盜賊凶害皆避之

螢火虫

鬼箭羽

蒺藜

碧石

各一兩  
煅枯

雄黃

雌黃

各二兩

麝羊角

銀龍灰

鑄柄

入斧頭木燒  
焦各兩半

共爲粗末以鷄子齒確鑿冠一具和之如杏仁大紅紬  
綫三角囊盛五丸帶左臂上仍可掛於門戶

麝蘇酒

大黃

十五  
銖

白术十銖

桔梗十五銖

川椒十五銖

炒出

防風六銖

銖

烏頭

六銖

桂枝十五  
銖

稜葵六銖

乃今之二錢

銖

廿四銖爲一兩

入紅囊中于臘月晦日懸井中毋著水元旦出藥入酒

蕷音稜葵  
音恰疑卽  
從疑之訛  
學者辨之

中煎數沸於東向戶中飲之先自小者飲起飲三朝若  
每年飲可代代無病內外井中宜恭著藥忌猪羊牛肉  
生葱桃李雀肉

僻痘丹

薯木 紅棗 和丸燒之

又方

時痘疫流行水缸內每早投黑豆一握全家無恙

五更潛投黑豆大握于井中勿令人見飲水家俱無恙

入病家不染方

香油和雄黃蒼术末塗鼻孔既出紙條探塞如無蒼术  
卽香油亦可飲雄黃酒一杯或止抹雄黃于鼻孔卽妙  
瘟病不染

五月五日午時多採苦耳嫩葉陰乾收之遇疫時爲末  
冷水服二錢或水煎舉家皆飲能辟邪惡

避瘟良方 瘟疫盛行車前子隔紙焙爲末服卽不染

瘟疫不染方 將初病人貼身衣服甑上蒸過合家不染

又避瘟方 入瘟家以麻油塗鼻孔出再取嚏則不染

避瘟方 以桃葉上更搗爛涼水調服瘟疫不染

方止用桃  
虫蠹

又方 以赤小豆糯米浸水缸中每日取水用

又方 以貫仲浸水用之或蒼术浸水用

斷瘟法 密以艾灸病人床四角各一壯勿令人知不染  
凡人瘟疫家常以雞鳴時默念四海神名三七遍百邪不犯

東海神阿明

西海神巨乘

南海神祝融

北海神禹強

每入病室存心念三遍勿出口

雄狐屎在山中石上或竹木上尖頭者燒之辟惡去瘟疫

茵陳烏梅湯 治瘟疫

九九盡日茵陳連根採陰乾遇瘟起每一人用茵陳五

分烏梅二个打碎水二盅煎八分熱服汗出卽愈

赤豆避瘟法

正月七日

用新布囊盛赤小豆置井中三日取出舉家皆服男十粒女甘粒瘟則遠避

薑酒避瘟法

几遇瘟疫行時當須先飲燒酒一盃回家時仍再飲一杯然後食別物但勿至醉不能飲者出入可食姜蒜或以塞鼻

神砂辟瘟丸

神砂一兩研細白蜜和丸麻子大以太歲日或平旦一日

一方 元日五更以紅棗祭五瘟畢合家食之吉

一方 正月上寅日取女善草末三合絳袋盛掛帳中能避瘟

避瘟殺鬼丸如要少做或四分之一或改兩作錢皆可  
方有空心青鱉甲作龜甲

雄黃

雌黃

各二兩

山甲

龍骨

鱉甲

蠅皮

各二兩

川芎

二兩

禹餘糧

二兩

真珠

內加一兩

羚羊角

七

虎頭骨十五枚  
兩  
鷄  
芫青十五枚代

東門上雄雞頭一枚

共爲末，蠟溶爲丸，彈子大。每正旦病家門口燒一兩丸。

並每人帶一丸

男左女右

避疫殺鬼，並弔喪問疾皆吉。

太蒼公避瘟丹 凡官舍旅館久無人到，積濕積邪，容易侵人，焚之可以遠此。五六月終日焚之，可以避瘟。

蒼术一斤

台芎

黃連

白朮

羌活各八兩

川芎

草烏

細辛

柴胡

防風

獨活

甘草

藁本

白芷

香附

當歸

荆芥

天麻

官桂

甘松

于姜 三奈 麻黃 牙皂 白芍各四兩

麝香三分

共爲細末

點之

一方 除夜將家中所餘雜藥調和成一處者焚之薰蒸可避瘟疫

一方 除夜有行瘟使者降於人間以黃紙朱書天行已過四字貼於門額吉

一方 懸掛馬尾松枝可免瘟疫

一方 天行時氣宅舍怪異并燒降真香有驗

一方 撥木香燒之去惡氣除生羌產兜渠國

一方 燒青木香、薑、陞安息膠杳可避瘟疫

燒香避瘟 樞密王博文每於正旦四更燒丁香避瘟

人病家不染 用舌頂土膈努力閉氣一日使氣充滿毛竅則不染

辟瘟丹 燒之避瘟邪氣

乳香 蒿术 細辛 生草 川芎

降真 白檀 藥肉丸燒

不染瘟方

硫黃五錢 赤小豆一兩 蒿术一兩 滷浸去皮壁土炒

共爲細末水調無服一錢

又方 姜豉和白水浸酒舉家常服 一方無水

又方 初伏採黃花蒿陰乾冬至日研末收存至元旦審  
調服

又方 六月六日採馬齒莧晒乾元旦煮熟鹽醋調食之

又方 元日用麻子三七粒赤豆七粒共撒井中避瘟

又方 元日吞赤小豆七粒服椒酒一杯却病避瘟

又方 立春後庚子日溫蔓菁沐合家并服不拘多少可

避瘟羅蔔汁亦可

蔓菁亦云蕪菁

麻豆投井方 除夜四更時取麻子赤小豆各廿七粒並  
佳人髮少許同投井中終歲無傷寒瘡疫

髮泥投井 除夜以合家頭髮燒灰同脚底泥包投井中  
呪曰我家眷屬不害傷寒瘡魔遠遁四季平安急急如  
九天金輪王勅令

### 避瘟方

於病人出汗時身下舒一挑担則不傳染須舒於褥底  
下不得近身恐挑担涼水汗不出

### 殺鬼丹

虎頭骨

真者  
酥炙

桃梟

係桃之乾枝上者

斧頭木

係斧柄入斧頭中之木

雄黃

明亮者  
月所

桃仁

去皮尖  
炒黃

朱砂

光明者另研各一錢五分

犀角屑

木香

白术

鬼箭羽各一瓣

七分  
錢

麝香

五厘

共爲粗末帶之可避瘟疫

一方 於春分日用遠志去心水煎日未出時東面飲二

蟲探吐則疾疫不生

一方 於穀雨以後用川芎蒼朮白芷藁本季陵香各等分煎水沐浴三次以泄其汙汙出臭者無病

吐免疫

桃湯 元日服桃湯壓邪氣制百鬼

納椒井中 蘭日之夜令人持椒卧井旁無與人言納椒  
井中可除瘟病一方除夜取椒廿粒行之

又方 元日飲蕎米湯並用湯沐浴及焚燒可避終歲疫  
逐蠅祛疫法

憶昔年入夏瘟疫大行有紅頭青蠅千百爲羣凡入人  
家必有患瘟疫而亡者後傳一法用鐵盆不拘大小納  
曰凡四面用淡水傾入盆內令滿將丸化開次以口含

火酒連噴三口於盆內又取桃核一桃割兩頭令通去仁用紙包鎗芥少許塞桃核空殼內用紅線繩一根穿入核內將紅線爲絃取桃枝縛作一弓安於鉄盆中凡水內弓肯往下已絃向上再用桃木作箭三枝插於盆外青蠅自當遠避舉家卽免痘病其盆隨便安於宅之僻處經年莫動相傳極效松峯記

避瘟方 新布盛大豆納井中一宿取出每服七粒

避疫椒柄酒 除日用椒三七粒東向側柏七枝浸酒一

瓶元日飲之

通治疫癘方、常以東行桃枝煎湯浴之

未病皆治

避瘟方、以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右

預防熱病

燕治急黃城風葛粉

二升生地一升豉牛食後米飲服三錢

升升

日三服已病則日五服

避瘟不染、穄米爲末頓服之

夏方、三月三日取黍麴和菜作羹食

預解瘡疹

茜根煎汁入少酒服

時行疹子正發時服此則可無患

李子建殺鬼元

辟瘟疫殺一切魑魅魍魎

一  
切

藜蘆

三兩虎頭骨

兩半雄黃兒白

天雄皂莢蕪荑

錢各五

共爲末揉入艾絨中用壯紙二層

捲住箇遇瘟疫時點著薰病人房中

七物虎頭元

辟瘟殺鬼

虎頭硃砂雄黃

各半

兔曰皂夷蕪萸雄

黃各二兩

爲末，鎔蠟丸，彈子大，紅絹袋盛一丸，繫男左女

右臂上，又懸屋四角，晦望夜半，各當戶燒一丸，晨起各

人吞小豆大一丸，則不傳染

太乙流金散

大辟瘟疫

雄黃兩半

羚羊角

一雌黃白礬鬼箭羽各七錢半

共粗末，用絳囊盛一兩，帶心前並掛戶上，又青布包少

許中庭燒之

臘月鼠

燒之辟瘟氣又于正旦所居處理之辟瘟疫氣

除瘟方

松峯審定五瘟丹

一名涼水金丹  
名代天宣化母

專治時症瘟疫發熱

頭身腹痛譫語無汗日久不愈或發黃斑疹與癩或二

便五六日不行等症並暑月一切熱症又解痘疹毒

甘草

製印已  
年爲君

黃芩

乙庚年  
爲君

黃柏

丙辛年  
爲君

梔子

丁壬年  
爲君

黃連

戊癸年  
爲君

香附

去淨細毛

蘇葉

鳳頭者  
爲君

蒼朮

米泔浸

陳皮

以上四味  
爲臣

明雄

另研細砂

另研細

硃砂

另研細

製甘草法

立冬  
日取

大青竹杆一頭截去節一頭留節納生甘草末于內蠟

封緊日浸糞坑中頭冬至取出晒乾用

前甘草等五味當以某年爲君者多臣數之半如甘草

等用二兩則香附等四味止用一兩也雄硃又減臣數之半止用五錢矣於冬至日將甘草等九味共爲末雄硃另研以一半入甘草等藥末中爲丸留一半爲衣再用飛金爲衣大人服者九如梧子小兒服者九如黍米雪水生蜜爲丸面東服五十九病輕日淺者一服而愈病深日久者三四服而痊忌腥辛辣油膩煎炒一切厚味其分兩如君用一兩臣則五錢多寡不論總臣減君一半雄硃又減臣一半也

松峯曰此方見萬氏家傳瘟疫門中與馬氏瘟疫發

原書內所載互有異同萬氏有蒼陳而馬則無之萬氏香附製炒而馬氏言俱不見火萬氏用雪爲丸而馬氏用大黃膏子萬氏不帖金而馬氏則帖金萬氏服用滾白水而馬氏則用涼水萬氏甘草法製而馬氏不法製其餘俱各相同愚意甘草製之則成人中黃大能祛疫蒼米香附吾用其生者蓋炒之則未免有火氣飛金重帖亦妙以其鎮靜也至於用大黃膏爲丸於初感瘟疫邪尚在經者大不相宜當仍以雪水爲丸如恐不粘酌加生蜜則易之初感瘟疫者用

滾白水送大熱時冷水送不大便時方用大黃水送  
取二方而斟酌盡善此爲近之

柴胡白虎煎 治陽明溫執表邪不解等症

柴胡 黃芩 麥冬錢各二 石羔三錢 甘草七分

引用竹葉、

柴葛煎 治瘟毒表裡俱熱能散毒養陰並治痘疹

柴胡 乾葛 黃芩 連翹去隔白芍 酒炒

甘草 水煎服

歸柴飲 治營虛不能作汗及真陰不足外感寒上難解

者此神方也 大便多溏者以冬术代當歸亦佳

當歸一兩 柴胡五錢 瓦草八分

流水煎或加薑三五片或加陳皮一錢或加參

人馬平安散 治一切時症風寒暑濕內傷生冷飲食頭  
風頭痛心痛絞腸沙門氣小腹疝氣牙痛猪羊瘋症用  
替脚點兩眼角或吹鼻孔男左女右

烟硝二錢 硫砂一錢 明雄各一錢 水片五分 蘆香一錢  
共爲細末端陽午時修合磁瓶收貯勿出氣

神仙祛瘟方 服後已病者卽痊未病者不染

撫芎八錢 蒼米三分 三  
厘米半錢 清炒 甘草一錢六分 乾葛一錢三分

五厘米 清炒 乾葛 分六厘

生姜三片 洋参三錢 連根水二碗煎八分空心服病急者  
卽當急服勿拘空心之說 撫芎用一錢亦效已試

葛根淡豉湯 治四時感冒

葛根五錢 淡豉三錢 煎服入姜汁少許

人冲黃丸一味不拘多少飯爲  
丸 繕豆 大下十五丸

炒蘇慰法

熱邪傳裡服藥後將鹽炒蘇一升絹包於病人腹上熨  
之藥氣得熱則行大便易通

松毛酒 可避五年瘟

松毛細切末 酒下二錢日三服

姜糖引 治瘧疾兼治傷寒

白糖一兩 生姜五錢  
搗爛 滾水和服不應再服

頭痛如破

連鬚葱半斤 生姜二兩 水煮溫服

姜熨法 治胸膈不寬一切寒結熱結水結痰結痞氣結  
生姜搗如泥將汁濱出存用取渣炒熟絹包揉熨心胸  
切下渣令入汁炒再熨

仙傳吐法 治一切瘧疫傷寒傷風傷酒傷食

病初得用之更宜

一百沸湯半碗以手揉肚再飲再揉直至腹無所容用  
雞翎探吐吐後煎葱醋湯飲之覆衣取汗甚捷

諸葛行軍散

菟豆粉一兩 麻黃末八錢

共研爛和勻每服一錢用無根水調服汗出即愈

靈瘀避瘟丹

蒼本一斤 降香四兩 雄黃二兩 硫黃一兩 硝石一兩

柏葉半斤 丹參二兩 桂皮二兩 霍香二兩 白芷四兩

桃頭

四月五月五日午時收

雄狐糞

頭者是

菖蒲根

四兩升麻

一兩

商陸根

二兩

大黃

二兩

羌活

二兩

獨活

二兩

雌黃

一兩

唵叭香

如無丁咸

赤小豆

二兩

仙茅

二兩

硃砂

二兩

兒箭羽

二兩

以上共二十四味按二十四味爲末米糊爲丸如弹子

大棗十九

松峯按桃頭不知何物豈桃樹尖耶唵叭香出唵叭

國色黑有紅潤者佳以軟靜色明者爲上瘧之能達

邪魅

逐癰方

地黃八兩

巨勝子一升研再同

地黃搗爛同

牛膝四兩

五加皮四兩

地骨皮四兩

官桂一兩

防風各二兩

仙靈皮三兩

用牛乳五兩同甘草湯浸三日以半升同乳拌仙靈皮  
放磁瓶內飯鍋中蒸之待牛乳盡出出子存疑方以溫水渴

切同前藥剉細袋裝浸于二斗酒中數日藥味全下後

去渣十月朔次至冬至

一方 雪水能解瘟疫當收貯  
聽用單飲煎藥俱可

一方 臘月取皂角燒爲末收贮遇時疫早起井華水調  
服一錢或加姜汁蜜少許井華水清晨

第一次及者

乾艾煎

治癰疫頭痛壯

脈盛

乾艾葉

三升

水一斗煮一升頓服取汎

松峯按水酒以升斗計不行於今久矣况艾葉平用

時艾葉計以錢水計以盥可耳

椿皮煎

治癰疫頭痛壯熱初得二三日者

生椿皮

一升切

水二升半煎每服八合

松峯云椿係香椿今之臭椿乃樗耳

高柳汁 治癰疫傷寒不論日之多少

黃蒿心

七個

柳條心

七個

入碗內搗爛或少加水亦可瀝去渣用雞子一枚飛金三貼和  
汗攪匀令病人一口吸盡隨卽炒鹽半碗研細羅下用  
手蘸鹽將病人胸腹并前後心遍擦再速用黃蒿柳條  
熬滾水將病人周身燙之照方如是者三次立時發汗  
而痊

呂祖塞鼻丹

歌曰沉香木香皆共乳香硼砂皂角共良薑細辛當歸  
各等分巴豆川椒及麝香又加硃砂雄黃等血竭硝砂  
熟棗核上每丸成桐子大呼吸補海便離床口含令

水面朝上

仰

不問輕重一炷香祖師留下靈丹藥諸病

聞之百安康

用此藥治瘟疫亦可故選入治瘡疫施去巴豆

人馬平安行軍散

明雄

硃砂

火硝

枯

乳香去油

兒茶

冰片

麝香

硼砂

淡藥去油

名等分共爲細末點大眼魚男左女右冰麝少加亦可

一點絞腸沙

二點氣腰痛

三點重傷風

四點虫蝎傷

五點火眼發

六點走風痛

七點急心痛

八點急頭痛

九點火牙痛

十點牛馬驥

神柏散 治癰瘍

用廟社中西南柏樹東南枝

疑用嫩枝  
帶葉者  
晒乾研末  
新汲水

水下二錢日三次

六合定中丸

蘇葉

二兩  
炒

宣木瓜

二兩  
微炒

真藿香

二兩  
帶梗

子丁香

一兩  
研末  
見火

白檀

一兩  
雨

香薷

一兩  
不見火

木香

一兩  
不見火  
見火

甘草

一兩  
微炒

共爲細末滴水爲丸如椒大每服二錢

一治胸膈飽悶用生姜二片煎水服

一嘔吐用滾水半盞對姜汁少許服

一霍亂用生姜三片煎水加炒鹽五分服

一不服水土煨姜三片煎水服

一絞腸沙炒鹽水煎服

一泄瀉生姜煎水服

藕蜜漿 治時氣癰症

生藕搗取汁一盞入蜜一合和勻分作兩服

生姜益元煎 益元散三錢生姜三錢黃酒水各半盞煎三

滾溫服卽愈除瘧解毒

松峯云方書煎藥每言一滾者益言煎滾取下落滾  
再煎再落如是者三

天行病心悶 用水中苦搗汁服

治癰方

用紅糖入罐內封固蠟塞口臘月浸糞尻中二月取出

患疫忌葷一日

牛柔飲 治餘熱不退煩渴四肢無力下能飲食

牛蒡根生搗汁約五六合空腹分二服服訖取桑葉一大把炙黃水一升煮五六合服緩覆取汗無薑用枝

白藥散 治瘟疫

白藥子出江西葉似烏臼子如葵莢末空腹水頓服卽仰卧一食時候

心頭悶亂或恶心腹內如車鳴刺痛良久或吐利數次皆勿怪服冷粥一碗止之

祐麌煎比方治瘟疫初起自直隸傳來試之亦不甚效意  
祐麌煎或瘟疫田食積而發者服之始效耶

神麴

五錢炒

青皮

一錢

葛根

一錢

枳實

錢

紅麴

五錢

茺蔚

根子條解者更妙

### 括萎湯

大括萎一个取瓣剉置碗中執湯一碗沃之益良外去

渣不拘時服治熱病頭疼發熱

一方 船底苔療天行時疫伏熱溫毒

### 治瘟疫秘方

麥冬

三錢去心

燈心

三十寸

茺蔚梗

三十寸

棗

三十枚

竹葉

三十片

流水煎熱服

### 治瘧疫並大頭方

大力子 防風各等共爲末每用五錢黃酒一盃水一

大盃同煎些腹溫服蓋被出汗

六一泥飲 治瘟疫八九日已經汗下不退口渴咽乾欲  
飲水者 六一泥即蚯蚓糞不拘多少新汲水調服

鷄子拖法

治同上

用鷄子打一孔留黃將青傾在病者腹上用手在腹上  
圓轉攤搓久則漸成白沫用手抹棄再敲開一雞子依  
樣搓之止用四五枚腹內便覺清涼

觀音救苦散 專治傷風傷寒並疫氣所侵稍覺頭昏腦

悶項背拘急吹鼻取嚏毒氣隨散永不染着仙方也

川芎

藿香

黎蘆

各三錢

丹皮

去心

元胡索

硃砂

各二錢

雄黃

白芷

牙皂

各四錢

七味草藥共爲細末硃砂雄另研調入收貯用時先噙水  
在口內次以藥吸人兩鼻孔吐水取嚏未病者吹之不  
染牛馬等受瘟者吹之亦效

治鬼魅魘入法

降香

末一錢

皂角

末一錢

硃砂

雄黃

各三分

麝香

三分與

同研

艾葉

五錢  
桑蠅

將藥末揉入艾中草紙裹爲長筒點放床

底則不魘兼祛百怪惡邪之氣

太乙紫金錠

一名紫金丹  
一名玉樞丹

痘疫煩亂發狂喉閉喉風以及陰陽二毒傷寒心悶狂言胸膈滯塞邪毒未出俱薄荷湯下凡遇天行時疫沿街閭戶傳染者用桃根湯磨濃滴鼻孔再服少許任入病家不染兼治數十種雜症用引各殊俱載醫宗金鑑外科脾發疽門中茲不錄

雄黃

三錢取明紅大塊研

朱砂

三錢大而有麝氣者研

麝香

三錢真者梗淨皮毛研

川五倍子

二兩色破去正屎研

紅芽

大戟一兩五錢去蘆根洗淨焙乾爲末杭

州紫色者爲上江南土大戟次之一兩自者

北方綿大戟色白性烈害人勿用

于金子仁

一兩去油一名

續隨子上藥各擇精品於淨室中製畢候端午七夕重

陽或天月德天醫黃道上吉之辰合藥前三日齋戒至

期更衣洗手薰香設藥王牌位焚香拜禱畢將前藥逐

味稱準八大乳鉢內再研數百轉入細石臼內漸加糯

米濃汁調和軟硬得中用杵搗干餘下至極光潤爲度

每錠一錢修和時除使令之人餘皆忌見倣此藥唯在

潔誠方效病人每服一錠勢重者再服一錠以通利爲

度利後溫粥補之

通治瘟病初得頭痛  
脉大壯熱小蒜汁少加水頓服再服卽痊

嵐瘴

大蒜生熟各七片

共食少頃腹鳴或吐血泄瀉卽愈

治時氣

猪脂如彈丸溫水化服日三次

苦參酒

治瘟疫欲死并治熱毒氣欲死

苦參

一兩黃酒一壺煮半壺飲盡當

吐則愈諸毒病服之覆取汗皆愈

比方三見各有不同故并錄之

梓皮飲

生梓白皮

切水煎服

治時氣瘟病頭痛壯熱初得

一二口者 瘟病復感寒邪變爲胃嘔治同

葵荷汁

治傷寒瘟病初得頭痛壯熱脈盛者

蕪荷

連根葉搗設汁服

治瘟疫 虎耳草擂酒服治瘟疫

時行風熱

藜蒿

音甜一名暮蓮  
齊魯多爲滾當

搗汁飲之

梨甘飲

通治瘟疫

梨核皮

大粉草

各一兩

黃秫谷

一合

爲未百草霜一錢共爲細末每服三錢白湯日二服

時氣頭痛煩熱 麒角燒研入姜汁蜜各少許水和二錢  
服之先以熱水淋浴後服藥取汗即愈

時疾煩悶癲癇大渴孕婦心熱等症

蘆根

一兩煎濃湯服

天行熱疾煩渴發狂吸服金石心熱發渴 幷煮荸薺汁服

瘟毒大熱 壮猪乾糞水漬取清飲