

洗冤錄詳義

可疑
疑難
審察
時

勒殺類自縊溺死類投水奴婢捶撻
在主家自盡俱詳前毆勒假作自縊
及溺水辨生前死後各條
刑律圖毆例云一原毆並非致命之
處又非極重之傷越五日因風身死
者免抵擬以杖流若死在五日以內
仍絞候如當致命之處傷輕或傷重
非致命之處因風死在十日以外方
準改流其致命傷重及雖非致命傷
至骨損骨斷即因風死在十日以外
仍擬絞抵若正限外餘限內因風身
死照毆至廢疾律杖徒至餘限外因

洗冤錄詳義卷三

海甯許樾編校

疑難雜說

凡檢屍差之毫釐失之千里切勿輕
視常有勒殺類乎自縊溺死類乎投
水。圖毆有在限內致命而實因患病
身死。僕婢因被捶撻在主家自害自
縊之類情迹不同並爲疑難務須臨
時審察。

刃傷

風身死止科傷罪其因患病身死與本傷無涉者仍依律從本毆傷法

殺傷篇云被快物傷死者看原著衣衫有無破損處隱對痕血點可驗

集韻擯取亂切音暴擯也

酒醉及失腳自傷

凡檢驗疑難屍首如刃物所傷透過者須看內外瘡口大處爲行刃處小處爲透過處如屍首已爛須看其原衣服比傷著去處屍或覆臥其右手有短刃物及竹頭之類自喉至臍下者或是酒醉攔倒自壓自傷如貼近有登高處或泥中須看身上有無他故錢物有無損動處恐因取物失腳自傷之類

腐爛無
迹可憑
驗顛門
骨

命門骨
手擊立
斃

正骨心法云顛頂骨一名天靈蓋位
居至高內涵腦髓以統全體是天靈
蓋即頂心骨非顛門也
安徽省奏手指拍傷咽喉死者生前
氣喘處所被拍指痕尚未實靠喉骨
皮肉消化之後其骨色作何檢驗刑
部議覆氣喘被拍正與疑難雜說卷
絕呼吸氣血上湧之條相符只檢顛
門一骨便明等因乾隆三十五年成
案

將人致死或經久屍肉腐爛無跡可
憑者但檢驗顛門一骨諺稱天靈蓋
必浮出腦殼骨縫之外少許其骨色
淡紅或微青皆因暈過絕呼吸氣血
上湧所致只撥驗此骨便明

凡命門骨最屬虛怯以手擊之即可
立斃因命門骨左右兩穴有紅筋若
細絲通於兩內腎拍斷即死外無痕
跡若有告稱拍著命門處身死只檢

命門骨卽骨格內所載腰眼骨之第一節也。自尾蛆骨倒數第八髓此作第七髓誤。詳見骨格內腰眼骨條上層。

屍無痕損立詳

洗冤錄表云此是不知有無爭鬪而屍無痕損者是一疑難。

元槩本洗冤集錄及平冤錄捫並作搗案搗俗搗字。

搗捫殺面色必紅。若檢骨其面上眉棱等骨及兩腳後跟骨俱紅。氣不得出。塞於胸間。故肉硬。

驗命門骨紫赤者卽是其命門骨。自尾蛆骨倒數上第七髓兩旁各有一小穴者是。

凡屍身無痕損。惟面色有青黯。或一邊似腫。多是被人以物搭口鼻。及搗捫殺。或是用手巾布袋之類絞殺。故不見痕。須看項上肉硬。此最爲切要。處手足有無繫縛痕。舌上或有嚼破痕。大小便二處。或有踏腫痕。若無此。

關毆分
散失跌
落水淹
死

方書云經喉風喉腫而大喉內有紅
絲纏繫或兩頤及項赤色纏連口多
涎沫手指印青頃刻卽死
患各本譌有據元繫本改
此專指關毆之後言之須看明分散
二字若當場因打而失跌落水難以
並論矣

淹各本譌泔據舊鈔本改說文泔雲
雨貌與淹之訓沒義異

頰方看口內有無涎唾喉間腫與不
腫如有涎及腫恐患纏喉風死或是
酒醉卒死宜詳

有關毆之後各自分散或近江河池

塘洗頭面血或取水喫但因相打力

乏或因醉相打後頭暈音運失跌落水

淹死初落水時尙活其屍腹肚膨脹

十指甲內有沙泥兩手向前此是落

水淹死相驗分明雖有毆擊痕損去

率限數語可與律例參用

相打分散乘高失腳身死

生前奔跑忿激氣血湧逆身死者面色黃瘦口鼻有血見成案

爭鬪致死屍無

此明知爭鬪而屍無痕損極宜詳細推鞠方無枉縱

處一一填入驗狀定作毆後落水致命緣打傷雖在要害處尙有辜限及限外以他故死者各依本毆傷法此既是落水身死則雖有傷痕其實以他故死○更有相打分散後乘高撲下而死者但須驗失腳處高下撲損痕癥致命要害處仍根究眼見相打分散之證佐人恐爲相打者所擠故須詳究凡因爭鬪致死而屍上並無痕損此

痕損

成案質疑駁好學姪女被曹氏迷拐將曹氏捉獲先以拳掌打其腮腴繼以樹枝打其左腿均係輕傷曹氏忽稱腹痛倒地旋即殞命驗得上下牙齒各指甲俱青色屍子供伊母夙患陰寒病證不時舉發其爲臨毆適值病發自斃無疑擬杖完結

宋本或字下有一個或兩個五字今脫去非是洗冤辨正云一個縮上亦可致死如何可去此五字

年老虛弱爭鬧氣絕

此與上條均以腎子縮上爲憑洗冤集編云凡年老人以手搏之而氣亦絕是無痕也

或是被傷人舊有宿患氣疾或是未
毆以前先曾飲酒至醉及爭鬪時有
所觸礙以致氣絕而死也如此者腎
子或縮上不見須用溫醋湯蘸音贊衣
服或絲絮之類罨一飯時令作作以
手按小腹下其腎子自下卽其驗也
然後子細看要害致命處
有年老虛弱之人與人爭鬧登時氣
絕沿身無傷更驗腎囊兩子多是一

各本腹下謬作肚腹據舊鈔本改觀
前條亦有此語可以互証

驗無傷
損又無
病狀

檢婦人無傷損處須看陰門恐自此
入刃於腹內離皮淺則膈上下微有
血沁深則無如男子須看頂心囊門
恐有平頭釘硬物刺入
火燒釘子插入骨內其血不出亦不
見形迹

被殘害
死

要錄凡被人用秤桿通入糞門死者
兩眼胞膜起兩手腳拳縮大腸拖出
四五寸

被打後
服毒自

被打服毒証以自服毒藥須參看後
服毒爲死後用繩吊起死後推在水

箇縮上須用手按小腹下則腎子自
下。

驗屍諸處並無傷損又無病狀難爲
定驗者恐是被人將刃物釘入顙門
或腦中致命先須令屍親干證人等
立狀訖然後剷除死人髮髻驗之

如被殘害死者須檢齒舌耳鼻內或
手足指甲中有簪刺之類

凡檢驗屍首指定作被打後服毒身

縊投水身死

中須參看被毆勒假作自縊及溺水辨生前死後篇

洗冤集編載甲乙同行乙有隨身衣服而甲欲謀之行至鄰河甲執乙就水而死驗得乙屍瘦怯胸前赤色肚腹脹口唇青十指甲黑黯色指甲縫鼻孔各有泥沙此乃乙劣而甲利其衣服執於水而致死也一鞠卽伏洗冤集說云有兇徒謀死小童推入水中發覺距行兇日已遠官司打撈得之皮肉潰盡僅存骸骨不可辨驗因雖招服未免疑其假合後因開卷見血屬所供其弟原是龜胸復檢果然方敢定刑

死及被打後自縊身死被打後投水身死之類須要見得親切若是打死人後以藥灌入口中誣以自服毒藥或死後用繩吊起假作生前自縊或死後推在水中假作自投水者一有差誤關係不小必須子細點檢死人在身痕傷如果不是要害致命去處其自縊投水及自服毒皆有確據實跡方可明白開報

見證無人屍無下落

密訪是極難事或平日喜恃此策則訟師地棍必遣人妄布流言變亂黑白不可不慎說詳卷一檢驗總論內廣爲訪察條上層

若昏夜被殺見證無人及屍無下落者只宜案候密訪不可妄意猜疑鍛鍊成獄

疑難檢驗毋使作舞

近時案關人命重情如遇財勢之家一經地保帶同屍親稟報不必俟官吏臨場而刑件人等早被勾通打點此事全在司牧者胸有把握不至被其欺朦方能無枉無縱否則不論案之大小難易未有不墮其術中者余作吏二十餘年目中所見因此被黜者不知若干人矣

凡疑難檢驗及兩爭之家稍有勢力須選慣熟件作人謹慎守分者隨帶同行毋使暫離左右飲食水火令人監之少休以待其來不如是則恐其作私舞弊變動事情枉屈人命不可不慎

驗病死
人先問
因由

屍傷雜說

洗冤集錄云死屍肥壯無痕損不黃瘦不得作患病死凡屍有青色者雖係病死應將銀釵探試是否服毒注明屍格以杜日後刁告

凡驗病死之人須先問本人來自何處幾時到來有無熟人識認原患是何疾病年歲若干病幾日身死若是奴婢則先討契書看問有無親戚會請是何醫人喫甚藥問明因由然後對眾證定如別無他故只取驗狀聲明遍身黃色骨瘦委是生前因患是何疾致死仍取醫人驗狀一紙如果

病死形狀

凡勞病死者形體瘦弱遍身皮肉黃白色氣膨食膨死者肚腹不堅硬按之則凹放手即高血膨死者當氣絕時即有黃水流出血脚腫脹

求乞病死

宋本蓋作著洗冤錄辨正上既云口合則不當復言唇不蓋齒言不著者

眾證因病身死分明既不是非理致死不須請復驗

凡因病死者形體羸瘦肉色痿黃口眼多合腹肚低陷兩眼通黃兩拳微握髮髻解脫身上或有新舊針灸癰痕餘無他故是因病死

凡患病求乞在路死者形體瘦弱肉色痿黃口眼合兩手微握口齒焦黃唇不蓋齒

病死發變

不過浮而相離之意

卷一驗屍篇有驗發變屍二條須參看

或疾病死。值春夏秋初。經隔兩三日。肚上臍下。兩脅肋骨縫。有微青色。此是病人死後。經日變動。腹內穢污發作。攻注皮膚。致有此色。不是生前有他故。

邪魔中風卒死

涎壅卒死

此與下邪祟卒死相同。但分別內因。外因邪魔者。內因也。心神昏亂。似頭非頭。或目閉口呆。不省人事。由於氣血衰耗。元神不守。所致。非真有鬼邪附著也。邪祟者。外因也。若十挂五尸。中惡客忤之類。由於感觸邪惡逆忤。穢氣所致。是實有鬼邪為患也。二者非不可救。但恐內外誤治耳。

邪魔中風卒死。屍多肥。肉色微黃。口眼合。頭髻緊。口內有涎沫。遍身無他故。

卒死。肌肉不陷。口鼻內有涎沫。面色

卒中死

卒死者猝然僵仆死也其症有中陰中陽之別中於陰者面色青黑痰喘昏亂中於陽者面色紫赤上視強直此即真中風也

紫赤。蓋其人未死時。涎壅於上。氣不宣通。故如此。

肝風乘胃則口齒閉牙關緊急以皂莢乳香黃芪防風煎湯熏之然須大作湯液如蒸如霧乃得力風中經絡則口眼喎斜手足拳曲以桂枝三兩酒煎濃汁用舊布蘸搭數次患左搭右患右搭左尚可救十中一二

卒中死。眼開睛白。口齒閉。牙關緊。閉。有口眼喎斜。並口兩角鼻內涎沫流。出手腳拳曲。

中暗風死邪崇卒死

此屬內虛暗風與外來風邪迥別肥人患此者多方書云中五藏之絡者口眼俱閉人肥必氣急而肺盛肺金尅肝木故痰涎流此當與前邪魔卒死條參看

中暗風。屍必肥。肉多澁白色。口眼皆閉。涎唾流溢。卒死於邪崇。其屍不在

暗風如發驚搐

虛風內煽必發驚搐中血脈則口眼喎斜中肺則手足枯細如此死者鼻

於肥瘦。兩手皆握。手足爪甲多青。或暗風如發驚搐。死者口眼多喎斜。手

死

衆十指甲俱青

足必拳縮。臂腿手足細小。涎沫亦流

出。

傷寒死

張仲景傷寒論云陽氣前絕陰氣後

傷寒死。遍身紫赤色。口眼開。有紫汗

氣後竭者其人死。身色必青。陰氣前絕。陽

流出。臂亦微綻。手不握拳。

冒時氣死

元稹本眼閉作眼開。舊鈔本同。應據

冒時氣死者。眼開口開。遍身黃色。畧

斑疹死

則爲溫濕傳染。卽爲疫癘。熱蒸鬱滯。節之氣。蔓延人觸之而病

有薄皮起。手足俱伸。

斑疹死者。兩眼合。十指甲青黑色。兩

斑疹死。皮肉上只有星點紅斑痕。而

曲脈有青筋紫紅瘰。

不甚浮腫。

中暑死

中暑與傷暑異。傷暑者或坐臥陰涼

中暑死。多在五六月。眼合。舌與糞

爲寒所襲。肢體拘急。嘔吐。變亂。此由

以死

餓死

驚死

靜而得者也中暑者或遠行勞役大熱而渴陽氣內伏卒然昏暈此由動而得者也二者不可不辨

山東省萊陽縣民王四毆推賣發才落水受凍身死查王文進推跌賣發才擦傷頭顱額角雖係致命之處原驗僅去浮皮傷甚輕淺不至於死賈發才爬起尚能叫罵後被王四推落水驚爬起蹲立寒顫經王四扶回用火烤救旋即氣微殞命原驗屍身面帶芙蓉色口有涎沫兩手緊抱胸前其爲落水受凍身死無疑將王四擬抵乾隆四十三年成案

案禁即噤字緊禁者即緊閉也

門俱不出面黃白色亦有鼻孔及糞門有血出者

凍死者面色痿黃口內有涎沫牙齒

硬身直兩手緊抱胸前一說項縮縮拳檢時

用酒醋洗少得熱氣則兩腮紅面如

芙蓉色口有涎沫出其涎不黏

餓死者渾身黑瘦硬直眼閉口開牙

關緊禁臍肚低塌手足俱伸

驚死者目瞪口開兩手舒展猶若怕

酒食醉飽死

醉飽悶脹未死尚可救治當問其所傷何物卽用其物爲灰好酒灌下急覓消導之藥以導之如麪食積則以麪食燒灰多加炒焦麥芽飯食積則以飯食燒灰多加炒神麪肉食積則以肉食燒灰多加炒山查如係米麪肉食積而更難以油膩則以米麪肉食共爲灰加以炒麥芽神麪山查好酒調灌外以生大黃末雜芒硝酒調敷其前後心及臍上再用艾灸三四壯得汗卽愈

元藥本如或作如因影宋本飲酒作服毒此段注語本係服毒篇正文列在服砒霜野葛之後意謂毒因吐瀉而變其狀似與服毒相反故申明其之說不知何以移作此注殊誤

肺之狀。

凡驗酒食醉飽致死者先令伴作用

醋湯洗檢在身如無痕損以手拍死

人肚皮膨脹而響者卽是因食飽腹

脹酒醉心肺致死仍取屍親供狀死

人生前常喫酒多少致醉及現今喫

酒多少數目以驗致死因由如或吐

皮膚微黑不破裂口內無血面唇指

甲不青糞門不腫突乃是飲酒相反

燒酒醉死

燒酒醉死用鍋蓋上氣水灌下牛碗
即活或以井底泥塗其胸浸髮冷水
中飲以綠豆粉可解

醉飽後
築踏內

貴州省健連科先被張林才等毆傷
小腹等處後被胡萬林嚇嚇適傷

燒酒醉死者牙齒動搖欲落屍軟弱
不硬口鼻閒有血水流出○燒酒不
可以錫器盛炖及過宿倘爲日稍久
飲之則能殺人其人之面多青黯

昔有人燒酒醉後復引烟而死
者又有人醉燒酒身頗畏寒以
綿被厚蓋之而死又有人醉燒
酒索飲冷水數碗而死或日冷
水徐飲可以漸引火毒外達若
連飲過多熱毒爲冷所遏無由
透達故開
厥不救

凡酒食醉飽後被築踏內損死者其

損死

連科臍肚下坐跌在地胡萬林順勢
推倒仆壓身上稱欲捆縛詎饒連科
醉飽被踢坐跌震動臟腑內損吐血
用藥醫治各傷將次不復惟臍肚下
之傷色仍紫赤且吐血不止延至三
十七日身死其爲內損致死無疑嘉
慶二十一年成案

狀甚難明若屍別無他故惟口鼻糞
門有飲食并糞帶血流出驗此等屍
須子細體究曾與人交爭因而築踏
見證分明方可定狀

一說其屍遍身微紅口眼俱開

兼有血出兩手握肚腹脹

鍼灸死者須另勾醫人驗鍼灸處是

否穴道有無錯誤致死因由

五臟之氣已絕於內而用鍼者反實
其外是謂重竭重竭必死其死也靜

鍼灸死

此條語氣未了朱本致死因由下有
雖無意致殺亦須說顯是鍼灸殺亦
可科醫不應爲罪二十一字刪去非
是

因其死之靜與躁以決其用鍼之誤
此非質之醫家難爲誤用之證故上
節云須另勾醫人

靈樞素問載鍼灸刺中心一日死其

動爲噫刺中肺三日死其動爲欬刺中肝五日死其動爲語刺中脾十日死其動爲吞刺中腎六日死其動爲噦刺中膽一日半死其動爲嘔刺跗

上中大脈血出不止死刺頭中腦戶人腦立死刺腎中太陰脈出血多立

臟氣已絕於內陰虛也反實其外誤益陽也益陽則愈損其陰是重竭也陰竭必死死則靜也

五臟之氣已絕於外而用鍼者反實

其內是謂逆厥逆厥必死其死也躁

臟氣已絕於外陽虛也反實其內誤補陰也助陰則陽氣愈竭故至四逆

而厥逆厥必死死必躁也

男子作過太多脫死

相傳婦人脫死面作笑容玉門不開有粉紅精外溢柳子厚河間婦人傷所云髓竭而死是也

凡男子作過太多精氣耗盡脫死於婦人身上者真僞不可不察真則陽

不衰僞者則痿

陰陽症死

陰症死

受杖死

陰陽症卽張仲景傷寒論所稱陰陽易易者卽交易之義男病而女與交接相染名陽易女病而男與交接相染名陰易男相染則陰腫八腹絞痛女相染則裏急腰膝連腹內痛此因淫情不禁陰邪得以投其隙移禍於不病之人頓令一身之精氣形神皆受慾火之害犯此症死者兩手足指甲青黯或青紫甚則頭面及遍身皆紫黯綠其血敗精脫故也

昔有人暈一婢而脫者斂時啟所蓋被異香四發此因服房藥多麝膻通透之品故也夢中脫死者男則陽不衰女則陰必洩屍俱有

笑容

男女囚陰陽症死者脣及指甲多青黯甚或遍身皆紫乃氣絕血凝之故陰症死者屍青黑黯似毒死形而色微淡口眼合兩手握陽縮小餘精流出

凡受杖而死者須驗所受杖處瘡痕

杖後因
他故死

古以荆杖打小杖曰笞大杖曰杖
笞罪自一十至五十爲五等杖罪自
六十至一百爲五等今以竹板代之
每一十折責四板除零核算小竹板
大頭闊一寸五分小頭闊一寸大竹
板大頭闊二寸小頭闊一寸五分
竹板新者質重而棱角尚存責臀上
有如石壓舊者質輕而鋒芒都去責
雖重而迎臀卽起早役受貽舞斃或
打用縮頭則傷聚一處血凝成瘡或
專打腿灣筋傷骨痠或將臂子挺起
打下則氣閉頭闕
受杖之人忌臥草席及竹席並熱炕
不獨潰爛難痊且恐引毒入心或至

開狹看外腎并陰囊婦人并兩脅肋
腰小腹等處有無血瘡痕

小杖痕左邊橫長三寸闊二寸五分
右邊橫長三寸五分闊三寸各深三
分

大杖痕左右各方圓三寸至三寸五
分各深三分各有膿水兼瘡周圍亦
有膿水淹浸皮肉潰爛去處

杖後有因他故死者若兩腿面及小

不救

受杖因
風身死

臨高跌
死

各項刑傷俱有生風變症不可不慎

腹有微紅色。勿以曾經受杖更作血
瘡傷痕。蓋受杖時按捺在地。或被硬
物打傷。死後自然發現。臨時務須分
別。

兩臂上各有破傷。斜長幾寸。闊幾分。
深至骨。上有血痂。委是受杖。決因風
透患致命身死。

驗明失腳蹤跡及致跌因由并查抵
撞物件此乃受傷確證仍將抵撞之
物比對傷痕可攜取者帶回照庫不
能攜取者同取封記

凡從樹及屋臨高跌死者看枝柯挂
絆所在并屋高低失腳處蹤跡或土

自跌推
跌有別

自跌止傷半邊推跌先傷頭面洵屬
不謬若云自跌多在腿足臂膊而竟
不及頭面推跌多在頭面手腕而竟
不及腿足未必盡然惟輕重有不同
耳全在臨時詳察
在上在下不可執定蓋被推而跌者
未必不自護其首失足者亦未必不
因他物磕撞猝不及護致傷頭面且
從高而下或先上身倒落則頭面安
得不傷

痕高下及要害處須有抵癰或物磕
擦痕癰若內損致命者口眼耳鼻內
定有血出若傷重分明更當細驗之
仍量撲落處高低丈尺

跌者從高而下或失足或自絆其力
在下則所傷多在腿足及臂膊然其
或左或右又皆止傷半邊如係人推
而跌者則其力在上所傷多在頭面
及兩手腕蓋推之力大而人之一身

塌壓死

江西省義甯州民段邦發從高自行失跌身死驗得該屍致命頂心偏左額角均有磕傷有血瘀委係失足跌傷身死嘉慶八年成案據此則錄中所載從高失跌所傷多在腿足及臂膊數語未便拘泥也

塌壓致死必有塌壓物件更須詳查塌壓因由以防仇人謀害

各本瘀誤作淤據舊鈔本改說文瘀積血也淤澀濁泥也此稱血瘀空作瘀爲是

其最重莫如首推而下之勢必自顧或兩手先至地或出於不知則頭面必先倒垂而下雖亦未必全傷而所傷與自跌者不同

凡被塌壓死者兩眼突出舌亦出兩手微握遍身死血瘀紫黯色或鼻有血或清水出傷處有血瘀赤腫皮破處四畔赤腫或骨并筋皮斷折壓著要害致命如不壓著要害不致死或

舍屋及
牆倒石
落壓死

樹木壓
死

共擡一
物力小
壓傷

長闊分寸必與所壓之物相對相符
方無差慮

若因傷致死。腰間必有瘀血痕。蓋擡
物全用腹力受傷。必致血瘀。

死後壓。卽無此狀。

凡舍屋及牆倒。或石頭脫落壓死者。其屍沿身虛怯要害處。若有痕損。須聲明長闊分寸。作堅硬物壓痕。仍看骨損與不損。若樹木壓死。要看所倒樹木斜傷著痕損分寸。死後壓者亦無此狀。

兩人共擡一物。一人力大。驟爲擡起。一人力小。被壓。則所壓之肩窩及相

他物壓
塞口鼻
死

各本他誤作外據舊鈔本改

口鼻流血及便溺汚可以洗滌掩飾
惟眼開睛突滿面血瘡囊門突出諸
形狀斷難掩飾漿泥

衣服溼
紙搭口

凡用衣服悶壓死者猶有血瘡痕跡
可驗如用溼紙搭口鼻死者面上並

先覓錄詳義

卷三

對之手足必俱有傷如誤觸而壓傷

者當辨其前後左右如被壓於後則

前有跌磕微傷被壓於前則後有跌

磕微傷左右亦然

凡他物壓塞口鼻出氣不得以致身

死者眼開睛突口鼻內流出清血水

滿面血瘡赤黑色囊門突出及便溺

污衣服等件

凡被人衣服或溼紙搭口鼻死則腹

屍傷雜說

古

鼻死

他物壓塞死

殭褥捲
原倒立死

無痕跡最爲難辨。須看手足心胸有乾脹。

無捉拏束縛傷痕細心查驗並詳訊犯證要在落腔初供庶可得情稍一

疎忽便成疑獄

凡以石灰袋悶死者頂骨必裂碎以紙或他物悶死者頂骨必紅色此皆補上二條所未及須合參

腦後腳踝腳跟必有挺撞傷痕

乾脹。

被他物壓塞而死者其兩手外膊不
拘上下兩足後骨並心胸之前俱各
有微傷方是蓋悶至喘突壓之必重
身雖不能展動未有并手足壓定不
能稍動者如或并縛其手足則亦當
驗手足有無束縛傷痕。

或有將人飲醉厚其殭褥挾令橫卧
俟其睡熟然後將殭褥捲而束之倒

倒入石
灰水桶
死

若止酒氣熏蒸安知非實係醉死故
又引讀律佩觿以申明之則與醉飽
死而脹在肚皮者不同矣

立片時卽死者並無口眼血出諸跡

卽或微有淨洗卽無而酒氣倍爲熏

蒸。一說大腹小腹皆平弱而無脹形

及心胸之前按之堅實擊之無聲者
卽是若檢骨則傷在頂心及兩足心

骨

有以高桶二隻疊而合之約如人身
之高下以下桶貯水令滿入石灰數
升攪渾將人倒入水中再以所合之
桶蓋上片時卽死名曰游湖其人死

既將人倒入水桶則死者手足應有
掙扎傷痕可驗否則有束縛痕

此等致死必有同謀多人但須供證
確鑿起鐵灰桶方可請檢否則一無
可疑之端豈得冒昧檢骨乎

後用水洗淨毫無傷跡面色微黃而
白一如病死雖云有血倒出然見灰
氣即回而血之應凝滯於面者得灰
盡解此若非檢骨則不得其實檢骨
之法必在腦殼之內蓋灰滓從口鼻
而入口鼻雖可淨洗而從鼻灌者直
入於腦灰最沈滯腦內必多灰滓以
此爲驗自無所遁

硬物癰
疔死

疔平冤錄作瘡云或作墊廣韻實徒
念切支也據此疔爲瘡字之譌無疑

凡被硬物癰疔音悶死者肋後有癰疔

字音店音店瘡疾也與義未合

筋當從平冤錄作肋爲是案上文既云肋後則此處係承上文而言應是肋字無疑且肋骨方是虛怯要害致命處設泛言筋骨便難直損矣

馬踏死

驢足牛角傷

著紫赤腫方圓三寸四寸許皮不破用手揣捏著筋骨傷損此爲虛怯要害致命處

凡被馬踏死者屍色微黃兩手散頭髮不慢口鼻中多有血出痕黑色被踏要害處便死骨折腸臟出若只觸倒或踏不著要害處卽有皮破癰赤黑痕不致死○驢足痕小牛角觸著處多在心頭胸前或在小腹脅肋若

人馬驢
驢牛踏
傷

青細漫筆云有人被馬蹄踏受傷甚重或傳一方用鼠糞五十枚故馬蹄一尺燒存性同研細末豬脂調敷數次愈

毛世洪便易經驗集馬齧傷潰爛以馬齒莧一握煎湯日服以愈爲度傷口以龍頭繩索燒灰糝之即愈洗冤錄備攷馬蹄踏傷心腹兩肋小腹間長寬三四寸不等月芽樣半邊青紫半邊紅色一蹠可踏肋三條中一條損折有芒刺

驢騾不甚跳動故凝聚成形

皮不破傷亦赤腫

牛角傷痕小而深者方是

人馬驢騾踏傷者有緩急叢亂之分總以傷之多寡輕重爲辨馬馳力大所傷處少傷必骨折或腸臟出擁擠仆地而踏傷必多但不似馳騾者之力重而折甚人踏傷成片而長一頭重一頭輕叢踏不起者則輕重長短不一驢騾踏傷不獨較小於馬其傷之量凝聚成形牛觸係不知而騾撻

車輪抄
死

集韻抄子末切通也各本从木作抄
誤據舊本正

幾希錄方騾馬踏傷骨碎用生半夏
二錢生黃柏二錢研末敷之再用鮮
蟹殼新瓦上燒存性研末黃酒調服
一醉其骨自合或用活蟹小者二三
隻大者一隻搗爛熱酒沖服亦驗

者傷多在前兩肋之半小腹及心胸
若牛佚而奔方避之而不及則受傷
多在脊背及肋之左右

凡被車輪抄死者其屍肉色微黃口

眼開兩手微握頭髻緊

速死者屍狀
如此經數日

死者
異是

凡車輪頭抄著處多在心頭胸前并

兩脅肋要害處便死不是要害不致

死

車有橫輦直輦
分別

橫輦及面迎二者半由自取追給埋
葬銀兩可也從背輦者辨其係曠野
係城市係空車重車城市地窄人不
及避空車可稍止以讓人重則人自
應避之卽酌輕重以定追埋杖懲之
衡

車有橫輦直輦之分。橫輦者十字路
口人從橫過。車行急驟不及挽回。其
人跌仆被輦而死。則或項或首或心
胸背脊。肋腹或手膊腿足。各有徑過
傷。如係對面迎輦者。其傷或手足或
脅肋。卻皆或左或右。俱在半邊。直而
徑過。其傷必長。卻多在仰面。若人在
前行。車從後至。傷亦如之。但屬在背
居多。

雷震死

江西省寧都縣監生郭鼎被雷擊傷身死。驗得左額角擊傷一處皮破緊硬焦黑色。兩眼胞微開口。開手散肌。腹火燒象文一道。焦黃色。髮散如燄。火燒焦腎囊微脹。穀道出血。周身黃黑色。乾隆四十一年成案。

雷有震擊分別

雷擊死者其形一如前條所載。惟震死者面色深黃帶黑黯而已。

凡被雷震死者。其屍肉色焦黃。渾身軟黑。兩手拳散。口開。眼皺。音脫皮剝也耳後髮際焦黃。頭髮披散。燒著處皮肉緊硬而纏縮。身上衣服燒爛。或不燒傷。損痕跡多在腦上及腦後。腦縫多開。鬢髮如燄。火燒焦。從上至下。時有手掌大片浮皮紫赤。肉不損。胸項背膊上。或有似篆文痕跡。○雷有震擊二項。震者被驚而死。無傷。擊則有傷。

虎咬死

毛世洪經驗便易方虎咬爪傷以蠶豆葉搗敷如無葉時以枯蠶豆水浸頓連皮持爛敷之亦應

集韻羣柱買切讀與篤近聲譜珍攬物也

虎咬傷不死用水調沙糖冷傷處或麻油塗或生薑汁拌白礬末敷均效

痕

衡陽人某被雷擊死身首俱無燒痕惟左足大指上如針刺一孔甚深自臍心起至膝上焦黃如灸亦無篆字文

凡被虎咬死者屍肉色黃口眼多開兩手拳握髮髻散亂糞出傷處多不

齊整有舌舐齒齧痕跡

虎咬人多齧頭項上身上有爪痕拏

聲派上損痕傷處成窟或見骨心頭胸

前臂腿上有傷處地上有虎跡勘畫

仍飲薑汁解毒

匠畫山虎跡并令刺甲及傷人處地

鄰爲證

虎齧人月初齧頭項月中齧腹背月終齧兩足貓齧鼠亦

然

死 顛狗傷

顛狗齧人其傷處雖未破但見青紅卽已中毒宜亟治之被齧後用冷水

洗淨齒垢蓋以杏仁泥服韭菜汁一碗以後隔七日一服服至七碗止此

症最怕七日一發發時卽無風但畏風大須人蒙護過三七日無此情狀

方吉百日內忌鹽醋一年內忌豬肉魚腥終身弗食犬肉蠶蛹

死 蛇蟲傷

讀律佩觿云黃風蛇倒東人身上以尾入鼻竅不救無噉痕青色帶腫

方書蛇傷人用蜈蚣燒存性研敷又焙研二條酒服

凡被顛狗傷死者傷處必有痕跡腹脹硬陰莖挺出其毒發之時如感冒風寒之狀畏風特甚時作狗聲每欲齧人及衣物小腹墜脹小便難

凡被蛇蟲傷致死者其被傷處微有齧損黑痕四畔青腫有黃水流毒氣

死後被
蟲鼠傷

道路死
屍

元槩本洗冤集錄他物齧作狗齧

驗道路倒卧無主屍須看身上有無
灸癍疤疔肉癰等項肢體有無舊損
皆要一一記明以防日後覆驗
驗報受傷路死及無傷而被禽犬殘
毀者要先看屍旁有無腳蹤血跡即
跟尋蹤跡由來並傷痕內齒痕禽啄
痕之類如有形跡即敘於件作喝報
之前或有屍親認領須訊明年貌衣
服並遺物是否相同設稍有未符不
得遽準給領以防垂延遺物致被冒

灌注四肢身體光腫面黑。

死後被蟲鼠傷者皮破無血破處周
圍有齧痕蹤跡有皮肉不齊處若他
物齧則痕跡粗大。

道路死屍地方申報即行相驗明白。
開造有無傷痕約畧年紀填註面貌
衣服如有攜帶行李財帛眼同鄰甲
公驗貯庫以俟親人認領買棺殮封。
培土暫埋標立記號若係兇死之屍

附
吞金身
死

認

軍流遺犯病故向係將屍浮埋飭傳屍屬領骸歸葬乾隆四十五年刑部以浮埋之棺日久無人赴領轉致屍骸暴露行令就近深埋此等道路死屍其親屬赴領更遙遙無期應一體深埋以免日久暴露

雲督劉參軍總兵田允中吞金斃命一案驗得屍身並無別項形狀用銀鍼探驗亦無青黑形色查田允中於初五日吞金戒指三個後精神恍惚不進飲食時索水飲于初八日口吐黃水不止卽于是夜殞命
檢驗驗說吞金死者其骨色黃

尤必斟酌申報

參附毒

烏沙脹

各項傷痕真偽易辨惟中毒一項有似毒而非毒者如傷寒陰症暗中風中毒之類各有青紫腫突形狀然猶有病情醫法可以查據至若誤中真毒如此論內所云參附癆瘵食物蛇蟲等類全在相驗時詳察其平素之服食起居同伴之親友奴僕務得誤中毒氣確情庶免冤累若但以屍狀係是毒死銀鍊成獄則爲害匪淺觀後服毒辨生前死後篇末節有中毒輒驗稱服毒宜子細辨之二語益當十分詳慎矣

沙脹死者面青色或身亦青色心坎兩肋有紫紅沙斑兩曲肱有青筋生前鍼刺無血出者十指甲青黯面青黑恐是中毒非盡沙脹也

論中毒

凡可以致人於死者非獨砒鴆爲然而參附爲尤甚。日夕服之不置以致口鼻流血膚爲寸裂而死。岐黃書中更有青筋脹一症。卽俗所謂烏沙脹。倘誤認爲陰症而投之以藥則斷乎不救。凡此等症候及陰症之不救者。兩手足指甲皆青黯或盡青紫甚則頭面及遍身皆紫黯緣其血敗積而

閩粵瘡
癰治法

有宦游閩廣者云嘗見人感受瘡癰之氣百般療治迄無一效惟以吾鄉之長安臥龍丹及塘西妙藥丸其應如響因思此一丹一丸海內著名但近年市肆所售往往減輕貴藥而以賤藥足之以此功效稍遜於前余家遺有二方特錄於此凡有心濟世者誠能選料配合不特瘡癰可治而內外諸症百試百效此居家出外必備之藥也臥龍丹方麝香二錢梅花冰片四錢糖酥二錢犀角肉桂水安息檀香沈香各五分丁香薄荷開楊花驚不食神各壹錢牙皂二錢火硝五分燈神炭六錢各研細末每藥秤準再合研極細裝餅收貯不論何症臨時取少許嗅鼻得嚏即愈妙藥九方茅山蒼朮六錢丁香大黃各壹兩二錢麝酥二錢麝香壹錢雄黃天麻朱

成色故也。又閩粵多瘡癰。凡為瘡癰所中之人。急令人以磁鋒代刺。或於額上。或於眉叢。或於兩臂膊。立出血升餘則瘡病淺者血紅而多。病深者血紫而少。若紫黑而極少。則病甚深。乃倖而僅救者耳。土人每以得血稱賀。如或不得血。或得之艱澀。則咸知不治。及其死也。其屍頭面。或多青黯。或盡紫黑。其手足指甲亦然。又肺癰。

肺癰腸
風中藏
諸症

食物相
反

瘰癧瘡
癰身死
形狀

砂麻黃各八錢甘艸五錢各研細末以糯米粥漿和勻杵數千下丸如薊子大朱砂爲衣晒乾蠶餅收貯內傷外感輕者七丸重者十四丸白湯送下外症照服并研末黃酒調服中臟據舊鈔本作臍毒爲是甘草與鮎魚黃瓜與花生南瓜與羊肉均不宜同食犯之立死物類如此者甚多

洗冤錄表云物性相反誤食而死須參看意外諸毒改變條

洗冤錄表云前曾瘰癧死者頭面青黯此言亦有面色紅赤等語蓋補前條所未備也

腸風及中臟諸症未死之前吐出惡物或瀉下黑血穀道腫突或大腸突出等項豈可盡視爲中毒之驗耶且如日用飲食中其物性相反誤食而死者更復不少卽如生蔥不可見蜜河魴不可見弔灰之類苟因其死之暴而狐疑以推之則大謬矣

滇粵等省受瘰癧身死者頗多其屍不盡青紫黑黯亦有面色紅赤脣口

蟲蛇毒
物狂犬
等傷

既有瘡痕較前二節之中毒易辨

中毒檢
骨

中毒檢骨有頭顱與下身仍然黃白者有牙根骨白色者蓋中毒有淺深久暫人有老少強弱未可一概論也惟胸骨十指尖骨或青黯或黑黯無

紫黑胸腹咽喉脹滿手足指甲俱青黯口眼耳鼻并糞門小便處所亦閒有血出若死後檢骨骨多青暈色毒有自外入而非飲食致者如蟲蛇等毒物傷則皮上有齧損痕若狂犬傷瘡乾後死亦有齒痕但分大小耳各所傷處但青黑腫

凡中毒屍骸潰爛檢骨則骨上下黯黑色胸膛心坎牙根十指尖骨俱青

不如此余歷次會檢俱經目睹卽成
案亦不少非憑空臆說也
色。

服毒死後形狀

凡服毒酒死者周身皮肉俱黑腹背俱發小疱七竅流血眼睛突出舌有芒刺肩吻碎裂十指甲青黑色肛門有血如將毒藥攪和食物服而死者周身皮肉青黑或紫黑腹背無疱七竅不流出血舌無芒刺

驗服毒死者當究明毒自何來若自藥肆買致應問是否知情須查明有無餘剩毒藥並取驗盛藥器皿以定虛實

耳鼻口内元藥本洗冤集錄作口鼻
眼内平冤錄同

未死前形狀

此節據元槧本洗冤錄合上文爲一節平冤錄未死前句上有仍論究

服毒死

凡服毒死者。口眼多開。面紫黯。或青色。脣紫黑。手足指甲俱青黯。口眼耳鼻間有血出。甚者遍身黑腫。面作青黑色。脣捲發。舌縮。或裂拆。爛腫微出。脣亦爛。腫或裂拆。指甲尖黑。喉腹脹作黑色。生皰。身或青斑。眼突。耳鼻口內出紫黑血。鬚髮浮亂。

未死。前須吐出惡物。或瀉下黑血。穀

三字

服毒發作

銀釵探法

驗水銀毒以金鍼試探取出白色者是

諸毒俱可用銀釵試探惟服瀉及瀉衣灰水雖有銀釵試探不出

口內照朱本作喉內爲是

洗鏡錄備載廣濟縣有用蛇毒命一案先將手足網縛逼令開口入蛇頭用火燒蛇尾使蛇衝過咽喉盤攪

無其色鮮白

人既死雖非服毒未免有穢故銀釵亦作黑色

黑色再用皂角水探洗其色不去如

死人口內以紙密封良久取出作青

驗服毒用銀釵皂角水揩洗過探入

死者坐處尋藥物器皿之類

或吐不絕仍須於衣服上尋餘藥及

若其藥慢或一日二日方發或翻吐

凡服毒死或卽時發作或當日早晚

道腫突或大腸突出服毒多而速死者形狀始有此

糯米飯
放屍口
驗法

五內初相驗時毫無傷痕卽銀釵探試亦無青黑色惟檢骨可得其情此骨從頂至足周身四旁凡一尺一寸之骨俱紅赤色鮮潤明亮將骨細刮愈刮愈紅是由蛇入腹攪亂周身血髓悉行透溢各處骨道故耳案洗冤錄表云查用蛇毒命既須先縛手足則手足定有細縛痕且逼令開口定有他物撬傷牙齒去處及有按住兩頤提勒髮辨種種痕跡可驗

袋當依元槩本洗冤集錄及平冤錄作袱爲是庶下袱字方有根
蒸元槩本洗冤集錄作饋平冤錄同注云饋甫文切音分牛蒸也案劉熙釋名饋分也衆粒各自分也
元槩本細破作打破

但洗之卽去也惟真中毒雖洗數次其色青黑不能鮮白

案毒藥身死者事多曖昧全憑銀釵定驗虛實銀釵似假一觸穢氣其色卽變難以辨明若臨事取辦於民則情弊多端必須令工匠用足色銀成造以官對牌試驗鑒記封收專爲驗屍需用亦絕冤濫之一端也

又一法用大米或黏米三升炊飯用

淨糯米一升淘洗訖用布袋盛就所

炊飯上炊蒸取雞子一個鴨子亦可細破

取白拌糯米飯令勻依前袱起著在

用縣絮至三五條未免過多。以三五條之絮而欲以三五升之醋煮覆。則醋又嫌過少。二者必有一誤。須臨時斟酌。

前大米黏米飯上。以手三指緊握糯米飯如雞子大。毋令冷。急開屍口。齒外放著。及用小紙三五張搭遮屍口耳鼻。臀陰門之處。仍用新縣絮三五條。音醋三五升。用猛火煎數沸。則縣絮放醋鍋內。煮半時取出。仍用糟盤罨屍。卻將縣絮蓋覆。若是死人生前被毒。其屍卽腫脹。口內黑臭惡汁自然噴來。縣絮上不可近。後除去縣

飯入屍口取與雞喫驗法

空腹食飽虛弱老病服毒形狀不同

廣東省開平縣民婦許氏毒死親夫李宜滿一案據覆檢件作供稱李宜滿食存胸膈毒不復行是以項頸胸膈骨色青黯而頭顱與下身各骨仍然黃白九卿會驗此屬臆揣之詞並無確證嗣據禮部尚書王安國奏李宜滿項頸並胸膈骨青黯不得謂非中毒所致照罪疑惟輕將許氏斬決

紫糯米飯被臭惡之汁亦黑色而臭。此是受毒藥之狀如無則非也。又一法將白飯一塊入死人口中喉內用紙蓋一兩時辰取出飯與雞喫雞亦死卽是。

有空腹服毒惟腹肚青脹而脣指甲不青者有食飽後服毒惟脣指甲青而腹肚不青者又有腹臟虛弱老病之人畧服毒而便死腹肚口脣指甲

乾隆十二年成案

糟醋法

並不青者。卻須參以他症。驗虛弱老病。人先以銀釵探喉中。如果色變。還作服毒論。其後方以他症參之。須詳審此人未死。前有何病。症虛損等情。有服毒已久。蘊積在內。試驗不出者。須先以銀釵探入死人喉訖。卻用熱糟醋自下。澆洗。漸漸向上。須令氣透。其毒氣熏蒸。黑色始見。如便將熱糟醋自上而下。則其熱氣逼毒氣向下。不復可見。或就糞門上試探。則用糟

哭物壓
毒入腸
試驗法

生前中
毒驗法

平冤錄云本屍唇破舌爛口內紫黑
手指甲青以銀釵探入喉中少時取
出其釵黑色是生前中毒身死
無冤錄云凡服毒死屍口眼多開面
紫黯或青色唇紫黑手足指甲俱青
黯口眼耳鼻間有血出中毒亦然
朱本其骨黯黑色作鑿色說文鑿淺
青黑也七感切

醋當反是

服毒中毒若生前喫物壓下入腸臟
內試驗無證卽自穀道內試其色卽
見

服毒辨生前死後

生前中毒遍身作青黑多日而皮肉
尙有亦作黑色若經久皮肉腐爛見
骨其骨黯黑色胸膛心坎牙根十指
尖俱青色

死後假
作中毒
驗法

中毒稱
服毒宜
細辨

死後將毒藥置口內。假作中毒。皮肉
與骨。只作黃白色。

有本是中毒。輒驗稱服毒者。宜子細
辨之。

蠱毒

凡頭面有光他人手近之如火熾者此中蠱也用蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀即愈
中蠱毒即取蠱相制之蠱蠱曝乾燒灰服少許立愈如知是蛇蠱用蜈蚣蠱蠱蜈蚣蠱用蜈蚣蠱蠱蜈蚣蠱用蜈蚣蠱
蛇蠱蠱之類
粵中名藥鬼又名挑生凡家中無塵網者必有藥鬼
刑律造畜蠱毒殺人條云凡置造藏畜蠱毒堪以殺人及教令人造畜者斬不問已未殺人財產入官妻子及同居家口雖不知情並流二千里安置教令者之財產妻子等不在此限
若以蠱毒毒同居人共被毒之人父母妻妾子孫不知造蠱情者不在流

諸毒

中蠱毒者偏身上下頭面胸心並深青黑色肚脹或口內吐血或糞門瀉血。

造蠱者取百蟲置皿中經年開視有一蟲盡食諸蟲而獨存者爲蠱故字從蟲從皿也能隱形似鬼神其毒不一皆變亂元氣多因飲食行之
南方有蠱毒之鄉於他家飲食即以犀角攪之白沫煉起卽爲有毒無沫者卽無毒令病人吐於水內沈者是蠱浮者卽非或

遠之限若係知情雖被害仍緣坐

金蠶

馮氏醫說蠶類不一有魚蠶雞蠶鵝蠶羊蠶牛蠶犬蠶蜈蚣蠶蜘蛛蠶蜥蠶蛇蠶蠅科斗蠶馬蠶蠅蠶小兒蠶等惟以金蠶為最烈被其毒者嚼白礬反甜生黃豆不腥以升麻鬱金各二錢煎服不吐即瀉立愈嶺南雜記雷州有挑生蠶凡喫雞魚瓜果皆可挑中毒覺心腹作痛滿十日則內物能動治法毒在上焦用熱茶投膽礬五分候礬化呷服良久以雞翎探喉中即吐出如在中焦以米飲下礬金末二錢即瀉出

述異記石門沈心庄任開化時偶坐晚堂見一物其光如畫詢之胥役云此蛇蠶也亦名飛蠶每於夜間飛出下食人腦故開化居民時扇黃昏不

令含黑豆豆脹皮脫者是蠶豆不脹皮不脫者即非

中金蠶蠶毒死屍瘦劣徧身黃白色

眼睛塌口齒露出上下脣縮腹肚塌

將銀釵驗作黃浪色用皂角水洗不

去金蠶蠶毒之巧者服之而死與病死者無異但銀釵上黃浪色洗之

不去此金蠶之色也又有身體脹皮肉似湯火

炮起漸次為膿舌頭脣鼻皆破裂乃

是中金蠶毒之狀

此言肥人

金蠶一名食錦蟲蠶屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉滇蜀

鼠莽草

敢露坐巢氏病源中蛇蠱毒心腹熱
問胸脅支滿舌本脹強不啞言語面
赤唇焦又心腹閉如有蟻行經年不
治肝腐爛而死崔行功纂要以馬兜
鈴一兩煎服即吐出

問小記聞有蠅蠶蠱每至庚辛申酉
日則蠱神下糞如白鳥矢取以膏人
或入飲食中或彈衣領內中其毒者
必先一嚏則蠱入百節五臟矣治法
用車轄脂半斤漸漸服之即出
五岳游艸一種稻田蠱胃中生土一
塊內生稻芒刺心而死

安徽省婺源縣民李獻與俞氏通姦
口角俞氏潛往山場采服鼠莽草越
三日殞命驗止唇吻青色起胞並無
唇裂齒齦青黑出血諸狀即取腹切
歷經究審實係中毒等語查鼠莽草
有二種一係木本一係藤本其質既

湖廣間粵皆有奸人畜之取其
糞置飲食中毒人人即死蠱得
所欲則日置他財使人暴富然
遣之極難水火兵刃都不能害
必倍其所致金銀錦物置蠱於
中投之路旁人偶收之蠱隨以
往謂之嫁金蠱不然入人
腹殘腸腸胃完而後出也
粵西有藥思蠱狀似龍雞蠱如
蠶豆大能變幻作小孩形遣嫁
之法仿
佛金蠱

中鼠莽草毒江西有之亦類中蠱毒

加之唇裂齒齦青黑色此毒經一宿

一日方見九竅有血出

有不同其性未必無異况春夏盛長之時其毒必深重若遇秋冬凋落僅存枯梗其毒必然輕減見成案急救方解鼠莽毒用黑豆汁或枯蓮房帶蒂梗煎水漱之

莽草木作網人以毒鼠故名鼠莽食之令人迷罔南中川蜀以及上谷皆有之木若石楠葉稀無花一說藤生繞石間是名網草

巴豆毒

中巴豆毒用芭蕉根葉搗汁服之痢止而安或飲以新汲水亦效

中巴豆毒口乾兩臉赤五心煩熱痢

不止

砒霜毒

山東省荷澤縣民婦張謝氏與王有通姦砒毒親夫張僧致死原驗官開棺驗屍口眼俱閉身白無血肚腹指尖皆微青疑為屍身發變據供以病死詳報覆檢身根骨心坎骨十指尖骨俱青黑色其餘骨殖俱黯黑色委係受毒身死乾隆四十五年成案

中砒霜毒得一伏時遍身發小炮作

青黑色眼睛聳出舌上生小刺炮綻

出口唇破裂兩目脹大腹肚膨脹糞

門脹綻十指甲青黑

鉤吻毒

湖北省漢陽縣民婦姚徐氏與劉長通姦用砒毒死親夫姚大誠明將砒霜放入茶內喫後只叫心燒腹痛尙能飲食越至十日始發狂身死因係砒霜底子不甚酷烈且原喫不多是以發毒甚遲驗得唇紫胸背青黑黯色實係受毒身死見成案

直隸省安平縣民陸二梅與李從泰之妻紀氏通姦起意商謀致死本夫將信毒入麵做成火燒李從泰取食一枚旋即毒發越八日殞命乾隆五年成案

浙江省松陽縣民詹廷華因葉長森姦佔其妻王氏遂服紅砒二錢延至八日殞命查紅砒卽砒石未煉成霜其毒稍輕見成案

折獄龜鑑王琰知福州時閩人欲報讎先食野葛而後闕卽死其家遂經

中砒霜毒吐逆腸腹絞痛不可忍發狂七竅流血口脣亦青黑色若飽時服上一半青饑時服下一半青外腎脹大

砒石出信州玉山有砒井故亦名信又隱信字爲人言此井官封禁取甚嚴然他處出銅錫之山往往有之生者名砒黃赤色毒緩以火煉之令烟上著器凝結作白霜者名砒霜毒尤熱烈若過酒及燒酒尤腐爛腸胃頃刻殺人

中鉤吻毒百竅流血狀與砒霜畧同

告之臻訊得其實懲誅告者賈昌齡
爲饒州浮梁尉其俗輕死與人有怨
往往食野葛以誣怨者昌齡能辨究
之

中鉤吻毒口不開者急以大竹筒通
節以頭挂兩脇及臍灌冷水入筒中
數次口便開多服人糞汁或斷鷲鴨
頭瀝血入口灌之

冰片毒
急救方中冰片毒飲以新汲冷水可
解

未信編昔文信國服冰片自戕而無
害以未飲酒故也冰片切忌入酒

水銀毒
毛氏經驗方中水銀毒飲地漿水立
愈其法掘地成坑以水傾注攪成泥
水謂之地漿

果實金
石藥毒

鉤吻卽野葛因入口鉤人喉吻
故曰鉤吻廣人謂之胡蔓草又
曰斷腸草滇人謂之火把花岳
州謂之黃藤其草近人則葉動
蔓生葉圓而光春夏苗嫩毒甚
秋冬草枯稍緩五六月開花似
檉柳花數十朵作穗
嶺南花黃滇南花紅

中冰片毒熱酒服冰片錢許則正氣
散亂血脈沸騰七竅流血而死

中水銀毒身死者以黃金驗之色白
者是

食果實金石藥毒者其屍上下或有

赤腫平冤錄作青腫

酒毒

藥毒菌
蕈毒

銀鋤毒

酒性最烈不宜近火如須熱飲必以重湯炖之而燒酒爲尤甚犯此者陰受其害而不覺也

蘇臺記略宋時天平山白雲寺有五僧偕行山間見一草甚大采而食之至夜嘔吐不止三人急采鴛鴦草生啖遂愈二人不肯甚啖吐至死鴛鴦草卽俗稱金銀花也

鋤方書作銷藥鋤銷二字字書俱無當卽鈎字集韻物有光也

中銀鋤毒頗門偏左偏右脊背肋骨俱紅色或起霉斑兩肩兩臂兩腿骨

一二處赤腫有類拳手傷痕或成大片青黑色爪甲黑身體肉縫微有血或腹脹或瀉血

中酒毒腹脹或吐瀉血

中藥毒菌音郡蕈音淨毒手腳指甲及身

上青黑色口鼻內多出血皮肉多裂

舌與糞門皆露出

服銀鋤死檢驗傷痕法各書中俱無

載

絡或爲毒氣攻成蜂窩樣

中銀鋤毒服黃泥水一盃卽愈又方

每日用竹篾四兩撚成小丸不時以

真芝麻油送下亦效

張氏驗方解銀鋤毒將帶皮綠柿連

喫十數枚自愈冬月喫柿餅

服鹽瀉死

服瀉死者面色黃周身皮發亮黃色
口鼻內涎沫流出嘗之必鹹肚腹低
陷十指甲黃或青黯色滿身經絡俱
收縮如服瀉太多皮肉俱青與毒相
似或面色微紫赤唇吻皮皺牙眼微
紅色舌縮微有小泡

案銀鋤性主腐爛皮肉今人每
用以去痣此物投入腸胃非比
砒藥諸毒性烈服之卽口眼鼻
竅流血唇齒齟裂裂指甲青黑現
有外傷可以檢驗係黏入腸胃
漸漸腐爛令人如患病狀或半
月一月而死卻無外現傷形又
金銀圓光無鋒芒者入腹可下
若剪碎尖稜鉤住腸胃能令人
斷腸而死亦無外傷可以檢驗
此種人命既無檢驗之法
姑闕疑以俟畱心體察

服鹽瀉死者髮亂手指甲禿胸前有

爪傷痕因痛極不可忍徧地滾跌自

抓掐音却所致

服灰汁
死

葛藟毒

余官平度驗服酒身死者一年壯婦人面色黃亮周身及十指甲俱黃色喉下抓破浮皮數點一年老人面色微黃口流涎沫十指甲青黯色

毛氏經驗方凡服鹽酒急先灌米泔水數碗再以活雞鳴一兩隻斷去頭塞於口中以熱血灌下卽解

服酒死者身不發炮口不破裂腹不膨脹指甲不青釵探不黑頗有黯色洗之卽白徧身黃兩眼合口中或有涎沫但其屍雖發變心肺不爛取汁煎之猶能成鹽

服澣衣所用灰汁死者有乘人病時以灰汁煎藥毒之致死者髮亂指甲禿身拳曲口鼻有血

本州葛藟一名天仙子一名行唐其子服之令人狂放蕩故名金匱要

中葛音郎藟音蕩毒悶亂如卒中風或似

苦杏仁
毒

略其莢葉圓而尤有毒誤食令人狂
亂甘州汁解之
生食亦能死人故市買杏仁須用清
水浸泡泡出之水令犬食之立斃
服杏仁死者周身皮及指甲俱黃色
見山西省成案
中杏仁毒急取杏樹皮煎湯服之雖
迷亂將死者亦可救

烏頭
毒

本州烏頭亦名烏喙野生狀類川
烏有大毒熬膏名射罔傅箭射獸見
血立死

熱盛狂病。

一名水莢莢葉圓而光
誤食令人狂亂或吐血

中苦杏仁毒西北諸省有苦杏仁生

熟服之都不爲害畧用火炒仍令半

生服數十粒卽能死人其屍眼閉舌

脣耳竅手足十指俱青色肚腹有青

色塊。

每有食以詐人者人不易防最
難禁化惟急取吐吐出可解

中草烏頭毒江左山南有草烏頭其

汁煎之名射罔俱大有熱毒而射罔

更烈塗破傷損處立能殺人

鴆鳥毒

此條自南海以下至末各本列爲小注今以上文中苦杏仁毒及中州鳥頭毒兩條例之一則西北諸省云云一則江左山南云云則此處南海云云明是正文無疑否則僅此中鴆鳥毒四字語氣未了且於上文亦不類因此改正

鴆各本爲鴆據廣志改

說文鴆爲鳥也玉爲鴆羽畫酒飲之即死

中鴆毒氣欲絕者用乾葛末井水調

服三錢即愈口噤者須之

浙江省仁和縣民祝永林服鴆酥一錢五分嘔吐發顛滿面大汗頓倒在

地身死驗得面色微青兩眼閉鼻竅

血水流上下唇吻翻牙齦黑口閉

舌起脰爛咽喉連食氣喉微腫肚腹

平陷十指甲青黯色穀道黃出乾隆

附服鴆酥

中鴆鳥毒南海有鴆鳥似鷹而大狀如鴉紫黑色赤喙黑目頸長七八寸雄名運日雌名陰諧食蛇及橡實蛇入口卽爛其屎溺著石石皆黃爛飲水羣百蟲吸之皆死巢於大木之顛其下數十步艸不生人誤食其肉立死惟得犀角其毒卽解

四十九年成案查本州戰塘酥即舊
墓窟開白汁辛溫大毒能爛人肌肉
惟疔瘡合他藥服一二釐取其以毒
攻毒

服官粉

服輕粉

河南省中牟縣民婦劉張氏被李進
強姦致令羞忿服官粉中毒身死驗
得張氏上下唇吻上下牙齒青十
指甲青委係中毒所致據伴作周大
聲稱洗冤錄雖無服官粉中毒一條
但官粉俗稱鉛粉是黑鉛燒成自然
有毒今驗唇吻牙齒指甲俱青色實
係中毒無疑乾隆十八年成案
江西省石城縣溫張氏與溫子勝通
姦用輕粉謀毒本夫溫名勝身死查
輕粉乃水銀加以鹽麝用火煨鍊而
成輕揚燥烈毒氣善竄經絡筋骨服
多者毒重唇吻牙齒指甲俱青服少
者毒輕僅現於龜子骨見成案

服鳴精
坤毒

江西省石城縣捕役黃和詐通張吉
瑞服鳴精州中毒身死檢得兩服脰
骨兩十指尖骨俱青色十趾甲骨俱
黑色委係服毒身死乾隆四十三年
成案

菟鼈并食

物類相感志鼈同菟菜食生血鼈物理小識以赤菟和鼈剉成小塊厚以茅包經旬卽化爲鼈舉投池中數月可食吳人謂之種鼈

驢肉荆芥并食

舊本驢肉作黃魚據注以黃魚爲是但驢肉與荆芥相反宜兩存之
新澗中石斑小魚亦與荆芥反

意外諸毒

菟鼈并食毒

昔有人將鼈與菟并食之遂病死屍未殮忽小鼈無數自九竅湧出散走馬廐中惟遇馬溺者輒化爲水又有人誤食鼈菟飲馬溺得瘥或云白馬溺尤良

食驢肉喫荆芥茶殺人

本艸昔有人喫黃魚羹罷採荆芥和茶而飲少頃足底奇癢上徹心肺跳行沙中馳走如狂足皮皆破欲裂急求解毒藥餌之兩日乃止○荆芥一名假蘇本艸謂性溫不然實微涼數見食

漏腐肉

方書茅屋漏下沾著肉上名漏腐中其毒者燒大糞酒調服

蜜鮮并食

養生雜記鮮與青小豆同食殺人食物本艸諸鮮不可合生胡荽葵菜麥醬蜂蜜食令人霍亂多死

藥後食河魴

河魴毒在肝血脂子并眼尤忌塵煤落人

食物禁

輟耕錄云中河魴毒用槐花微炒與乾燕脂各等分同搗水調灌妙風藥如荊芥之類河魴與荊芥相反并食必死洗冤錄筆食物變改禁忌凡錄中所未詳者攷諸載籍分類摘錄以備參

黃頰魚偶犯荊芥者必立死甚於鉤吻毒

茅舍漏滴肉上食之殺人

蜜鮮并食毒

韶州月華寺側民家設僧供新密方熟羣僧飽之有某院長老兩人還至半道遇村墟賣魚買食盡半斤至夕皆死

河魴風藥并食毒

昔有人招友晨餐者烹河魴爲饌友以故不食遺歸餉妻妻方平明服藥不以爲慮藥之甚美卽時口鼻流血而絕

食物變改及食禁○按禽獸蟲魚之

稽如雞四距六趾黑身白頭鴨目白
黑身白頭或五色元鳥白首鳥足不
伸卵有八字此羽族變改也羊六角
心有孔白羊黑頭黑羊白頭豕白蹠
青爪心肝有孔黑牛白頭白馬黑頭
六畜自死口不開首北向肉多黑星
此獸族變改也魚無腮目能開合腦
中連珠鮎魚赤目赤鬚鰻魚腹有黑
斑鰕無鬚煮熟不縛繫目白目陷獨
目赤足無裙頭足不縮腹下有蛇文
有三字天字卜字小字額下有軟骨
如龜形蟹獨目目赤兩目相向腹斑
腹中有骨背有星點此水族變改也
其餘禁忌備列於後

各木腎色作腎氣據舊鈔本改

余家於數年前剖一鮑無腸膽并無
血惟有一物似帶蟠屈其中引之長

屬或有感沴氣所生形質變異者如
獸有歧尾蟹有獨螯羊一角雞四足
是也○物有形、色、變、異者如白鳥烏
首鳥雞白首白馬青蹠白馬黑蹠是
也○有、形、色、無、異、其、肉、變、怪、者、如、落
地不沾灰塵經宿肉體尙暖曝炙不
燥入水自動之類是也○有皮肉無
異腸臟變改者如肝色青黯腎色紫
黑魚無腸膽牛肝葉孤之類是也○

丈許因棄不食

洗冤贅筆凡食物禁忌如雞肉忌橘

皮合糯米食生小蟲合兔肉食發虛

黃雞卵合蟹與莧菜食生血驚鴨肉

忌薄荷野雞忌蕎麥木耳合鮭魚食

令人生癰鵝肉合榧子食生應節風

此羽族禁忌也羊內忌半夏合南瓜

食殺人羊肝合笋食令目盲豬肉合

蕎麥羊肉食脫鬚眉豬心肺合吳茱

萸食發痔疾牛肝忌鮎魚馬肉忌蒼

耳大肉忌商陸合澆食令人生癰兔

肉合芥菜食成惡疾此獸族禁忌也

鮑魚合天門冬食生水腫合麥醬食

生喉瘡鱖魚合銀杏食生風黃魚

忌蕎麥鯽鱸忌大肉蛤忌米醋此水

族禁忌也其他桃李雙仁瓜有二蒂

王瓜花生同食斷腸之類難以悉數
養生家不可不察也

有一物常食性善與他物相反過口

而害人者如鮓魚同鹿肉食之殺人

羊肉同鱸酪食之害人羊肝得生椒

破人臟豬肉得胡荽音雖爛人臍是也

○有一物常食性平與他物相感入

腹成動物者如鮓生同酥乳食之變

諸蟲鯨肉與莧菜食之還生鯨牛肉

同豬肉食之成寸白蟲豬羊肉以桑

楮柴煮炙食之亦成寸白蟲也

蛇遺水

張氏驗方誤服蛇遺水用甘州煎湯灌下吐十餘次自愈

隔宿茶水恐亦有毒蟲所遺不淨皆當慎之

餅花水

洗冤集編云餅中花水凡有色可愛香可嗅者除薰花外俱毒不可飲其味辛故中毒死者口微開不閉

飲蛇遺水毒

湖州陳某因步春渴掬澗水咽之數日覺心腹微痛日久疼甚醫診之云心脾受毒今心脈損甚陳語其故醫曰蛇遺不淨在澗子誤飲其水蛇已成形在腹食心而痛也遂以水調雄黃服之果下赤蛇數條皆能行

飲餅花水毒

宋汪待舉字懷中守處州郡部民有飲客者客醉臥於空室中夜醒酒渴索漿不得乃取花餅水飲之次早啟戶客死矣其家訟於官待舉究舍宇所有物惟餅浸旱蓮而已細鞠之訟乃白

三足鰲

洗冤錄附考蜀人買得鰲十數枚痛飲大嚼且食紅柿至夜忽大吐繼之以血昏不知人病垂殆同邸有知其故者憂之忽一道人云惟木香可解但深夜無此偶有木香餅子試用之病人口已嚙遂調灌卽漸甦吐定而愈

艸藥

不獨艸藥爲然卽園圃菜蔬亦當揀淨而食不致有誤
自來醫家開方於柴胡上必加一淨字詢之醫士茫然不知偶遇一貨藥者云斷腸艸往往與柴胡並生采取時必得揀淨方可入藥正藥且然何

○一云餅
浸蠟梅

食三足鰲毒

太倉州民道見漁者持一鰲而三足買歸令婦魚之旣熟呼婦共食婦不欲食出坐門外久不聞其夫聲入視已失所在地上止存髮一縷衣服冠履事皆在如蛻形者驚怖號喚里甲以婦爲謀殺大而詐譏也官爲鞠之得其情乃原婦罪

艸藥夾雜毒

英州僧某往州南三十里掃塔有客船自番禺至舟中士人攜一僕僕病腳弱不能行舟師憫之口舌有一藥治此病如神旣

泥艸藥

賽廟畢飲酢頗醉乃入山求藥
漬酒投病者其藥入口腸胃卽
痛如刀割遲明而死士人咎舟
師舟師恚卽取所餘藥自漬酒
服之不踰時亦死蓋山多斷腸
艸人食之輒死而舟師所取藥
爲根蔓所纏結醉而取擇徑投
酒中是以及於禍則知艸藥不
可妄服也

食魚投
荆花

秋鎰餘話載王阮亭尙書過濟南有
友邀飲正荆花盛開卽布席庭中阮
亭距荆花丈許一客纔二尺餘野人
以鯉魚進阮亭素不嗜魚置不食客
與主人甚笑未幾俱作嘔遂致殞命
次日方知魚與荆花相反也

食物過荆林毒

單縣有田作者其婦餉之食畢
死翁姑曰婦意也陳於官不勝
筆楚遂誣服是時天久不雨許
某時官山東曰獄其有冤乎乃
親歷其地出獄囚徧審之至餉
婦乃曰夫婦相守人之至願鳩

老雞

張氏驗方解老雞毒犀角井水磨汁服屢試極驗

雞毒

毒殺人計之至密者也焉有自
餉於田而鳩之者哉遂詢其所
饋飲食所經道路婦曰魚湯米
飯度自荆林無他異也許乃買
魚作飯投荊花於中試之狗斃
無不死者婦冤遂白即日大雨
注如

昔有蘇人出商於外其妻畜雞
以待其歸數年方反殺雞食之
夫即死鄰人疑有外姦首之太
守鞠之無他故後細察其山獄
遂白蓋雞食蜈蚣百蟲久則畜
毒食之殺人故養生家雞老不
食又夏
不食雞

黃蠟炒

既服悶氣塞斷不死如平人矣故凡
內補出屍狀并檢驗之法
洗冤彙編云黃蠟人雞炒其味最美
食之氣塞腹脹死明劉誠意飲於胡
惟庸家歸而腹中如有拳石築鑿而
死其卽此之類也

黃蠟炒雞人食之脹悶氣塞三日而
死他毒可驗此毒死如平人絕無可
驗亦無可救法

考辟穀諸方每有用黃蠟者云
食之不飢必須解下然後可喫
他物解之之法用青菜湯或冬
葵子湯飲一二碗藥卽解下依
然未化也若未解時止可飲清
水凡有質有味者俱不可食食
之必甚脹滿然則黃蠟炒雞之
毒或亦前物可解乎或麻油大
麻子汁葵菜湯菠菱菜湯亦可
解乎又黃蠟能飲氣不散故凡
丸藥之珍貴者以蠟裹之可久
貯不壞今中此毒者口鼻等竅

此條出智囊原本令異之下有召此婦而烹焉出死囚與食便稱腹痛俄仆地死十九字洗冤錄辨正云此謂其人性嗜鱈因妻烹鱈啖後腹痛而死縣令疑中鱈毒乃以鱈數百斤置水中見有昂頭出水者已覺其異必仍令其婦烹食死囚而驗方得實據然後定獄若僅以鱈昂頭爲異而無烹食一層卽無實據矣此十九字如何可刪

鱈毒

自當無血水流但既脹悶而死必有眼凸臍凸莖門凸腹膨脹等狀可驗或屍已腐當視其腸胃必有蠟雞未化似宜取出洗去他穢以水煎之蠟浮水面候冷自凝成片仍作黃色此亦似屬可驗者乎

鉛山縣有賣薪者性嗜鱈一日自市歸飢甚妻烹鱈以進恣啖之腹痛而死鄰保謂妻毒夫執送官拷訊無據械繫踰年縣令閱其牘疑中鱈毒召漁者捕鱈得數百斤悉置水甕中有昂頭出水二三寸者數之得七令異之知爲他物所變其毒必甚細

守宮

說文云在壁曰蜺蜺在艸曰蜺蜺本艸綱目蜺與守宮也一名守宮一名壁虎一名蜺虎以善捕蜺蜺故得虎名博物志守宮以鬻養之食以朱砂體盡赤搗以點女人臂終身不滅淫則脫滅故謂之守宮吾鄉又謂之潛龍

暑衣

中暑類傷寒故善醫者必問病原驗屍者亦宜推鞠因由

沈氏尊生書云夏月曝書曝衣暑氣未散隨即收藏至秋冬近之其氣亦從口鼻而入而即發此暑毒伏于物而觸于人者也其病或霍亂吐瀉或洩痢腹痛或癰發寒熱皆當細詢其因以爲治甚或有身熱足冷者其

守宮毒

爲鞠究婦
冤始白

驚蟄後至九月凡茶水在几上經宿者雖渴甚不可飲因守宮之性見水則淫每於水內相交餘瀝遺入爲性最毒如誤飲時急覓地漿水解之或吐或瀉尚可拯救一二

衣有暑毒

夏日汗透衣切不可於烈日中曬若將乾忽暴雨將至急爲收納則烈日之毒即錮於內如遇酷暑汗出時偶一衣之則暑以引暑其毒立中證候全類傷寒若誤作寒治必至發狂譫語再

勢則甚危矣

冬月且中暑毒可見夏日曬衣尤不宜驟爲收藏

空屋邪氣

巴蜀志異明彭將軍征寇入蜀偶過一禪院規模宏敞詢之士人云已百年無僧彭慮有伏寇率兵而入前殿中有黑鵬奔門飛去中殿無異又進之軍士咸覺頭痛彭親入亦然須臾有燭自梁簏簏而下大如琵琶一軍驚走彭遂火其寺

空屋邪氣毒

誤投參芪桂附陽以益陽未有不至口鼻流血不已者有婦因聞從兄自遠至更衣見之時方冬月凡所更衣皆夏日所暴而藏者婦方有娠胎爲暑毒所中激而生煩腹痛脈伏熱極似寒諸醫誤認中寒參附併投病益煩悶而死

房屋園林久閉其中毒氣最盛切莫急入蓋久閉宅舍陰晦潮溼淫毒閉結不散甚或狐淫邪魅借以潛蹤蛇虺惡獸從而盤踞若夫園林深秘恐更有異物潛身必大其聲勢或先之以火驚而散之使其預匿以免卒遇相傷也

蛇虺涎

養生雜記夏月有食物過夜被蛇涎
沾上人誤食之腹內隱隱作痛時刻
患飢食之卽吐用赤頭蜈蚣一條炙
爲末分二服酒下
集驗方中蛇涎毒覺胸中有物如蟲
行頃刻皆亂酒調貝母末盡飲自
愈

蛇虺涎毒

凡年久臺榭池館藤蘿花樹
蔚之下不可恣爲烹飪恐爲毒
中前明閩中一田姓鄉紳得一
園亭掃除初就卽宴邑令於園
中其時盛夏蓮花正茂飲將午
夜席未及半邑令忽憤憤不語
疑爲沈醉急扶舁回入署未幾
而殂且縣素有蠱因問傳邑侯
爲本紳所毒事聞於上奏請逮
繫獄遂成然卒無可指之實各
存疑案以待再推延至十餘載
欽遣恤刑往閱及半毅然日酖
毒之施所以復讐怨卽果讐而
毒之焉有大設筵宴廣集多人
以肆其術之理因訊本紳以宴
客之園置自何年曰係購得之

非自置也訊以在內亭舍會鼎
新否曰仍其舊惟加圻墁而已
再訊以花樹亦蔭翳可觀否曰
古樹逾圍竹木亦頗叢森更訊
以被罪後曾以售他人否曰得
此園卽膺禍人咸咎之畏不敢
售故雖家業盡零而此園獨存
恤刑隨呼縣令語以夙聞斯園
甲茲邑當卽往遊仍爲廣諭士
民各攜肴酒以示同樂更命密
具畚鍤待用衆咸莫解所以至
期恤刑攜縣令先往呼士民隨
之至則啟其園除辟草萊令士
民中有識宴邑令之所者指其
處巍然大廈蘿積重簷蔭陳古
砌恤刑曰斯紳之冤吾得之矣
命諸士民各以酒肴雜坐盡飲
至醉以其餘各散

煤炭

洗冤錄編云其屍軟而無傷此脫無字非是應據增

煤炭死者口開舌出兩手微握胸前有細黑斑點肚腹脹周身並無傷痕見成案餘詳卷二火焚辨生前死後篇上層

升高并力拆毀於墻垣內得毒虺盈數石若其不經見物則不計也恤則日例占則陰沴積陰沴積則苔蘚生藤蘿附即為蛇虺窟穴之地矣而毒物又多乘陰氣以遊行若其捕生自養更以氣取宴設至夜蠅蚋之類必為叢積諸物遊行梁上吸其所欲而不得涎墜肴中誤而饜之焉不立斃若非斯圖猶存冤何白以

中煤炭毒土炕漏火氣而臭穢者人受熏蒸不覺自斃其屍軟而傷與夜臥夢魘不能復覺者相似

養生雜記中煤炭毒心口作嘔或卽
量倒魚搗生蘿蔔汁灌之或清水亦
可

房中置水一盆并使窗戶有透
氣處則煤炭雖臭不能爲害

湖北補用知縣潘介繁校

洗冤錄詳義卷四

海甯許樾編校

洗冤錄表云救得一人不死便全得兩人性命此急救方所由錄也

急救方

救縊死

救縊死

不絕其繩而從容放解則氣不驟泄踏肩提髮而撚整喉嚨使氣得舒貫磨擦其胸腹臂足使氣得運行尤須綿軟裏緊大小便則氣無他溢自從口內出又用官桂湯粥飲等管吹耳以通順其氣自能救活當與下數節參合行之

不可使頭垂下一語影宋本元槧本均無

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若心下溫一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱解放臥令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊不可使頭垂下一人微微撚整喉嚨以手

浙江省富陽縣民何盛榮妻蔣氏於五月二十九日自縊氣尚未絕因解救不能如法致氣管仍難通順又不擦胸按腹屈伸臂足血脈仍是不行延至六月初二日身死乾隆四十八年成案

甦醒後三字宋本作勿苦勞動

擦胸上散動之一人磨擦臂足屈伸之若已僵但漸漸強屈之又按其腹如此一飯久卽氣從口出得呼吸眼開甦醒後又以官桂湯及粥飲與之令潤咽喉更令二人以筆管吹其耳內若依此救無不活者

官桂湯

廣陳皮

八分

厚樸

一錢

肉桂

五分

製半夏

一錢

乾薑

五分

甘草

三分

用手捲口

洗冤錄表云一法取活鷄新入口內
鷄鳴應聲即活

阜角細辛吹鼻

又法緊用手捲其口勿令通氣兩時許氣急即活

眞山羊血酒灌

佩觿二三分作二三釐并云不可過多未知孰是
切忌將茶水灌

又法用阜角細辛等分爲末如大豆許吹兩鼻孔

僵定可救

又法用眞野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活

又法凡男女縊死身雖僵定尙可救活不可割斷繩索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭要扶正先將手

足慢慢曲彎。然後將大小便用絲軟之物裹緊。不令泄氣。用一人坐於頭前。兩腳踏其肩。揪住頭髮。將縊人之手拉直。令喉項通順。再用二人將細筆筒或葦筒入耳內。不住口吹氣。不住手撫摸其胸前。用活雞冠血滴入喉鼻之中。男左女右。男用公雞。女用母雞。刻下卽能甦活。如氣絕時久。照前救法。務要多吹多摸。勿謂已冷。忽能救活。

手脈驢作首是洗冤錄辨正云拉直頭然後喉項方能通順若拉直手與喉項何涉且上文已云先將手足慢慢曲彎如何又要拉直應據改洗冤錄表云雞冠血滴入喉鼻之內凡跌打縊溺心頭熱者均可用一法灸湧泉穴男左女右各三壯亦

醫不救

救溺死

救溺水諸法總以出水爲主。據氣被水閉。水漸出則氣漸通矣。
元稹本或屈死人兩足以下提行。另作一條。或字作又。

壁泥覆

元稹本云。洪丞相在番陽有溺水者。用此法救。卽甦。

救溺死

水溺一宿者。尙可救。擣阜角以懸裏納下部內。須與出水卽活。或屈死人兩足著人肩。上以死人背貼生人背。擔走。吐出。水卽活。

又法。先打壁泥一堵。置地上。卻以死者仰臥其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣喻入泥間。其人遂甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。

炒沙覆面

元槧本熟作熱舊鈔本同此誤作熟應據改

醋灌

石灰納下部

倒懸灌酒

倒懸吹耳

灸臍

四時分別救法

又法炒熟沙覆死人面上下著沙只

畱出口鼻沙冷溼又換數易卽甦

又醋半盞灌鼻中

又絛裏石灰納下部中水出卽活

又倒懸以好酒灌鼻中及下部

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以

筆管吹其耳

又急解死人衣服於臍上灸百壯

又撈起時急急將口撬音開橫銜箸

一隻使可出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏末吹其鼻孔。皂角末置管中吹其穀道。如係夏月將溺人肚皮橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩行走。腹中之水自然從口中並大小便流出。再用生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛以活人覆臥躬腰。令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上。令活人微微動搖。水亦可

救凍死條下云冬月溺水之人雖纖毫人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可駭令近火但一見火則必大笑不可救藥

出若一時無牛兼活人不肯拯救或鍋一口將溺人覆於鍋上亦可如係冬月急將溼衣解去爲之更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內不著草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆臥於上臍下墊以縣枕一個仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰眊於眼內其撬口銜箸灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道

燒燼痰
臍

脫衣更
換

等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少
飲溫酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖
而能拔水凡蠅溺水死者以灰埋之
少頃卽活此明驗也

又以酒罈一個紙片一把燒放罈內
急以罈口覆臍上冷卽再燒紙片放
罈內覆臍去水卽活

又初救起之時尙有微氣或胸前尙
煖速令生人脫貼身裏衣爲之更換

燄紙熏

近時遇中風中暈等人昏迷不省以臥龍丹通關散諸嗅藥吹入鼻孔頃刻即嚏較阜角末尤驗

抱擔身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。卽有生機。一面用粗紙燎灼。取煙熏其鼻竅。稍熏片時。卽用阜角研細。吹入鼻竅。但得微有一嚏。噴。卽可得生。

傷未透膜

刃傷透膜則難救

治刃傷

元藪本半溫作通口通口者一口咽
盡也半溫者不大熱也當以半溫爲
是
宋本止上有血字
此段論本膏體例應作小注元藪本
此爲前半段尚有後半段云曾以語
樂平知縣鮑旂及再會鮑曰蔥白甚
妙樂平人好鬪多傷每有殺傷公事
未暇詰問先將蔥白傳傷損處活人
甚多大辟爲之減少出張聲道經驗
方等語據此似不可刪

凡般傷不透膜者乳香沒藥各一阜
角子大研爛以小便半盞好酒半盞
同煎半溫服然後用花蕊石散或烏
賊魚骨或龍骨爲末敷瘡口上卽止
昔推官宋瑒定驗兩處般傷氣偶未
絕亟令保甲取蔥白熟鍋炒熱徧敷
傷處繼而呻吟再易蔥白傷者無痛
矣

洗冤錄續輯馬前子壹斤樹殼壹斤
於屋下雨水不及常有人溺之溺缸
將前二物放入浸至四十九日取起
長流水淘淨將馬前子用磁鋒刮去
面上薄皮枳殼破開挖去瓢各晒乾
切片用黃土拌炒微焦黑去黃土研
極細末磁餅收貯無論跌打手足水
石金刃各傷以及湯火傷並火藥毒
箭傷均治凡傷痕已破損見血或已
潰爛者將藥乾敷如腫而未破者用
黃酒調敷若湯火傷泡起未破者用
麻油調敷泡已破乾敷傷重者急以
一錢五分熱黃酒一碗沖服不能飲
者作二三次服此百試百效之方也

花蕊石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

蛇含石

童便煨
三次

草烏

厚樸

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

各二錢
麝香 三分

花蕊石

五錢童便
煨七次

右共研極細。罐收聽用。蔥湯洗淨。

刀傷血
出不止

刀傷痛
不可止

血流不止用千年石灰或生半夏研
細末敷上或用乾麩和白糖搽傷處
均立效
紫藤香忌銅鐵器故用薑刮石礮

用此糝之。輒縣紙蓋扎。一日一換。
神效。

又被刀傷血出不止用紫藤香

剉透
香生

者。薺瓦鏹刮下石礮碾細敷之血卽

止。又無癰痕。

又刀刀傷痛不可止用好雞骨炭擲

地上鏗然有聲者與松香明透者等

分捶成一塊再多用老韭菜搗汁拌

入陰乾如此拌捶三四遍後爲細末

金瘡腸出

近時治金瘡並跌打損傷骨斷筋折血流不止者以七釐散爲最驗用飛淨朱砂壹錢二分當門麝香梅花冰片各壹分二釐乳香沒藥紅花各壹錢五分血竭壹兩兒茶二錢四分各研細末稱準淨數再合研極細磁餅收貯臨用先以藥七釐燒酒沖服復用藥以燒酒調敷傷處如見血急以此藥乾糝立時見效并治一切無名腫毒亦照前法調服

收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升。漚濾淨汁待極冷令病人臥席上。一人含汁嚙其背。則腸漸入。嚙時勿令病人知之。及多人在旁言語。如未入。擡席四角輕搖。則自入。既入者。須用麻油潤線縫緊。仍以潤帛紮束。慎勿驚動。使瘡口復迸。

箭鏃傷

治箭鏃木竹器傷者用艾絨攤成餅
干將火硝細末鋪上再用大蛻蝦搗
成末鋪火硝上包傷處一日夜即拔
出

治誤吞鍼方以大蝦蟆挖取眼睛酒
沖服下其鍼即穿入睛內從大便而
出

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活
美好者用其肥細切剉濃將象牙末
及人所退爪甲爲末共研極細拌入
所剉醃肉內再爲勻剉令其合一厚
敷箭鏃周圍一飯頃其鏃即自爲迸
脫。

蚌漿掃治

凡遇湯火傷一時驟難覓藥先飲童便一盞再將生大黃細末用麻油調敷爛至肌肉者用百艸霜三錢輕粉一錢五分研末用麻油敷之
又方用大麥以淨沙鍋炒之以漆黑爲度取出隔紙攤土上山火氣研細末爛者乾磨末破者用麻油調敷又方用蛇皮煨存性將真菜油調敷一宿卽愈又絲瓜煨灰敷之亦愈

讀律佩編載此條於層層掃入上有隨乾隨加四字可見不是但掃一次卽能見效若去此四字便誤事矣應據增

救湯火傷

湯潑受傷急覓水中大蚌置甕盤中將其口向上置無人處俟其口自開時預將冰片二三分真當門麝二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其口卽合而蚌內之肉卽化爲漿然後再入冰麝少許用雞翎黏掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最

冰片摩

藥用冷

杭粉調

佩臚於火氣已退下有由白轉紅由紅漸淡塗上不卽乾卽防其潰處腐害二十字此謂慢慢細察轉色又恐不乾腐潰再將蚌殼灰圍掃若但云火氣已退其如何是退使不明白此二十字不可無

又從邊圍掃下佩臚有俟蚌漿未乾時用絹篩將蚌殼灰勻篩傷處或竟將蚌漿調勻雞翎敷上外以舊絹護之更加抹熟粗紙數層紮束令緊沁去傷中毒水如覺稍痛仍用蚌漿四面滲入內服甯心敗毒之劑以除煩無不立愈等云如此方爲詳細又如無蚌處下有如其地有藏冰急取冰一小塊從四圍摩起今錄中將冰塊易作冰片設誤以此爲藥品貽害匪淺不可不亟正也應據改

驗之第一方也及其火氣已退將用

下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四

面摩起漸及於中亦可漸瘥

凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之其熱氣遇冷則入之愈深輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣

一法用好杭粉爲細末同婦女所用

陳醬寬塗

劉寄奴糯米漿搗

鹽末急

大黃醋敷

好頭油調塗之。如無。或柏子油亦可。又法。用多年陳醬。寬寬塗之。但愈後有黑瘡。

又用劉寄奴爲末。先以糯米漿。雞翎掃傷著處。後糝藥末。並不痛。亦並無痕。大約湯火著。急以鹽末糝之。護內不壞。然後用藥敷之。至妙。

又用生大黃。以米醋調敷。二日卽愈。

救中暈

地漿灌

說文暈傷暑也玉篇中熱也漢書武帝紀元封四年夏大旱民多暈死

禁喫冷水

冷水漱之暑毒攻內死之必速方書云凡暑病有傷暑有中暑傷暑者或食受陰涼爲寒所襲頭疼發熱霍亂吐瀉宜香薷飲以溫通之中暑者卽中暈或遠行勞役大熱而渴陽氣內伏卒然昏暈少與冷水卽死亦禁臥冷地溼地急移其人於陰處再以熟土放臍上撥開作窩令人尿其中

熱湯淋臍

中以生薑或蒜搗汁和童便或熱湯灌之立甦切忌香薷等溫散之品此傷中暑所當分別而治之者也

暈死於行路上旋以刀器掘開一穴入水搗之取爛漿以灌死者卽活中暈不省人事者與冷水喫卽死但且急取竈間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物喫暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆

氣海在臍下一寸五分

熱土塞臍

濕臍代湯

蒜水研灌

前言與冷水喫即死此言以冷水送下未免自相矛盾據方書立改用熱湯下條新汲水亦恐未宜

臍下及氣海開續以湯淋布帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉卒無湯處搗道上熱土於臍端以多爲佳冷則頻換後與解暑毒藥或道塗無湯處卽搗熱土於臍上仍撥開作窩子令眾人旋溺於其中以代熱湯亦可取效。

凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼卽用水研灌之立

生蔥解渴

胡麻研末調服

炒灰熨心

新汲水乃初出井水不可驟飲惟調胡麻末喫下或可無妨

醒路中倉卒無水渴甚急嚼生蔥二

寸許和津同嚥可抵飲水二升

中暑暴死以胡麻一升炒黑攤冷爲末新汲水調下

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋盛熨心上冷卽換之候目開以溫酒及清粥稍稍與之若不先溫其心便以火炙則冷氣與火爭

藺薦捲
謁

溺水凍
極毋令
近火

害不至如近火之甚但不知而驟飲
則滿口之齒盡落

冷氣凝結二人相對以足推滾使血
活氣舒自然甦醒

杆各本作杆形近而譌據宋本改說
文杆摩展衣古案切

寒氣遇火逼入內臟則笑而無救中
寒之不可驟近火猶中暑之不可驟
飲冷水其理一也

必死。

又用藺或藁薦捲之以索繫定放在
平穩處令二人相對踢令滾轉往來
如杆藺法候四肢溫卽活

冬月溺水之人及被凍極之人雖纖
毫人事不知但胸前有微溫皆可救
倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩
則笑而不止不可救矣切不可驟令
近火但一見火則必大笑不可救藥

噉足呼
名唾面
徐灌薑
湯

此條見奇效良方生薑陳皮下有各
一兩三字應據補

說文魘夢驚也方書肝藏魂者也游
魂爲變平人肝不受邪則魂歸於
肝神靜而得寐若肝有邪魂不得歸
是以臥則飛揚常多驚魘治法以獨
活湯送真珠母丸以安魂定驚湯用
人參獨活羌活前胡各一錢茯苓半
夏沙參炒棗仁各二錢細辛三分炙
甘草五分烏梅半個五味子十四粒
生薑一片水煎丸用珠母二錢五分
當歸熟地各五錢人參炒棗仁柏子
仁茯苓各三錢犀角沈香龍齒各一
錢五分爲末蜜丸朱砂爲衣

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮

陳皮搗碎用水三碗煎一碗溫服

救魘

魘死不得用燈火照並不得近前急
喚但痛蔽其足跟及足大姆指頻頻
呼其名及唾其面再灌以薑湯必活
魘不醒者移動些小臥處徐徐喚之
卽醒夜間魘者原有燈卽存燈無燈
者不可用燈照

吹耳刺

鼻

鹽湯灌

救

韭汁灌

救

元槩本無得嚏二字

灸足大
指

元槩本豆上有大字此脫應據補

阜角吹
鼻

蘇合丸
調灌

又用筆管吹兩耳。及取病人頭髮二

七莖。撚繩刺入鼻中。○又鹽湯灌之。

又研韭菜汁半盞灌鼻中。冬用根。亦

可得嚏。

又灸兩足大拇指聚毛中三七壯。

聚毛

乃脚指向
上生毛處

又方阜角末如豆許。吹兩鼻內。得嚏

則氣通。三四日者尚可救。

魘死者。若身未冷。急以酒調蘇合丸。

非黃刺鼻

阜角半夏吹鼻

沈氏尊生書中惡者口鼻吸著鬼氣也。凡人偶入荒墳古廟人迹罕到之處，忽見鬼物卒然昏倒，四肢厥冷，口鼻出清血，白沫，慎勿輒動，速令眾人圍繞打鼓，熏香，候逆方可移歸調治。客忤者感觸邪惡之氣也，多於道路得之。即時昏暈，心腹絞痛，脹滿氣逆，心胸不達，治亦能殺人。急取鹽如雞子大，炒熱，納酒中灌之，令吐出惡物，然後服藥。

凡人卒死，皆一時氣血凝滯，脈絡閉塞，故也。宜用阜角末吹入鼻孔，得嚏則氣通，血活，可徐按各症，更以湯藥救之。

灌之即活

救中惡

凡中惡客忤卒死者，或先病及睡臥閒，忽然而絕，皆是中惡也。用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七寸，令目開，血出即活。

視上脣內沿有如粟米粒，以鍼挑破。又用阜角或生半夏末，如大豆許，吹入兩鼻。

羊屎熏

鼻

醋汁入

鼻

元漿本醋作酒前救溺死篇亦有醋半盞灌鼻中一條又有酒灌鼻中一條當是醋酒均可用也

灸臍吹
鼻灌耳

灸則艾氣攻達吹則皂角通竅灌則非汁散邪自有奇驗

菖蒲研
汁灌救

非汁灌耳中

又用生菖蒲研取汁一盞灌之

救驚癇

溫酒灌
救

驚怖死者以溫酒一兩杯灌之即活

救撲打卒死

捏髮吹鼻

凡救五絕之法急於人中穴及兩足大指中外側離一韭葉許各灸三五壯即活
撲打壯倒在地者用血管鵝毛燉存性一錢乳香沒藥百煉霜各一錢共爲末老酒調服即醒
凡跌打損傷者用人中白煉紅投好醋七次研末已死者勿移動將藥末二錢好酒送下吐出惡血即可救矣但移動者不治
救五絕之法全在通關開竅使氣得展舒此方止用生半夏一味以其能開通關竅作噴嚏也

蘇合九調灌

五絕及撲打卒死等但須心頭溫煖雖經日亦可救先將死人盤屈在地如上僧打坐狀令一人將死人頭髮控放低用生半夏末以竹筒或紙筒筆管吹在鼻內如活卽以生薑自然汁灌之可解半夏毒五絕者謂產魅生薑搗爛取汁不用水者是
卒暴墮頭築倒及鬼魘死若肉未冷急以酒調蘇合香丸灌入口若下喉

傷重昏
暈救法

跌壓與撲打無異。撲打跌壓雖分有
心無心。而其氣血受傷則一。大氣運
乎血。血本隨氣以周流。氣滯則血凝。
而經絡藏府并與俱傷。其患達不可
勝言。大法以導氣行血為主。
打撲跌傷內損經絡吐血不止。童便
調白芨末服。

此條載見佩觿云。先拳其兩足束其
兩手。又少頃二字作候。有微氣又不
令洩氣。下有扶坐少頃。然後緩緩呼
之十字。此等皆緊要情節。未便抹去。
致有遺誤。

去可活。

救跌壓傷

凡跌壓傷重之人口耳出血一時昏
暈。但視面色尙有生氣。身體尙爲鬆
軟。則皆可救。但不可多人環遶嘈雜
驚慌。致令驚魂不復。急令親人呼而
扶之。坐於地上。先拳其兩手兩足。緊
爲抱定。少頃再輕移於相呼之人懷
中。以膝抵其穀道。不令洩氣。若稍有

童便馬
溺熱灌

加味四
物湯
救

肢體全仗血氣傷損必加補養初治
消瘀和血爲急若去血過多服微欲
死者獨參湯加童便服接住元氣

知覺卽移於素所寢處將室內窗櫺
遮閉令暗仍拳手足緊抱不可令臥
急取童便乘熱灌之馬溺更妙如一
時不可得卽人溺亦可要去其頭尾
但須未食蔥蒜而清利者強灌一二
杯下得喉去便好一面用四物湯照
原方加三四倍再入桃仁去皮尖及
好紅花各一兩全當歸及南山楂搗
碎各二兩生大黃二兩童便一大鍾

用急流水取其性速而趨下也在芎
煎藥欲使藥氣漸漸透達患處也藥
承鼻下先令藥氣入內然後投藥汁
緩以受之反有速效也藥先運氣非
至緊時仍只氣動豈可驟解以洩之
及動而有聲往來數徧則氣得藥力
而攻惡血矣故所下盡屬瘀毒切勿
急急以致有損無益

如係夏月加黃連四五分多用急流
水卽在芎用急火煎半熱傾入碗內
承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則
不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓
服如其不受則姑緩少刻又進只要
陸續灌盡不可使臥服藥之後其穀
道尤須用力抵緊不可令其洩氣如
藥已行動非至緊不可卽解恐其氣
從下洩以致不救也必俟腹中動而

有聲。上。下。往。來。數。遍。急。不。能。待。方。可。
翼。之。以。解。所。下。盡。屬。瘀。紫。毒。已。解。半。
方。可。令。睡。至。所。下。盡。爲。糞。卽。停。止。前。
藥。否。則。再。用。一。二。劑。亦。不。礙。然。後。次。
第。調。理。不。可。輕。用。補。藥。

四物湯

當歸一錢 川芎七分 熟地黃三錢

炒白芍一錢

治蛇蟲傷

沈氏錄詳義 卷四

利刀割肉

遲則毒氣流走上攻及心即死

毒蛇能斃人惟急以利刀割去所啗之死肉可以漸解

藍汁雄黃調點

治蛇毒莫妙於斑蘭根先令患者口嚼即以嚼細之滓敷患處此物出自閩廣花有斑點葉有花紋根與蘭花根相似而較細蛇過此蘭即化為膿并非希罕之物閩廣販藥材者常有帶來第勿以藥肆中之板蘭認作此物致有誤事

蛇傷蟲咬倉卒無藥以大藍汁一碗雄黃末二錢調勻點在所傷處併令細細服其汁如無藍以靛花青黛代之

米醋燒酒吮傷拔毒

虺蝮傷人其毒內攻即死立將傷處用繩絹紮定勿使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮傷以吸拔其毒隨

白芷麥冬湯調服

五靈脂雄黃酒灌救

斑蝥雞蛋熱食

蛇咬致潰爛不愈用香白芷爲末入麝香麝香各少許水洗患處令淨以藥末敷之

此條本夷堅志急下有則字較爲明

斷

瘋狗毒最屬人受其咬毒氣入腹頓孕小狗攻脹而死初咬猶可救藥毒

吮隨吐。隨換酒醋再吮。俟紅淡腫消

爲度。吮者不可誤嚥中毒。又急飲麻

油一二盞。護心解毒。以薑末敷之。

被蝮咬死。用香白芷一味。以麥冬湯

調服。急以水代之。飲之卽活。

又方。用五靈脂一兩。雄黃五錢。以酒

調灌。每服二錢。再以滓塗咬處。

治顛狗傷

乘毒未發。用斑蝥七個。去頭足翅淨。

已發則狗形已成不治雖敵而未破但現青紫即已中毒宜急治之

斑蝥奔走下竅而至精弱之處能下敗物用此以毒攻毒但初愈後忌聞煙鼓之聲復發則不可治又畏巴豆丹參惡甘艸豆花不可不慎

用防風獨莖者一兩天南星一兩水炮七次晒乾爲末每服二錢白湯下半日再進一服出汗即愈

又法以細辛五分白芷一錢雄黃一錢好酒研入麝香少許一服立效

用雞蛋二枚同蒸去斑蝥淡食雞蛋

於小便內取下血塊痛脹不解則血塊未淨仍再食塊盡乃止

又法用斑蝥同米炒俟米老黃去斑蝥將米研末蒸雞蛋食如前法血塊下盡爲度

又法受敵後立至溪河將傷處洗擠血淨盡多飲生薑汁則毒可解仍封禁瘡口勿使受風

擠血盡
多飲薑汁

救服毒中毒方

解砒毒

服下未
久雞蛋
調礬末
灌救
服久磨
鉛水灌
救

雞蛋鎮心安厥明礬防毒內攻故服
砒未久者急用此方若已經入腹則
用鉛水鉛性重能墜下且解毒安神
多磨多灌或者有濟然終不如後方
用薑膏之爲第一也
凡中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青
肢冷用防風二兩煎湯服之即解
又方柏樹葉搗爛沖生白酒飲之即
解
又方楊梅樹皮煎水二三碗飲之即
愈
又方用紫蝴蝶花根搗汁頻頻灌之
立愈
又方甘艸末一錢明礬五分綠豆粉

砒霜服下未久者取雞蛋一二十個
打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之
吐則再灌吐盡便愈但服久砒已入
腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一
塊用井水於石上磨出黑汁旋磨旋
灌盡則愈即先吐出之後亦宜再用
鉛水服之以盡餘毒方無後患

洗冤錄詳義

卷四

洗冤錄詳義

丰

鴨血糞
青灌救

一錢新汲井水一碗調灌下如手指紅則活黑者不治

豆豉湯

又方用冬青樹葉或用嫩葉更佳帶水搗汁灌下以吐爲度或得瀉下亦愈

解法

解砒毒方不勝枚舉莫靈于用防風

甘艸藍汁同飲

一兩冷水調服余在京師知此方活人不少後閱紀文達如是我聞載歎

豆腐漿灌救

人蔣紫垣以醫爲業有解砒毒方用之十全卽此方也

大豆煮汁冷飲

治薄粥一碗喫下卽止如大豆汁等亦須冷飲若熱飲痢愈不止

大黃等藥冷服

中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又

糞青灌之亦解

又方以豆豉濃煎湯飲之可解

又用甘艸汁同藍汁飲之卽愈

又用熟豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

中巴豆毒痢不止以大豆一升煮汁

飲之

又巴豆畏大黃黃連蘆筍菰筍黎蘆

蕉葉搗
汁冷服

黑豆汁

解

蓮房煎
水灌救

甘艸藍
汁灌救

鼠莽艸以黑豆汁澆其根即爛可知
其能解毒矣
咬咀各本譌作咬咀據舊藏鈔本改
方書藥之粗齊爲咬咀本艸綱目注
李杲曰咬咀古制也古無刀以截細
令如麻豆曰咬咀

各煎冷服皆能止泄

又用芭蕉葉搗自然汁服之即止

解鼠莽毒

黑豆汁可解○又方用枯蓮房殼帶
蒂梗陰乾咬咀煎水二三碗灌之如
無用荷葉中心蒂或用藕節煎湯二
碗溫冷灌之毒即散

解莨菪毒

用甘艸汁或藍青汁飲之即愈若服

藥卽劇。

解苦杏仁毒

杏樹皮
湯灌救

本艸凡杏仁如誤食雙仁者殺人

用杏樹皮煎湯飲之。雖迷亂將死者亦可救。

解斑蝥毒

芫音官

豬膏等
解

各方中以大小黑豆汁解斑蝥毒。青毒須濃煎多服試之極效。

用豬膏、大豆汁、戎鹽、藍汁服之。或用鹽湯煮豬膏、巴豆飲之。又或用大小黑豆汁服之。並瘡用肥皂水灌下。再以鵝翎攪喉數次。令吐卽活。

雞鴨卵
痾救

生雞鴨卵灌吐此治危險之症曾在
山左有僕患淋閉服斑痧過多幾至
殞命灌之得吐而活

又方用生雞鴨卵開孔灌入口中連
灌五六枚得吐卽活倘閉以箸挾開
灌入

治菌毒

掘地攪
水救治

凡菌毒如夜中放光者欲爛無蟲者
煮不熟者煮汁照入無影者上有毛
下無紋者仰卷赤色者俱極毒殺入
飲以地漿及糞青俱可解
中笑菌毒飲冬瓜蘆汁立解或用苦
菜白礬調新汲井水服之
凡中菌毒莢花生研新汲水服一錢
或濃煎防風飲

四明溫台閒山谷多產菌然種類不
一食之閒有中毒往往至殺人蓋蛇
虺毒氣所熏蒸也有僧教掘地以冷
水攪之令濁少頃取飲皆得全活其
方自見本艸楓樹菌食之笑不止俗

言笑菌居山閒不可不知此法也

解胡蔓艸毒

胡蔓艸卽鉤吻亦卽斷腸艸

汁雞
卵灌救

中斷腸艸毒先將服毒人扶正攪開
可開到取生鴨蛋圓圖灌下三箇符
蛋入胃裏住毒艸次用豬膏銕化溫
和灌下一碗又用黃豆一大碗雜雞
一隻連毛帶腸同豆搗爛用清水一
碗泡入布袋濾渣取汁灌下其毒卽
吐如不吐卽用鵝翎探喉毒卽吐出
但在胃者可治入腸者難治

中胡蔓艸毒將糞汁灌之可解或飲
浸艸毒水百竅潰血急取抱卵不出
之雞蛋研細和麻油開口灌之吐出
可救

解蕈毒

金銀花
生嚼

與菌毒治法一例須參看前治菌毒
條

誤食毒蕈至吐卽採生金銀花嚼之
可解

餽糖黑

豆冷水

救治

甘艸等

射罔卽艸烏頭之汁煎成詳前諸毒條內

鉛壺煮酒任飲

解艸烏頭毒

用餽糖黑豆冷水解之。

解射罔毒

用甘艸汁或小豆葉浮萍薺苈汁冷

水解之。薺苈又名甜桔梗河南人呼爲杏葉沙參能解百藥毒

解輕粉冰片毒

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五

斤。納土茯苓半斤乳香三錢封固重

湯煮一日夜埋土中出火毒每日早

新汲水
解

桌布洗
水灌漱

鷓鴣肉
等救治

凡服毒用生黃豆入水攪爛絞汁或用生大黃二兩搗碎以生豆腐漿一碗同搗數十下灌服俱效

吞金者用上好綢絲剪斷約二寸長置碗內以滾水泡軟如細麵連滾水吞下則絲自裹金從大便出其法神效

晚任飲數杯。渴時以瓦盆接之。當有粉出。服至筋骨不痛乃已。

冰片毒。飲以新汲冷水可解。

救服酒

服鹽酒。將常用擦桌布。洗水灌之。使吐即解。

治吞金

中黃金毒者。食鷓鴣肉。中白銀毒者。以黃連甘艸解之。又洗金以鹽。駱駝

輕粉調服

石礬磨水熱服

金銀光潤者能柔而下若翳碎而有尖角者鈎住腸胃易致斷腸恐未必能出

有吞金者金重墜不能出醫者惟以升麻等升提藥與服蓋漸提其氣金必漸動漸動則漸隨大便而出若鎮重不移何由令其轉運乎凡吞銅錢者多食核桃及生葶藶自然消化吞鐵鐵者煮蠶豆同韭菜食或用黃蠟鎔化入磁石細末合勻搗如鐵大冷水送下蠟與鐵從大便出

驢馬脂餘甘子皆能柔金羊脂獲子

皆能柔銀吞金銀入腹中當服食前品柔則易出

又服金者用真輕粉爲末水調下能令金從大便出

解藥蠱金石毒

治一切藥毒蠱毒金石毒用石礬以熱水磨服

解水銀入耳

黃金枕

本艸載荷葉松葉松脂熬精艸黃艸
巨松夏枯艸煎湯服下皆能制汞

以黃金枕耳邊自出。若水銀入肉。令
人筋攣。以金物熨之。水銀乃出。蝕金
其病卽瘥。

解煤熏毒

飲冷水可解。或蘿蔔擣汁灌口鼻。移
向風吹便能醒。

解飲饌毒

凡中飲饌毒。不知何物。卽煎甘艸薺
芫湯飲之。便治。

冷水薑
汁灌救

甘艸薺
芫湯解

凡中一切毒。從酒得者。難治。從食得
者。易治。蓋酒性行諸血脈。流徧體也。
食入於胃。胃能容雜毒。又逐大便。瀉
出毒氣。毒氣未流於血脈。故易愈也。

白礬膏
試味甘
黑豆不
腥
槐皮湯
解

白礬芽
茶搗飲

保靈丹
治一切
毒

蠱多暗藏飲食內行之中其毒者必腹絞痛如有物嚙噬或吐下皆如爛肉或好臥暗室或乍噴乍寒或吐逆不定或面目青黃甚者十指俱黑其毒有緩有急急者倉卒或數日即死緩者延引歲月游走腸胃蝕五藏盡則死

此條載見宋蔡條鐵圍山叢談惟石榴皮湯作石榴根皮未知孰是各本作皮根誤叢談下字上有不字言不大便也不大便即上吐如誤作飲下解便非此方當照開藥味預行修合以備急需可治諸毒非僅專治蠱也

治蠱毒及金蠶蠱

泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者先以白礬末令嘗不澀覺味甘次食黑豆不腥乃中毒也即濃煎石榴皮湯飲之下即吐出蟲皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白礬芽茶搗爲末冷水飲之即愈

保靈丹 治蠱毒諸毒
一切藥毒

大山豆根 半兩
雄黃 一兩
硃砂 淨細研

雄黃黃藥子黃丹麝香均不注若干錢數非是查醫學祕要載此方雄黃等四味各二錢五分應據補

祕要云如遇急用但擇吉日精潔修合以石灰襯紙收乾又於不得嚼破下云病人自覺心頭如拽斷皮條聲須與毒物下或自口出或大便出蠟出血老則成髓或蛻蝦諸動物隨藥九並下其病如失瘥後忌酒食發物一月服淡尤妙較此詳明應據改

黃藥子 黃丹 麝香

斑蝥 二錢半 去頭足 續隨子 生杵末 二錢半

糯米 半生 半炒 大赤蜈蚣 二條一 生一炙

川巴豆 肥者取肉不 去油二錢半

右藥入乳鉢研和於端午重陽臘日修合宜避婦人及雞犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾蠶合收每一丸好茶清吞下不得嚼破須與毒物下藥丸凝血並下以水淨

鰻鱺魚 卷三金鷺蠱毒條上層備載各蠱名
未救治目及治法當參看

收可救三人。

治諸蠱毒。用鰻鱺魚乾末。空心服之。
魚或燒炙令香食之。其魚有五色文
者佳。

常山馬兜鈴力能發吐而本艸載馬
兜鈴尤爲吐蠱要藥

志云嶺南俚人解蠱毒畏人知
其方乃詭言三百頭牛藥或云
三百兩銀藥久與親狎始得其
實所云三百頭牛藥者土常山
也三百兩銀藥者馬兜
鈴也俱用水煎服卽愈
福清縣有訟遭金鷺蠱毒者縣令
治之不得蹤或獻謀取兩刺蝟
入捕必獲蝟獸類遍身有刺如
栗房蓋卽山中之刺鼠也金鷺

畏蝟蝟入其家金蠶不敢動雖
匿榻下牆飲盡爲兩刺蝟掄出
之

三神湯

各本脫能辟屍氣四字據宋本及舊鈔本增宋本屍作死洗冤錄辨正云言能辟死氣則與後能辟穢氣之辟穢丹稍別

毛氏經方載有辟瘟丹云時疫大行恐其傳染急服此藥雖與病者同居亦無害藥用丹參壹兩赤小豆壹兩鬼箭羽壹兩雄黃五錢共為末煉蜜丸如桐子大每日空心酒下七丸甚驗

辟穢丹

辟穢方

三神湯能辟屍氣

蒼朮

二兩米泔浸兩宿焙乾

白朮

半兩

甘艸

半兩

右為細末。每服二錢。入鹽少許。點

白湯服。

辟穢丹能辟穢氣。

麝香

少許

細辛

半兩

甘松

一兩

川芎

二兩

蘇合丸

此方載見宋時太平和濟局方及蘇
沈良方兩書藥共十五味並無天麻
台烏白豆蔻肉等三味蘇沈云丸如
雞頭實大每服一九溫酒嚼下大能
安氣血卻外邪凡疾自內作不曉其
名者服此往往得效惟治氣瘴氣厥
氣逆氣不和吐利榮衛阻塞尤有神
功嘗見嘔血奄奄即絕傷寒日久而
死心窩尚暖腹瀉諸藥不效病瘳日
漸厥削並霍亂邪氣瘟疫瘧疾疰瘵
疔腫等疾服之均驗惟古方雖云用
酒化下多不相宜只白湯為佳

右為細末。蜜圓如彈子大。久嘗為
妙。每用一圓燒之。

蘇合丸。每一丸含化。九能辟惡。

犀角尖 丁香 香附

安息香 明天麻 沈香

白朮 檀香 木香

畢撥 硃砂 訶子肉

麝香 蘇合油 白豆蔻肉

台烏各二兩 大片腦 乳香各二兩
或一兩

藥味只三十六兩。勘無用蜜至六斤之理。卽黃蠟更不能。用三十斤之多。以每藥一錢作九計之。不過三百六十九。嘗以粵東所售之各種蠟丸。權蠟殼之輕重。每殼重一錢二分。合計只須二斤十一兩二錢。是三十斤必係三斤之誤。蜜六斤當是六兩之誤。要在修合時以意消息。爲是。

黃蠟

三十斤

蜜六斤

或金箔

一百片

右藥一十八味。各取淨末。煉蜜搗

和爲丸。金箔爲衣。用蠟作丸裏之

或不用蜜。丸別以糯米糊搗和。印成香佩亦妙。

湖北補用知縣潘介繁校