

濕熱條辨

痧脹源流

濕熱條辨

南園醉 雪生白著

第一條

濕熱症始惡寒後但熱不寒汗出胸痞舌白口渴不
引飲

此條乃濕熱症之提綱也濕熱病屬陽明太陰
經者居多中氣實則病在陽明中氣虛則病入
太陰病在二經之裏者每兼厥陰風木以少陽

厥陰同司相火陽明太陰濕熱內鬱鬱甚則少火皆成壯火而表裏上下充斥肆逆故是症最易耳聾乾嘔發癰發厥而提綱中不言及者因以上諸症皆濕熱病兼見之變局而非濕熱病必見之正局也始惡寒者陽爲濕遏而惡寒終非若寒傷於表之惡寒後但熱不寒則鬱而成熱反惡熱矣熱甚陽明則汗出濕蔽清陽則胸痞濕邪內甚則舌白濕熱交蒸則舌黃熱則液

不升而口渴濕則飲內留而不引飲然所云表者乃太陰陽明之表而非太陽之表太陰之表四肢也陽明也陽明之表肌肉也胸中也故胸痞爲濕熱必有之症四肢倦怠肌肉煩疼亦必竝見其所以不干太陽者以太陽爲寒水之府主一身之表風寒必自表入故屬太陽濕熱不必盡從表入故不必由太陽況風寒傷榮衛榮衛乃太陽所司表濕傷肌肉肌肉爲陽明所主

寒濕之屬太陽者以太陽爲寒水同氣相求也
濕熱之屬陽明者以陽明爲中土火化從陽也
濕熱之邪從表傷者十之一二由口鼻入者十
之八九陽明爲水穀之海太陰爲濕土之臟故
多由陽明太陰受病膜原者外通肌肉內近胃
府卽三焦之門戶實一身之半表半裏也邪由
上受直趨中道故病多歸膜原要之濕熱之病
不獨與傷寒不同且與溫病大異溫病乃少陰

太陽同病濕熱乃陽明太陰同病也而提綱中
言不及脈者以濕熱之症脈無定體或洪或緩
或伏或細各隨症見不拘一格故難以一定之
脈拘定後人眼目也

濕熱之症陽明必兼太陰者徒知藏府相連濕
土同氣而不知當與溫病之必兼少陰比例少
陰不藏木火內燔風邪外襲表裏相煽故爲溫
病太陰內傷濕飲停聚客邪再至內外相引故

病濕熱此皆先有內傷再感客邪非由府及藏之謂若濕熱之症不挾內傷中氣實者其病必微或有先因於濕再因飢飽勞役而病者亦屬內傷挾濕標本同病然勞倦傷脾爲不足濕飲停聚爲有餘所以內傷外感孰多孰少孰實孰虛又在臨症時權衡矣

第二條

濕熱症惡寒無汗身重頭痛濕在表分宜藿香香薷

羌活荅木皮薄荷大力子等味頭不痛者去羌活

身重惡寒濕退衛陽之表症頭痛必挾風邪故
加羌活不獨勝濕且以祛風此條乃陰濕傷
表之候

第二條

濕熱症惡寒發熱身重關節疼痛濕在肌肉不爲汗
解宜滑石大豆黃卷茯苓皮荅木皮藿香葉鮮荷葉
白通草桔梗等味不惡寒者去荅木皮

此條外候與上條頗同惟汙出獨異更加關節
疼痛乃濕邪初犯陽明之表故略見惡寒及至
發熱惡寒當自罷矣用藥通陽明之表而卽清
胃脘之熱者不欲濕邪之鬱熱上蒸而欲濕邪
之淡滲下走耳此乃陽濕傷表之候

第四條

濕熱症三四口卽口噤四肢牽引拘急甚則角弓反
張此濕熱侵入經絡脈隧中宜鮮地龍秦艽威靈仙

滑石蒼耳子絲瓜藤海風藤酒炒川連等味

此條乃濕邪挾風邪者風爲木之氣風動則木張乘入陽明之絡則口噤走竄太陰之經則拘攣故藥不獨勝濕重用息風一則風藥能勝濕一則風藥能疏肝也選用地龍諸藤者欲其宣通脈絡耳

或問仲景治瘧原有桂枝湯加栝蔞根及葛根湯二方豈宜於古而不宜於今耶今之瘧者與

厥相連仲景不言及厥豈金匱有遺文耶余曰
非也藥因病用病源既異治法自殊傷寒之症
自外來症屬太陽治以散外邪爲主濕熱之症
自內出波及太陽治以息內風爲主蓋三焦與
肝膽同司相火中焦濕熱不解則熱甚於裏而
少火悉成壯火火動則風生而筋掣脈急風煽
則火熾而識亂神迷身中之氣隨風火上炎而
有升無降常度盡失由是而形苦尸厥正內經

所謂血之與氣并走于上則爲暴厥者是也外竇經脈則成瘡內并膻中則爲厥瘡厥竝見正氣猶存一綫則氣復返而生胃津不克支持則厥不回而死矣所以瘡之與厥往往相連傷寒之瘡自外來者安有是哉

暑月瘡症與霍亂同出一源風自火生火隨風轉乘大陽明則嘔賊及太陰則瀉是名霍亂竇入筋中則掣急流入脈絡則反張是名瘡但瘡

症多厥霍亂少厥蓋瘻症風火閉鬱鬱則邪勢
愈甚不免逼亂神明故多厥霍亂風火外泄泄
則邪勢外解不致循經內走故少厥此瘻與霍
亂之分別也然瘻症邪滯三焦三焦乃火化風
得火而愈燭則逼入膻中而暴厥霍亂邪走脾
胃脾胃乃濕化邪由濕而停留則溼及諸筋而
拘攣火鬱則厥火竄則攣又瘻與厥之遺禍也
瘻之攣急乃濕熱生風霍亂之轉筋乃風來勝

濕痙則由經及臟而厥痙亂則由臟及經而
總由濕熱與風滑亂清濁升降失常之故夫濕
多熱少則風入土中而霍亂熱多濕少則風乘
三焦而痙厥厥而不反者死胃液乾枯火邪盤
踞也轉筋入腹者死胃液內涸風邪獨勁也然
則胃中之津液所關顧不鉅哉厥症用辛開泄
胸中無形之邪也乾靈亂用探吐泄胃中有形
之滯也然泄邪而胃液不上升者熱邪益熾探

吐而胃液不四布者風邪更張終成死候不可不知

第五條

濕熱症壯熱口渴舌黃或焦紅發癉神昏譫語或笑
邪灼心胞榮血已耗宜犀角羚羊角連翹生地元參
鈎藤銀花露鮮菖蒲至寶丹等味

上條言症此條言厥溫邪暑邪本傷陽氣及又
熱極逼入榮陰則津液耗而陰亦病心胞受灼

神識昏亂用藥以清熱救陰泄邪平肝爲務

第六條

濕熱症發痙 神昏笑妄脈洪數有力開泄不效者濕
熱蘊結胸膈宜倣涼膈散若大便數日不通者熱邪
閉結腸胃宜倣承氣微下之例

此條乃陽明實熱或上結或下結清熱泄邪止
能散絡中流走之熱而不能除膈中蘊結之邪
故陽明之邪仍假陽明爲出路也

第七條

濕熱症壯熱煩渴舌焦紅或縮齒參胸痞自利神昏
瘧厥熱邪充斥表裏三焦宜大劑犀角羚羊角生地
元參銀花露紫草方諸水金片鮮菖蒲等味

此條乃瘧厥中之最重者上爲胸悶下挾熱利
癥疹瘡厥陰陽告困獨清陽明之熱救陽明之
液爲急務者恐胃液不存其人必自焚而壞也

第八條

濕熱症寒熱如瘧濕熱阻遏膜原宜柴胡厚朴檳榔
草果藿香六一散蒼朮半夏乾菖蒲等味

瘧由暑熱內伏秋涼外束而成若夏月腠理大開毛竅疎逕安得成瘧而寒熱有定期如瘧三發作者以膜原爲陽明之半表半裏濕熱阻遏則榮衛氣爭症雖如瘧不得與瘧同治故倣吳又可達原飲之例蓋一由外涼束一由內濕阻也

第九條

濕熱症數日後脘中微悶知飢不食濕邪蒙繞三焦宜霍香葉薄荷葉鮮稻葉鮮荷葉枇杷葉佩蘭葉蘆尖冬瓜仁等味

此濕熱已解餘邪蒙閉清陽胃氣不舒宜用極輕清之品以宣上焦陽氣若投味重之劑是與病情不相涉矣

濕熱初起亦有脘悶懊惱汗出口渴眼欲閉時

詰語渴邪蒙閉清陽在上焦者宜用枳殼桔梗
淡豆豉生山梔涌泄法若投輕劑又與病情不
相合矣此說須與第九第十兩條叅看同一邪
在上焦而第九條屬虛此說屬實且同一實症
而第十條邪在中焦此說邪在上焦臨症者當
慎之

第十條

濕熱症初起發熱汗出胸痞口渴舌白濕伏中焦宜

霍梗蔻仁杏仁枳殼桔梗鬱金蒼术厚朴草果半夏
乾菖蒲六一散佩蘭葉等味

濁邪上干則胸悶胃液不升則口渴病在中焦
氣分故多開中焦氣分之藥此條多有挾食者
宜加瓜蒌杏肉萊菔子舌根瑪黃色即是挾食
症

第十一條

濕熱症數日後自利弱亦曰濡濕流下焦宜滑石猪

芩茯苓澤鴻草薢通草等味

下焦屬陰太陰所司陰道虛故自利化源滯則
渴赤脾不轉津則口渴總由太陰濕勝故也濕
滯下焦故獨以分利爲治此條藥味獨用分
利然症兼口渴胸痞須佐入桔梗杏仁大豆卷
開泄中上源清則流自潔矣不可不知以上
三條俱濕重熱輕之候

濕熱之邪不自表而入故無表裏可分而未嘗

無三焦可辨猶之河間治消渴以三焦分者是也夫熱爲天之氣濕爲地之氣熱得濕而熱愈熾濕得熱而濕愈橫濕熱兩分其病輕而緩濕熱交合其病重而速濕多熱少則蒙上流下當三焦分治若濕熱俱多則下閉上壅而三焦俱病矣猶之傷寒門二陽合病三陽合病是也蓋太陰濕化三焦火化有濕無熱止能蒙閉清陽或阻於上或阻於中或阻於下濕熱一合則身

中少火悉化爲壯火而三焦相火有不皆起而爲虐者哉所以上下充斥內外煎熬最爲酷烈兼之木火同氣表裏分司再引肝風瘞厥立至胃中津液幾何其能供此交征乎至其所以必屬陽明者以陽明爲水穀之海鼻食氣口食味悉歸陽明邪從口鼻而入則陽明爲必由之道路其始也邪入陽明早已先傷其胃液其繼也邪盛三焦更欲取資於胃液司命者可不爲陽

明顧慮哉

或問水火同氣熱甚生風以致瘡厥理固然矣然有濕熱之症表裏極熱不瘡不厥者何也余曰風木爲火熱引動者原因木氣素旺肝陰先虧內外相引兩陽相煽因而動張若肝腎素優竝無裏熱者火熱安能招引肝風也耶試觀小兒一經壯熱便成瘻癰者以純陽之體陰氣未足故肝風易動也

第十二條

濕熱症舌偏體白口渴濕滯陽明宜用辛開如厚朴草果半夏乾菖蒲等味

此濕邪極盛之候口渴乃液不上升非有熱也辛泄太過即可變而爲熱而此時濕邪尚未蘊熱故重用辛開使上焦得通津液得下也

第十三條

濕熱症舌根白舌尖紅濕漸化熱餘濕猶滯宜辛泄

佐清熱如蔻仁半夏乾菖蒲大豆卷六一散連翹桑豆殼等味

此濕熱參半之症而燥濕之中卽佐清熱者亦所以存陽明之液也○上二條憑驗舌以投劑極爲臨症時要訣蓋舌爲心之外候濁邪上薰心肺舌胎因而轉移

第十四條

濕熱症初起卽胸悶不知人督亂大吐痛濕熱阻閉

中上二焦宜草果檳榔鮮菖蒲六一散芫荽各重用
或加皂角地漿水煎

此條乃濕熱俱重之候而去濕藥多清熱藥少
者以病邪初起卽閉不得不以辛通散邪爲急
務不欲以寒涼凝滯病機也

第十五條

濕熱症四五日口大渴胸悶欲絕乾嘔不止脈細數
舌光如鏡胃液受劫膽火上沖宜西瓜汁金汁鮮生

地汁甘蔗汁磨服鬱金木香附烏藥等味

此榮陰素虧木火素旺者今木乘陽明而耗其津液幸無飲邪故一清陽明之熱一散少陽之邪不用煎者取其氣之全耳

第十六條

濕熱症嘔吐清水或痰多濕熱內留木火上逆宜溫膽湯加瓜蒌碧玉散等味

此素有痰飲而陽明少陽同病故一以滌飲一

以降逆與止條嘔膈而治異正當合參

第十七條

燄熱症嘔惡不止晝夜不差欲死者肺胃不利胃熱移肺肺不受邪也宜用川連三四分蘇葉二三分兩味煎湯呷下卽止

肺胃不和最易致嘔蓋胃熱移肺肺不受邪還歸於胃必用川連以清潔熱蘇葉以通肺胃投之立愈者以肺胃之氣非蘇葉不能通也分數

輕者以輕劑治上焦之病耳

第十八條

濕熱症咳嗽晝夜不寧甚至喘不得眠者暑邪入於肺絡宜葶藶六一散枇杷葉等味

人但知暑傷肺氣則氣虛而不知暑滯肺絡則肺實葶藶引滑石直瀉肺邪則病自除

第十九條

濕熱症十餘日大勢已退惟口渴汙出骨節痛餘邪

留滯經絡宜元米湯泡於木隔一宿去木煎飲

病後濕邪未盡陰液先傷故口渴身痛此時救
腋則助濕治濕則劫陰宗仲景麻沸湯之法取
氣不取味走陽不走陰佐以元米湯養陰逐濕
兩擅其長也

第二十條

濕熱症數日後汙出熱不除或痙忽頭痛不止者榮
液大虧厥陰風火上升宜羚羊角蔓荆子勾藤元參

生地女貞子等味

濕熱傷榮肝風上逆血不榮筋而痙上升顛頂
則頭痛熱氣已退木氣獨張故痙而不厥投劑
以息風爲標養陰爲本

第二十一條

濕熱症胸痞發熱肌肉微疼始終無汗者腠理暑邪
內閉宜六一散一兩薄荷三四分泡湯調下卽汗解
濕病發汗昔賢有禁此不微汗之病必不除蓋

旣有不可汗之大戒復有得汗始解之治法臨
症者當知變通矣

第二十二條

濕熱症按法治之數日後忽吐下一時竝至者中氣
虧損升降悖逆宜生穀芽蓮心扁豆米仁半夏甘草
茯苓等味甚者用理中法

升降悖逆法當和中猶之霍亂之用六和湯也
若太陰傷甚中氣不支非理中不可

第二十三條

濕熱症十餘日後左關弦數腹時痛時闊血肛門熱
痛血液內燥熱邪傳入厥陰之陰宜倣白頭翁法

熱入厥陰而下利卽不圊血亦當宗仲景治熱
利法若竟逼入榮陰安得不用白頭翁湯涼血
而散邪乎設熱入陽明而下利卽不圊血又宜
師仲景治下利詰語用小承氣之法矣

第二十四條

濕熱症十餘日後尺脈數下利或咽痛口渴心煩下
泉不足熱邪直犯少陰之陰宜倣猪膚涼潤法

同一下病有厥少之分別藥有寒涼之異然少
陰有便膿之候不可不細審也

第二十五條

濕熱症身冷脈細汗泄胸痞口渴舌白濕中少陰之
陽宜人參白朮附子茯苓益智等味

此條濕邪傷陽理合扶陽逐濕口渴爲少陰症

烏得妄用寒涼耶

第二十六條

暑月病初起但惡寒面黃口不渴神倦四肢嬾脈沉
弱腹痛下利濕因太陰之陽宜倣縮脾飲甚則大順
散來復丹等法

暑月爲陽氣外泄陰氣內耗之時故熱邪傷陰
陽明消燥宜清宜滋太陰告困濕濁逃漫宜溫
宜散古法最詳醫者鑒諸

第二十七條

濕熱症按法治之諸症皆退惟目瞑則驚悸夢惕餘邪內留膽氣不舒宜酒浸郁李仁薑汁炒棗仁猪膽皮等味

滑可去着郁李仁性最滑脫古人治驚後肝系滯而不下始終目不瞑者用之以下肝系而去滯此症借用良由濕熱之邪留於膽中膽爲清淨之府藏而不瀉是以病去而內留之邪不去寐則陽氣

行陰暗熱內擾肝魂不寧用郁李仁以泄邪必用
酒浸者酒入于胃先走于膽也棗仁之酸入肝安
神而製以薑汁者安神而又兼散邪也

第二十八條

濕熱症曾開泄下奪惡候皆平獨神思不清倦語不
思食渴數唇齒乾胃氣不輸肺氣不布元神大虧宜
人參麥冬肉生谷芽川石斛木瓜生甘草鮮蓮子等
味

開泄下奪惡候皆平正亦大傷故見症多氣虛之
銀連合清補元氣若用賦滑陰藥去生便遠

第二十九條

濕熱症四五日忽大汗出手足冷脈細如絲或絕口
渴牽痛而起坐自如神清語亮乃汗出過多衛外之
陽暫亡濕熱之邪仍結一時表裏不通脈故伏非真
陽外脫也宜五苓散去术加滑石酒炒川連生地芪
皮等味

此條脈症全似亡陽之候獨於舉動神氣得其真
情噫此醫之所以貴識見也

第三十條

濕熱症發痙神昏獨足冷陰縮下體外受客寒仍宜
從濕熱治只用辛溫之品煎湯薰洗

陰縮爲厥陰之外候合之足冷全似虛寒矣乃
詰觀本症無一屬虛始知寒客下體一時營氣
不達不但症非虛寒并非上熱下寒之可疑也

仍從濕熱治之又何疑耶

第三十一條

濕熱症初起壯熱口渴腕悶懊憆眼欲閉時詎語濁邪蒙閉止焦宜涌泄用枳殼桔梗淡豆豉生山梔無汗者加乾葛

若病退後腕中微悶知飢不食是餘邪蒙繞上焦法當輕散此則濁邪蒙閉止焦故懊憆腕悶眼欲閉者肺氣不舒也時詎語者邪逼心胞也

若投輕劑病必不除經云高者越之用梔豉湯
涌泄之劑引胃脘之陽而開心胸之表邪從吐
散

第三十三條

濕熱症經水適來壯熱口渴詎語神昏胸腹痛或舌
無胎脈滑數邪陷榮分宜大劑犀角紫草茜根貫仲
連翹銀花露鮮菖蒲等味

熱人血室不獨婦女男子亦有之不第涼血并

須解毒然必重劑乃可奏功

第三十三條

熱症止下失血或汗血毒邪深入榮分走竄欲泄宜

大劑犀角生地丹皮赤芍連翹紫草茜根銀花等味

汗血卽張氏所謂肌衄也內經謂熱淫於內治以鹹寒方中當增入鹹寒之味

熱逼而上下失血汗血勢極危而猶不卽壞者

以毒從血出生機在是大進涼血解毒之劑以
救陰而泄邪邪解而血自止矣血止後須進參

清寒化勢
卷二十一
三

芪善後乃得

第三十四條

濕熱症七八日口不渴聲不出與飲食亦不欲默默不語神識昏迷進辛香涼泄芳香逐穢俱不效此邪入厥陰主客渾受宜倣吳又可三甲散醉地鱉蠍醋炒鱉甲土炒川山甲生天蠅柴胡桃仁泥等味

暑濕雖傷陽氣然病久不解必及於陰陰陽兩困氣鈍血滯而暑濕不得外泄遂深入厥陰絡

脈凝瘀使一陽不能萌動生氣有降無升心主
阻遏靈氣不通所以神不清而昏迷默默也破
滯通瘀斯絡脈通而邪得解矣

第三十五條

濕熱症口渴胎黃起刺脈弦緩裏縮舌硬訥語昏不
知人兩手搊搦津枯邪滯宜鮮生地蘆根生首烏鮮
稻根等味若脈有力大便不通者大黃亦可加入
胃津劫奪熱邪內據非潤下以泄邪則不能故

倣承氣之例以甘涼易苦寒正恐胃氣受傷胃
津不復也

濕熱條辨終

痧脹源流

沈金鶴撰

痧脹風濕火三氣相搏病也。夫痧脹之病，自古已有。痧脹之名，自古未立。攷之方書，曰乾霍亂，曰絞腸痧，曰青筋，曰白虎症，曰中惡，即皆痧脹之病也。特未專立痧脹之名，而其症亦偶一患之，未如近今之甚耳。故從古患此症者，北方多有，謂之曰青筋症，又曰馬頭瘧，今則南方遍行，謂之曰水痧，又曰水傷寒，江浙則爲痧閩，廣則曰瘴氣，其寃一而已矣。惟古已有此病，故凡方書所以治乾霍亂，絞腸痧，青筋，白虎中惡者，皆卽治痧脹之方藥。惟古未立此名，故凡後世焮刮刺等法，及所以治之之方劑，皆自古所未專詳。後之醫者，因得藉口以爲古書之所無，今人自不能治，以致患此症。

者俱束手以視其斂亦可憾矣。雖然，皇古無醫書，自軒岐創法歷代名人各有撰述，因而一切之病著，一切之治法亦備。痧脹之病特古未遍行，故治法遂畧耳。迨後世其病既盛，其法又何嘗不有人詳論之耶？且痧脹至今時而始有人詳論，不猶之一切病症亦爲古畧而後詳耶？是亦理有固然，無足怪已。夫所謂今時詳論痧脹者何人？王養吾是也。養吾名凱，毘陵人，精于醫，尤善痧症。曾詳列七十二種正變痧，于康熙年間刻痧症全書行世，而其板惜早湮沒。其書不甚傳，向余于痧脹一症，曾遍稽古方書言乾霍亂等症者，參以己見，著爲論，後得養吾書讀之，詳盡無遺。仍復理精詞達，雖其言兼症變症類症處，未免頭緒太煩，然掘抵搜根，發前人所未發，直覺養吾未有書痧症如隱烟霧中。養吾既有書痧症如

顯日月照臨中而人皆得共見也。視余向之所論殊爲簡而未該矣。迺卽養吾之言最精確者採輯而條貫之以著斯篇。又恐人不知余斯篇之寔本于養吾而反沒養吾也。因于此特申之亦不敢掠人之美云爾。且余前言痧脹爲風濕火三氣相搏之病者何也。風爲厥陰風木。濕爲太陰濕土。火爲少陽相火。三氣雜揉清濁不分升降不利。遂至胸腹脹急或痛或不痛而痧脹之症以成。此則病因之由于內者也。其寔內三經之因。其發必由外感而外感必分表裏。其始感于肌表人不自知則入半表半裏。故胸悶嘔吐腹痛也。用焯法可愈。不愈以藥治之。宜四號否象方或感于半表裏。五號觀象方入自不知則入于裏。故欲吐不吐欲瀉不瀉。痧毒冲心則心胸大痛。炒毒攻腹則盤腸吊痛。用放血法自愈不愈以藥治之。宜十四號豐象

方十九號
大畜方

或中于裏人自不知則痧氣壅阻惡毒逆攻心竇立時

發量氣血不流放之亦無紫黑毒血卽有亦不多此痧毒入深凶兆也但當審脈辨症風寒暑濕氣血食積痰飲辨其何因治之使甦令氣血流动然後扶起放痧如不甦急以藥灌之宜二十一號
三號巽象方四號巽象方三十號

如此重症當立時速進湯丸方能有救遲則必死十五號橐象方凡痧服藥但由痧氣壅盛而無食積瘀血宜冷服若痧氣壅阻食積而無血瘀稍冷服若痧毒盛而血瘀微溫服若痧入氣分而毒壅宜刮痧若入血分而毒壅宜放痧其大較也且痧症必分涼熱如痧犯太陽則頭疼發熱犯少陽則耳旁腫脹寒熱往來犯陽明則但熱不寒面目如火犯太陰則腹痛身涼犯厥陰則少腹或腸胸痛亦身涼犯少陰則腰痛亦身涼犯肺則咳嗽痰喘微熱甚

則鼻衄犯心，則心痛。或心脹，頭額冷汗如珠，而身或熱或涼。犯膀胱，則小便血甚。則身熱。犯大腸，則痢，膿血，嘔吐。身熱犯肝，則沉重不能轉側。嘔熱內熱甚，則吐血。犯三焦，則熱毒內攻，口渴便結而身熱。此痧犯六經臟腑而寒熱之外現者也。又有痧氣壅盛發爲熱症，或熱而不涼，或日晡發熱，或潮熱往來，皆痧毒阻而不通搏擊肌表，發而爲熱。若誤爲外感傳經熱症，發汗溫飲，雖漫痧遲緩，勢必益盛，變出頭汗發狂詰語種種重症。不知外感之脈浮數而繁，熱症之脈洪數有力。痧症之脈終有不同，或有可疑，須看痧筋，有無辨之卽明矣。而痧脈又必觀其所起，與其所伏，蓋痧之發也，與中風痰厥昏迷相似。若脈不洪滑，便有可疑，非真瘡矣。故症或口渴身熱，而脈變爲沈遲，症或不渴身涼，而脈變爲緊數，皆爲脈。

症不合必取青紫筋色辨之方有確見不得誤認爲中風痰厥昏迷也。且其病源之起伏更有顯然者如先吐瀉而心腹絞痛其痧從穢氣而發爲多也。先心腹絞痛而吐瀉其痧從暑氣而發爲多也。心胸脅悶癉涎膠結遍身腫脹疼痛難忍四肢不舉舌强不言其痧從寒氣久伏鬱爲火毒而發爲多也。則其源之所在安可不詳審哉。且夫治痧脹與治他症之法異欲治痧脹必先明乎他症之所以異何言之如傷寒食未化下之太早反引寒邪入胃變而爲熱熱邪固結所食不能消化乃成結胸若痧症新食固宜以吐爲先至所食既久驟然痧脹雖所食消化未盡下之無害蓋痧脹非有寒邪入胃變成熱結之患但因痧毒在腸胃部分肌肉作腫作脹盤腸絞痛偏及臟腑故外宜用刮放以泄毒于表內可即平

以攻毒于裏則腫脹自消食積因之通利原無結胸之可憂也但下之必兼去食積又宜以漸而進中病卽止痧毒若犯咽喉則痰喘如鋸先放其痧急用薄荷牛蒡童便山豆根之類以清之兼用吹藥宜二十號損象方。痧症危急大便不通急宜放痧用藥攻之宜用小便不通亦急放痧用藥分利之宜四十四號未濟方。放舉兩三端可見痧與他症之異也卽或有痧與他症相兼而發者亦當首重治痧兼醫他症以痧症急而他症緩也惟胎前產後有痧常並重處治蓋胎前宜補痧症宜消產後宜溫痧症宜涼也此際最當斟酌雖然痧症之發其表裏寒熱起伏以及他症同異固不可忽視而痧氣侵犯必先及十二經故其發時每隨所犯之經而有十二經現症必明乎此方可隨症尋經因經設治而十二經脈所起及十二引

經之藥俱不可不知試條列焉或腰背嶺項連及風府脹痛難忍是足太陽膀胱經症也其脈起于足小指外側之端其引經藥黃柏藁本或兩目紅赤如桃唇乾鼻燥腹中絞痛是足陽明胃經症也其脈起足次指外間又一支入足中指外間又一支入足大指端其引經藥葛根厚朴白芷少用或脇肋腫脹痛連兩耳是足少陽胆經症也其脈起足四指間其引經藥柴胡青皮或腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉不已是足太陰脾經症也其脈起足大指端其引經藥酒炒白芍或心胸吊痛身重難移作腫作脹是足厥陰肝經症也其脈起足大指叢毛上其引經藥柴胡青皮川芎或痛連腰與外腎小腹脹硬是足少陰腎經症也其脈起足小指下其引經藥獨活鹽酒或咳嗽聲啞氣逆發嗆是手太陰肺經症

也。其脈起手大指端。其引經藥。葱白桔梗。白芷少用。或半身疼痛。麻木不仁。左足不能屈伸。是手太陽小腸經。瘻也。其脈起手小指端。循外側上行。其引經藥。羌活少用。或半身脹痛。俯仰俱廢。右足不能屈伸。是手陽明大腸經。瘻也。其脈起手食指端。其引經藥。白芷少用。或病重沈沈昏迷不省。或狂言亂語。不知人事。是手少陰心經。瘻也。其脈起手小指內側出其端。其引經藥。獨活細辛。或醒或寐。或獨語一二句。是手厥陰心包絡經。瘻也。又名手心主。其脈起中指端。其引經藥。柴胡丹皮。或胸腹熱脹。揭去衣被。乾燥無極。是手少陽三焦經。瘻也。其脈起手無名指端。其引經藥。川芎少用。夫既因十二經現症。而知何經之瘻。即可因何經之脈所起之處。以施針刺。再用藥治之。寧患瘻脹之不愈。或有謂針刺手足無如指

項爲妙者。法最簡便。參用可也。然而治癆莫要于手法。更有不可不明者。手法奈何。不外粹刮放三者而已。蓋癆在肌表。有未發出者。以燈照之。隱隱皮膚之間。且慢粹。若旣發出。有細細紅點狀。如蚊迹粒。如瘡麤疎。則纍纍密。則連片。更有發過一層。復發兩三層者。粹法。看其頭額及胸前兩邊。腹上有腰。照定小紅點上。以希撲條或粗燈草。微蘸香油。點灼粹之。卽時爆响。粹畢。便覺胸腹寬鬆。痛亦隨減。此火攻之妙用也。此粹法也。癆在皮膚之裏。有發不出者。則用刮法。若背脊。頸骨上下。胸前。脇肋。兩肩臂。灣用銅錢或碗口。蘸香油刮之。若在頭額項後。兩肘臂。兩膝胱。用棉紗線或苧麻繩。蘸香油。曼見紅紫血點起。方止。大小腹軟肉內癆。用食鹽以手擦之。旣刮出。痛楚亦輕矣。此刮法也。古人云。東南卑濕之地。利用

之所謂針刺出毒者卽用砭之道也但今放痧俱用鐵針輕者一
針卽愈重者數刺不痊蓋因痧毒入深一經鐵氣恐不能解惟以
銀針刺之庶入肉無毒又何懼痧患之至深乎此刺法也夫治痧
之手法旣明而放痧之要處宜悉放痧者卽刺痧也其可放之處
有十一在頭頂心百會穴只須挑破畧見微血以洩毒氣不用針
入二在印堂頭痛甚者用針鋒微微入肉不必深入三在兩太陽
穴太陽痛甚者用之針入一二分許四在喉中兩旁惟蛾蟆大頭
瘡可用五在舌下兩旁惟急喉風喉驚痧可用急令吐出惡血不
可嚥下六在兩乳乳頭垂下盡處是穴此處不宜多用不如看有
青筋在乳上下者刺之七在兩手十指頭其法用他人兩手摝下
不計過數捏緊近脈息處刺十指尖出血一法用綫扎住十指根

刺指背近甲處出血隨人取用若刺指尖太近指甲當令人頭眩八在兩臂灣曲池穴臂灣名曲池腿灣名委中先蘸溫水拍打其筋自出然後迎刺九在兩足十指頭與刺手指同法十在兩腿灣看腿灣上下前後有青筋所在名曰痧眼卽用針迎其來處刺之如無青筋用熱水拍打腿灣直刺委中便是惟此穴可深入寸許或謂刺腿灣痧筋法細看腿灣上下有筋深青色或紫紅色者卽是痧筋刺之方有紫黑毒血其腿上大筋不可刺刺亦無血令人心煩腿兩邊硬筋上不可刺刺之筋吊臂灣筋色亦如此辨之此說參看可也以上刺痧要處皆當繫切牢記總之凡痧有青筋紫筋或現于一處或現于數處必須用針刺之去其毒血然用針必當先認痧筋醫者不識孟浪用藥藥不能到血肉之分或痧症復

原缺

于血而爲畜爲瘀。凡遇食積痰火氣血因之阻滯，結聚不散。此所以可畏也。故壯寃者有痧症。忽飲熱酒熱湯而變者。固然。卽虛弱者有痧症。忽飲熱酒熱湯而變者。亦無不然。至如人有雜症兼犯痧。脹是爲雜病變端。亦畏熱湯熱酒。人不知覺。遂遭其禍。則痧症之發。又何論人虛寃乎。夫惟寃者犯之。固當以有餘治虛者犯之。亦卽以有餘治。蓋其有餘者非有餘于本原乃有餘于痧毒也。故藥雖剋削。病自當之中。病卽已于本原依然無恙。可見治痧之藥。絕無補法。痧之有寃無虛也。明甚。然則有手法以洩毒于外。有藥劑以清毒于內。痧不旣治矣乎。乃竟有放血不出用藥不效者。寧遂無法以治之。蓋痧筋隱隱。放之而血不流。卽昏迷不醒。勢在危急。若審其無食積血痰阻滯于中。急用陰陽水或溫漿水或晚蚕

沙水或白沙糖梅水或細辛水擇一種用之俟其稍醒然後扶起再行別法療治。有因血瘀放之不出者用桃仁紅花童便之類。有因飲後便犯痧症多用鹽湯或礬湯冷飲以吐去新食食久痧脹用蘆子山楂麥芽消之。有積痧阻用大黃枳榔驅之宜看氣方或痰血凝結昏迷欲死不省人事用菜油二兩麝香一錢調下立醒。如是先去食積血痰之阻滯者則痧筋自然復現。痧氣自然散行而後可刮卽刮可放卽放當藥卽藥益綠。痧症初發未攻壞臘麻故也總之肌膚痧用油鹽刮之則毒不內攻。血肉痧看青紫筋刺之則毒有所洩。腸胃及脾肝腎三陰痧須辨經絡臘麻在氣在血則痧氣內攻者可消可散可驅而除其病相也。且凡病用藥得宜斷無不效。獨痧症竟有得宜亦不效者何故夫痧熱毒也。熱毒宜涼不

宜溫。宜消。不宜補。湯劑入口。必須滯冷冷。則直入腸胃。而肌膚血肉之間。雖有良劑。安能得至。故治痧者。莫先于刮放也。如刮放而肌膚血肉之毒已除。後將腸胃肝脾腎之毒。用藥驅之。未有不效者矣。然有刮放過藥。仍不效。奈何。蓋雖刮而刮有未到。雖放而放有未盡。則肌膚血肉之毒。猶在。故藥有不效也。若刮已到。放已盡而痧症猶在。則毒惟在腸胃及肝脾腎三陰經絡。非藥將何以治之耶。雖然。痧之治法。卽已精詳。而痧之名稱。又當枚舉。蓋痧各有受病之由。其原雖不離七情六氣。然不盡關七情六氣也。有因糞穢所觸而發。有因饑飽勞逸而發。有因傳染時行瘟疫而發。本無定脈。凡脈與所患之症不相應者。卽爲痧之脈。痧亦無定症。或感風。或感食。或感勞。或感痰。而以本症治之。不效者。皆爲痧之症。有其症。

卽應有其名。有其名。卽應有其治。故養吾于有所感而獨發爲痧者。定爲正痧。三十六症。而以三十六方治之。又以痧之發。或兼他症。或類他症。或變他症。皆有必然之勢。故復卽此而定爲變痧。三十六症。而以二十八方治之。總計痧症共七十有二。治痧方六十九。又以一症有兼用數方者。有一方或可治數症者。有有症而不必用藥。因無方者。其方難於立名。遂取六十四卦象。定名編次。蓋以症皆已析。方皆已造。從古無七十二痧之名。亦無六十四方之治也。今得取其方症。而列陳之。曰風痧。頭疼腿痠。身熱自汗。咳嗽腹痛。此因時邪所感。不可同傷風治法。純用疏風。當用刮法。後服藥。宜第一號乾象方。曰暑痧。頭眩惡心。自汗如雨。脈洪拍拍。上吐下瀉。腹痛或緊或慢。宜第二號石青湯方。而亦有暑脹不已者。宜第三號逐象方。如竹葉石青湯六

河朔散 魁曰陰瘻腹痛而手足冷者是也宜用火焯或因穢氣所觸而致
宜第四號曰陽瘻腹痛而手足煖者是也出血卽安或因鬱
否象方 氣不通之故宜第五號曰紅瘻皮膚隱隱紅點如瘡疹相似瘻在
肌表感受雖淺熱酒熱湯亦不可犯外用焯刮宜第五號曰班瘻
頭眩眼花恶心嘔吐身有紫斑瘻在血肉急用刮放遲則漸入于
裏必生癰疽宜第六號曰烏瘻滿身脹痛面目黧黑身有黑斑毒
在臟腑氣滯血凝以致疼痛難忍宜第七號曰吐瘻湯水入口卽
吐急用伏龍肝研碎水泡澄清飲卽定若湯藥亦以此水煎之宜
四號否 象方 曰瀉瘻水瀉不計遍數不可下不可澀惟分理陰陽用五
苓散去桂白朮換蒼朮加車前木通之類宜五號曰紫瘻其瘻急壅
時暈倒不消半刻卽死故曰紫若知之者急爲放血焯刮宜麻疹

教曰慢痧緊痧只在頃刻。慢痧十日半月死甚或一月三四月死。然亦必速治。蓋其死雖遲久。則痧毒延蔓。腸胃經絡正多凶險。如。痧毒結滯于身。或左右。或上下。或表裏。其在內者先壞臟腑在中者先損經絡。在表者先瀆肌肉。一不治便成死症。夫痧之有緊有慢。人多不識。未能逐症詳明。如初犯邪氣勝元氣衰。或十日半月一發。或一月二月一發。久之則日近一日。蓋由胃氣本虛故爾。數犯當用藥以充其胃氣。則毒自解而痧自斷矣。並六十四號歸妹方曰暈痧

一時頭眩眼暗昏迷跌倒。乃毒痧所攻毒血。一冲必至敗壞臟腑。其勢甚急。不能少延。蓋因毒血與食積痰氣結聚心腹胸膈而經絡不轉。氣血不通。雖放而血不流。雖刮而痧不顯。治法視其食積痰血氣阻。及暑熱伏熱穢氣之類。消之散之。俟胸膈一鬆。則昏迷。

自醒，然後驗其青紫筋以刺之。宜第八號大有方。

第九號坎象方

曰絞腸痧心腹

絞切大痛或如板硬或如繩轉或如筋吊或如錐刺或如刀刮痛

極難忍輕者亦微微絞痛脹悶非常放血可愈若不愈必審脈症

何因辨明暑積食積血痰氣阻治之須連進數劑俟其少安方可

漸爲調理此症多有放血不愈不肯服藥遂致痧毒攻壞腸胃而

死者更可惜哉本症右手脈伏宜放血用第十號簡象方第八號

大有方十一號屯象方服下能熟睡即愈如昏沈

救偏口吐瘀涎宜先刺指頭出血用十二號既濟方冷砂仁湯調

下井一號乾象方加山豆根茜草金銀花丹參山楂菔子服之安

如盤腸絞痛脈俱伏宜十三號革象方十四號豐象方或飲之稍

愈後復經痛非常叫喊不已宜十五號明夷方十六號師象方必

愈曰抽筋痧兩足筋抽疼甚忽一身青筋脹起如筋粗必須處處

大放毒血宜十七號

良象方

曰暗痧心悶不已不食行坐如常卽飲溫熱

不見凶處心腹腰背不痛但漸漸憔悴日甚不治亦大害此痧之

慢而輕者放之愈。更有頭痛發熱心中脹似傷寒亦有往來寒熱似癟悶悶不已又有咳嗽煩悶似傷風有頭面腫脹面口如火有四肢紅腫身體重滯不能轉側此癥之慢而重者誤吃熱物遂乃沈重或昏迷不醒或痰喘氣急狂亂如遇此等必當審脈辨症果係何因在表者刮在中者放在裏者或煎或散或丸須連進數服俟其少安漸爲調理一婦忽不省顏黑左脈洪大右脈沈微此暗號節象方稍甦至五日又刮痧用十八號資象方乃大甦一老夫人六月發熱昏迷舌上黑胎芒刺狂罵不已六脈伏此痧之極重者刺之血不流用十號節象方十九號大畜方稍令飲之又用三號逐象方次日痧退少甦但身重如石黑胎不退用六號制象方而痊一婦懷孕失火急下樓墜仆絕聲以驚治不效安胎又不效明日胎下見已死診之脈伏細按如有一絲但四體溫軟如熱瘡狀急爲刺手足血便呻吟投湯匙散遂甦曰悶痧痧毒冲心發更用十九號大資方并二十號損象方而痊

起放痧不愈審脈用藥急投滌痧丸如發暉不甦扶不起必須辨症的確用藥數劑灌甦再放痧再調治宜十號節象方九號致象方曰落弓痧忽昏不省或痰喘目上吊如小兒落弓症此暗痧難識必須審脈辨症是何痧毒再看身之涼熱唇舌潤燥何如然後治之據明夷方如痧氣未盡宜二十一號喫象方加銀花山楂丹參龍子一人常身熱口微渴飲熟茶忽昏迷左尺沈細動止不匀右寸浮芤乃腎虛而痧犯之腎水之痧逆行于肺故痧氣壅盛而發暉也用十二號屢象方加貝母牛膝入童便飲之更用二十三號中孚方然後扶起曰噤口痧不語語亦無聲乃痧氣鬱盛熱痰上升阻逆故瘀愈曰噤口痧不語語亦無聲乃痧氣鬱盛熱痰上升阻逆氣管咽喉閉塞而然宜先放血審肺腎脾三經脈次之推詳餘經則知病之所由來矣一女爲後母所詈痧脹昏沈不語左關有力右脈沉伏乃傷氣之痧也陳香棟一個煎湯微冷服稍有聲次日左關弦長而動益因怒氣傷肝痧氣尚阻肝經之故刺委中三針血出如注又刺頂心臂指十餘針乃用十八號真象方二十四號漸象方加元胡索香附微溫服之乃痊曰撲驚痧痰涎壅盛氣急發喘喉

聲如鳴此三焦命門之痧也當放臂指腿擣青筋紫黑血不愈服藥宜十三號革象方二十一號曉象方外吹二蓋此症痛如喉嚨十五號震象方再服二十六號豫象方自愈蓋此症痛如喉嚨狀但喉嚨喉內腫脹痧只如喉嚨之痛而不腫脹形如急喉風但喉風痛而不移痧則痛無一定且痧有痧筋喉嚨則無可辨也曰角弓痧心胸脹極痧毒內攻故頭項向上形如角弓反張是臟腑已壞死症也然反復試驗又得一治法胸腹脹悶自不必言身難轉側或手足拘挾不能屈伸有時蹉踏有時反張急用毛青布一塊蘸油燒抹其手足拘急處再口含火酒噴其通體少頃定覺舒展鬆動然後用藥或可回生五十號節象方之類曰瘟痧寒氣鬱伏肌膚血肉間至春而發變爲瘡症是名瘟痧又暑熱傷感凝滯于肌膚血肉中至秋而發亦名瘡痧但春瘡痧受病者少不相傳

染時或有之。秋癰瘍毒受病者多老幼相傳。甚至一家一方俱犯其發也。惡寒發熱或腹痛或不痛似瘻非瘻或氣急發喘頭面腫脹胸膈飽悶或變下痢膿血輕者牽連歲月重者危急一時治宜放血消食積爲主然後和解清理。宜第九號坎象方二十八錢加恒象方一二錢曰滿瘻初起跌倒牙關緊閉不省人事捧心拱起鼻煽耳鳴急爲大放毒血宜七號晉象方九號坎象方二十九號升象方曰脫陽瘻小腹急痛腎縮而黑氣短出冷汗名爲脫陽有似發瘻用蓮鬚葱白三莖研爛酒四碗煮一碗作三服又炒鹽熨臍下氣海穴令氣熱自愈曰羊毛瘻腹脹連背心或腰胯如芒刺痛宜用燒酒瓶頭泥研細將燒酒和成團帶滾在團上疼即止用皆驗曰羊筋瘻腹脹渾身板痛此與上羊毛瘻症或胸前或腰背當用小針穿皮提出筋毛自愈只捺疼處看其有毫毛

聚起者便是。

疽癰瘍丸。濟消毒飲。

曰紫疮瘀症不內攻則外潰即如爲

腫爲毒之外又有發爲紫疮血者此真瘀之異者也宜刺腿灣及
手指頭令出毒血直三十號

井象方

曰瘋癲曾見一人犯大麻瘋症冒髮

俱脫面目頹敗手足踳擊遇一老者爲之放痧三次曰痧瘋也傳

一方日日服之以漸而痊瘋者天地之攜氣蓋惡毒之氣織于血

肉散于肌表留于經絡以成瘋症最惡候也病亦時行惡毒之氣

所鍾變爲大瘋又何疑乎牛膝三錢赤芍紅花生地各二錢黃芩

一錢半皇角刺一錢水酒各半煎附瓦移手搘內綱搘無此

症無藥吃亦不多見惟有急破去風剝去皮一法耳曾見一女遍

身起大痘其癥無比用熱水洗之稍解嘗欲服于

瘡瘍

瘡瘍包上痘若破內藏虱一包如此數月而死

曰血瘻胸中脹

瘡瘍

門飲食俱廢兩脇疼甚口中嘔涌出淡紅色血沫如西瓜瓢自用

瘡瘍

舌苔白君卽丹陽零香佐以茜草剗寄奴之類治之自愈

曰蛔結瘻瘍毒攻胃故蛔死入于

瘡瘍

腸與宿糞相結。腹中大痛。是爲蛔結。又有痧毒入胃。胃必熱。脈之極。蛔不能存。因而上涌。乘吐而出。或蛔結腹痛。不大便。或入大腸。由大便而出。與傷寒、吐蛔伏陰在內者不同。法當清其痧。脈爲主。先用刮放後服藥。宜二十六號豫象方十五號明夷方三十一號大通方

曰銅痧

渾身上下

頭面眼珠。盡如薑黃色。直視。四肢僵直。六脈似有似無。一時又如沸羹。大小便閉。淹淹欲死。急拔絳瘻丸。列指臂委中。俱令出黑血。宜三十二號隨象方良曰鐵痧。頭面手足十指。如鍋煤色。不治以週身血凝聚也。急深刺委中。令多出黑血。用火酒擦身法。曰痧塊。痧毒留于氣分。成氣痞塊。留于血分。成血塊。痛壅于食積。成食積塊。痛蓋因刮放稍愈。痧毒未盡。不用藥消之。故治法在氣分者。用沉香砂仁之類。在血分者。用桃仁紅花之類。由食積者。用枳榔菔子之類。或

氣血俱有餘毒者兼治之更兼食積并治之又有痧症不忌食物。痘毒裏食結成痧塊兩脇下痛其痧塊變症多端故難治且治痧唯在初發若不知或飲溫熱毒血凝結卽慢痧不至殺人亦成脇痛。瘡之日久勢必難散宜二十九號井象方三十三號井象方與三十四號曰身重。痧症初發勢雖凶暴未必身重若飲熱湯熱酒痧毒卽阻塞經絡血肉之間徧身重痛不能轉側或嘔吐腹脹脈伏放痧之後治先清瘀解毒宜三十五號家人方如瘀氣漸減再放痧用三十六號苦象方曰心煩嗜睡痧氣冲于心胸故心煩或嗜睡此等俱慢痧若誤以心煩嗜睡治之必日甚倘吃溫熱必日凶至不起治法刺血爲主可不藥而瘳曰偏身青筋痙攣發面色如靛滿身青筋脹起粗如筋痛自小腹起攻上胸膈困倦不堪切不可誤認作虛急劑曲伸

委中出黑血。宜潑痧丸。以火酒下。曰遍身腫脹。痧者暑熱時疫惡厲之氣。

攻于裏。則爲痰喘。爲瘀血。昏迷不省。若元氣塞。內不受邪。卽散其

毒于肌膚。血肉之表。爲腫。爲脹。若誤吃熱湯酒。便成大害。此痧之

暗者。宜從腋異處辨。一女手足俱腫。將及于腹。六脈弦細沈遲。此

二十。除針黑毒血。出用十號節藥方。并散痧解毒消麥梗氣藥。十

餘帖安。一女久生瘡。脹腫如鼓。手足腫。左脈微數。右脉歇止。夫

瘡毒脈必洪數。今脈症不合。此慢痧爲患也。刺腿灣奇筋五針。又

刺指頭十餘針。用十號節藥方。並三十六號益象方。連進五服。乃

症以上三十六正痧也。試更卽三十六變痧述之。曰傷寒兼痧。凡

傷寒頭痛。寒熱諸症。或當暑天。或觸穢氣。或感疫病。忽犯痧脹。是

惟認脈看筋辨之。必先治痧。痧退。乃治傷寒。若誤食溫熱湯酒。生

薈。立見凶危。一人傷寒。發痧昏沈。卧不能轉蓋。痧氣冲心。故昏迷。

痧毒入血分經絡。故不能轉側。先放痧。用三十七號

无妄方。痧退。治傷寒而痊。一女太陽傷寒。治之四日。面赤身熱。

心胃煩悶。六脈洪大。無倫。此兼痧症也。刺青筋一針。流紫黑血。餘

有細筋隱隱痙攣之故用三十四號小畜方二帖稍緩次日筋大見刺九針服二十三號中孚方少安又早飲食復發熱面赤又刺兩足青筋用小畜方二帖稍痊偶飲溫茶立刻妄言此痧未盡故故又發耳飲冷井水二碗更服小畜方數帖痧乃清但病久身虛服參曰痧症類傷寒傷寒集中僅有四症類傷寒至于痧症類傷寒比四症尤凶暴而方書不載故醫者不識夫傷寒頭痛惡寒發熱是太陽經症寒從肌表而入故宜發散若痧症頭痛是痧毒上攻頭面三陽不因外感其惡寒發熱雖在肌表是游行之氣所感由呼吸而入搏擊于肌表之中作爲毒熱內熱則外寒故亦惡寒治宜先刺巔頂放痧以洩其毒用藥惟以透竅解毒順氣爲上若誤用麻黃羌活發表太甚反助痧火邪勢必惡毒攻冲作腫作脹立時凶危故痧與傷寒症雖同而治各異要知痧症宜清涼則痧毒可內解傷寒宜辛散則寒氣可外舒固不可以治痧症

者治傷寒更不可以治傷寒者治痧症也急刺腿灣指臂及項心
宜十號節象方三十八號益陰方三十九號頭象方四號否象方曰傷風咳嗽痧毒從時氣所感
因而咳嗽肺經受傷不可同傷風治蓋傷風以疏風爲主痧則當
以刮放爲先用藥以清喉順氣涼肺散痧爲上宜四十號疊象方
加前胡山豆根曰嘔嗽嘔嘔痧毒之氣上凌肺經故氣逆發嗰而咳嗽痰涎上
肩或嘔噦恶心或面目浮腫或心胸煩悶此熱毒入于氣分痧筋
往往不現當刮之間有入血分者必待痧筋方剗之急宜清理其
痧毒若從傷風治誤矣宜十號節象方加童便微冷服又二十號
損象方或一號乾象方加貝母薄荷童便曰霍亂痧痛而不吐瀉者名乾霍亂毒入血分也宜放痧新食宜
痧筋則放宜調其陰陽之氣須知腸胃食積宜驅不宜止止則益
吐久食宜消食積下結宜攻痛而吐瀉者毒入氣分也宜刮痧有

痛若吐瀉而後痛者。此因瀉糞穢氣所觸。宜用薑香正氣散。須防食積血滯。或消或攻。或活血。山藥茯苓不可亂施。燥濕之品溫緩之藥俱在所禁。乾霍亂盤腸大痛。先放痧後卽服藥。宜十號節東方導導下丸妙若上腹大痛。吐瀉數十次。痛更甚。宿食雖吐瀉盡。乃毒入血分。血瘀作痛也。二十七號損象方曰。癥病夏傷于暑。秋必癰。痢疾初發。必先泄瀉。瀉則腸胃空虛。虛則易觸穢氣。卽成痧痛。或天氣炎熱。時行疫癘。感動腸胃。因積而發。亦致痧痛。夫痘不兼痧積去。便輕。若一兼犯勢。必絞痛。屢常止治其瘡。亦不效。或變瘡如猪肝色。或如屋漏水。或惟紅血水。或變噤口不食。嘔吐凶危。或休息少痢。惟先治痧兼治積。則痧消而積易去。積去而痧可清矣。急宜刮放。直九號坎象方或仁湯。或三十號井象方或更發熱。腰悶沈重。痢下紫血。六脈。

洪大不勻此瘡氣不清毒尚盛也急刮放量更歟次以蘇木紅花
薑草五靈脂烏藥香附當歸以導其瘀

曰瘡類瘧疾瘡有寒熱往來似瘧或昏迷沈

童或狂言亂語或痰喘不休或心胸煩悶叫喊不止或嘔噦吐痰
睡卧不安或大小便結舌黑生芒如此重極脈必有變不與瘧同
宜細辨之

一人日晡潮熱晝沈張闊大便不通肺厚舌焦左脈浮

大而虛右脈沈細而潤若是瘧脈不應虛且潤視其乳

下有青筋刺出黑血用散瘀消毒活血之藥諸症退又

用劑下丸三錢大便通惟寒熱未除用小柴胡湯而愈曰瘡疾兼

瘻瘡疾連朝間夕多因暑熱相侵心中迷悶或感疫氣兼犯平瘡

瘻因瘡變勢所必至不可慢以爲瘡而忽視之瘡猶可延瘡必傷

人自非先治瘡決難全愈兼瘡之禍可勝道哉

宜十號節象方八號大有方

又不勻右脈虛澀此非瘡脈乃爲瘡之變症非瘡而何刺臂出毒血
或有本患瘡疾日晡寒熱七八日後忽壯熱不已昏沈不醒左脈

不愈。服藥宜五號觀象方加養香菔子厚朴梔榔并四十一號離
用十八號貴象次日再列指頭卽觀象方加大黃枳壳俟熱退再
方運動其氣曰頭痛痧症毒中臟腑之氣閉塞不通上攻三陽

顱項故痛入腦髓發暈沈重名真頭痛且發夕死夕發且死急刺
破顱頂出毒血以洩氣藥則惟破毒清臟爲主病毒中臟腑之血
壅瘀不流上冲三陽頭面肌肉故肌肉腫脹目閉耳塞心胸煩悶
急刺破顱項及其餘青筋藥宜清血分破壅阻爲要氣分宜四十
血分宜先冷服紅花膏子半錢再用四十三號貴象方二號旅象方

疼時止痰涎壅盛昏迷煩悶此其候也治宜刺手臂服順氣藥爲
主痧毒攻心屬之于血則大痛不已昏沈不醒此其候也治宜刺
腿澣服活血藥爲主遲則難救宜十一號屯象方曰腰痛痧症毒入腎則
腰痛不能俯仰若誤吃熱湯酒必煩躁昏迷手足搐搦舌短耳聾

垂斂而已。故凡瘻中于腎脈或左尺虛微右尺洪寔或兼歇止者急刺腿灣出黑血。宜二十二號既濟方連服曰大腹痛瘻瘍毒入大小腸則小

腹大痛不止形如板推絞切不已治之須分左右二股屈伸爲驗

如小腹大痛每每左卧左足不能屈伸小腸經瘻也或瘻筋不現

先服藥濟方兩三劑未俟筋現刺左腿灣二三針出紫黑血再服

藥宜二十三號中孚方冷服愈如大腹大痛每每右卧右足不能屈伸大腸經

瘻也急刺右腿灣青筋三四針出毒血服藥宜二十二號隨象方冷服如夏月

不頭疼發熱但覺小腹痛或心腹俱痛脹痞不能屈伸此皆暑火

流注臟腑故先小腹痛徧及心腹急用藥宜六和湯清解之或四

和散之或若香正氣散加山楂或用炒鹽和陰陽水探吐痰涎亦可曰頭眩偏痛癰瘍氣慳者上升於三陽頭面常覺頭眩內熱或半邊頭痛心煩不安宜刮瘻不愈

用清熱下氣之劑治之。曰流火。流痰。瘀毒傳遍。不待晦日。朝發於足而足腫痛。夕發於手而手腫痛。朝發于肌膚而紅腫夕發于裏而瘻喘不休。此等痧乍隱乍現乍來乍去。按脈而痧脈又不現。最難識認。如痧毒所流及之處熱者似流火而非流火腫者似流瘀而非流瘀。或痒痛不已。或但痛之極。又痧之變者也。欲知此病須看病勢凶暴不比流火。流瘀輕且緩者。驗于痧筋發現刺之無疑。然後憑脈所犯風暑濕食瘀血氣阻分治之。斯能有效。一女人足小腿紅腫大痛。夜則腹痛而足痛止。次日左足小腿紅腫大痛。腹痛又止。來去不常。痛無一定。但六脈如常。難據爲痧。委中。有齒筋三條刺之。血甚多。反加疼痛。放痧未盡。也用十六號陳家方。加土貝母三錢。二帖少愈。次日又刺左委中。痧筋一條。額頭一針。用前方加牛膝三錢。痛退。又用二十三號中孚方。腫痛俱瘳。一人晚間右腿紅腫痛之已。喉旁腫痛。初不覺其爲痧。只見頭痛。犯此者甚多。細看兩臂痧筋刺出毒血。用十六號師象曰。瘻喘氣急。痧方。佛山查腹子加大黃一錢。微之食消便下。前安曰。瘻喘氣急。痧

先癆喘氣急。痧服因之先治癆。後治痰。氣無令痧爲本病之助。先
痧服後。痰喘氣急。因之但治痧。而痰氣自愈。若病有寒熱不清。痰
喘氣急者。兼和解。痧有但熱無寒。喘急者。兼消食順氣。有二便不
利。喘急者。有病。膿血或赤白。喘急者。但急攻裏。有瘀血凝滯。小便
利。大便黑。喘急者。當防痧毒攻壞臟腑。不痛者可治痛。不已者難
治。服藥不應者必死。一人發熱頭疼。眼悶昏迷。痰喘氣急。六淫無根。因放痧用十三號草象方二十號損柔方。清冷服。又用四十五號蒙象方。服平。再用一號乾象方。加青艾連
翹山楂散子。熟大黃病痊。一婦喘急。眼悶刺乳下。二針出紫黑
血。用二十八號損象方二帖愈。一人喘急。體熱身重。腹中絞痛。
利放不效。用四號否象方十四號豐象方。加大黃服之愈。
半身不遂。總因痧毒爲害也。見有青筋急。宜剝破。乃用藥散毒。
成半身不遂。總因痧毒爲害也。見有青筋急。宜剝破。乃用藥散毒。

活血消瘀始得愈

宜四十六號換象方

曰腋脹兼痧先腋脹忽痧氣乘之腋

脹益甚在腋不可先醫在痧自宜早治一人腹脹如鼓脣突筋青

心口將平知爲血鼓症其指頭黑色兼痧無疑刺二十餘針腿臂

出血畧鬆遂服藥

宜十九號大畜方臍下青筋漸退後用鼓張著導去惡水日服治鼓香擦九二月餘鼓症平未

不復曰痧變腋脹痧者毒也慢痧之毒遷延時日留滯肌膚腸胃

中若不早治卽成真鼓

一人氣急作脹胸腹飽悶臍下青筋突起心口將平此慢痧成鼓也出毒血二十餘針

針筋淡腹熱用十號節象方

曰老病兼痧先患痰火咳嗽忽喘急痰涎喉聲如

鐘或頭汗如油喘而不休心胸煩悶莫可名狀雖是痰火危固然

有兼感時氣或觸穢驟然勢盛者必宜察脈按症先清痧次治痰

漸補氣血斯可耳

一婦素痰火或痰壅喘急六脈雀啄此兼痧症尚有救刺出惡血用散痧消毒豁痰順氣藥并

用四十五號兼象方治

曰弱症兼痧先患羸弱或吐血或乾嗽而

後惟大補氣血愈

顫唇口鮮紅或骨蒸熱一感時氣或觸穢必兼痧症或瘧對或咽喉如哽或心腹脹悶煩躁發熱較之平時不足益加沉重宜先治痧令痧毒退盡方治本症。宜十號節象曰內傷兼痧人有內傷詎無外感外感不獨風寒卽暑熱時疫傳染穢惡觸犯一侵之亦如外感然內傷本病也外感標病也內傷兼痧宜先治痧次治本病。一老婦奪產爭厥發熱咳嗽吐痰胸中悶悶知是內傷兼痧病移筋二十餘針與十號節象方少變又用四十七號証象方治其內傷下黑糞瘀血諸症除後用曰痧變癆瘵病症有忌飲熱湯者有反喜熱湯者惟喜飲熱痧益難辨慢痧所以漸成癆瘵也原夫痧毒之始入于氣分令人喘嗽吐痰發熱聲啞蓋火毒傷肺肺爲娇藏若不知治變爲百日緊痧輕亦數年難愈卒至危亡入于血分重者因變在節輕者歲月挨延若乃毒瘀胃口必須去毒而

。憇。毒。瘀。肝。經。損。壞。內。漬。吐。血。數。發。勢。極。凶。危。毒。瘀。心。包。絡。更。加。凶。
險。不。待。時。日。毒。瘀。腎。經。腰。脊。疼。痛。嗽。痰。咯。血。日。甚。難。治。凡。病。毒。遺。
患。總。成。癆。療。治。須。識。之。于。始。莫。咎。厥。終。
一人癥脹不服藥但放痧
發熱不食日瘦右關甚繁餘皆散此內有瘀血必吐出方解用桔
仁蘇木澤蘭白藜藜香附烏藥酒煎服吐出紫黑血碗許更用活
血引下藥加
釐便酒服愈
曰。癥變吐血衄血便紅痧毒冲心則昏迷冲肺則氣
喘痰壅甚則糞衄入肝則胸膈疼痛不能轉側甚則血湧吐出流
于大腸則大便血流于小腸膀胱則小便血治宜先清痧毒順其
所出之路則氣自順而血自止矣。
一人故瘡不敗藥變筋骨疼痛
十日後吐血甚多寒溼不愈脈芤
瘡氣已退尚存瘀血用三十六號疎瘀方一丸兒瘡頭大便
血令放痧用四十八號同人方一女瘡滿滿血於母不愈日日
十九號坤象方加益母草金銀花牛膝達喬人瘡脹鼻衄是痧氣由血而致也用六味剝象方
粒不過紅點而已至有渾身成片斑爛發熱頭暈者宜五號其有
曰。癥變發斑痧

疹變發黃者邪熱攻乎脾胃而土之木色見于外也脾胃雖屬土又有濕熱之分蓋脾陰臟屬己土主燥觀其納甲于離宮可見胃陽腑屬戊土主濕觀其納甲于坎宮可知一濕一燥濕熱熏蒸如晝廻之狀故發黃也其方治載銅痧條曰犯痧小便不通痧毒結膀胱令便溺不利小腹脹痛難忍宜四十四號水濟方并瀉寒清下丸曰眼目怪症瘡者火毒也若犯瘡症適與心主之火相合痧毒逆冲須防攻心之患今少陰心君不受邪逆犯厥陰肝母故兩目紅腫如桃甚則眼珠突出然他症患目惟在于目若因瘡爲患必心中煩悶而目疾因之不早治則瘡毒已參陽位其火炎極輕則壞目重則預命治宜先刺顛頂百會穴以洩毒氣用清火活血順氣藥加牛膝石斛引火歸原良法也若心中煩悶頭眩兩目紅腫大痛眼珠

桂出。左目尤甚。至晚卽昏沉眩暈。宜五十號復象方加蜜便服眼珠始收。若兩目通紅。甚至起障生翳。此瘀之餘毒在肝。宜五十一號臨象方加燈。移後牙痛。此瘀毒入于胃也。宜五十二號素象方神效曰瘀後胸膈痛。瘀毒雖退。尚留瘀血在胸膈間。是積血作痛也。宜失笑散。曰婦女倒經。瘀經行之際。適遇瘀發。經阻逆行。或鼻血。或吐紅。肚腹腫脹。卧床不能轉側。肚腹不痛。亦爲暗瘀。若瘀毒攻壞臟腑者。不治急放瘀。宜五十號大壯方曰胎前產後瘀。孕婦犯瘀。最易傷胎。產後犯瘀。須防惡阻較之平人更甚。當急救養。暗瘀陵發。則胎前瘀脈。固于有孕。產後瘀脈雜于惡阻。又無心腹痛可據。須當究其症候。察其聲色。看有瘀筋急。宜刺破肌膚。瘀壅培刮兼施。至若瘀毒橫行。肆攻臟腑。莫可挽回矣。曰胎前病痛。毒氣攻冲絞動。殞命傷胎。豈爲細故。至如安胎

用白朮當歸茯苓之類。痧所大忌，以痧服所宜，惟是破氣破血之味。又胎孕所忌，斟酌其間，活血解毒用金銀花，益母丹，參紅花，寄生，消瘀而不傷胎元。順氣用香附，陳皮，厚朴，砂仁，烏藥，行氣而不傷胎氣，散痧用防風，荆芥，細辛，透竅而不動胎孕。消食積用山楂，葡萄，穀芽，麥芽，寬中而不伐胎性，採擇子中最爲穩當。然此等藥勢盛難于速效，權用一二味，尅藥恐干胎氣有妨，不可不慎。宜五號決曰：產後痧痛，產後用藥必須溫緩。痧症用藥惟重清涼，既屬象方，方曰：產後痧痛，產後用藥必須溫緩。痧症用藥惟重清涼，既屬相反而處治之方，毋執產後一于溫緩亦毋執痧症一于清涼也。今統製一方爲臨症之法：散痧用獨活，細辛，破血用桃仁，紅花，順氣用香附，烏藥，陳皮，解毒用金銀花，紫花地丁，消食用山楂，葡萄，神曲，麥芽。如產後常用薑炭，肉桂以溫血，是痧症所忌，痧症必用。

荆芥防風以散痧。連翹薄荷以清熱。又產後所不宜也。况痧症服極尤貴。大黃枳實。枳榔以通積滯。而產後更不可用。蓋痧而用溫。脹者益脹。產而用涼。瘡者益瘡。惟取微溫之氣。則兩不相妨。更加童便以清熱消瘡。豈非良法乎。

一產婦三日腹脹絞痛惡露不通血。用二十二號履象方。痧盡惡露行。一婦產八日惡露太多忽寒熱。胃中服悶。脈洪大無倫。今惡露去盡。此脈不宜放紅紫痧筋三條。慎不洪大。又刺臂指十餘針。用五十五號需象方。四帖。病痊。

一婦產六日。身痛寒熱如暈昏。悶脈欲止。指甲黑乃兼口小兒瘡症也。刺指七針。舌底一針。稍緩。用五十六號比象方。愈。口小兒夾驚。炒小兒。一時痰涎壅盛。氣急不語。眼目上翻。手足發搐。肚腹脹滿。誤作驚治不效。看有痧筋速爲出血。額現痧粒急爲火焮。先令痧退。然後治驚。

宜四十五號蒙象方。痘前痧痘本先天。因時而發必由外感。如痧亦時疫之氣所感。作脹作痛而胎元之毒因之俱發。凡

痘未見點之前。痘脹必心胸煩悶。痰涎壅塞。甚至昏迷不省。此其候也。小兒滑疾之脈類于痧症。厥厥動搖之脈。雖若疑似難明。然有痧筋可辨。單用藥清之。痧自退。痘自起矣。若逗點既形觸穢。痘隱者。痘科自悉。不載。一兒痘初發犯痧。腮脣有痧筋二條。余曰兩形也。口熱如盪紅紫之色。熱之盛也。但是痰喘氣急。腮脣痧筋必痘。因痧脹而發治宜先透痧。或兼發痘。用五十七號兒象方。一帖稍冷服。痘乃發。十二朝而痘。曰痘後痘脹。痘後中氣多虛。有感必傷。一遇暑熱。及觸惡。卽成痘脹。往往忽然生變。人多誤爲惡痘所致。竟不知痧之爲害有如此也。宜二十六號豫象方。合二十八號恒象方。曰痘前痘後痘論。凡痘前後。見有痧筋。正可辨其爲痧。用藥治之。切忌針刺。非不可針也。痘變不常。若一差池。爲害不淺。故切忌不可用針也。曰瘡症兼痧瘡。痛者心火血熱所致。故火盛而膿腫作痛。然膿瘡雖痛。必漸漸而

來非若兼痧之驗故凡瘡瘍兼痧其腫痛必多可畏處况瘡脈多洪數兼痧脈固不同筋色又可辨驗不容混也急刺指頭及頭頂

宜五十八號萃象方

曰痧變腫毒

痧毒不盡留滯肌肉腠理間卽

成腫毒急先放痧用解毒散痧藥以除其根然後審毒所發照二經絡癰膿分陰陽寒熱處治輕則消重則拓虛則補寔則瀉若

紅腫甚者屬陽

宜五十九號萃象方

白色平腫不起發者屬陰

宜六十號臺成象方

又有半陰半陽者

宜五十八號萃象方

凡毒穿破後護之

宜貼太乙膏

若腫毒無膿止有毒水流出或膿少血多須拔去毒水膿血

宜飛龍奪命丹研碎些些填太乙膏

中醫書中

水有毒口難收者收之

宜捲紅玉散一貼頭裏色惡熱飲水

瘀變惡毒用冷圓藥而成此痘也令去圓藥放痧訖俟痧氣絕

六十號臺成象方

溫托之外敷如前法另有六十一號臺象方

丸散

曰痘後調理痘退之後痧氣已絕氣血虛弱者急補之

宜六十二號臺象方

若屢患痧症者，待痧氣既清，調理之，
十六變痧也。列正變之名目，攷正變之症狀備，正變之方法治痧焉。
瘦哉，痧焉瘦哉！以是知養吾之書，寃能發前人所未發，足爲軒岐
之功臣也。余能不祖其說而述之哉。

脈法 王養吾曰：痧症脈多微緩細濶，有時弦數，縱浮大亦虛
而無力，疾徐不倫。或六脈俱伏，伏亦無妨。鰲按又有或左或右
一部兩部伏者一手伏者有一部兩部瘡氣一退，脈即漸還。假如頭疼肚熱，脈應洪寔而反微遲
者，瘡也。如厥冷不語，脈應沈細而反滑數者，瘡也。大抵瘡脈與
他脈有異，脈症不符，便舍症而從脈。凡診瘡無過此兩言，盡矣。
且瘡之毒氣冲激于經絡血肉之分，或脈多洪數，或沈緊，或大
而無倫，或洪寔有力。若脈症稍有不合，便審瘡筋有無，有則俟

刮放後再診脈之來復如何以斷病之寒熱虛實從治無則憑脈斷其寒熱虛實用藥如傷寒雜病自有本脈若一兼痧其脈必變病必因暴然兼痧之脈自可細攷而知也傷食之痧脈多繁寒傷血之痧脈多芤滑傷暑之痧脈多洪滑而數疾傷風之痧脈多沈微觸穢之痧脈多變異不常傷氣之痧脈多沈伏或形如雀啄傷寒濕之痧脈多沈細耳或有搏脈一似陰症者尤不可不辨蓋痧毒之氣阻抑於經絡血肉間故多沈伏卽有別病兼痧者亦然如傷寒脈沈遲無力是真中三陰經之脈也治用無藥固無疑矣惟傷寒兼痧痧脈與陰症相似莫辨一服溫補熱藥痧毒變幻悔無及矣凡臨傷寒症見有沈微或伏之脈一似在中三陰經其外觀症候稍有不合者便取汗第脉之有

則爲瘻無則爲陰症施治或涼或熱萬不失一旦刮放服藥之後血肉經絡之分通而無阻卽按其脈便不復如前之沈微或伏矣然後按脈辨症治其傷寒未有不效者至如雜病兼瘻有沈微或伏之脈亦以此法驗之誠爲至當不易是故凡瘻察脈可決死生脈微細者生寔大急數者重脈洪大無倫者凶一部無脈者輕一手無脈者重兩手無脈者死六脈無根放血服藥不應者不治諸怪脈現放血服藥不痛者死也總之治病欲辨明虛寔寒熱之法斟酌輕重緩急之宜惟脈是恃若諸脈伏不可推測醫者將何以斷驗乎故必求他症以辨之方有治法耳當諸痛脈伏者推驗筋之青紫識其爲瘻卽諸病不痛而脈伏者亦必推驗筋之青紫識其爲瘻蓋因瘻毒氣壅血瘀于經絡

間故爾脈伏。若刺放血流氣亦泄。毒無壅阻而脈乃復。其常至于重痧傷在三陰。針刺有所不到。血流有所不盡。惟從食積血瘀所阻之毒以治之。脈且隨藥而復。乃知痧症脈伏。反爲平常事耳。

痧脹原由症治。陶節菴曰。濕霍亂死者少。乾霍亂死者多。以上不得吐。下不得利。上下不通。腹痛甚而頭疼發熱。此爲乾霍亂也。犯此死者多。因其所傷之邪不得出。壅塞正氣。陰陽隔絕也。宜先用吐法。再服藥。繆仲淳曰。絞腸痧屬胃氣虛猝中天地邪惡穢污之氣鬱于胸腹間。上不吐。下不瀉。以致腸胃絞痛異常。胸腹驟脹。遍體紫黑。頭頂心必有紅髮急尋。出拔去之急。以三棱銳針刺委中。擠出熱血。可立蘇。次用新汲涼水入盞。兩

許志飲得吐瀉卽止。委中穴在兩膝下灣橫紋中間兩筋之中刺入一分。王養吾曰：痛而絞動者，痧毒阻于食積之氣分也。痛而不移者，痧毒壅于血分而有瘀也。發于頭而上部者，痧之毒氣上壅也。纏于手足下部者，痧之毒血下注也。上吐下瀉者，痧氣上下冲激也。煩悶氣脹者，痧氣壅塞于心肺也。惡寒發熱者，痧氣遏抑于肌表也。胸膈偏痛者，痧之毒氣流滯于經絡也。結滯腸胃者，食積瘀血爲腫爲脹也。吐血便血者，痧血泛溢而潰敗也。咳嗽喘急者，痧毒壅于氣分而生痰逆也。立時悶死者，痧之毒血攻心也。手足軟而不能運者，痧入于血分，毒注下部也。腰脇俱痛者，毒阻于血分而有瘀也。半身偏病者，毒阻于半身而血瘀也。身重不能轉側者，痧之毒血壅瘀不能轉運也。變

成癰毒潰爛者。毒血凝滯敗壞肌表也。以上宜分表裏又曰。癰癥之發未有起于寒者。然亦有時爲寒非真寒也。蓋因世人知癰之熱而服大寒之劑以致此。夫犯癰症必其無食積血阻于中者。方可服寒飲而得效。若一有食積血阻而飲大寒則食不消血不散。積不行。痧毒反冰伏凝阻。未有得寧者。嘗見高岩窮谷中行旅感受暑氣渴飲澗水而卽死者。是名寒痧。蓋緣痧毒攻心。假寒飲太過。痧毒反凝結于心胸。多致不救也。若爲放痧。毒血一同行。便無阻滯得有其命。故方書有服陰陽水者。不獨取井水。以此故耳。是以久服涼飲之後。痧有未痊者。又當以微溫之藥施之。畧用三香溫和之劑。誠爲權宜之術。若用桂附乾薑吳萸參芪之屬。則又誤矣。又曰。治痧當辨身涼身熱。身涼而內熱者。宜

攻其裡。表熱者。宜透其肌。用藥隨時活變。故不立主方。

以上言宜分乘

熱。又曰。痧症危極。昏迷不醒。卽扶不起。呼不應。雖欲刮放而不得。卽當用藥救之。以期必效。然痧症用藥。必須帶冷。雖未能卽

周于肌膚血肉間。其昏迷不省。乃痧之熱毒冲于心胸。心卽不能自主。而昏迷若藥帶冷入口。先從胸膈間順流而下。則熱毒之氣在心膈間者。隨藥而消。故昏者復明。迷者復省。卽有不省

者。乃食痰血積所阻。若能攻而下之。未有不省者矣。

以上用藥法

又

曰。痧脹有一等凶症。心胸高起如饅頭者。不治雖曾以升氣方治活一婦人。胸前高突如拳大。堅如鐵石者。亦偶也。背心一點痛者。凶。角弓反張者死。腰腎一片痛者死。心胸左右有一點痛者不治。脇肋痛四肢腫痛者難治。鼻如烟煤者死。舌卷卵縮者

死。環口黧黑者死。頭汗如珠。喘而不休者死。昏迷不省。放痧不
止。服藥不應者死。痧塊大痛。服藥不應者死。此皆寢熱爲害。固
然耳。以上難治症又曰。什景傷寒論中。不及瘟疫。何況後世所云。痧
張乎。夫傷寒原爲傳經熱症。蓋因六氣陰陽同異。不齊風熱火
統乎陽。寒燥濕統乎陰。大抵六氣由表及裡。故云外感。乃肝脾
胃腎與膀胱傳變。皆遇而病自解矣。至于痧有由內而出者。有
自外而入者。有無端而起者。或發于臟。何臟受之。或發于腑。何
腑受之。或犯兼症。或犯變症。但止于一經而不傳。原不拘拘經
之手足也。故內受邪。則爲絞列。爲脹急。爲悶亂。外顯于症。則爲
癰疹。爲斑黃。爲吐瀉。誠中形外。自然之理耳。又曰。河間云。諸熱
瞀。瘞。暴瘡。冒昧躁擾。狂越。置燭驚駭。附腫疼。癰癧。氣逆冲上。噤慄。

如喪神守。嘔嘔瘡瘍。喉痺耳鳴。及聲嘔湧溢食不下。目昧不明。
暴注卒瀉。瞤瘛。暴病暴死。皆屬於火。已上諸症。今時痧暯十居
八九。至如暴病暴死。河間但指中風痰暯。由今觀之。暴病暴死。
者。於痧暯最爲酷肖。想古時不立痧暯之名。未經說破故耳。則
知暯之屬火明甚。然火有君相之別。手少陰經君火也。右賢命
門爲手心主。乃手厥陰包絡之臟經。言心之原出于太陵。凡刺
太陵次者。所以瀉手心主相火之原耳。又有手少陽三焦合爲
表裡。神脈同出現于右尺一經。代君行令。故相火之爲病居多。
皆因火性最烈。其氣上炎。以致三焦阻塞。六脈全乘。昏冒口不
能言。痰喘聲如曳錐。然相火作病。猶有可回。若犯少陰心君。確
具死症。則殞在須臾。莫謂醫工藝術之疎耳。又曰。事心師古。何

况于醫。丹溪治雜病。以氣血痰三者爲先。蓋三者成疾。人身最多。能詳審于三法之間。便可指下奏功。至于痧脈。又何能離此三者乎。痧有氣塞者。爲喘息。爲脹滿。爲嘔嘯。爲頭目脹。其病陣緊脈必洪數。屬陽有氣閉者。爲昏冒不語。爲口噤目翻。不省人事。上下厥冷。雖痛口不能言。脈必沈伏。屬陰痧。有血熱者。爲煩躁。爲紫斑。爲頭目赤。爲衄。爲口吐紅沫。脈必蹇大。屬陽有血阻者。腰脇痛攻心痛。手足青紫。脈必緊而牢乍大乍小。屬陰痧。有痰壅者。喉中瀝瀝有聲。吐咯不出。嘔吐酸水清涎。脈必弦滑。屬陽有瘀厥者。卒倒僵仆。手足厥冷。肌膚芒刺。遍身青筋。坐卧不能轉側。脈必微細。似有似無。屬陰。凡氣血痰之爲害于痧。有如此者。不得謂陽痧則生。陰痧則死也。即使陰痧。又不比傷寒直。

中陰經並可用薑桂參芪也。痧服有脈伏三日亦得救活者四
肢厥冷。刺血投劑後卽時溫活者目閉牙噤刺血投劑後卽時
睜眼認人而苦其所苦者醫工能識其竅則危者立安失其機
雖得生全者亦死矣可不深爲究心以救人生命乎。以上參集諸家名論

又曰：凡犯痧症仰卧將大公鵪一隻放肚上鵪卽伏好疼止卽
跳下而愈此法試過亦驗又法凡痧症屬肝經者多肝附于背
第七骨節間若犯痧先循其七節骨縫中將大指甲重指入候
內骨節响方止以鹽塗之如不响必將鹽重擦必使透入方能
止疼以上取之清法又曰治霍亂腹痛之甚以新汲水百沸湯各半合
欽之甚效蓋上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調
和升降周流則臟腑暢遂一失其道二氣滯亂濁陰不降清陽
和升降周流則臟腑暢遂

不升故發爲嘔吐霍亂之病。飲此湯卽定者分理陰陽。使得其平也。此卽無病。凡夏月早起或卧間用一盞亦能清暑調中消食。以上論陰陽之利益 凡痧症飲湯藥云稍冷者九分冷一分溫也。云微冷者八分冷二分溫也。云微溫者冷者四分之三溫者四分之一也。云冷服者十分生冷也。云溫者四五分溫也。以上陽藥規則 又曰。痛時則不欲飲食。病後亦有不喜食者。有食而作脹復痛者。或疑傷寒而敵壞者。其間飲食最要斟酌。宜忌不可不慎也。夫發痧忌熱湯熱酒粥湯米食諸物。若飲熱湯酒輕必變重。乃至危。吃米物恐結成痧塊。日久發生他疾。難于救治。如有食消瘦。立能變重。必忍耐一二日。乃以萬全之法。愈後。

再不復發以無暈脣故也今後凡遇痧病得愈者當知所戒即無屢發之患如傷寒不飲食至一候兩三候不妨者以邪氣在口也痧服十日五日不飲食亦不妨者以痧氣滿塞胸膈也惟俟痧氣盡然後與之生薑痧症大忌切不可泡湯服或作藥引犯之必死今將宜忌食物開列醫家病家各遵毋忽食忌生薑聚圓眼川椒胡椒辣醬烟茶酒滌湯索粉醋麵筋豬肉羊內鵝魚慈蒜芥菜瓜茄菱橘米食糖食桃梅李杏一切甜物食宜黑沙糖芋艿食鹽荸薺百合藕西瓜燈心湯山楂湯茱萸子湯蘆根湯陳香綠湯陰陽水然卽所宜亦必待痛止後知餓方可吃清水飯湯如米粥米糊亦宜少用且須冷吃不然則復發

物忌宜

以上食

治癰腫忌宜諸藥

忌藥切勿犯

人參
甘草

白朮
茯苓

山藥
附子

黃芪
半夏

熟地
乾薑

白芍
桔梗

升麻
五味

肉桂
木瓜

竹瀝
蕤仁

吳萸
巴戟

杞子
柏子仁

桔梗
故帝

宜藥須酌用

陳皮
砂仁

枳壳
枳實

夏蔻香
防風芥

獨活
荆芥

柴胡
前胡

葛根
厚朴

荳蔻
沙子

杏仁
乳香

阿魏
角

桑皮
花旗冬

秦艽
牛膝

澤蘭
甘菊

凡須防治吐症用半夏
治穢濁倘腸胃中有食積瘀血

切不可用薑香惟取其正氣以
作吐半夏性燥

獨瘻症作吐半夏性燥

巴戟有閉

巴戟有閉

巴戟有閉

此以上止吐反有閉矣

此以上止吐反有閉矣

此以上止吐反有閉矣

此以上止吐反有閉矣

此以上止吐反有閉矣

此以上止吐反有閉矣

石膏

龜甲

薑母

童便

梅花

板藍根

小青草

卽血見愁

紅蓼子

紫荆皮

大麻

白芥子

劉寄如

益母草

地骨皮

草山甲

瘡症寒熱

不由外感其毒從鼻吸而入搏擊肌

表裏活麻黃俱在所禁如荆芥細辛善能透表

散惡寒之氣由表而入故用以治瘡亦由表而

湧若防風乃巨使之品取爲透表之佐不比麻

黃羌活專主發表反

有升發火毒之慮也

羌活

藿香

檀香

當歸

黃連

元參

川芎

沉香

丁香

生地

黃芩

花粉

凡忌宜相半之藥如必不得已而欲用之輕者

止可用半分至三分重者亦只可四五分至錢

許

治瘡脹方六十四

一號乾象方

防風

細辛

陳皮

枳壳

旋覆花

荆芥

穗各等分水煎稍冷服

頭面腫加薄荷甘菊

口渴加天花粉

手足腫加威靈仙牛膝金銀花

腹脹加大腹皮厚朴

吐不止加童便

內熱加連翹知母

血滯加茜草丹皮

瘡多加貝母瓜蒌霜

小腹脹痛加青皮

寒熱加柴胡獨活

赤白痢加枳榔

食積腹痛加山楂菔子

喉腫加射干山豆根

心痛加莪术延胡索

驚穀加藿香薄荷

瘀血崩漏加紅花蘇木

以上加

放痧不出加蘇木桃仁倍細辛荆芥

以上加

減法大同小異餘可類推後不具載

此方治感風成痧之劑

歌曰乾象風瘡腹痛頻嗽煩身熱汗頭疼荆防

細壳陳旋獨時氣相干一服寧

香薷薄荷蓮蒿各一錢

金銀花紫厚

二號瘡象方

此方治傷暑成痧之劑

歌曰暑痧瘡象止頭眩自汗如傾吐瀉兼荷

澤膏通車輶朴香薷瓜豆是更須此首歌內有

加味

三號瘡象方

香薷紫蘇厚朴山楂枳壳葛子

等分水煎冷服汗多者本方

去紫蘇

此方治暑熱成痧之劑

四號否象方

歌曰：暑服難當，逐象名香。
查朴壳陳青更加，腹子蘇清意竹葉石膏湯亦靈。
連喬山楂元胡各一錢，薄荷葉七分，枳壳此方治陰症之劑。腹痛而手足冷者是也。

五號觀象方

防風皮青皮各八分，水煎稍冷服。
荆芥各一錢，川芎三分，連喬陳食不消加山楂子，有積加枳榔。
心煩熱去川芎加山楂子，痰多加貝母白芥子。
氣壅加烏藥香附子，血壅加桃仁紅花。
暑熱加香茹厚朴，食積加三棱莪术。
便祕加大黃枳實，小便祕加木通澤瀉。
喉瘡加薄荷射干牛蒡子去川芎。

此方治陽痧之劑。腹痛而手足煖者是也。
歌曰：觀象陽痧于足溫，多因氣鬱，痛相爭。荆防陳細根，香櫞燒熱梔子青。
地骨皮薄荷山梔丹皮，天花粉元。

六號刺象方

參細辛各等分，水煎稍冷服。

七號晉象方

此方耑退痧熱之劑
歌曰：斑痧剝象是良方。嘔吐頭眩發紫斑地。
皮薄荷便身涼。
元胡索 蘇木 五靈脂 天仙子各一兩
表木 廣皮 三棱 枳壳 厚朴 桔梗
黃各七錢 烏藥五錢 檀香各三錢
阿魏二錢 香附四錢 蕃子一兩

水泛丸每十五丸砂仁湯下。
此方耑治食積壅阻痧毒瘀癥，病難忍，頭面黑色。
手足俱腫，胸腹服間等症。
歌曰：烏痧惡症，痛難當。晉象丸方果是強蘇。
木元胡陳附朴，蓬棱阿魏蘆根，枳榔靈脂烏藥天。
仙子枳殼薑黃沉降，再水泛爲丸，如葉豆砂仁。
湯送月圓雙月圓。

雙者每服十五丸也。

八號大有方

沈香 檀榔各五錢 萍子 枳壳 厚朴各七錢
烏藥各四錢 天仙子 廣皮各六錢
蔻仁 山稜 蓬木 木香三錢 薑黃五錢
水泛丸每三十丸砂仁湯稍冷服。
歌曰：暈痧大有救，昏迷厚朴天仙萬廣皮白。
此方耑治痧氣急，胸腹脹痛，迷悶昏沉。

菟蕪黃板枳橘蓬陵烏藥

木香齊

丸服法同前

九號坎象方

烏藥

各五錢 蓬木

黃各七分

青皮

天仙子

靈脂

廣皮各一兩

沉香各二錢

枳壳大錢

蔻仁一錢

錢

製法取法同八號

木香

沉香各二錢

阿魏一錢

此方

治瘍症氣壅血阻昏迷不省傷身沉重不能轉側

歌曰

坎象同萌氣阻壅青陳烏藥塞後蓬仙臺白蔻兼阿魏更有蘆黃沉木功

鬱金二錢

細辛一兩

降香三錢

荆芥五錢

每木三匙

追清茶冷服

此方

通帝瘍症之仙劑

歌目

紋膿瘍瘍病非常節象仙方效最良鬱

細辛

荆芥穗三匙細末和茶漿

以上七方俱屬此條

十一號

屯象方

三稜

蓬木

白芥子

延胡索

苟子各一錢

蜜

松壳

青皮

烏藥各八分

紅花七分

歌曰

屯象祛瘍氣內攻

蓬稜白芥枳延紅葛

青鳥藥

同香附任是

蘊腸一劑通

十號香五錢

牛膝二兩

大紅鳳仙花

紅桃花各七錢

白芨蓼一兩

爲末砂糖

調童便冲服

此方耑治痧毒中腎之劑

歌曰 既濟方除中腎麻

桺牛桃葉鳳仙花

紅花共末同調和童便冲水效可誇

三號革象方

鬱金沉香各二錢

木香各一錢

烏藥三錢

桺

歌曰 治痧氣寒凝之劑

此方治痧氣寒凝之劑

來爲末三錢服定

使陰寒見太陽

十號豐象方

三棱蓬朮枳實各一錢

水煎服

此方尙治痧症因于食積者

歌曰 豐象多緣食積因青烏芍朮與蓬朮查

板神曲能消食水

此方當治痧症心渴冷下

五號明夷方

大黃枳實厚朴桃仁

等分水泛丸每服一錢重者二錢再

火麻仁三分水煎成取八分

此方當治痧症大便乾結氣血不通煩悶壅盛

音流者

歌曰明夷乾結便難通頸門脊沉氣血壅萎

蹇將軍辛厚朴二仁木瀉滌消融

此首歌內無青皮有瓜蔞

十號師象方

三稜 蓬术 厚朴 山楂 枳實 茄子
連翹 青皮 陳皮 紅辛 等分水煎冷服

此方治癆症氣食壅盛者

歌曰師象連前有七方絞腸瘻內療多般清

陳楂朴蓬枝壅蕷

七號艮象方

五靈脂 薤子 山楂 神曲 青皮各一兩
蓬术 厚朴各八錢 三稜 檀榔各七錢

蔻仁 鳥藥 芫黃各五錢 沉香 木香各

三錢 阿魏二錢 丁香一錢 水泛丸每一

錢 柴荆皮湯下

此方專治瘻症良積成塊痛而不已推上移下

日久叶筋脈抽掣之症

歌曰艮象抽筋手足疼青筋脹起筋粗痕三

香查葛神靈著鳥藥蓬稜朴塞青阿魏姜黃枳

治塊丸吞十粒紫荆皮 三香沉木丁也

木香 檀香 沉香 等分爲末每服五分砂

八號黃象方

此方耑治過飲冷水海不愈者
歌曰 賀象皆由飲冷過三番未服暗瘻多皆
因暑熱寒冰受凝
結于中毒阻何

九號大畜方

白蒺藜二兩 漚蘭 姜黃 茄子 山楂
茜草 土貝母各一兩 元胡索 五靈脂各
兩五錢 桃仁七錢 金銀花八錢 烏藥
青皮各六錢 桃仁一兩二錢 每末一錢溫
酒下

此方專治食積瘀血痞毒凝滯成塊日久不愈
之症

歌曰 大畜能消積食瘀毒凝成塊久難除
澤蘭白蒺藜茜草青皮烏藥俱查內銀花土貝
母桃仁各一兩 胡索五靈脂

十二號損象方

沒藥三錢 紅花四錢 白蒺藜 元胡索
桃仁各一兩 檉香三錢 每末一錢酒下
此方治血鬱不散之症 晴瘀難識爲病尤
多故立實損大畜三方

歌曰 損象血鬱不能散紅花沒藥桃仁檉元
胡白蒺藜酒水調已上三方症屬晴
又歌曰 角弓筋脈僵硬瘻瘍昏迷不醒時發
厥中字分辨治放步去血復何疑

二十

一號 暈象方

枳壳 薑子各一兩
葛根二錢

烏藥

連

葛根各八分
共爲末茶清稍冷服

葛根

烏藥

連

二十
二號 腹象方

刺蒺藜 獭活

桃仁

蒲黃

紅花

元胡

烏藥各一錢
枳壳七分

香附三分

香附

元胡

元胡

水煎微溫服之

此方專治瘀症因于血鬱者

歌曰 腹象專攻血鬱症

桃仁獨活壳蒲黃元

香附四分

枳壳

元胡

二十
三號 中孚方

紅花 青皮

蒲黃各一錢
貝母二分

水煎溫服

香附四分

枳壳

此方治血瘀之症
上落弓宜選用香附

中孚專治血瘀症

血瘀症只附青紅枳壳蒲

已沉發暈一時蘇

二十
四號 漸象方

陳皮 青皮

山楂 厚朴

烏藥 等分水

煎冷服

葛根大黃

痰多加貝母白芥子

頭汗加枳壳大黃

口渴加薄荷花粉

血瘀加香附桃仁延胡索
此方專治痧症因氣阻者

歌曰
象青陳查紫朴延胡香附可回生
又歌曰
痰涎壅盛撲鷺病莫認喉鳴藥用差
解方來救治外吹內服妙堪誇

二十
五號震象方

天竺黃 砂硼各二錢 珠砂一分 元明粉
八厘 冰片五厘 共爲細末吹喉中

歌曰
此方耑治痧症咽喉腫痛
研吹入喉中好搜錦之聲一旦寧 瘀脹之害

二十
六號豫象方

劉奇奴 荆芥 紅花 茜草 丹皮
各一錢 烏藥五錢 香附三分 羚藜八分
水煎溫服

此方耑治血滯之症

歌曰
豫象方醫血滯凝青奴茜草蒺藜荆紅
花赤芍丹皮共香附還同烏藥并
牛蒡子蘇梗薄荷甘菊貝母金銀

二十
七號解象方

花連翹 枳壳各一錢 桔梗五分 烏藥四分
水煎微溫加童便服

此方專治痧症咽喉腫痛

二十號恒象方

歌曰
花蕷梗金銀貝烏藥須添鹽卽消
大腹皮黑豆湯泡洗 薑皮 細辛 蒜子
前胡 蓼芽各一錢 山楂二兩先煎湯代水

二十一號升象方

此方治寒氣食積勢中胞閨腹中絞痛
歌曰 遠移爲病有多端恒象方半大腹前細
麥散東先六味山楂漫汁更負熱
蘇木二兩 猪腰散 元胡索 桂仁 紅花
各六錢

鳥藥四錢 三棱 五靈脂七錢 大黃五錢 姜黃
海末 番木 陳皮 青皮 角刺各

三號井象方

此方治瘀每血瘀成塊堅硬突起不移者
歌曰 溝痕跌倒最需奇繫閉牙關事不如丹
象血瘀堅塊延蘇潤活膏靈脂桃紅赤芍二
黃附烏藥青皮角刺宜更有三棱蓬木等共研
細末酒相資 二黃姜黃大黃也

蓬术 紅花 澤蘭 桃仁 烏藥 桔梗
川芎 牛膝 水煎溫服

十號井象方

此方治瘀泡痧之劑

歌曰 柴泡成瘀極多若求井象免愆疴澤

薑芎桔桃烏藥牛

三十號大過方

麻紅花木用莪
連耆各等分
木香磨二分
水煎加砂仁末

此方專治痧症食積氣阻之劑

歌曰 大過方醫蝴蝶皆因氣食痛難當極

陳查藤砂香附薄荷連耆與木香
赤芍 陳皮 桃仁 枳殼 茵陳 黃芩

三十號隨象方

黃三袋 金銀花 山梔 連耆各一錢
水煎微溫服

此方耑治痧症毒結于大腸之劑

歌曰 鈎蟲過體似姜黃隨象除瘀結大腸青

赤芩 蕁桂枳實姜苗梔子大黃審
木香 沉香各五錢 沙子 茄子各八錢

三十號與象方

檀香三錢 五靈脂六錢 水泛丸每服五分
白湯下

此方耑治過服冷水痞滿者

歌曰 痘塊成形痞滿多單求與東莫能過三香

橘子砂仁共再入薰附慈舟搖 三香沉木香
附砂仁共再入薰附慈舟搖 三香沉木香

三十號小畜方

山楂 薏苡仁 大黃 貝母
赤芍 紅花各四錢 桃仁 大黃
青皮 五靈脂各一錢 水煎

微溫脈

此方耑治痧症因于血食者

謂曰 小畜同前因血食燒紅貝附青查赤蘆
脂還共大黃煎氣導血瘀全沒得
二錢 鐮尾 桧壳 赤芍各一錢 山查 旗子各
一錢 厚朴八分 水煎微冷服

三十號家人方

此方耑能消食順氣和血
謂曰 身重消寒解毒先家人氣順食消兼朴
查薑充同歸尾赤

三十號益象方

蘇木 桃仁 紅花各一錢 青皮八分 烏
藥四分 獨活六分 劉寄奴一錢 白蒺藜
一錢 水煎微溫服

此方耑治血結不散之劑
歌曰 益象同前因血結桃仁蘇木并紅花寄
奴白蒺藜青烏獨轉側如常不用嗟

七號无妄方

葛子二錢 楝榔 山查 連翹 赤芍 金
銀花各一錢 防風 烏藥 元胡索 炒枳
壳 桔梗各七分 水煎稍冷服
歌曰 无妄兼寒食血成防延桔壳腹查枳壳
烏赤芍銀花共沉

暑冲心痧發昏

三十號噬噓方

桃仁

蘇木

烏藥

香附

白蒺藜末

獨

八號噬噓方

活澤蘭

山楂

水煎微冷服

此方

耑治痧症

邪陽寒

歌曰

噬噓頭疼發熱攻類傷寒症

最爲凶

桃

蘇烏附澤蘭蒺獨

三十號頤象方

荆芥

花粉

山楂

連翹

紅花

枳壳

柴胡

葛子

熟大黃

二錢

水煎冷服

此方

耑治先因傷食發熱口乾等症

歌曰

頤象方

因傷食先口乾身熱症同前

柴胡葛子熟大黃二錢水煎冷服

亮將軍酒製煎

馬兜鈴

桑皮

桔梗

薄荷

天花

射干

元參

貝母

枳壳

金銀花

甘菊

粉

分水煎溫服

嗽甚加童便沖服

此方

耑治癆似傷風咳嗽

歌曰

噬噓傷風咳嗽癆兒鈴桑桔貝銀花身

干壳粉

同甘菊薄荷克參童便加

此方

耑治痧症

青皮

厚朴

枳壳

柴胡貝母知母

香

枳榔

陳皮

葛根

水煎溫服

此方

耑治痧症

青皮

厚朴

枳壳

柴胡

貝母

知母

此方

耑治痧症

青皮

厚朴

枳壳

柴胡

貝母

知母

離象方

葛根

水煎溫服

此方

耑治痧症

青皮

厚朴

枳壳

葛根

水煎溫服

柴知亮青陳朴板
藿桂除夏月天

四十號旅象方

貝母二錢 姜黃一錢 細辛 紅花各八分
水煎冲砂仁末五分微冷服

荆烏藥同煎後冲服砂仁更是強

四十號鼎象方

牛膝二錢 獨活 枳壳 桃仁 連翹 漢

山楂 姜黃 蒲黃各一錢 水

煎微冷服

此方專散瘀毒引火下行

四十號未濟方

牛膝二錢 金銀花 丹皮 連翹 細辛

元胡索 澤蘭 白芨 蒲黃 木通各一錢

水煎冲童便微溫服

此方治小腸經瘀

歌曰 小腹疼痛伸屈難方推未濟澤蒲黃通
延牛膝 銀花細白芨連翹并用丹
四十號蒙象方 天竺黃 胆星各三錢 雜黃硃砂各五分
麝香 牛膝各三錢 甘草湯泛丸如梧子大

每服三丸白湯下

此方治瘧疾喘急之症

歌曰 蒙象瘧延喘急聲殊淮天竺祖南星屬
香研末牛黃共甘草湯丸收盡根

四十號 漢象方

旋覆花山甲赤芍澤蘭山楂姜黃橘紅元胡索川芎

此方治半身不遂瘧半身不遂瘧來攻漢象丹延澤橘紅角

歌曰 半身不遂瘧來攻漢象丹延澤橘紅角

刺穿山楂赤芍姜

四十號 訟象方

澤蘭延胡索赤芍桃仁陳皮紅花
烏藥獨活丹參水煎溫服

此方治內傷兼瘧
歌曰 訟象兼屬瘧內傷丹烏延赤澤爲蘭陳

桃獨活銀花以不畏煩勞咳嗽疾

此首歌內加金銀花

四十號 同人方

歸身山楂紅花枳壳赤芍川斷
苦皮茜草丹參連翹水煎微溫服

此方養血和中之劑
歌曰 同人吐衄便紅增養血和中此劑平查

羌活共丹參

四十號坤象方

白蒺藜
陳皮

荆芥炭
赤芍

薄荷葉

青皮

九號坤象方

陳皮
等分水煎服

荆芥炭
赤芍

薄荷葉

青皮

歌曰：此方專治癆症氣血阻塞。

歌曰：坤象同前血阻明肝心肺部患非輕莫

芥青皮
又用陳皮

荆芥炭
赤芍

薄荷葉

五號復象方

連翹
牛膝

山梔
金石斛

丹皮
金银花

決明
草决明

水煎冲
木通

荆芥
大黃

木豉草

細茶葉

重便服

此方專治眼目怪症癆

歌曰：眼目奇癆復象方

連翹
甘草

五十號臨象方

羚羊角
赤芍

生地
生甘草

黃連
甘菊

木通
大黃

荆芥
木豉草

羌活
望月沙

水煎服

此方耑治癆毒在肝目生障翳

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

五十一號泰象方

生甘草
水片

兒茶
一分

薄荷葉
牛黃

細茶葉
珠子各五厘

研

此方耑治癆毒在肝目生障翳

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

歌曰：臨象同前用二生連翹

此方專治痧後牙疳

五十號比象方

香附

姜黃

桃仁

蘇木

山柰

丹參

益母

牛膝

艾葉

柴胡

獨活

金銀花

草

水煎消溫服

歌曰

比象同前

蘇木姜查

桃益母柴香

銀

此方當治產行症

五十號兌象方

荆芥

丹參

獨活有龍邪

亦不妨

姜黃也

桔梗

防風連喬

桔梗

枳壳

山楂

紅花牛蒡子

青皮

苟子

歌曰

此方治小兒痘

瘡前瘡後

痘瘡痘瘡

用心專兌象

荆防桔梗看青

喬共劑

自安症

壳牛蒡子

紅花

五十號因象方

羌活

紅花

荆芥

木通

當歸

牛膝

青皮

連喬

蟬退

牛蒡子

此方治瘡後

熱毒流連

不已致成瘡瘍

皮蠅退

紅花合腫

一

旦空

甘菊

荆芥

紅花

甘草

木通

連喬

此方治瘡後

餘毒發爲瘡瘍

毒留

土貝母

金銀花

牛蒡子

紫花地丁

等

胡桃肉一枚

水煎溫服

滌肌肉骨膜間者

歌曰 草象同前 毒發紅金銀土貝菊喬通荆

防甘草地丁紫引
用胡桃肉一宗

六號咸象方

人參

當歸

黃芪

甘草

牛膝 紅花

加胡

桃肉

一個 角刺

白芷

山楂

金銀花

加胡

此方專治

疔後鮮毒消連氣血不能即散者

歌曰 咸象變成惡毒症參芪歸貝草銀紅肉

查角刺

胡桃芷莫使流連氣血攻

六十號蹇象方

乳香

沒藥

貝母

雄黃

花粉 黃連各

一錢

大黃半炒半晒

赤芍各二錢

牛蒡

穿山甲土炒七分

子錢二分

甘草七分

穿山甲土炒七分

每細末五分蜜湯下

此方主治疔後熱毒發燒發疔疼痛不已

歌曰 蹇象這疔不可當川連乳沒貝雄黃將

軍赤芍穿山甲細末

蓬調是蜜湯

六十號謙象方

人參

菝葜

當歸

白朮 白芍 黃芪

陳皮

川芎

熟地

甘草 空心服

此方

疮後調理之劑

歌曰 痘退調和謙象稱芎歸熟地芍參苓陳

皮生甘草
生甘草

六十小過方

金銀花 土貝母 牛蒡子 白扁豆子 山藥
三分 胡桃肉一枚 連肉六枚 水煎空心溫服

此方能退後調理之劑

歌曰 小過同前調理清銀花土貝草歸參蒡

六十小過方

桔梗各一兩 炙川烏 甘草各五錢
乾薑三錢 滚丸頭服一錢白湯溫服

新犯者一二服即愈久犯者十服全愈蓋用甘草以助胃用薑烏以充胃用桔梗以解毒用食鹽以斷宿五味之妙用誠爲千古之良方若病人素本虛寒必加倍多服方能有效此方專治屢患癆症必待全愈然後服之以絕其根若癆氣未除切不可服恐甘者能作脹熱者反能助邪也

歌曰

歸妹常沾要絕根待他全愈斷疾靈華蓋烏草共米飯爲丸湯送溫

治痧服應用古方十七

玉樞丹

山萸茹去皮焙二兩此味不真則藥不效五

信子洗淨焙三兩千金子霜一兩紅芽大
載去蘆培乾一兩半麝香另研和入三錢
右除干金麝香另研三味爲末和入二味研匀
橘米濃湯和木相內杵子乍分爲四十錠宜端
午七夕重九日於淨室焚香修台勿令女人孝人
于鶴犬見其效如神孕婦忌服每用一錠生無
薑汁磨薄荷湯服并華水磨亦可通利兩次無
妨用溫粥消之

此方所治諸病開列于後

一治瘡疽發背未破時用井華水磨塗患處并

一磨服之良久癢痒即消
一治陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語頭暈眼澀
邪毒未發并瘟疫山嵐瘴氣并痧癰
腹疼冷水入薄荷一葉同磨下

一治急中風癇邪喝叫亂走鬼胎鬼氣無灰酒

送下

一治自缢死落水死心頭溫者及驚死鬼迷未
醒宿者並冷水磨灌下

一治蛇犬咬傷冷水磨塗傷處并服尤妙

治新久諸瘡癰發桃枝煎

少許香下

治湯火傷東流水磨塗患處

沙松節無灰酒

煎

治跌損傷敷沸下

大酒上貼

年深日近頭疼太陽痛酒磨塗

上貼大

治諸般瘡疾口渴唇眼掣及夜睡多涎言

服牙關急紫磨塗并服

中風口噤牙關緊急煎服擊擦骨

筋頭腫手足疼痛行立俱覺艱辛風氣疼痛

並用酒磨服

治小兒急慢驚風五種二病蜜水薄荷葉同

服牙關急紫磨塗并服

卒中風口噤牙關緊急煎服擊擦骨

筋頭腫手足疼痛行立俱覺艱辛風氣疼痛

並用酒磨服

治新久諸瘡癰發桃枝煎

藥

川連

各三錢

牛黃

冰片

各二錢

各三錢

青黛

各二錢

共研細末

再將

羊角

犀角

珍珠

四分

硃砂

五分

炒貝母

乳香

沒

土炒

板

大葉

炒光活

土炒

炒

大葉

炒

板

大葉

炒

錢金銀花

紫花地丁甘菊各二兩甘草五

錢金銀花

仙方腦麝丸

黃藥子一錢

白藥子各三錢

花粉二兩

黃連

兩研末篩止用頭末

木香三錢

沉香二

麝香五分

龍腦三分

猪胆汁丸

每丸

重一錢

每丸

此方耑治瘧症發斑發狂渾身赤紫瘡後惡毒

瘻瘍皆能消化

此方專治山嵐瘴癰絳茶瘻酒渴除伏暑退心

神并將藥治之症開列于後

打碎以井華水調服

大熱用五丸或七丸同好茶一撮

鹽梅一個

此方專治山嵐瘴癰絳茶瘻酒渴除伏暑退心

止喉痹目翳及赤白瘻一切火症功效如

神并將藥治之症開列于後

打碎以井華水調服

大熱用五丸或七丸同好茶一撮

鹽梅一個

一治瘧

心熱頭疼用三五丸含化

一治瘧

赤痢用七九茅根汁同搗服

白瘻用七九

一治瘧

同茶葉益物搗服

赤身熱瘻喘氣急不省人事服之

即愈

黃金丸

滑沙五靈脂一兩

元胡索八錢

木香

薑

金異者研
五靈脂
神曲糊丸每三十九或四十丸用自己

口中津

喉下

心

疼

自己

潤下丸

酒製大黃四兩

黑丑頭未炒二兩

牙皂莖

生熟砂仁各

和丸鳳仙子大每服一錢或錢半至二錢燈

心湯服

牙皂莖

此方治大腸燥塞二便秘結痧毒壅盛者

此丸不但潤

煉石丹

千年石卽陳年灰水飛一兩

松根石卽真琥

珀

三錢水骨石卽滑石水飛二錢

水泛爲

水

丸爲衣熟燥燒青紙爲衣

眩暉心悶者殊

殊

每服二錢重頭盧

栗湯下

栗

燒炒枳壳三分

微炒小茴三錢

搘碎篩上

每末二錢溫酒調下如

不能止再

服一錢

此方可補瘀脹筋不遂

兼治當心痛過身骨節牽疼或嘔吐惡心不時

發作者并疝氣勞根等症

失笑散

五靈脂去砂土炒
炒蒲黃等分每末一二錢溫酒調服

此方治男婦癆發症張服此不再發兼治血迷心竅不省人事婦人產後心腹絞痛及腹瘀血作痛者

白虎湯

熟石膏五錢
加竹葉名竹葉石膏湯
甘草一錢
粳米一撮

甘草一錢
粳米

此方治暑熱病大及霍亂一切暑病

熱治溫病身熱白

汗口乾渴來洪大解曰病在陽明肌內則巨陽之表邪已解矣故外不惡寒又無頭痛身疼之症但自汗出而發熱然也經曰熱淫所勝佐以苦甘以知母甘草解熱盛熱則傷氣用粳米甘草之甘以益氣且治不得眠而煩躁也煩者肺也躁者腎也以石膏爲君佐知母之苦以清腎之源因石膏體堅而重堅知母沉寒而走下故用米草之甘以接之使不遽達于下焦也名之曰白虎者以白虎爲母之苦寒又能保太陰肺金之氣故名之曰白虎以爲三陽經一解表藥耳雖是三陽經解表切記有汗當施無汗當戒也若無汗者必須兼采

益元散

葛升麻以解其表邪不可見其身熱設用白朮
以遏其熱而使之內陷也
滑石六兩甘草一兩每末三錢暑月涼水
調服加殊砂名辰砂六一散此方耑清暑熱利小便止渴除煩降火利城之
劑也

大羌活湯

余治小兒身熱咳嗽微帶驚風者用益心湯調
服之屢屢有效

防風

防己

羌活

獨活

蒼朮

白朮

黃芩

黃連

細辛

炙草各一兩

川芎

俱咀片每用一兩半水

知母生地各二兩煎得清藥一大盞熱飲之不解再服此解利兩感神方也若瘧症與此相似亦以此方加減而遂用之
經曰兩感者死不治一曰太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽者膀也自背俞而入腎爲水流濕故腎受之又曰天之邪氣感則害人五臟以是知內外兩感臟腑俱病欲表之則有裏欲下之則有表裏既不能一治故死矣然所稟有虛實所感有淺深虛而感深

治腋香樣丸

者必死寃而感淺者猶或可治治之而不能救
陳澤瀉各二錢去白廣皮醋三錢
香樣四兩去白廣皮
丸每服五六十九米飲下
此方或水或氣或食俱治

加味活命散

土炒陳皮穿山甲金銀花大黃各二錢去白
地歸尾各錢半花粉薄荷赤芍
各一錢白芷乳香甘草節防風貝母

忌醋并諸毒物角刺各五分水煎空心服

此方耑治癰瘍後一切留滯熱毒發爲腫毒發行
疔疽其加法開列于後

毒在背加皂角刺一錢半
毒在面加白芷一倍

毒在頭項手足加金銀花五錢
此方之妙卽非毒後尋常發毒亦可用

祛瘡辟瘍丹

厚朴蒼朮羌活防風陳皮板榔白芷各八分
牛蒡子各一錢

葛香

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

加葱白

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

無汗加蘇葉薄荷

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

身重汗出加防己石膏

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

大便秘結加大黃

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

遍身瘡瘍腫痛加藍葉姜黃

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

肌肉發紅黑紫斑加元參青黛

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

先中暑又中暑加白虎湯香薷

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

咳嗽涕唾頭目昏眩加旋覆花荆芥

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

風溫身體灼熱加黃芩黃連黑山梔

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

加減聖效散

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

厚朴

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

胡索

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

五錢

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

每服各八錢

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

氣不和空心飲之可辟邪疫

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

東坡守杭時設劑

濟疫全活萬人之方也

細辛四分

甘草三分

症相類者用此以治之亦無不效

川芎各五分

細辛四分

甘草三分

卷之二
硫礬丸

疼痛發熱惡寒嘔逆喘咳鼻塞聲重及飲食生冷傷在胃脘肺膈飽滿脇腹脹痛心下痞結手足逆冷陽鳴溲渴水穀不消小水不利等症。

明礬 硫黃各四兩
砂罐內煮一日夜取去豆腐渣仍入砂罐大蒸至乾燥罐盛二藥埋地深三尺三日夜取出禁硫化紫金色再下一層有泥渣不用然後再將茯苓 山藥各三兩同蒸晒露一宿酒炒當歸 酒炒白蒺藜各四兩 烏藥略炒熟半夏三兩 荔枝肉一兩半 去白膜皮炒小茴香各一兩 荘肉九分 晉鹽湯下一錢半
臨臥白湯下一錢
此方爲斷除痧根之神劑 有人病瘧十年或十日半月或一季半年發則痛不可忍叫喊驚人隨卽暈死或用探吐或用醋炭熏鼻并用華陀危病方擗得解醒後用此丸全愈遂得除根此病已入骨髓百無一救今幸而得此且余屢用而多效真神方也

附華陀危病方 吳萸 木瓜 食鹽各五錢同炒焦 用砂罐盛水三杯煮百沸隨病人冷熱任意服之卽甦

又症服隨宜便用救急小方十九

陰陽水涼水滾水各半或井水河水各半

細辛爲末砂仁湯冷調服此治氣阻受寒症

晚蠶沙爲末白湯冷服

羊糞一把滾水泡蓋一時取上面清湯冷極服之

白沙糖攪梅水服黑沙糖亦可

童便連飲數碗

汎漿水路上受暑症用仰天皮水攪澄清飲之

菜豆湯稍溫服做菜豆粉泔水亦可

麻油一盞灌下牙關緊抉口灌之

蘆根湯微溫服

菜油二兩麝香一錢昏迷不省欲死者灌下立甦

蘿蔔菜作湯飲

伏龍肝泡水飲

生豆腐漿服碗許

絲瓜葉搗汁飲之亦可治霍亂

生黃豆細嚼不豆腥氣可用辨試是否痧症

芋艿連皮毛生嚼是痧便不麻口可用辨試

燒鹽湯待冷不拘多少灌下探吐以下二方乃吐新食阻隔
痧毒之法必多飲方吐

明礬研末陰陽水調服二錢亦可探吐多則用至三錢

以上六十四方古方十七小方十九皆錄養吾原本