


秘傳眼科全書

秘傳眼科全書卷之五

硬臉睛外障



硬臉硬睛者，胞臉騎沫俱木痛，遊難開。肝膈間積熱，肝臟風壅氣血凝滯，睛臉堅硬，血旺氣虛肥膩之人，或飲酒大腸堅積多受是症。先患一眼，後乃相牽，俱損漸生翳膜，治法初發者宜用摩風膏，摩去風邪散，運血氣，或煎生地黃當歸，鬚赤芍川芎防風白芷羌活薰洗一日，三度宜。隔肝膈之熱，熱以時藥，若積年久腫，有瘀血宜剝洗，黑曉有翳膜可。

吹可點，但此眼初患者，多久患者，少宜服。渴肝散當

歸活血陽洗肝散

渴肝散 方載前禾行赤眼外障條

當歸活血陽 方載前被物撞破外障條

洗肝散

當歸

川芎

梔子

防風

羌活

薄荷

甘艸


大黃

滑石

眼有血流加朴硝，胞腫加桑白皮。

右為細末，每服一錢，溫陽泡下。

向隔鱗外障



向隔魚鱗者肝肺二經積熱充壅攻上致黑睛遂生向翳如魚鱗鋪砌之狀或如棗花中有向隔發歇不時或發或聚疼痛自出然婦人多生此疾何也苦樂不由已出七情鬱結不舒毒壅於肝肝者血之室也婦人以血為主血傷則肝風黑仁風輪多生是翳甚至向隔衝入黃仁引血相提漸成大患額腦兼痛用摩頂膏摩擦封貼於額項痛處用陰二陽四丹吹點或用青鹽黃泥固濟包煨

熟研末以鴨領蘸點于魚鱗中，每日一次，亦能除此翳，宜服知母飲酒，調散摩頂膏。

知母飲

知母

茺蔚子

防風

赤芍

青葙子

黃芩

大黃酒煎過

桔梗

桑白

茺蔚

細辛

或加朴硝

右水煎半錢，溫服。

酒調散

當歸

川芎

赤芍

黃芩

桔子

木通

防風

龍膽草

大黃

研爲細末，老酒調下。

摩頂膏

子鵝脂

牛脂

木香各一兩

鹽花一兩

硫砂錢 龍膽分

右以四味為末，用鵝牛脂熬，入前藥末，熬成膏。若敷入黃蠅多少，要用手蘸，摩擦頭頸諸痛處，或用紙貼痛處亦可。

水蝦翳外障



水蝦翳者，黑睛上翳如水蝦形狀，因而名曰水蝦也。大抵與白陷魚鱗同症，亦因肺經有熱，肝經受風，致令黑睛生白翳，形如水蝦之狀，微小占在眼之風輪，黑睛含糊，瀆眵，粘于翳之低處，閉時亦能淚出，眵滿，膜蔽瞳仁，動

如臭溼或黃或白看則如膜遮眼一般醜却又生目
久至損眼發歇來往治法用陰二陽四丹一夜吹一
次稍退宜點清晨用菊花倒柏冬青葉黃連歸鬚桑
白之類煎湯日洗一二三度服藥除根宜服充蔚子散
人參湯清涼湯

充蔚子散 方載前楂刺生翳外障條

人參湯

人參

白茯

桔梗

五味

大黃

車前子

玄參

黃芩

知母

桑白

右白水煎食後服

清涼散

蔓荊子

薄荷

防風

荆芥

桔梗

苦竹葉

耳艸

青葙子

細辛

右白水煎食後服

玉翳障外補



玉翳障外補者風衝入腦積熱肝膈發歇
疼痛失於調理日久累積血凝不散結
成白翳遮滿瞳仁如玉五色相似故立
名玉翳障補如此之狀有退有進有紅
有淚發歇不定治法用陰三陽二丹藥
吹點眼藥帶藥汪汪流出如此之狀其

翳必能漸以收卷，渾如磨鏡，塵垢去，益明。必復矣。若發年久，無進無退，不紅不痛，縱有丹藥之驗刀針之利終無揣手之處。宜墮翳洗肝撥雲之劑服之。宜服墮翳散、洗肝散、撥雲散。

墮翳散

車前子

青葙子

蒺藜

木賊

蟬退

石決明

艸決明

黃芩

玄參

防風

細辛

大黃

右向水煎食後服

洗肝散 方載前硬臉硬睛外障條

撥雲散


黃連

黃芩

白芍

菊花

赤膜下垂外障



赤膜下垂者三焦炎上胞屬胃陽明經壅熱血運至此沉滯不行不時眼澁疾出故生赤膜下垂而長直覆睛珠牽引瞳仁翳如紅霞之色治法不宜鉤割頸用陰三陽四丹藥一根吹一次點一次斬利消壅若翳厚色淡有淚者吹之易退翳實如紅霞薄而無淚吹之難退宜用退火退血之藥服之方能取効大抵此翳與逆順生翳理同宜服羚羊角飲大黃當歸散酒服之翳可去

羚羊角飲

方、載前，棗花內，障條。

大黃當歸散

方、載前，血蘆，曬仁，外，障條。

酒調散

方、載前，肉，鯉魚鱗，外，障條。


蠻翳丸

方、載前，白，翳黃心內，障條。

黃膜

黃膜上衝者此脾、胃風熱氣滯，膏、脂塞，血運不能流通故生是翳，發歇無時，痛，緩，疾出，則生黃膜上衝，發則膜舒退，則

膜捲胞皮下，垂羞明，倘內雖舉不振，黃膜漸長，遮滿瞳仁，甚至滿目皆黃，難辨人物，治法雖不是拳毛倒睫之症亦可。



衝外障

來去一些，眼皮瞓毛，鐵索黑旒，黃頭氣舒，發歇年久者，可灸少陽，不宣灸治法宜通脾臟胃，撥雲八正之劑點以對交之丹片，膈少許，如有宿退之速無疾退之遲，宜口齋戒，使寒其血，易于調治也，又有一症，黃膜下垂，與上衝，大抵治同宣厥，通脾臟胃散，撥雲散，八正散。

通脾腸胃散

大黃

知母丙

天門冬

麥門冬

茺蔚子

防風

黃柏

坤決明


甘草

熟地加朴硝

石白水煎食後服

發雲散 方載前王醫序篇外障竇

逆順生翳外障竇



逆順生翳者與赤膜下垂黃膜上衝之症頗同但逆順者五臟虛勞風熱衝于肝膈上胞陽明經壅熱血氣凝滯故生赤膜下垂下為之垂簾翳此為順下臉太陰脾經毒壅故翳膜下生向上為之逆翳治法演寫脾胃之劑大抵去翳之藥有輕重增減宜忌口諸毒宜服知母飲潤肝散東前散補虛人參丸

知母飲

知母

茺蔚子

車前子

桔梗

大黃

青芩

五味

右白水煎食後服

鴟肝散

方載前天行赤眼外障條

車前散

車前子
艸决明

密蒙花

白蒺藜

龍膽艸

羌活

菊花

青芩

菖蒲

黃柏

前胡

細辛

右研細末每服一錢食後米飲調下

補虛人參丸

人參

枝

白茯

熟地

山藥

各二兩

防風

桔梗

各一兩

木香

枝

細辛

五兩

桂心

生桂心

石斛艸

黃柏

澤漆

艸决明

八兩

兔絲子一兩 覆盆子八錢 牛膝

玄參


當歸

川芎各二兩

右研細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服三十九粒。

心酒下或白湯下。

漏睛眼血骨障



漏睛膜血者，有甚于針瘻，并膜入水輪二症之利害。此症未發之時，其頭先脅悶，四肢如勞，五臟多積，風熱壅毒致衝乎黑睛，黃仁生出，毒瘡灌滌水輪，淤血中炒熟以綿裹熨，眼胞上屢換熱的散。

其惡血消其敗膜止其惡痛生地黃湯。燒炭有蒸處更妙。或用陰二陽四丹藥對有瘡處吹或單用布藜輕粉血竭乳香研細對瘡處吹亦可。薰洗用桑白塗花明藜薰洗忌食動風動血物服宜倍風黃芪陽沒藥散竹葉隔肝散明目丸。

治風黃芪湯

黃芩

防風

遠志

人參

白芍

地骨皮

知母

大黃

熟地黃

麥門冬

右白水煎食後微熱服。

沒藥散

方數煎血灌瞳仁外障薰

外障薰

竹葉鴉肝散

淡竹

柴胡

桔子

甘草

羌活

升麻

赤芍

艸决明

白茯

澤鴉

各五分

車前子

黃芩

黃連

大黃

酒煎
各三分


右向水煎食後熱服

壅血明目丸

方載前血龍膽仁外障條

飛塵入眼外障

飛塵入眼者此症全然無事設被物或
飛塵或飛絲入眼此外傷也只因產物
粘在胞瞼之間布定不出痛澁難開
眵淚出以致障膜初患之時治法用絲
綿鑑針翻轉上下胞瞼抽撥出塵物卽



可若初時不識此症，久必生翳膜，遮竅瞳仁，須用丹藥吹點，胞臉浮腫，仔細翻轉看，有物粘處，必定有血積成塊，或肉有疙瘩，此是病之幾處，宜用小鋒針抽撥，或針出毒血，出則除病根。須服退翳車前散，煎散，補肝丸。

退翳車前散

細辛

玄參

白蒺藜

人參

大黃酒浸

等分向水煎食後服

桔梗

糖煎散

當歸

赤芍

川芎

防風

防已

甘艸

荆芥

龍膽草

山烏豆

大黃

研爲末，每服四錢，砂糖一塊，內水同煎服。

補肝丸

人參

手參

白茯

熟地

山藥

遠志

知母

澤鶴

防風

桔實子

鬼絲子

酒煮

萎梨

炒去核

當歸

酒洗去頭

石菖蒲

夏枯草

石斛

各

覆盆子

酒制

葛荊子

龍膽草

細辛

川芎

蜂蜜

右研細末，煉蜜爲丸，如梧子大，每服三十丸空心，白湯下，或酒下。

卷毛倒睫障外



卷毛倒睫者此肺經受損肺者五臟之
氣養生一身之皮毛肺損則皮聚而毛
落也有因勞倦思慮太過大怒致冷肝
家受熱膈內風虛痛酸不時淚出脾氣
下陷惰月羞明不好乍寒以手摩引致
卷毛倒入刺眼癢澀瞳仁慚生繫膜
敵頭側視不能正觀治法須用竹夾
起眼皮睫毛使生向外其疾瘳矣睛中
有翳用清涼丹或八寶膏吹點翳即消
落其夾須依口訣務宜緊夾不可以鬆

水滸有疤痕若胞下癰處用光粉，或杏油逐早擦之。
久則肉色一般。眼目光明如晝夜。服細辛湯防風飲。
明目流氣飲補腎丸。

細辛湯

細辛

防風

知母

充筋子

大黃

桔梗

髮羊角

女參

菟絲子水煎食後服

防風飲

人參

當歸

黃芪

甘草

防風

黃柏

蔓荊子

細辛

用白水煎食後溫服。須避風忌口。

明目流氣飲

大黃

酒浸

川芎

亭蘿子夢菊等

防風

荆芥

玄參

蒺藜
炒

細辛

黃芩

桔子

坤決明
炒

甘草

蒼朮

蔓荆子

木賊

甘草


補腎丸

方載前偃月內障條

右研細末每服二錢臨卧時飲湯調下或酒調下

充風淚出外障

充風淚出者治非一也有腎水虛不生肝木木生風而經而木動此是肝虛而風入眼故淚出則不能收其水蕩滯故曰迎風而淚出也然淚非一端有冷有熱腫痛亦隨者此熱淚也若迎風淚出



庄之冬月多夏月少拭却還生翳日久不分春夏秋冬皆有冷淚也治法熱淚者點藥去之冷淚者用乳香川烏丸 川烏一箇川烏二箇去皮明礬一錢肉酒麴一團共為末棕猪膽一箇用竹為丸如黍米大每夜卧用一丸放於眼大背頭後山即止或灸止之又有肺臟久冷大皆有孔名為淚堂此淚雖久淡則冷眼愈腎睛矣宜細辛飲平肝散暖風陽荆桔陽燉肝丸

細辛湯

細辛

防風

充蔚子

藁本

知母

黃芩

川芎

五味子

熟地

白芍

地骨皮

菊花

木贼

各一
西

右研爲末，每服二錢，清茶調下。

平肝散

歸鬚

赤芍

川芎

白芷

防風

荆芥

羌活

蔓荆子

柴胡

蟬退

各半
分

龍膽艸

生地

各八
分

甘草

二
分

夏枯草

白水煎起癢，加酒一盞，食後服。

緩風湯

細辛

五味子

防風

充蕎子

藁本

知母

黃芩

川芎

龍膽艸

木賊

蔓荆子

蒼朮

夏枯草

香附

白水煎

二
分

食後服

二
分

荆枯湯

蔓荆子

夏枯艸

黃芩

香附

茺蔚

卷柏

密蒙花

玄參

當歸

防風

木贼

細辛

陳皮

右各等分水煎食後服

燒肝丸

細辛

藁本

知母

夏枯艸

猪實子

兔絲子

防風

黃芩

石斛艸

艸决明

龍膽艸

川芎
當歸洗切

枸杞

玄參各一

五味子

蔓荆子

黃柏各七

牛膝

熟地黃

茺蔚子

白茯各一

川芎五

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸食

後白陽下

肝風積熱外障



肝風積熱者，肝家勞苦，七情鬱結，二三年間來往，狂發一歇，逐生翳，或聚或散，亦虛濶出。此疾多是夜勤灯火，或觀書，或雕畫，或造器，細巧之人，久累肝家，積熱成風。肝若受風，必有腦痛，不覺漸成昏瞓。治法有之，剪者吹以丹藥內服，洗肝省風之劑，除肝家之風熱，其薰洗照依，疼痛，眼之藥方載前症條下，宜忌口保養。

洗肝散

當歸

羌活

薄荷

梔子仁

大黃

防風

甘艸

川芎

家傳加龍膽草、生地黃、


右研為末，每服三錢，白湯調服，或煎服。

省風陽

方載前沉麝內障條

起坐生花者，此症是內瘡條移在外障中誤也。此症由肝血衰，膽腎二經虛也。六陽不舉，久坐傷血，起則頭暉眼，前常見花，發數般，或赤或黑，或白，擦亂，昏暗，不明良久，乃定。瞳仁開大，不清不辨，不

坐主華外障



痛無聊無，族皆因肝腎虛敗，氣不充周，以致視如無
見。此真氣血不足，水木不榮者也。治法宜補肝腎，或
明目固本丸，不治恐久變為青盲，內障或變為五風
雜症之症，則無及矣。宜服固本丸，補肝散，補腎丸。

固本丸

人參

生地黃

天門冬


麥門冬

右研細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服三十丸，空心鹽湯送下。

補肝丸 方載前，偃月內障條

補腎丸 方載前，圓翳，內障條

肝風目暗外章



肝風目暗者乃是肝腎虛勞肝氣不足血虛故也不時疼痛舉發無時痛則如眼珠望頰有赤濶淚出看物依稀前見花發數般或黃或黑或白見一物如見形狀此實有相兼之病若不諳療誠恐損眼治法非徒向外當先治內則服蒺藜散補肝丸外則用陰二陽八丹藥調乳什點二三夜點一次肝腦少許加洗以生地黃菊花赤芍鉢柏葉桑皮白芷川芎頭急口五辛諸熱物宜服白蒺

止或湿痒用碧天丹洗清晨以鹽湯洗或桑白皮防
風荆芥煎湯洗宣烏蛇湯祛風一字散補鷺丸點洗
八寶膏碧天丹

烏蛇湯

烏蛇

藁本

川芎

防風

赤芍

羌活

右研為末白水煎食後服

祛風一字散

防風

荆芥

紫荊

坤鳥

羌活

右研細末每服二錢薄荷湯調下

補膽丸

人參

柴胡

白朮

桂梗

前胡

馬勃鈴

細辛

玄參

枸杞

熟地

牛膝

當歸

赤芍

川芎

右研爲細末，煉蜜爲丸，如梧子大，每服五十丸。

食後酒送下。

八寶膏 方，載後點眼丹膏條下。
碧天丹 方，載後洗眼藥，要藥條下。

鶴眼瞼瞼障外



鶴眼瞼瞼者此突然所感非久患之症因五臟皆受熱毒攻五輪振起堅硬不能轉運血氣凝滯眸非一而鶴鳥之眼瞼視不運之貌難辨人物因形而名曰鶴鳥瞼瞼治法先以香油調姜汁於額臉部摩擦或頂上用麻風膏摩擦更妙服以酒煎散以被蓋出汗眼即活動此症多是小兒急慢驚風之症大人少有此疾宜服酒煎散禹膳陽搜風湯退熱飲

酒煎散 方載前蟲蠶赤取生藥外障條

渴膽陽

防風

茺蔚子 黃芩

玄參

桔梗

朴硝


右向水煎食後服

搜風湯 方載前旋螺突起外障條

退熱飲 方載前臉生風粟外障條

摩風膏 方載前風瘡喝斜外障條

輶 軸 轉 關 開 外 障



輶軸轉關者，典謂眼凝睛症，同鵠眼矇。睛者，睛凝不運之貌。輶軸轉關者，黃仁受風，變黑而縮，中央暗，瞳仁展開而大。膽腎之水散為盞，瞳仁大小隨黃仁之縮。黃仁展則瞳仁小，黃仁縮則瞳仁大。人不知以為瞳仁能大小者，非也。此乃肝經受風而不展，輶軸則圓，圓也隨肝輪而縮，覺見瞳大而不收，號曰輶軸瞳仁展開，風衝入脣，眼帶吊起，此症小兒急慢驚風多受之。治法如前，用姜竹調。

小兒通睛外障



小兒通睛者與鶴眼凝睛輒轉閉三症一同然此症誤被物打着頭顱或跌着心膽皆驚風邪脅壅至眼通睛黃仁木輪皆黑似無黃仁此黃仁與瞳仁通混不分號曰通睛亦用摩擦發散其風

摩風膏摩擦藥用蚌蛤頻下乳母忌口但大人此患難有道服鴟肝散麥門冬陽滋腎丸鴟肝散方載前天行赤眼外障條麥門冬陽方載前血蘆瞳仁外障條滋腎丸方載前鳥風內障條

邪服牛黃丸不須點丹藥只宜服藥然龍症鴟眼與
輒驥此用牛黃丸通頂石南散亦可服也宜服牛黃
丸通頂石南散

牛黃丸

牛黃錢

白附子

全蝎

川芎

赤石脂

白芷

麝香錢

硃砂錢

肉桂錢

麝香分

右研細末煉蜜為丸如大黃豆大每服二三丸
臨卧薄荷湯調下

通頂石楠散

石楠

莉筍

川芎

右研細末每服一錢米湯調兩度灌之去風疾

小兒瘡瘍外障



小兒瘡瘍名為百歲瘡不論大人小孩
頸患一度瘡瘍之眼症有兩般瘡瘍
症者初上皮膚之際眼閉不開睛上生
有痕瘡古在黑睛者易治急取益母草
煎湯薰洗一日三度更以丹藥調鱠魚
血點之忌口及夜啼哭乳母亦宜忌口
須瘡瘍其眼漸開眼中之痘亦隨而
瘡矣又有二症瘡瘍之後瘡瘍落盡肌
體肥壯眼肉忽然紅腫此乃餘毒鬱于
肝發出此症十分為害急用車前草擂

蜜水頓一，喫下，却肝經毒熱，先以益母草，黑以鱉血，調藥治稍遲，毒氣鬱結于肝，不能舒，渴發于眼目，傷于瞳仁，無治法也。須服涼膈散，密蒙花散，秦皮湯，宗膈散。方載前，乘花內障條。

密蒙花散

密蒙花

錢

青相子

錢

艸決明

錢

車前子

錢

右研細末用羊肝一斤，破開採藥末在內，仍合之，濕紙數重包裹，熗熟空心典食之。

秦皮湯

秦皮

秦艽

細辛


防風

葛根

各半錢

右句水煎，洗眼，彼竄不入眼。

○ 小兒眼生翳，外障外翳，生翳。



○ 一小兒痘疹未出之先，用銀珠或胭脂浸水點眼，及心窠喉嚨，頭下免致痘疹長之。
○ 一小兒痘後有目瞼者，用坤藥金雞子，雪裡開磨水，與飲或磨米泔水。

○ 一小兒目內有痘，翳者，用枳生鷄蛋，調乳點眼妙。小兒眼生翳者，脾胃實熱而發出，以致臉生肉翳，如粟，如麻，或有血塊，又是膽中受毒，或因乳母籽食熟物，皆能令兒患眼，治法諒兒大小疾之遠近輕重，一周半載者，其藥須令母飲，或用蝶殼灌。

下小兒能若二三歲者此屬胎毒也又譙母之後患
眼者此是小兒自受之症母無預此藥須令小兒
自飲忌食奇膩炒煎糖果之類不獨患眼所忌如不
忌多生別疾變為瘡傷亦能害目甚至不治之症其
瘡眼別有條款此乃小兒生翳症也黑睛如麻大或
如蘿蔔花與瘡眼大不侔宜服導赤散撥雲散除風
陽

導赤散 方載前大皆赤脉穿睛外障條

撥雲散 方載前王蜀淳備外障條

除風陽 方載前臉生風粟外障條

小兒瘡傷眼外譜



小兒瘡傷眼者，此富貴之家小兒多生是疾，蓋由父母愛之所致也。小兒如艸之萌蘖，怎受風霜之欺？且小兒五藏六腑未實，血氣柔弱，禁油膩煎炒諸般，量腥或一週半載，縱糖果之物及鵝鴨、鷄、豬、羊、牛等肉，或食譚^茶，又哺以乳，或乳方飽，又與以飯，此出於父母之情，富貴之家有此症，貧賤之家豈有是患？何也？一食諸物，不消化，傷于脾胃，至腹脹，午後發熱，至半夜方退，日久頭髮稀疏。

轉作鴟鴞成痺。頻口渴致傷肝膽，眼之白仁鮮紅羞明，怕日，漸生翳膜，遮滿黑珠，或突起如黑豆，如杏核之狀。治法先治內，而後治外。用鷄蛋入輕粉一二分，史君子二箇半，葱幾莖，用濕紙包煨，與食空心，連食五七蛋止。又宜煮羊肝露一宿，醃夜明砂食，或豬肝亦可切。宜忌口，葷腥其白膜。用陰一陽七丹藥，調乳點煎，胡宜二連服。後用側柏葉煎湯薰洗。若痺傷肝膽，眼珠突出，或瞞進為不治之症，不直瞎，甚至喪命。若聲啞，口乾脚手俱腫，十死八九，可不慎哉？宜服

二艸散五瓣丸三黃丸。

二艸散

龍膽艸

菖艸

當歸各一錢

細辛分

右研細末，每服一錢水一盞煎五分，入白糖三匙，食後溫服。

五蘆丸 杜絳 小兒癩，眼面瘦，色黃，羞明，怕日，食乳

不消

綠攀

盛鬼

蜜陀僧

遇

夜明珠砂

各二錢

共研細末，蒸棗肉搗爛，入末為丸，如黍米大，每服三四十九丸，量兒大小空心米湯送下。

三黃丸 方載 前擎肉攀睛外障條

每日服三錢，為佳。

胎風赤爛外譜



胎風赤爛者其症有三初生時血露入眼洗不乾淨而生是疾遂至赤爛又有一母腹中其母不知忌口多食壅毒之物酒麪五辛之類至產三四箇月兩眼雙赤脣枯四目紅赤濕爛此卽是胎毒所發益小兒在母腹中飲母血血毒於兒生出則發此症又有乳母壯盛之人抱兒供兒之際口沫滿乳頭乳汁脹滿洒然射出衝入兒眼亦能生出濕爛若衝射面亦或疵濕癩痒大抵此三症同

號曰胎風赤爛，但血露不乾，與乳汁衝射，宜碧天丹洗。胎毒致者，須母服三黃丸，忌口及黃氏飲，其小兒亦用三黃煎湯薰洗，點以痔藥，或煎黃連側柏葉薰洗，宜服黃芪飲。正料消風散、三黃丸洗，宜湯泡散。

黃芪飲

黃芪

東前子

細辛

黃芩

五味子

右白水煎食後服

正料消風散

川芎

白芍

葛根

防風

荆芥

羌活

姜桑

蟬脫

厚朴

人參

合香

右白水煎服

三黃丸 方載前努肉攀睛外障條下

湯泡散

當歸

赤芍

黃連

杏仁

薄荷

防風

銅綠

右用白煎水煎沸湯泡洗眼効

久年爛胞風者因脾胃壅熱久受風濕
更加食諸般物日積月累致成風爛胞
臉之內變生風症動作發痒用手拂拭
甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬譬如
望候出滿腮有不可近人之狀治法翻

久年爛胞風外障

轉臉胞，剥洗淤血，二三度用小鋒針出淤血亦可。
若用摩引，有紅膏紅筋，宜用老酸醋煮爐灰石淬七
次，加以丹藥，量輕重搽點眼瞼，或吹入眼內無妨。宜
忌口動風動血之物，切勿食。宜服蟬花無比散，神効。
明目湯洗宜碧天丹金錢湯。

蟬花無比散

蟬蛻去

蛇蛻蟄蟲

羌活

石决明僵桑當歸

川芎各一

蒼朮

防風

赤芍

白茯

葛艸各一

白蒺藜

炒去刺

右研細末，每服三錢，食後水潤，調服。

補効明目湯

黃連

黃芩

乾葛

蔓荆子 防風

甘草各四分

細辛三分

右水煎加葱一莖同煎臨卧稍熱服

碧天丹 方載後洗眼要藥條下

金錢湯 亦載後洗眼要藥條下

俱用清晨或晚以綢帕洗

秘傳眼科全書卷之六

諸症湯散丸藥類

洗肝散 治眉稜角眼眶骨痛不可忍者

當歸

薄荷

羌活

梔仁

大黃

防風

菖艸

川芎

加膽艸生地各一錢

水煎食後服

二陳湯

陳皮

半夏

白茯

菖艸

連翹

防風

黃芩

蒼朮

皂角刺酒

獨奇方

治眉稜角痛甚者

防風

羌活

黃芩

菖艸

各一錢

水煎食後溫服入

防風羌活湯 治眉棱角痛而風寒痰濕者

防風

羌活

細辛

黃芩

白芷

南星

半夏

白朮

藁本

芎艸

右等分為末，每服四錢，水煎溫服

黃芩白芷散 治眉棱風熱痛

黃芩

酒炒
二錢

白芷

研爲細末，食後臨卧清茶調下

眉棱角痛論

丹溪曰：眉棱角痛，屬風熱與痰類。痛風作，風痰治。

或云眉角痛者有二眼屬肝有肝虛而痛總見光明
則眉角痛甚宜服生地黃丸有眉棱痛目不能開則
靜夜劇者宜服導痰丸之類入芎茶一陳湯吞或青
州白丸子亦効

鼻按眉棱角痛者多是肝火上炎怒氣甚者有此疾
甚謂風症亦火之所致熱甚生風也大抵抑肝火
有風痰則參治之

二烏散

川烏

卿烏

俱用蜜炒去毒

細辛

羌活

黃芩

草艸

等分爲細末每服二錢清茶調下

洗心散

治心經積熱，四臂赤痛。古方。

當歸

赤芍

麻黃

大黃

白朮

薄荷

葛艸

荆芥穗

水煎服

防風通聖散

治時行暴熱風，腫火，眼腫，痛難開。或

頭面俱腫。

防風

大黃

赤芍

薄荷

川芎

葛艸

朴硝

梔子

連翹

桔梗

黃芩

白朮

麻黃

荆芥

滑石

石膏

歸須

右用水煎食後服

明目清涼飲 治一切熱目翳淚羞明

歸鬚 赤芍 川芎

蔓荆子

黃連

連翹 防風 荆芥

生地

柴胡

葛艸各六分

桔梗

薄荷

葛艸各三錢

右水煎食後臨臥服

萬應蟬花散 治一切目疾多眵目上熏有邪熱

蟬蛻 蛇蛻各三錢

歸鬚

赤芍

川芎

防風 羌活

蒼朮

葛艸各二錢

白芍各一錢

石決明

眼藥五錢

右研細末每服二錢食後臨臥米飲調下

當歸養榮湯

治騎珠竇甚，血少枯澀。

分身

當歸

赤芍

川芎

白芷

熟地

防風

羌活

水煎食後服。

本事菊花散 治肝腎風毒上衝，眼痛，

菊花

牛蒡子

燒

防風

各二錢

白蒺藜

甘草

各一錢

右研細末，每服二十錢，食後臨臥，熱湯調下。

桑白皮散

治風氣壅塞，熱毒攻睛，肉腫脹，日夜疼痛。

桑白皮

杏仁

去皮

玄參

枳殼

防風

升麻

赤芍

旋伏花

甘菊

黃芩

芎艸

芎藶

右等分爲末，每服五錢，同姜三片，水煎食後溫服。

四物龍膽湯

治目痛，暴作，雲翳，痛不可忍者。

當歸

川芎

芍藥

生地

各一錢

防己

右水煎食後溫服。

當歸龍膽湯

治眼中白翳。

當歸

膽草

酒洗

赤芍

黃芩

馬頭

黃柏

酒炒

各一分

黃芩

芎艸

黃連

蜜炙

柴胡

防風

卷活

五味子

升麻

石膏
分量

右水煎起碗用酒一盃熱服

開明散

治風毒攻眼，瞼澀膜脹通用

川芎

防風

羌活

蒺藜

天麻

白芷

蟬退

蒼朮

細辛

荆芥

羌活

甘草

甘菊

錢

研為細末，每服二錢，用鹽一粒，食後沸湯調下。

寫向陽

治風熱翳膜血筋一切肺熱外障，

歸鬚

赤芍

生地

黃芩

梔子

分量

加桑白菊花青相干防風蒺藜連翹木賊，

右研為末，每服三錢水煎服。

前胡犀角湯 治傷寒熱病後，兩目昏暗，或生浮翳。

前胡 犀角屑 防風 蔓荆子 桔子仁

麥門冬

生地

酒洗
青葙子

隔火
炒活

菊華

艸決明 車前子 細辛

黃芩

甘草
五分

右水煎食後服。

芩菊湯 治外障翳一切眼疾。

其菊 旋伏花 石決明 升麻

川芎

大黃

酒洗

木賊

生地

車前子

黃連

黃芩

青葙子

艸決明

熱

石膏

梔子

防風

荆芥穗

羌活

地骨皮

葛艸

專為末，每服二錢，入蜜少許，同煎，食後臨溫服。
清神益氣湯 治脾胃虛弱之人，誤服洗肝散，或服
寒涼過多而目愈病者。

人參

白朮

白茯苓

耳艸

麥門冬

五味子

各五分

蒼朮

陳皮

升麻

赤芍

防風

黃柏

青皮

各六分

用姜三片水煎，食後服。

助陽活血湯 治腰無力，常欲睡，閑或痛，羸。

黃芪

蜜炙

葛艸

杏仁

當歸

酒洗

蔓荆子

炒

升麻

酒洗

防風分

卷五十一

向芷四分

柴胡六分

右水煎食後熟服

石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠近內外氣
障風昏倒睫拳毛一切眼疾

石膏

羌活

木賊

密蒙花

黃芩

細辛

川芎

荆芥

甘菊

黃芩

藁本

菖蒲

白芷

乾薑子

麻子

右研細末每服一錢食後臨風用蜜湯調下或
清湯亦可日進三服二十日後大有神功

蛤粉散 治小兒雀目至夜不見物

蛤粉

石决明

夜明珠

其艸

右等分爲細末，小兒三歲者，每服五錢，煮豬肝，
什晨後調服。

又雀目方 治大人小兒通用

養丸

為朱砂

用羊肝一具，以竹刀切開，搽末在內，麻

線綁定，再將粟米泔水一大碗，煮熟，令患眼人，
對瓶口薰之，藥氣略溫，即以肝及什食二三次，
卽効。

簡要補肝散 治肝虛，目痛，眼淚不止，怕光，羞明，目
珠痛，肩棱角痛，及頭半邊腫痛。

桑枝艸

錢一錢

香附

一兩重便煎透
洗淨打碎用

右研細末每服一錢滾湯調

排風湯 治兩臉癰

天麻

桔梗

防風

赤芍

五味子

陳皮

升麻

桑白

用_水煎食後服

烏豆湯 治拳毛倒睫

烏豆

黃連

甘草

密蒙花

大黃

朴硝

右用順取東流水煎服

止痛光明方

青葙子

密蒙花

龍膽草

甘菊

地骨皮

女寸金

金鷄舌

天香草

鱗鷄辰

右水煎食後服

瀉肺湯

治白仁赤腫

桑肉

大黃

條黃芩

白牽牛

黑牽牛

甘艸

右水煎食後服

桑白散

治肺經熱白仁腫脹

桑白

杏仁

玄參

防風

升麻

赤芍

薄蘆

用水煎食後服

濟肝散 治眼淚常出

羌活

細辛

菊花

蒺藜

右研細末，麥門冬煎湯調下

九仙丹 治眼通紅久不退

歸鬚

赤芍

川芎

黃芩

木通

南芷

荆芥

菊花

甘草

右水煎食後服

七寶散 治大小便赤，腫痛，生瘡，翳者，

歸鬚

赤芍

梔子

荆芥

麻黃

大黃

甘艸

木煎食後服

渴肺散

桑白

葶藶子

玄參

旋伏花

地骨皮

桔梗

知母

黃柏

黃芩

菊花

朴硝

右水煎食後服

渴肝散

郁李仁

荆芥

甘艸

梔子

右水煎食後服

除翳掃雲散

當歸

防風

梔子

薄荷

川芎

大黃

甘草

羌活

木誠

玄精粉

錢草

西

右研細末熱陽調下

谷精艸

車前子
鹽落後用

谷精艸

防風
甘草

右研細末水飲調下

退血散 治眼睛疼痛腫者

歸鬚

赤芍

木誠

細辛

龍膽

右研細末每服四錢溫湯調下

蒼朮散

治風目

蒼朮

姜蠶

蟬蛻

川芎

防風

荆芥

蔓荆子

白芷

憂祐艸

菖艸

右研細末清茶調下

機雲遞醫丸

消膜

當歸

川芎

羌活

青葙子

車前子

石决明

地骨皮

黃連

蕘藜

知母

枳殼各一

蔓荆子

石南藤

穀精艸

密蒙花

荆芥

蔴荷各一

木賦

菊花

瓜萎子

烏藥

各六錢

菖艸

川椒

各四錢

蟬蛻

石燕

石斛

各三錢

右研細末，煉蜜為丸，梧子大，每服四十九丸，
後，淡湯下。

退翳復明丸

人參

五錢

枸杞子

防風

蒺藜

炒去刺者

菟絲子

一錢半

赤芍

各二錢

青葙子

石斛

艸薢

木駁

密蒙花

一錢半

石決明

一錢半

熟地黃

向芍

玄參

各二錢

蟬蛻

一錢半

薄荷

各二錢

肺決明

一錢半

甘菊

夜明砂

三錢

羚羊角

各二錢

犀角

各二錢

右研

細末

煉蜜為丸

如梧子大

每服四十丸

水送服

後，白湯下。

羊肝丸 治肝虛風熱，冷淚赤，微痒外障眼，

黃連三

當歸四

熟地四

枸杞子

菊花明

石决明三

龍膽草

防風

牛膝

麥門冬

羌活

黃柏

柴胡各一

人參五

青鹽七

肉桂三

羯羊肝

丁具大

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸或

陽或酒下

石斛夜光丸 俗神水散大昏如霧露眼前常見黑色

花視一成二久則光不復鍛及內障神水淡白綠

色

人參五

枸杞子

鬼繩子各一

當歸四

熟地四

石斛艸

夜明珠洗

川芎

青葙子

枳殼

白茯

生地黃

蒺藜

麥門冬

肉蓯蓉

酒洗

艸决明

燒

天門冬

防風

黃連

牛膝

酒洗各一

乾山藥

杏仁

錢各七

家菊

五味子

甘草

錢五分

犀角

羚羊角

錢三分

右研細末，煉蜜爲丸，如梧子大，每服四五十丸，酒飲下，或湯下。

加減三花五子丸 治五臟風熱上攻，肝虛頭痛，眼

見飛花，或生翳障，並膏肓之病。

菊花

密蒙花

旋伏花

荆芥

夏枯草

升麻

木賊

錢各七

枸杞子

菟絲子

歸蘿

酒洗各一

青葙子

責本

連翹

白英

去ル
後ヲ

石斛

羞姑

橐本

黃柏

知母

桑葉
卷

防風

白芷

西
各一

艸决明

熱
石決明

蔓荆子

桑葉
卷

地膚子

各一
錢

宜艸

六
支

右研細末，煉蜜爲丸，如梧子大，每服四十丸，鹽湯下，或酒下。

地膚子丸

治青盲不見物
白英藜

熟地黃
熟地黃

青葙子

茺蔚子

防風

地膚子

熟地黃

白英藜

熟地黃
熟地黃

青葙子

茺蔚子

防風

茺蔚子

酒浸一宿

車前子

酒浸一宿

大黃

熟地黃
熟地黃

蕷虫

去壳
生用

細草

黃連

各一
兩

右研細末煉蜜爲丸，梧子大，每二十丸，溫酒

送下。

夜光輝紅丸，治諸般風毒眼生翳膜，

人參

五錢

當歸

酒一斤

川芎

防風

荆芥

薄荷

細辛

白芷

蒼朮

米泔水一斤
月乾

南星

石膏

藁本

蒲黃

薑香

苡仁

全蝎

酒一斤

川烏

大半錢

艸烏

姜湯泡過，去皮
天智酒一斤

何首烏

五錢

羌活

酒一斤

雄黃

酒一斤

右研細末，煉蜜為丸，梧子大，雄黃為衣，每二十丸，清茶送下。

清涼丸

治小兒癩瘡入眼溫服

人參

白茯苓

防風

黃芩

克蔚子

大黃

玄參

各一錢

右研細末，煉蜜為丸，梧子大，二三十丸，空心清茶

送下

三黃隔心丸

治肝熱

黃連

黃芩

黃柏

後過者

柏

大黃三兩

右研細末，米糊為丸，梧子大，每二三十丸，淡竹葉煎湯下

小補陰丸

黃柏

知母

各八錢

加夜明砂五錢

一錢

為衣粗平
不燒加砂

右研細末，流水為丸梧子大，每三十丸，清茶下。
涼膽丸 治眼昏花

黃連

黃柏

地膚子

龍膽草

防風

荆芥

姜蠶

右研細末，煉蜜為丸，如綠豆大，每六十丸，薄荷

陽下

椒黃丸 茄上盛下虛，內外障翳疼痛，盞明，胬肉侵

鴟冷熱淚下

川椒

熟地黃

右研細末煉蜜爲丸梧子大每三十丸溫水送

水送下

乳香川烏丸 治一切冷熱

乳香錢 川烏番錢 千川烏番錢 白礬錢 白酒燒

右研細末用雄豬膽汁和丸如粟米大每用一丸夜卧時放於大背止候神妙

點眼丹膏類

清涼丹 耳石製過六味 破砂分 疏砂分 齋膏

冰片各一

右研極細末薑用

止瘍丹

其石錢

硼砂半分

銅綠半分

麝香八厘

冰片一分

右研極細末，蘸用。

散血丹

其石錢

硫砂

硼砂

辰砂五厘

麝香五厘

右研極細末，蘸用。

止瘍丹

其石錢

銅綠半分

青鹽二分

硼砂半分

右研極細末，用。

開膜丹

硼砂半分

硼砂

青鹽各一

右研極細末，用。

去膜丹 黑厚膜立効

其石

一兩

珍珠

一錢

硼砂

各二分

駐仁

各二錢

冰片

三分

硃砂

一錢

麝香

各半錢

硼砂

各二分

硼砂

一錢

膽礬

三分

青楓

一錢

銅綠

各半錢

海螵蛸

八個

黃丹

五錢

製過

右研極細末，聽用。

去翳膜丹

其石

五錢

熊膽

二錢入石牛，熟地黃各一錢

珍珠

一分

珍珠

一分

銅綠

半錢

硼砂

二錢

石燕

一錢

石蠟

用清冰糖一錢

通各五分

右研極細末，聽用。

八寶丹

黑時起翳，立効。

耳石錢

石蒜

石蠟分

硫砂分

硼砂分

熊膽

珍珠

蕤仁錢

琥珀

麝香分

右研極細末，蘸用。

止痛丹

甘石錢

兒茶三

血竭分

麝香

冰片各一

右研極細末用。

紫金定子

熟翳膜風熱，很効。

耳石錢

珍珠

瑪瑙

辰砂

硫砂各二

冰片一

輕粉

五

右研極細末，用製甘石藥水，留清的調定子，依

附候用或重翳多和後天開丹同用

天開丹

耳石

熊膽

五分用黃連薄荷酒浸開入耳石內日煎

硃砂

硼砂

沒藥

姜酒各三分

珍珠

膽礬

青鹽

硼砂

製過各一分

乳香

姜酒二分

右研極細末收藏應用。但此丹其効最速不可輕舉。須拭症加減。如翳膜重厚者獨用此丹。猶輕者當和前紫金定子同用。故膜初生而輕則少用天開。多和定子。或時久而重則多用天開少用定子。臨期應變自量加減至神至効。

白龍丹 黑亦目後生翳膜

芒硝錢

硃砂

麝香

冰片

右芒硝用白硝若許，放於碗，銀窩再用新瓦蓋，白炭火溶化，傾於碗中，凝成塊，白玉色者，取起，薑用，併別藥同研細末。

立消丹 薰淳翳竊翳翳膜遮睛，痛眼。

食鹽生自為火候，置淨器中，生研，如塵，以灯心蘸塗，手指定醫上，點二三吹，卽不痛。

去老膜丹

硝砂五分上下无金定，混合文武火煅後

巴豆

毒酒半盞用，萬州水煮過

龍骨

煅過

白丁香

飛過茶

共研細末，薑用。

陰丹 黑翳膜眼

甘石錢 珍珠

琥珀

瑪瑙

砌砂

熊膽

乳奇

沒藥

青鹽

膽礬

冰片

麝香

食鹽

五厘

共研細末候用

陽丹

黑翳膜眼

甘石錢

珍珠

瑪瑙

琥珀

雄黃

乳香

沒藥

麝香

熊膽

冰片

共研細末用

光明丹

黑翳光明

甘石

錫

珍珠

瑪瑙

雄黃

麝香

冰片

右研極細末，薑用。

八寶駡仁膏
點一切翳膜及風眼。

甘石

熊膽

銅線

石燕

石蠟

硃砂

珍珠

駡仁

珊瑚

琥珀

麝香

五分

黃丹

製成

冬蜜

薄荷

二兩

冰片

二分

黃連

四分

右十三味共研細末，用連荷二味煎湯，熬蜜，籠
眼肉色取起，候冷加前藥末，為膏，薑用。
眼肉色取起，候冷加前藥末，為膏，薑用。

磨翳靈光膏

點一切障翳

甘石

二錢

硼砂

五分

珍珠

熊膽

黃丹

各一

石膏

石蠅

蕤仁

各五分

硃砂

二錢

乳香

沒藥

雄黃

各三分

白冬蜜

六兩

黃連

三兩

薄荷

五錢

右研細末用蓮荷煎湯熬密成龍眼肉色取起候冷加前藥末為膏

碧雲膏

黑雲翳

銅青

五分

輕粉

麝香

各一

黃丹

一錢

右研細末煉蜜一兩加前藥末為膏

長春膏

黑撞碎生翳膜眼亦除翳膜

生地黃汁 薄荷汁 冬青子汁

右三味汁熬濃加蜜一兩同熬成膏

勝金膏 治拳毛倒睫

阿膠明者三五片 水片五厘 麝香五分

右將阿膠用水煎濃成膏候令下片麝取起以罐盛之每時分用手指膏抹倒睫臉上為妙

曾青膏 治爛眼風

銅線 百藥煎

等分

右二味入鍋內煖研為細末用蜜調成膏臥少許抹在眼瞼上以薄紙貼之來日即効

敷貼腫眼方

芙蓉葉

研末細茶
分分

右煎細茶調一昧，為膏以紙托住，貼于眼一竅，其腫立退。

又方

用豬腿精肉一片，以大黃磨濃水浸肉，溫煖，

貼眼腫處立退。

又方

用胡蘿蔔搗爛溫煖，作餅貼眼，其腫立退。

摩頂膏

治眼眶疼或太陽疼及肩骨痛，可摩可貼。

木香

子鵝脂

牛脂

各一

鹽花

一錢

殊砂

錢

龍腦

三分

右四味研為細末用猪牛脂熬滾入末同熬成膏若軟再加黃蠟多寡用手指摩頭頸諸痛處或作篋貼痛處俱効

搐鼻退翳方

單用艸藥一名紫裏金釵以根搗爛搐鼻眼翳立消
又方 用艸名鵝不食打爛搐鼻其翳立退

搐鼻通關散 凡點眼先用此搐鼻為妙

楊梅皮 跳躅花根 薄荷葉 向芷

粉坤

細辛各等分 牙皂

麝香

右研為末作丸搐鼻以吹入鼻孔能洗疾清上

雄黃散 治頭風竄不可忍者

雄黃

全蝎

薄荷

川芎

乳香

沒藥

牙硝

共研細末吹入鼻孔立効

麝手退翳方

苦膽菜 地薄荷

二味搗爛溫燙將手合掌向上以患眼合手天
府處敷纏在其患立消

又方

艸名蛇苞又名五爪龍搗爛膏手天麻穴或繩手

脉門患立退

玉方

鵝不食，亦可。據天魔先患立消。

洗眼丹藥類

洗眼藥

桔子

秦皮

桑葉

槐枝

艾葉

冬青葉

五倍子 味苦，性溫研末泡湯洗眼去風止淚。

收爛眩風退翳

秦皮

煎湯洗眼去風毒，除翳膜，收爛眩風冷淚。

桑葉

煎湯洗眼去風熱止淚除翳止漏明目

槐枝

煎湯洗眼去風止淚明目

艾葉

煎湯洗眼或用氣薰能去風仗爛眼風

止冷淚

冬青葉

煎湯洗眼去風熱仗眼風止冷淚

又方 不拘疼痛外障可洗

新鮮菊花或乾菊煎湯

又方 可洗紅腫

桑白

木賊

防風

歸鬚

黃連

側柏葉

生地

共煎湯，洗眼立効。

又方

黃連

黃柏

側柏

歸須

赤芍

防風

荆芥

木賊

菊花

同煎，纏清洗眼効。

又方

黃連

黃柏

歸須

瀉之金

同煎水洗。

當歸飲 治癰，痈，瘻，疽，癰，癧。

當歸

黃連

生地

熟地

鬱金

杏仁

梔子

黃柏

赤芍

分作二服，水煎熱洗。

鵬雪膏 專洗翳膜

大黃

黃連

秦皮

滑石

右各等分爲末，每服一錢，湯泡澄清，洗眼，明朗。

又方 薰洗，熱眼，

當歸

赤芍

生地

蓼芽花

黃柏

黃連 紅華 谷精草
研末，煎湯薰眼，後微冷，傾出洗眼。

又方 專洗風眼，

用薄荷煎湯同淡，有薑汁少許，洗眼，爲妙。

又方 經冬桑葉煎湯及桑樹燒灰，泡水洗眼。

開日期于后

正月初八 二月初十 三月初五 四月初八

五月初八 六月初七 七月初七 八月初三

九月初十 十月初九 十月初十 十二月九二

又方 朴硝六錢煎湯澄清溫洗 開日期于後

正月初一 二月初八 三月初四 四月初五

五月初五 六月初四 七月初五 八月初一

九月十三 十月十三 十一月十六 十二月十五

製藥品類

製蘆甘石法 其石解 用黃連二、薄荷、黃柏、歸鬚

各赤芍。荆芥。生地。蒺藜。錢同煎湯。瀝清以大碗盛。

住將甘石放於銀窠內。用瓦蓋定。以炭火。煉如法。

好取起。傾于前藥湯內。若未溶者。再煉數次。陳于

湯內。取浮細者。澄底日乾。取用。

製黃丹法

黃丹

用黃連

內

薄荷。鹽同煎湯。瀝

清以黃丹飛過。取浮者。再澄底。取起日乾。驗用。

製硼砂法

用銅歸盛住

以二黃湯煮乾

製銅綠法

銅綠

內

用蜜。濃調塗于磁碗上。以文作

條燒烟薰之。數次黑色為度。取起。聽用。或乳汁。浸

焙乾亦可用。

秘傳眼科全書卷之六 大尾

夫眼自三書諸家之醫書全冊
內列耳鼻口眼三各門而眼疾
全部之書行世者輒云機啓微
銀海精微二書耳以故或人欲
鍛此書而乞和點然而書中

津々文一章云差誤不許略以

愚見補之俗說後賢此皆自

龍樹論至眼疾證候總於及

五藏冷熱虛實二要兼七十
二症圖說而來亦有瘡眼諸

症湯散丸藥 點眼洗眼 神驗丹

膏而眼斜之大意備馬於是乎
和點以塞易責五

自享五年後戊辰孟夏吉

旦青木芳齋書



眼科大全

全部六冊

明傳仁辛著

寛政三年 辛亥十一月

心齋橋通南久寶寺町

大坂書林

河内屋八兵衛