

秘傳眼科龍木醫書總論

秘傳眼科龍木總論卷之三前

第二十四肝虛積熱外障

此眼初患之時忽然發動赤色淚出醫生或退
或聚或散初時卽輕如經一二年間漸重於日
不明卽寃神鬼祈求此疾皆因肝家勞熱所作
毒風入眼眼中覺患宜服藥將息不得燒灸頭
面可服瀉肝湯青箱子丸及硃砂煎點之立效

詩曰

用力勞神赤痛來

暗瞳怕日淚難開

有時發動有時退

怨鬼求神作禍胎

忽爾翳生還自可

須知肝膈洗藥排

急求湯藥先除去

根株莫遺臟中理

一眼初時生作患

相牽後眼莫相違

今年發動輕輕過

後歲應多轉轉危

九藥青箱須至服

披鎌雙臉血相牽

眼中宜點硃砂藥

但炙頭中卽易爲

第二十五傷寒熱病後患眼外障

此眼初患之時或因傷寒起早熱病後氣未

全六腑之熱未盡體虛易損過食熱物過多致

令患眼或見黑花瞳人開大發歇不定赤腫淚

出宜令鎌出瘀血服龍膽丸生犀飲子瀉肝湯
勿不可點藥恐損睛也

詩曰

熱病傷寒可後虛

因衄壅熱患雙眇

睛疼一日先昏暗

不久相赤左右拘

紅腫必須鎌臉肉

生犀飲子最能驅

次服決明丸半劑

免教白肉更須瘀

未宜點眼緣何事

却恐生瘡敗黑珠

瞳子忽然開黑大

舊來肝腎有風虛

神方用膽點和服

雙目光明却復初

若是眼前花出現

三年兩載始能除

第二十六混睛外障

此眼初患之時先疼後痒礮澁淚出怕日羞明
白睛先赤發歇無定漸漸眼內赤脉橫立遮睛
如隔紗看物難以辨明此是毒風在肝臟積血
臉背之間然也初患宜令銖洗鉤割莫熨烙去
除根本然後宜服涼膈散點七寶膏服退翳丸
立効

詩曰

白睛先赤作根基

痛痒風吹淚出眩

瞤澁難開旬日內

發無定體有壞時

年深漸變時爲碧

滿目凝眵如覺之

赤脉如絲橫與豎

混睛外障莫狐疑

毒風赤血成其量

如此誰言可易醫

冷澁藥中須得妙

點摩翳膜盡爲期

頻鎌雙臉同籠烙

風熱平時卽往之

湯藥稍和年歲服

要除根本莫爲遲

第二十七 努肉侵睛外障

此眼初患之時或痒或痛赤爛多年肺臟風壅
發無定準漸生肉翳侵睛遮睛瞳人此狀宜令

鈞割熨烙服後宜服除風湯七寶膏立効

詩曰

努肉根基有兩般

便須分別見根源

或因赤爛多年後

肺腑風冲亦使然

或痒或痛無定準

一條根肺漸侵瞞

初生浮小鈞除易

覆着瞳人卽稍難

去熱去風先服藥

終須割烙卽長安

殘餘服藥徒能効

七寶銷磨當自痊

第二十八兩臉粘睛外障

此眼初患之時或痒或痛年多風赤臉中有瘡

因熱在肺膈脾胃風壅致令兩臉相粘卽宜鈎
割灸烙服排風湯烏犀丸立効

詩曰

兩臉粘睛何所論 多年風赤是其因

睛疼臉澁皮肉爛 瘡可相粘似有筋

割烙只須多出 銅篋燒赤烙玄門

治風丸散須頻服 年歲中間只去根

第二十九膜入水輪外障

此眼初患之時肝臟積熱虛勞年多發歇有時
睛上有瘡疔後更生障翳漸入水輪因大腸壅

滯致使熱也宜服退熱飲子鉤割熨烙鎌洗宜服補虛鎮心丸卽瘥

詩曰

黑上生瘡病後痕

積生努肉漸相侵

時多常覆過痕了

因此名侵入水輪

離卽三光微可視

烏珠沉下必氤氳

痛醫猛浪強鉤割

遂使雙眸轉更昏

第三十釘醫根深外障

此眼初患之時眼中疼痛作時赤澁淚出怕日忽然治療失時致令睛上有翳如釘頭子相似

不宜鉤割熨烙難得全效宜令服藥此是熱毒
在於肝心宜服除熱飲子鎮心丸卽瘥

詩曰

滯留邪熱在肝心

疼痛生瘡那可任

毒藥既深開得后

眼前翳入黑暗深

萬藥雖然磨不盡

能除發渴解愁襟

若乖忌省無堅固

恐怕癢痕轉更深一作侵

第三十一 黑翳如珠外障

此眼初患之時忽然疼痛難忍淚出不開有翳
如黑珠子在黑眼上如是大人患者肝腎俱勞

毒風入眼如此疾狀不宜鍼灸觸發卽服補腎
丸如小兒患者卽是實熱急疳宜服於羊角飲
子卽塵

詩曰

黑翳珠排黑水間

醫工會者始知難

如神藥點翳爲極

藥用湯丸卽得安

不用強看將手摩

恐因手重出青煙

庸醫桃發並燒香

要見三光路更難

第三十二花翳白陷外陷

此眼初患之時發微忽然疼痛淚出時速生

鬚白如珠棗花陷砌魚鱗相似此爲肝肺積熱
壅實上冲入腦致生此疾切宜服藥治療不得
失時恐損眼也宜用摩頂膏摩於頂內然後服
知母飲子兼服山藥丸立瘥

詩曰

忽生白鬚族瞳人

點點如花陷砌鱗

肝肺伏藏多壅實

上冲入腦病爲根

膏摩頂上除風熱

湯飲除肝服裏瀉

酒麩休食諸毒藥

莫因小事餐貪噎

第二十三 冰瑕鬚深外障

此眼初患之時或痒或疼發歇不定作時赤脈
淚出眵慢致令黑睛上橫立似青眼多少不定
久後爲患全損眼目此疾不可挑撥莫去鉤割
宜服芫蔚子散除熱入參湯點退翳清涼散立
効

詩曰

黑睛橫豎點青瑕 似翳沉沉少與多
醫者細看如此狀 根沉入黑莫挑摩
老憂久後添爲患 除熱除風藥最嘉
出入不妨須謹慎 志心醫瘡別無他

第三十四玉翳浮瞽外障

此眼初患之時或時疼痛皆是毒風上冲入腦
積熱在干肝鬲之間致令眼內有翳如玉色相
似遮瞽瞳人如此疾不宜針割熨烙宜服退翳
散立効

詩曰

黑上浮雲如玉色

還因瘡疔後畱根

在施磨翳膏和散

拱手神醫無妙門

服藥治風兼去熱

還睛丸散是其因

燒香供養龍樹王

覓取來生清淨根

第三十五 因他患後生翳外障

此眼初患之時或卽赤爛漸生翳目侵睛蓋定
瞳人卽無所見醫者細看翳心若不赤黃猶見
光明宜令鈎割熨烙後點爛翳散服細辛散

詩曰

眼因他患後

漸漸失光明

初覺微生膜

經年翳厚成

遍通睛上黑

日久赤黃生

火燒銅筋烙

用意手輕輕

秘傳眼科龍木總論卷之三後

二十四肝虛積熱外障

瀉肝湯

黃芪

大黃

黃芩

知母

芒硝各一兩

桔梗一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

青箱子圓

青箱子

車前子

細辛

乾地黃

兔絲子

防風

菖蔚子

五味子

人參

澤瀉

茯苓各一兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

硃砂煎

龍腦

一分

乳香二分

硃砂

半兩

細辛

白芷

黃蓮

秦皮

各一兩

右爲末以水浸一復時去滓用汁以蜜五兩煎之

點眼

二十五傷寒熱病後患眼

熊膽圓

熊膽

一個

石決明

車前子

澤瀉

細辛 各一兩 乾地黄 芫蔚子 各二兩

黃牛膽 一個

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

生犀飲子

生犀角 桔梗 各二兩 羚羊角 人參

茯苓 黃芩 知母 防風 各一兩

右爲細末以水一盞散一錢煎至五分去粗溫服
瀉肝湯

石決明 川大黃 桔梗 車前子

芒硝 各一兩 羚羊角 防風 各兩半

右爲極細末以水一盞散一錢煎至五分去粗溫服之

二十六混睛內障

涼肝散

川木黃

桔梗

各半兩

黃芩

羚羊角

人參

茯苓

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫服

服

七寶膏

玳瑁

水晶

貝齒

各一兩

琥珀

石決明各分三空青

馬腦

龍腦各半兩

右爲末研令細勻水五升石器內煎至一升去粗煎至一盞入蜜半兩煎和爲膏每至夜卧時點之早晨不得點

退翳圓

白芷

細辛

五味子

枳殼

各一兩去

炒 穰楚

牡蠣

芫薺子

各二兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心米飲湯下十九
二十七猪肉侵睛外障

防風

黃芪

芫薺子

各二兩

桔梗

五味子

細辛

大黃各兩

右爲末以水一盞散五錢煎至五分食後去粗溫
溫服之

七寶膏

珍珠末

龍腦

熊膽各一分石決明

琥珀各三分水晶

龍齒各五錢

右搗碎爲末研令細勻水五升石器內煎至一升
去粗煎至一盞入蜜半兩和爲膏每至夜臥後點
之早晨不可點

二十八兩眼粘睛外障

弄風散

天麻

桔梗

防風

各三兩

烏龍

五味子

細辛

芍藥

乾薑

各二兩

右爲末空心食後米飲湯調下一錢

烏犀圓

烏犀

茯苓

芍藥

細辛

黑參

人參

各一兩

乾山藥

羌活

各二兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

二十九膜

水入

輪外障

退熱飲子

防風

黃芩

芫蔚子

桔梗

各二兩

大黃

黑參

五味子

細辛

右爲末以水

散一錢煎至五分食後去粗服

之

鎮心圓

石決明

人參

茯苓

大黃

各一兩

遠志

細辛

乾山藥

防風

各二兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

三十銜鬚根深外障

除熱飲子

黃芩

黑參

桔梗

知母

芒硝

各二兩

防風

大黃

芫蔚子

各一

兩

右爲末以水一盞

散一錢煎至五分

每日空心食

後去粗溫服

鎮心丸

遠志

人參

茯苓

栝子仁

細辛

各二兩

乾山藥

芫蔚子

車前子

右搗羅爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

三十一黑翳如珠外障

羚羊角飲子

羚羊角

五味子

細辛

大黃

知母

芒硝

各一兩

防風

二兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫服之

補腎圓

人參

茯苓

五味子

細辛

肉桂

桔梗

各一兩

山藥

栝子仁

各二兩

半兩

乾

一兩半

右搗羅爲末煉蜜爲

桐子大空心茶下十九

三十二花豨白陷

摩頂膏

子戲脂

牛酥

木香

各一兩

鹽花

一兩半

硃砂

龍腦

各一分

右搗羅爲末和成膏每日兩度摩之頂上立効

知母飲子

知母

芫蔚子

各一兩

防風

細辛

各一兩半

桔梗

大黃

茯苓

芒硝

各一兩半

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

溫服之

山藥圓

乾山藥二兩 人參 茯苓 五味子

細辛各一兩 乾地黃 防風各一兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

三十三水瓊巖深外障

竟蔚散

竟蔚子 防風各二 黑參 細辛

大黃 枳殼 知母 芒硝各一

芍藥一兩半

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

人參湯

人參

茯苓

五味子

桔梗

大黃

黑參

車前子

各一兩

黃芩

知母 各兩半

右爲細末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗

溫服

清涼散

馬牙硝

白礬

曾青 各一兩半

龍腦

青黛 各一分

右搗爲細末研令勻細爲妙每至臨臥時用散乾
點半字在眼內

三十四翳玉浮瞽外障

退翳散

石決明 大黃 細辛 黃芩

車前子各一兩 防風二兩 芍藥一兩半

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫
服

三十五因他患後生翳外障

爛翳散

硃砂

石決明

珍珠末

各半兩

曾青

礞砂

龍腦

各一分

右搗研細每至乾點眼內立効

細辛散

細辛

菟蔚子

各二兩

黑參

黃芩

桔梗

大黃

各一兩

車前子

一兩半

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

秘傳眼科龍木總論卷之三

秘傳眼科龍木總論卷之四前

第三十六逆順生翳外障

此眼初患之時皆因五臟虛勞風熱沖入肝膈之間漸漸生翳或後上生向下或從下生向上名曰逆順障亦用鈎割熨烙點膜去除暈膜然後宜服補勞人參丸知母飲子立効

詩曰

此眼眸有翳 逆順要須知 從下生為逆

名醫効亦遲 消停經日月 湯藥至還生

熨烙並鈎割 塗摩散却宜 下來生順翳

治法宜知之 勅速非同逆 忌省卽依依

第三十七難冠蜺肉外障

此眼初患之時皆因脾胃積熱肝臟受風漸漸
入眼致生翳膜如雞冠蜺肉其肉或青或赤此
疾宜令鈎割鑿洗熨烙然後宜服抽風湯除熱
芫蔚散卽瘥

詩曰

眼中生翳似雞冠 療者應須審出看

覩肉或青或赤黑 不嫌割烙始能痊
要除風熱憑湯散 須要會青點病源

若言根本未痊愈

志心多服决明丸

第三十八 臉生風粟外障

此眼初患之時皆肺臟壅毒大腸積熱肝家有
風致令眼臉皮肉上下有肉如粟粒相似唯多
淚出澁痛如米隱一般積久年深翳膜昏暗漸
漸加重此眼切宜三五度鎌洗出血去根本卽
瘥然後服除風湯退熱飲子

詩曰

澁痛多淚出 真如米隱睛 番看上下臉
粟子只頻生 赤白非言定 針挑更似冰

直須瘀血盡 涼藥必能徵

第三十九胞內膠凝外障

此眼初患之時皆因脾胃積熱腦內風冲入眼胞脰有肉初時小如麻米年多漸長大如桃李之狀摩隱瞳人爲翳裏邊宜令針出血然後鎌洗瘀血服細辛湯摩翳散効

詩曰

眼胞皮肉夾膠形 漸長如同梅李形

鍼破裏邊膿出後 還須服藥使光明

或因此患加風熱 淚出應當有翳生

按割理如風毒服

盡磨退散自相應

第四十漏睛膿出外障

此眼初患之時微有頭旋昏悶四體如勞五臟
多積風氣壅毒致令瘡出於眼中或流清涎皆
是腦無所作雖然不痛漸加昏暗切宜補治服
治風黃芪湯卽瘥

詩曰

眼目緣何患漏睛

熱和風在臉中停

昔頭結聚爲膿汁

或流涎水色粘青

雖然不痛無無累

漸攻瘡大豈心寧

黃芪象膽丸和散

眼安蘆薈作膏蒸

若也因緣經歲月

烏珠漸落始心驚

第四十一蟹睛疼痛外障

此眼初患忽然疼痛坐卧不得赤澁淚出怕目
羞明皆是肝臟伏熱膈中膽氣不足致令瞳人
突出如黑珠子又如桃李相似此是蟹睛眼也
急宜服藥不可針灸鉤割熨烙恐損眼也宜服
瀉肝湯補膽丸鎮腎决明丸立瘥

詩曰

忽然豆粒出烏珠

蟹眼因茲作號呼

此狀必因疼痛極

便明搶睛最難除

鉤膜針鍊皆其用

照諸疾藥敗須臾

只宜涼藥兼宜補

決明丸散大相宜

肝中熱退還消散

針灸塗摩總不須

第四十二突起睛高外障

此眼初患之時皆因疼痛發歇作時蓋是五臟
毒風所致令睛突出此疾不宜針灸鉤割只宜
服退熱桔梗飲子還睛丸若要平穩用針針破
流出膏汁卽得平復

詩曰

忽然疼痛便睛高

毒風五臟熱相遭

冷飲瀉肝令大洩

又吞左散漸須明

莫要中歸平穩處

針出青涎莫要挑

便突更針三五度

睛輪平復伙元朝

第四十三風牽睛偏外障

此眼初患之時皆因腎臟虛勞房事不節脾胃
壅毒夜臥多涎肝氣不足致使不覺中風口眼
喎斜臉中赤痒時時翳之牽動宜令火針出痰
又針睛明穴若有努肉卽依法鉤割熨烙若無
努肉不宜鉤割只服羚羊角飲子用摩風膏摩

之

詩曰

偏風牽動日斜囁

淚出還應不奈何

湯飲去除風毒了

摩風膏與且摩塗

若除努肉休鉤割

有卽應當用亦佳

求泣清明須是穴

風牽臉動莫針他

第四十四倒睫摩外障

此眼初患之時皆因肝家受熱膈內風虛眼多
淚出或痒或疼乍好乍惡以手揩摩致令睫毛
倒拳刺隱瞳人移澁睛上白膜遮睛不宜鎌洗

出血熨烙切恐眼皮漸小急開合稍難然後宜
服細辛散補腎丸立効

詩曰

若因風赤淚消消

翳膜消生碧漸瞞

乍好乍惡多年後

眼皮急小欲開難

倒睫拳攣如刺礮

摩應瞳人豈可安

醫者去毛根永斷

太陽針血最爲先

湯藥入除風與熱

按鎌敷敷點朱煎

第四十五風牽驗出外障

此眼初患之時乍好乍惡發歇無時多因淚三

不止蓋因胃氣受風肝膈積熱蘊毒在臉背致
便眼皮翻出切宜鎌洗散去瘀血熨烙三五度
然後服黃芪湯煎摩風膏摩之臉內塗白臉膏
卽瘥

詩曰

一般風熱入雙眸 此眼緣何患異殊

脾臟毒風翻出臉 腎因傳送入爲珠

若是臉翻還易療 毒風入黑卽難除

銅篦輕摩風藥 白欬爲膏臉內塗

第四十六神頰疼痛外障

此眼初患之時舊無根基忽然發動疼痛如針
刺臉皮亦如火炙此疾不可忍且求神頰氣風
服藥補治臟腑不得鈎割熨烙針灸不爾恐生
翳障宜服羚羊角飲子點秦皮煎効

詩曰

舊沒根基忽患生

疼痛如針刺不安

並如火炙來相近

求他神頰不虛言

痛定須還湯藥治

莫教風熱更相連

不須熨烙並燒灸

點去秦皮作散煎

第四十七 睫頰摩起外障

此眼初患之時忽然疼痛作時由熱積毒毒
在肺間切宜補治恐損眼也宜服搜風瀉肝
飲子宣腸立効

詩曰

眼前生障翳 尖起似旋螺 治望難依舊

根深更奈何 時時疼痛發 風起未消磨

湯藥勤爲服 宣通肺腑多 治求丸散解

痛定卽從他 是瘳不相應 睛高或陷窪

第四十八鵲眼凝睛外障

此眼初患之時忽然疼痛淚出五臟眼起皆硬

難以回轉不辨人物切宜針引血脈以摩風膏
摩之此疾皆因五臟熱壅冲上腦中風熱入眼
所使宜服瀉肝湯抽風散立効

詩曰

五輪目硬轉回難

鵝眼凝睛是本形

欲知根深何處起

腦中風熱臟中蒸

先將針風引風壅

藥壓塗摩血脈行

員損只宜從向洩

除噴戒行即平平

第四十九 轆轤轉開外障

此眼初患之時皆因膈中壅毒肝臟熱極風毒

八腦致令眼吊起睛瞳難以回轉不辨人物存
在胎中患者乃不可治若初患之時急須治療
宜服天門冬飲子瀉肝散

詩曰

上臉載中下臉藏

則還不肯定中央

轉開恰似轉轉轉

聖者留言難改張

病即雖云醫不得

徒教學者用形彰

堪嗟永處幽冥地

不識青黃坐久常

第五十偶被物撞破外障

此眼初患之時忽然被物誤有打撞眼胞青珠

疼痛惡腫難開宜令鎌洗出血後以爛搗地黃
綿裹封眼然後宜服除風散壓熱飲子

哥曰

非理因遭撞破傷

不任疼痛堪乖張

瞳人被振全昏濁

惡血仍流在眼眶

欲療只須鎌臉血

地黃綿裹密封翳

除風壓熱涼湯飲

免使他風作禍殃

秘傳眼科龍木總論卷之四後

三十六逆順生翳外障

補勞人參圓

人參

茯苓

桔梗

乾地黃

防風

木香

桂心

乾山藥

細辛各一兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

知母飲子

知母

芫薺子

車前子

各二兩

黃芩

桔梗

大黃

五味子

一兩

兩
右爲末以水一鍾散一錢煎至五分食後去杞溫
服

三十七雞冠覘肉外障

抽風湯

防風二兩

大黃

細辛 桔梗各一

黑參

黃芩

芒硝 車前子各

兩
右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫
服

芫薺圓

芫薺子

人參

乾山藥各二兩

茯苓

石決明

大黃

黑參

黃芩

各一兩

乾地黃

一兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

三十八臉生風粟外障

除風湯

防風

犀角

大黃

知母

黃芩

黑參

桔梗

羚羊角

兩右爲末以水一盞散一錢煎至五分空心去粗溫

服

退熱飲子

芫藶子

知母

大黃

茯苓

五味子

人參

芒硝

各一兩
車前子

半
右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

三十胞內膠凝外障

細辛湯

細辛

人參

茯苓

車前子

五味子

黑參

防風

地骨皮

半
右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

摩翳散

龍腦

麝香

水晶

各一兩

珍珠末

琥珀 各一兩分

右搗羅爲末令細至夜後點散眼內立效

四十漏睛膿出外障

治風黃芪湯

黃芪

一兩半

防風

遠志

地骨皮

人參

茯苓

大黃

各一兩

知母二兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分去粗溫服

四十一 雙睛疼痛外障

瀉肝湯

黑參

地骨皮

車前子

芒硝

各一兩

大黃

知母

各一兩半

葶藶子

二兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分去粗空心溫服之

補膽圓

防風

細辛

各一兩半

遠志

黃芩

人參

茯苓

桔梗

芍藥

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

鎮腎決明圓

石決明

鬼絲子

五味子各一兩

細辛

乾山藥

乾地黃

知母

各一兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

四十二突起睛高外障

退熱桔梗飲子

桔梗

芫蔚子

大黃

墨參

芍藥

防風

黃芩

芒硝

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

遠睛圓

遠志

芫蔚子

防風

人參

乾山藥

五味子

茯苓

細辛

各一兩

車前子

一兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

四十三風牽咽偏外障

羚羊角飲子

羚羊角

知母

人參

五味子

茯苓

各一兩

黃芪

防風

芫蔚子

各一兩

兩右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗濕

二服

摩風膏

木香

當歸

白芷

黑附子

細辛

蒼朮

防風

骨碎補各

兩
烏頭

芍藥

肉桂

各兩

猪脂半觔

牛酥

鰵脂

各四兩

右爲末以麻油半觔浸藥末一宿一日以文武火

煎如膏爲度

四十四倒睫拳纒外障

細辛湯

細辛

防風

知母

芫薺子各

兩黑參

桔梗

大黃

牾羊角各一

兩右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫服之

補腎圓

五味子

人參

澤瀉

乾山藥

車前子

茯苓

細辛

黃芩各一兩

乾地黃三分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服十九空心茶清

下

四十五風牽臉出外障

黃芪湯

黃芪

芫薺子

各二兩

防風

半兩

地骨皮

茯苓

川大黃

人參

黃芩

各一兩

甘草

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗濕

服

白欬膏

白欬

白芨

白芷

各一兩

突厥子

半兩

右爲細末用牛酥五兩煎爲膏早晨塗在眼睛內

夜半塗亦得

四十六神藥疼痛外障

羚羊角飲子

羚羊角

二兩

人參

茯苓

大黃

天門冬

黑參

黃芩

車前子

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫服

秦皮煎

秦皮

黃芪

木香

黃連

黑參

各一兩

右爲末以水一盞浸藥二宿去粗入蜜四兩煎成

膏用之

四十七旋螺尖起外障

瀉腦湯

防風

五味子

大黃

天門冬

桔梗

芍藥

細辛

各兩半

菟蔚子二兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫
溫服之

瀉肝飲子

大黃

細辛

芒硝

車前子

黃芩

桔梗

知母

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫
溫服之

四十八鵲眼凝睛外障

瀉腦湯

防風

大黃

芫薺子

黃芩

黑參

桔梗

芒硝

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫
溫服之

抽風散

石決明

茯苓

車前子

五味子

人參

細辛

知母

各一兩半

右搗羅爲末食後米飲湯調下一錢七分

摩風散

黃耆

細辛

當歸

杏仁

各一兩

白芷

一兩半

防風

松脂

黃蠟

各二兩

小麻油

四兩

右搗羅爲末煎成膏塗之

四十九轉轉開外障

天門冬飲子

天門冬

芫薺子

知母

各一兩

防風

五味子

各一兩

茯苓

人參

羌活

各二兩

右爲末以水二盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

瀉肝湯

天門冬

一兩

大黃

黃芩

細辛

芒硝

各一兩

黑參

桔梗

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗溫

服

五十偶被物撞破外障

除風散

防風二兩

車前子

膏本

細辛

芎藭

五味子

桔梗

各一兩半

右搗羅爲末用陳米飲湯空心調下一錢七分

似熟飲子

犀角

大黃

知母

人參

茯苓

黃芩

黑參

麥門冬

甘草

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去根溫

服

秘傳眼科龍木總卷之四後

秘傳眼科龍木總論卷之五前

第五十一 撞刺生翳外障

此眼初患之時因被物撞刺着治療不盡有餘
痕積血在臉背之中致使生翳如此病狀不宜
鈎割熨烙切須將息大忌滿慾噴怒宜服人參
湯退熱芫蔚子散

詩曰

若有撞刺翳主根 治療不盡有餘痕
待他疼定瘡徒治 勸君將息忌滿噴
覺熱便須將藥壓 莫使增加風熱侵

若然此翳鉤除得
知君不是解醫人

第五十二血灌瞳人外障

此眼初患之時忽被物誤刺着針或卽之夫度
致令一眼先患後乃相牽俱損蓋爲疼痛難忍
臥時好眼安著枕上便流毒血在好眼中致使
損傷先宜服止疼痛藥散後服墜血明目丸
點摩摩石散立效

詩曰

眼因射刺五輪虧
疼痛眶中若受錐

好眼臥時安著枕
便流惡血隔光輝

可憐清淨無瑕翳

沉沒明珠甚可危

須用摩摩爲點藥

却教惡血本鄉歸

第五十三 眯目飛塵外障

此眼初患之時皆因風吹塵物入眼貼臉皮粘
定睛上疼痛隱澁難開不辨人物欲治之時須
翻眼皮用綿裹針撥出眯物宜服藥時息忌口
若有翳膜急服退翳中前散補肝丸

詩曰

眯目請般物 飛塵并澁來 貼睛粘定後

疼癢隱難開 綿裹針撥出 尋睛目暢懷

因茲生翳膜 好藥却能回

第五十四天水行後赤眼外障

此眼初患之時忽然赤腫淚出若有患者或輕或重遺從一眼先患後乃相牽俱損切宜鎌洗去瘀血後宜服瀉肝湯用洗眼湯點龍腦煎卽効

詩曰

忽然赤寒腫相并 天行赤眼是爲各

腐竹熱氣相傳染 躰性隨人有重輕

瀉肝湯飲應酒服 臉中鎌血更星星

秦皮湯洗吞丸藥

不瘥經年玉醫生

忌毒也須將息治

不須鈞恪恐傷睛

若將疳藥強爲點

損敗神光實可驚

醫療之門何最穩

多食涼藥得平平

些些翳膜得消散

善哉之自見微

第五十五暴赤眼後急生翳外障

此眼初患之時忽然白睛赤腫淚出或痒或痛

皆是肝心壅毒在胸膈之間更相擊發蔽氣上

冲致使如此切宜鑱洗出血後飲蘆根飲子鎮

肝丸立効

詩曰

忽然暴患白睛紅

輕者無妨重者寒

疔是肝心二臟熱

更須擊發其相攻

盧根飲子須通洩

莫違他時更復縱

丸散餌肝吞半劑

如斯治療有神功

第五十六胎風赤爛外障

此眼初患之時皆因生後乳母多食濕麪酒醋

鹽毒之物致令小兒雙目盡赤時掩以背赤爛

辨曰胎風後長成十五以來切宜鹹洗出血服

黃芪飲子點禁仁膏即愈

詩曰

襖裸雙眸皆盡紅

醫人欲識號胎風

嬰兒乳母吞諸熱

潛入初干五臟中

痒發手揉能禁制

外風因便得侵中

良醫先用通丸散

次用麩仁眶內攻

服藥臨時隨冷熱

披鎌瘀血斷根踪

不然久後爲何狀

倒睫拳毛一世中

第五十七風赤瘡瘻外障

此眼初患之時或卽痒痛作時發歇不定或出
多淚遂合臉內瘡出四眦如硃砂色相似然後

漸生膜翳障閉瞳人蓋是脾臟毒風卽熱膈中
致令眼病不宜點藥灸着頭面恐傷眼也宜服
瀉肝湯墜膈丸立効

詩曰

風赤生於脾臟家

瘡生面臉似硃砂

烏珠潔淨未爲事

兩年還有翳來遮

輕翳點除權得差

欲飲鉤鎌知者誇

若把灸燒來退却

欲除根本路程賒

第五十八冲風淚出外障

此眼初患之時蓋因毒風入眼遂乃淚出拭却

還生冬月卽多夏月卽少後至三五年間不分
冬夏皆有淚出此疾蓋謂淚堂通肺臟中久次
便令眼目轉加昏暗難辨物色如此疾狀宜服
細辛丸暖肺湯以銅筋燒烙睛明穴點止淚散
乃得痊効

詩曰

風冲淚出血還流

每到三冬法不休

傾側淚堂通肺臟

細辛丸散斷根由

雄黃五味迎風點

銅筋灸燒烙皆頭

蚤蚤勸君醫治却

他時免得一生憂

第五十九暴風客熱外障

此眼初患之時忽然白睛脹起都覆烏睛紅腫
人或痒或痛淚出難開此是暴風客熱久在肺
臟上冲肝膈致令眼內浮脹白睛不辨人物此
疾宜服瀉肺湯補肝散披鎌出血後點抽風散
卽瘥

詩曰

白睛脹起蓋烏睛

臉腫還應痒痛生

此是暴風兼客熱

來侵肺臟不安寧

瀉湯之內加風藥

丸散臨時得妙名

披鎌瘕血應須盡

抽風膏藥眼中烹

第六十驗硬睛疼外障

此眼初患之時胞眼赤脹腫硬雖開淚出疼痛
還從一眼先患後乃相牽俱損漸生翳膜昏暗
皆是膈中積肝臟風火上冲入眼宜令鎌洗去
瘀血後服瀉肝散熒腫膏宜謹諸事

哥曰

驗中紅腫睛酸疼

肝膈丸來熱生冲

腮腫塗膏兼服藥

輕輕鎌洗斷其踪

無令發歇生浮翳

此後尋醫在費工

省謹若能三五日

人間諸事却通容

第六十一眼痛如針刺外障

此眼初患之時微有頭痛目眩眼系常急夜卧
流痛淚出難開時時如針刺外障相似是心曠
伏毒熱氣塞在膈中以後漸生障翳遮睛相牽
如此疾狀宜服瀉心湯後服補肝散兼洗出
血火針太陽穴立効

詩曰

忽然睛內痛如針

熱毒潛藏伏在心

使雙眸兼系急

日昫急則痛侵侵

夫陽陽白翳針刺

湯飲宜通宜洗淋

隱澁難開由臉內

披鎌出血卽能禁

第六十二眼痒極難忍外障

此眼初患之時忽然痒極難忍此乃肝臟有風
膽家壅熱冲上所使切宜鎌洗出瘀血火針針
陽白火陽二穴後服烏蛇湯補騰丸還睛散卽
瘥

詩曰

時時晴痒極難忍

此病根由誰與尋

瞳子氣連清淨府

遭他風熱上來侵

也須陽白將針刺

湯用烏蛇病自輕

此目不忘丸與散

教君去却病根深

秘傳眼科龍木總論卷之五後

五十一撞刺生翳外障

人參湯

人參

二兩

茯苓

黃芩

五味子

黑參

羌活

細辛

各一兩

車前子

半兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗

溫服

退熱芎藭散

芎藭子

二兩

防風

芎藭

桔梗

人參

知母

各一兩

石膏

五分

白芷

三分

右搗羅爲末每日米湯調下一錢

五十二血灌瞳人外障

止疼痛沒藥散

沒藥二兩 麒麟竭一兩 大黃一兩 芒硝一兩

右搗羅爲末令細食後熱茶調下一錢

墜血明目丸

石決明 芫薺 知母 乾山藥

五味子 各一兩 人參 各一兩半

右搗羅爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十

丸

摩挲石散

摩挲石

少許曾青

龍腦

石膽

各一分

右搗羅爲末令細早晨夜後點眼立効
五十三昧目飛塵外障

車前散

車前子

五味子

芍藥

各一兩半

細辛

黑參

茯苓

人參

大黃

桔梗

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗

温服

補肝丸

澤瀉

菖蒲

各半

人參

茯苓

乾山藥

遠志

防風

知母

乾地黄

各二兩

若爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

五十四天行後赤眼外障

瀉肝散

知母

黃芩

桔梗

各一兩半

大黃

黑參

羌活

細辛

芫薺子

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗

溫服之

淨眼方

秦皮

甘草

細辛

黃芩

各一兩

防風

一兩半

右搗羅爲末以水一盞散三錢煎至一盞半熱
洗一日兩度用之立効

龍腦煎

龍腦

一分

秦皮

防風

細辛

甘草

宣黃連

各一兩半

右搗羅爲末以水一大碗浸藥末三日三夜用

銀鈔子煎至七分已束綿濾去粗又入蜜四兩
煎至五七沸入磁瓶子內盛勿令泄氣每用點
眼立効

五十五暴赤眼後急生翳外障

盧根飲子

蘆根

大黃

防風

黃芪

芒硝

各一

黃芩

黑參

各一兩半

右搗羅爲末以水一盞散一錢煎至五分食後
去粗溫服

鎮肝丸

羌活

石決明各二兩

蒼朮一兩半

乾山藥

細辛

五味子

茯苓

車前子

人參各一兩

右搗羅爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十丸

五十六胎風赤爛外障

黃芪飲子

黃芪

三兩

車前子

細辛

黃芩

五味子

各一兩

防風

一兩半

右搗爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去

相溫服

雞仁膏

雞仁 五錢 石膽

黃蠟

小麻油

膩粉 各少許

右搗研令細如粉爲妙後入油蠟子磁碗內煨
火煎成膏點眼

五十七風赤瘡癩外障

瀉脾湯

人參

黃芩

茯苓

大黃

桔

芒硝各一兩

黑參

兩 麝子二兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗
溫溫服之

墜膈丸

五味子 乾山藥 知母 澤瀉

車前子 石決明 各一兩 防風 一兩半

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心茶下十九

暖肺湯

芫薺子 細辛 五味子 乾地黃 各一兩半

薺本 各一兩半 知母 黃芩 芎藭 各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗

溫服

點眼止淚散

雄黃

錢五

曾青

一兩

龍腦

白礬灰

細辛

乾薑灰

各等分

右搗羅爲末令十分細如粉麪每至夜後點在
眼內立効

五十九暴風客熱外障

瀉肺湯

羌活

黃芩

黑參

各一兩

桔梗

大黃

芒硝

地骨皮

各一兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去相
温服

補肝散

膏本

二兩

白芷

車前子

石決明

各一兩

芍藥

天麻

防風

細辛

各一兩

右爲末每日空心米湯調下一錢

抽風煎

黃蘗

秦皮

秦艸

防風

細辛

各一兩

黃連

木香

各五錢

右爲末以水一盞浸一宿去粗入龍腦少許家

四兩同煎爲膏點眼

六十臉硬睛疼外障

馮膈散

大黃

知母

芒硝

車前子

芫蔚子

黃芩

天冬

各一兩半 黑參 一兩半

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去

溫服

湯腫膏

代赭石

黃蠟

各半兩

細磁末

麻油

一兩

膩粉

少許

黃栢

一兩

右爲末於鈿子內入油蠟同煎爲膏塗臙上
六十一眼痛如針刺外障

瀉心湯

大黃

黃芩

桔梗

知母各一兩

馬兜鈴

黑參

各一兩

防風

二兩

右爲末以水一盞散一錢煎至五分食後去粗

溫服

補肝散

人參

茯苓

五味子

芎藭

瞿本

各一兩

茅蔚子

細辛

各一兩

半

右爲末每日空心米湯調下一錢

六十二眼痒極難忍外障

烏蛇湯

烏蛇

膏本

防風

芍藥

羌活各兩

芎藭

細辛

各半兩

右爲末每日食後米湯調下一錢

還睛散

沙風

一兩

車前子

黑參

石決明

五味子

細辛

各一兩

知母

五錢

右爲末每日食後米湯調下一錢

馬兜鈴丸

馬兜鈴

紫胡

茯苓 各一兩
黑參

桔梗

細辛 各一兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每日空心茶下十丸

秘傳眼科龍木總論卷之五