

種痘新書

種痘新書卷之四

寧邑張 琰遜玉氏編輯

受業曾衡波仝參

調理法三條

夫痘所由于五臟而必達于皮膚一遇風寒穢氣則退縮而歸臟腑或誤服阻滯之物則毒留而不外升故小兒出痘當發熱之時即宜置之淨室謹避風寒厭穢節飲食調理得宜則逆變順而重轉輕否則輕變重而順轉逆矣為父母者可不慎乎
一冬月宜避風寒必須置于密室令其溫暖然衣破亦不宜太厚炭火亦不宜太熱恐煩熱之氣反助以邪而包裹太厚則

毒氣難洩又不可不知也。若夏月宜取清涼亦不可置風中。併或對之動扇恐睽理開張扇風一入卽能閉毒不可不慎也。

一 小兒初熱則勿對行房。勿對梳頭。勿對洗浴。勿對濯足。勿對搔痒。勿大驚小怪。無故呵叱。凡行經女子。坐蓐婦人。切不可近。或至郊野積汗流背。身軀污穢。亦不可近。禁忌生人往來。禁忌師巫邪說。禁忌腥膻臭穢之氣。禁忌蛇蟲污穢之物。至于猪大牛羊。俱能帶厭魚蝦之類。腥氣難聞。厭污不能枚舉。凡遇不潔之物。總當屏此。切莫與近。

一 初熱之時。毒火方張。凡荔枝龍眼。榴餅冰糖。一切辛熱之物。

俱能助火不可與食且難助肝火魚則生痰猪肉滯氣而滯
利麥粉積滯而生膨生冷恐其冰毒而又慮其不化故凡寒
熱積滯以及冰冷之物總宜戒之只宜吃素不可用葷若至
八九日後則辛熱補物方可漸進至是寒涼之類又宜禁矣

小兒進藥法

小兒多不肯服藥強之亦不能多進然病熱重者非藥力又不
能驅逐况痘症限時尅日當清則宜急清當補則要速補用藥
斷不可緩也故藥宜重劑濃煎止用頭服則藥雖少進亦有力
矣

乳母脹藥

凡兒小不能服藥須隨症立方加以引乳之藥用大劑令乳母服之其乳汁自有藥力此以母代子而進藥也

天門看痘法

凡小兒不能言語又無脈之可憑醫者在視當以望顏色審聲音問其飲食二便潮熱若何方可辨症下藥一到其家勿先飲酒須先淨手安坐寧其精神定其心志然後呼病者於明亮之處定睛先看其精神精神清爽者無事神昏目閉者非元虛則毒閉也再看其面部唇舌兩頰及目紅赤而眼有淚漿唇紅紫舌有白黃苔者熱重毒猛唇舌黑者不治面青者有風唇淡舌無苔者毒輕熱大者毒重熱緩者毒輕言語飲食二便如常者

吉。又看耳後筋紋。淡紅色者吉。紫色者重。青黑筋紋者凶。又須看均直上耳尖而無分枝者吉。若分枝纏繞或橫過髮際者凶。又耳上屬脾。執者重。原者輕。耳下屬腎。涼者重。熱者輕。又耳蒼黑者腎熱。黑色從太陽繞耳者死。眼內黑珠起浮油者吉。神光不明。珠色轉綠或赤者危。瞳子不明。烏珠不亮者死。目翻白者凶。鼻青玉吐乳。鼻有黑氣者死。鼻寒流涕者傷寒。鼻燥氣粗者。母甚。鼻尖紅直上印堂者。心經執盛。肛門如竹筒者死。魚目魚口。青遮口角。黑掩太陽者死。

痘疹傷寒辨

痘疹發熱之初。大抵與傷寒相似。但傷寒從表入裏。只見一經。

之症痘疹從裏達表而五臟之症俱見如呵欠煩悶肝症也
寒在執手足稍冷多睡倦臥脾症也而赤總紅咳嗽喘逆肺症
也。熱冷耳涼腎症也。常形驚悸心症也。又觀心窩有紅色耳後
有紅紋或身熱而腹尤熱惟中指稍獨冷男左女右脈從底強眼有
淚影是痘疹也已上五臟之症獨見多者必至其臟之毒死甚
治者又宜知也

將擦照法

痘初潮熱二三日尚在疑似之間將草紙作擦子飽蘸清油乃
于燈上往來熾熏令勿爆炸將病者房中牖門緊閉令其黑黯
乃點燃子照之須以手執擦一手用掌抵其火光觀兩顧宜以

擦子在耳邊及鼻邊平照觀中庭且以擦子在兩眼角平照則
痘疹之在皮膚中皆磨歷而可指矣但麻疹則浮于皮外而肉
內無根痘疹則從肉底而出其根脚甚深此又所當辨也

痘症日期

凡痘三日發熱三日出齊三日起脹三日收靨蓋五
三一十五日爲正期也惟有出齊起脹六日吉皆定于此最
爲緊要切莫忽畧症之輕者不拘常數或十二三日亦皆收靨
症之重者則出于常數之外或至二十餘日而後乃全靨也但
痘色明潤根脚紅活二便如常又無雜症卽遲數日亦無妨說
有當出不出當起不起當靨不靨者須詳察之或爲元氣虛弱

不能運行則宜補其氣。或爲雜症攻剝不能貫通則速去其雜症。又六日以前毒未發盡有雜症者常也。六日以後毒皆盡出而雜症亦當除矣。當除而不除者逆也。須急治之。

痘症傳變

痘發自腎而傳肝傳脾傳心傳肺皆自內而出外也。故痘發一
二日自腎髓而出于肝筋。氣血充足者盡透于筋而不少留于
髓。二三日盡出于肌肉而不少留于筋。三四日盡出于血脈而
不少留于肌肉。四五日盡出于皮毛而不少留于血脈。五六日
盡出于瘡疹而不少留于皮毛。八九日膿水漸乾。十日而結痂
矣。十一二日落痂而骸光澤矣。若初出于筋而少留于髓則種

身壯熱口乾。問亂雖出于肌肉而少留于筋。則陰氣強。熱潮熱。雖出于血脈而少留于肌。則痘不圓肥。雖出瘡疹而少留于皮毛。則痲遲落而多痲癩。此痘傳五臟之說也。痘疹將出五臟皆有病症。惟腎無留邪者。吉。若初熱便作腰痠。而見黑點者。必死。蓋毒氣壅盛。一發端而腎收。卽絕其毒。安能發越乎。

治痘總訣

夫遠本臟中之毒。非猶外染之瘡。故諸瘡雖烈。而外染之症。終不至傷臟腑。痘毒雖微。倘內攻不出。頃刻立妖。治之可不慎乎。其發熱之初。內毒已動。而欲出外。慮其寒邪壅閉。腠理緊。秘毒氣難宣。治之之法。宜開提發。散解毒。鬆肌。此時毒火方張。敢忌

驟投辛熱以致助毒爲虐。故桂附于姜諸品戒之。萬勿亂投。當此毒邪欲出。尤忌藥中滯補。以致毒不能宣。故滋水熟地諸藥。慎之。切莫輕試。懼發驚宜利小便。慮不出善用湯提。嘔吐多是毒攻胃管待痘出而吐。自平勿驟用砂香而止寒。唯面青唇白虛寒可據。然後相投和胃之劑。泄瀉多是毒氣奔越。宜用加味四苓內分清濁。以導毒于膀胱。後毒盡而瀉自止。凡柯朮粟壳切勿妄施。以滯毒氣。惟利清糞白神方。用參苓豆蔻以固其脾。若或寒戰咬牙。此際恐爲實熱。而滯胃解肺。其症立平。設或頻頻腹痛。此內毒作痛。須以解毒爲良。若是痛叫太甚。則寒邪積胃。當以平胃爲佳。在腰痛最爲不吉。速剖生雞以散之。

膿或發搐不要驚慌與益元加以鎮驚天發熱固宜發散尤宜
發表太過而表虛必成潰爛痘前雖要清解尤慮清之太甚而
裏虛後癍灰白故治之于始而必慮之于終不可以不慎也既
詳發熱須論見標未熱先數恐爲疔賊之標見之急宜驅破坎
離報點必爲不順之兆方出速用燈燒一日放標者死二日見
點者凶必三四日而後見點者乃吉也且標香粗肥而嫌瑣屑
粗肥則必稀瑣屑則痘密一齊湧出定作南河一片紅腫必歸
陰府膏疔若見魂歸鬼錄焦紫遍身魄赴黃泉二便出血須知
莫救痰鳴腹脹總是難醫三五成群如梅瓣後日必成水泡皮
間隱躍似紅萍此際便知不起點如黍種十死一生形同蚊咬

良醫難治出齊熱退乃爲吉兆若痘齊猶熱急與解毒之劑而
生旁連喬是其聖藥界地不清速解血分之毒而行荏紫草可
謂良方清毒活血之藥此際不容少緩以爲瀉膿之計蓋毒不
清則必焦而不活則必紫焦紫之痕安能起脹而升漿乎但毒
不可以盡解過於解毒其漿必清熱不可以盡除身無微熱其
膿不成故一至地清色潤而清涼在所必屏以顧成漿之地倘
至七八日後則臟腑空虛候當用補而清解之藥敢復試乎故
治痘之法六日以前不敢溫補七日以後不敢清涼若到七八
日間總以安裏爲本而大扶元氣使氣血壯盛乃能送毒升漿
此內托之藥所以不敢缺也但漲水之時忌其洩瀉而膀胱利

水之剗切不可用。又忌土燥制水而助脾乾。液之藥不可燥。觀痘之形。畏頂平而脚濶。然脚濶由于血散。治當斂血爲主。頂平必是氣虧。法以補氣爲先。迨水足而漿尤清。則補益中須加白朮。縱或身執白渴。此時定作虛。看况作漿。定然身執痂。結乃自退。潮卽有謔語。狂言補血寧心。自定。若或咬牙寒戰。理中桂附無疑。然痘之生死。絢着膿漿有無。有漿則生。無漿則死。至于收靨。須從鼻準地角先收。則腎竭。天癍先靨。則心焦。聲啞痰鳴。死期已至。一時齊靨。頃刻立亡。遍身痂皮如竹紙。收齊亦當長逝。面部手足盡無痂。不久定返泉鄉。漿清痂薄。必留餘毒。壞壞痂厚。變症終無餘毒。蒸熱扶元。而兼化毒。冒風潮熱發表。而且

濕中執瀉能消餘毒不必驟止盜汗乃是表虛宜固表肌手足拘攣是血氣之不足眼目羞明乃餘毒之傷睛爲疳爲癩毒內貴調元爲疳爲疥雖內解亦兼外敷變症雖多因人調治虛實得宜自無不效

初執辨症賦

初發悠悠身執尤宜氣息和平二便如常面容不改兼之精離清爽雖臥安寧便見症來順候肌色青而皓白精神少而倦怠此症當作虛看痘出決然不振再見晁乳便溏只宜補益爲先若執盛氣粗煩燥不寧譫語狂言面紅眼赤均爲內執如加喘滿腹膨脹便秘須知執壅肌膚燥而毛色焦口氣乾指身燥灼

此則蓄熱過內症。因重而外症尤烈。腹脹口張而喘。脈不絕而嘔嘔五竅不通。須防矢血點來。隱隱出。忽復顛吐乳更兼搭眼而青。又見搖頭狂語。忽生發驚。先兆是故。熱盛者宜清涼發散。不宜峻用苦寒發散。則毒得外出而熱自解。若寒則毒反冰伏。而出愈難。故發散之劑。輕則如升麻乾葛以疏其熱。而煩燥壯熱者。非此何以定其標。重則麻黃羌活以開其壅。而喘急腹脹者。非此何以救其危。未萌先泄。有熱症莫作虛看。無熱症定為虛論。止泄瀉以清涼。重加發散。治虛瀉以溫補。仍用開提。是以內虛誤用寒涼。不特助伊作泄。實熱而投補劑。尤恐勃增煩劇。安靜而能食。勿謂便秘而可下。泄瀉而煩渴。莫言熱。

症而投涼宜毒雖貴開提恐發表太過有傷真元之氣初執雖當清利但恐清利太甚以致臟腑之寒慮始慮終方爲妙用顧首顧尾乃是良方

〔初熱三日調治法〕

初熱一日病症未見姑稍待之不必服藥至第二日宜以蘇解丸量覓大小與服必使其身有微汗則勝理開通乃不閉毒兒若體性怯者用蘇解丸兼于金丸一匙與服此補中帶散爲體怯元虧者計也若至第三日身熱燎人舌有黃苔則其毒必盛此非丸散之力可退其毒急用和中散毒或清解毒連進重劑水藥數服以解其毒不可鬆乎蓋毒之盛者非輕

藥必不能解於此之際若延觀望不急解藥則必出
而錯理香檀之禍至矣

凡痘初熱之時毒之輕重症之吉凶皆兆於此蓋熱之微者毒
必輕而痘必稀吉之兆也熱之甚者毒必盛而痘必密凶之
機也此必然之理醫者宜預知之如身熱和平時熱時退神
清氣爽飲食如常大便稠黃小便清利並無雜症者吉若
而後見痘者皆蓋毒從心經過也 又初熱時或吐或瀉不
可驟止蓋吐者邪從上解瀉者毒自下奔因吐瀉發越而毒
乃輕是順症也若驟以止之是閉門盜其輕者反變重矣
况毒氣奔越之吐瀉候痘出後則勿藥亦自止矣又何必施

治乎凡不必施治之際而強治為正恐復增他症也故但戒
葷酒禁風寒者干調護而已若增寒壯熱咳嗽流涕多因外
感入寒也恐毒為風寒所閉不可不為之發表但體性壯旺
者用加減升麻湯

加減升麻湯

升麻 錢 防風 六分 桔梗 川芎 陳皮 各五分 牛蒡 連翹 各

四分 山查 柴胡 各八分 蠟退 四分 赤芍 六分 甘草 三分 木通 五分

體性怯弱者古人用參蘇飲但今世人參耨重人多不肯用
參茸方無參而復用之豈不反誤入乎愚謂且用

扶元宣解湯

生芪

當歸各

升麻

柴胡

各八分

桔梗

陳皮各

分

生旁

山查

各七分

甘草

三分

木通

五分

防風

五分

如頭痛則加薄荷

藳朮

白芷

如咳嗽則加半夏

炒

芩

如腹痛則加厚朴

香付

木香

總于二方之中看症加減不可執一服藥之後既經發汗見聲
安靜身熱稍緩則勿峻攻姑稍待之看其症出如何另施方者
蓋既汗則不可再發恐表虛而後難收拾也 若既用二方依
然大熱蒸然眼紅唇紫舌有黃甚口中氣臭狂言譫語二便不
通惡風惡寒噤齒咬牙腹中隱隱作痛者必毒氣壅盛急宜解
毒為三須用

解毒湯

連喬

生芍

各一錢

皂莢

木通

各六分

防風

桔梗

各五分

紫背

七分

川芎

升麻

虫退

黃芩

黃連

各四分

前胡

一錢

麥冬

八分

甘草

三分

右方喬芎等連解毒除煩只結防木疏風開竅芎升虫退連氣上升清毒之方甚良于此服之覺煩悶少解則止俟痘出而中自安而熱亦漸退云蓋熱以發痘痘未出其熱終不退也若服此仍煩燥不安症不稍減則毒氣壅盛之甚非一服而可清也須連進數劑其毒乃闕但有等愚人不知辨症只以平日而論見覺用涼藥則曰吾兒素弱不敢用涼致見醫

用補藥則曰吾見性熱不敢用補孰知寇來將抵藥進病益
宜清宜補俱因其症豈可以平日無病之時而論乎學者須
宜對症用藥切不可聽主家之言以阻其應用之方也至于
藥之可止不可止方之宜更不必更証看其病勢何如耳

初熱時煩渴腮紅唇乾紫口氣臭氣粗悶亂舌有黃苔眼有
淚漿二便黃赤而不清利狂語咬牙口中常如食物身熱
如熨斗而脈浮數者此俱熱症且眼目眇睛手足牽引肝經
有風咳嗽喘急痰壅失音肺經有熱驚悸妄言心經熱痰腹
中叫痛腸胃積邪傷寒則惡寒傷風則畏風俱宜發散清熱
因各經而投藥餌不可誤用補劑俱宜用上清毒湯看各經

之症而加各經主藥如肺熱宜用黃芩肝風宜用柴芍姜重
心熱宜用硃神麥冬腹痛則宜消導傷風則宜發表因時制
宜難以盡析

初熱時若唇淡面青手足冷舌無苔精神困倦不思飲食二便
清利脈沉細而遲緩者乃虛症也若猶大熱灼人心中迷悶
則元氣虛而毒氣又盛若不急治恐元虧不能送毒毒不得
出三四日間須臾告變良可悲也宜急用

調元解毒湯

人參

八分

生芪

當歸

連喬

牛旁

防風

川芎

各五

錢

各五

分

刺麻

黃芩

黃連

各五分

前胡

一錢

木通

各六分

炙草

虫退

各二

分

在方參芪當歸扶氣血。膏菊苓連解毒。此補中兼解。謂藥
虧虛盛者計也。

初發熱。或爲風寒所閉。一時無表散之藥。須用推拿法。以鬆肌
表。其毒自出。又或其兒素性怯。仍爲風寒所束。固不得不
發。又恐表虛。用藥發表。有傷元氣。亦用推拿之法。又或其
兒既服表藥。依然身無微汗。寒邪閉。錮其症不退。欲復用表
散之劑。又恐過表。以損元神。亦須用推拿之法。其發散之藥。
多能耗氣。推拿之法。不過鬆肌發。髮運動筋骸而已。竅開則
氣通筋。運則血行。氣血通暢。而邪自出。勿謂推拿之無益也。
余嘗用之。其效甚捷。故備其法。

推拿法

取溫水一碗，先用大指蘸水于小兒兩鼻孔洗擦，而上推者二十四下，謂之洗井灶。再于印堂用兩手指分開擦二十四下，謂之開天門。又于小兒兩手食指擦下三十六下，以瀉三關之火。又于中指擦下三十六下，以瀉心經與肝之氣。又將小指數推，謂之烏龍擺尾。再于脈門擦下三十六下，復擦上十二下。又于掌上順運八卦，週旋擦一百二十下。然後于虎口及手足凡接骨之處，其穴有窩于各穴窩間，用力俱捏一下。臍下丹田各捏一下。背上一兩飯匙骨下及背脊、脊骨節間各捏一下。任其啼，則冷汗出，而肌鬆，這毒亦從而出矣。但推拿後宜令兒睡，發汗不

可冒風。勝理既開。恐風邪之復乘也。

或用頂方將桃樹皮與葶藶搗爛炒溫敷于臍上一炷香爲度亦取其發表之誼也。

一初熱時小便如血遍身見紫色斑點者此毒盛血熱也急宜

用二寶散或犀角地黃湯

二寶散

治痘紅紫與諸失血之症

犀角

玳瑁

二味磨水服卽愈

犀角地黃湯

治痘血熱焦紫與諸失血

犀角 赤芍 生地 丹皮 三味等分水煎另用犀角磨入

服之無犀角則用升麻代之

一初熱之時四肢殭直不能舉動或氣粗目閉迷悶不醒者皆爲風寒所束毒不能宣之故也宜用蘇解散加天麻白附全蝎姜虫治之若元虛弱者用扶元祛風湯

扶元祛風湯

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 羌活 防風

天麻 虫退 全蝎 蠶蚕 木香 芍藤生藥引

一初熱時遂變失聲者必風邪傳入肺經重則用清肺飲輕則用甘桔湯

清肺飲 治咽乾聲啞

麻黃二錢 麥冬三錢 知母五錢 花粉五錢 荆芥 柯子八錢 桔梗五錢 玄參五錢

入竹瀝姜汁服

甘桔湯

治咽旁痛

甘草

三桔梗五

牛子

荆芥

四

玄參

六

一痘發熱時或耳下頸上有泡者皆寒氣風痰所結宜用生薑磨地泥敷上散其寒邪俟痘出自愈切不可用癰毒草藥妄敷恐水毒氣爲害不小

又方用紫刺皮

防風

荆芥

南星

生

半夏

生

麻黃

白芷

共爲末調酒或醋敷之即愈

初熱雜症

夫痘毒出干臟腑達于皮膚其毒一動五臟皆爲撼搖故其見

症多端况平日所受風寒暑濕之邪皆隨痘毒而出所以雜症紛紛而見焉然痘毒者戕生之巨寇雜症者助惡之群邪雜症不平則痘亦不順必除雜症而痘乃無患也然祛除雜症之中又必以痘為主其痘既正則雜症自平若渠魁已服羣邪安有不順乎。

初熱時要問其大小二便飲食寢處若小傾不長夢中或發驚悸其兒必將發搐急與定心散。方見三卷九散條以燈心湯爲引不然則驚搐之症必然至矣。

驚搐

驚搐之症多出心經有目睛上吊口不能言者有身若反弓者

足僵直者有目翻白而雙手擎拳者或牙關緊閉或口吐白涎
或舌頻出入名蛇舌風或大叫如鴉聲而卽死者名烏鴉風或
嘴歪頭搖者名黃揭風或十指擎搯者名鸚爪風如此之症俱
爲驚癇此皆毒從心經過故有是症必痘出而驚乃定多在痘
將出時方發驚搐但隨搐而隨醒者吉搐醒而有汗者亦吉蓋
邪從汗解痘出必稀搐定而精神清爽而不青藍者吉若面色
青藍形神昏暗醒後目閉無魂不思飲食而反潮熱大作者是
惡候也其痘必稠密而難治矣昔人謂未痘先搐皆爲順症豈
盡然乎遇此之症爲父母者切莫驚慌只可扶持不可把捉恐
鬱其氣則立斃矣爲醫者不可作急驚施治竣用寒涼之藥倘

誤用寒涼冰其毒氣不得發越其兒必斃矣可不慎乎然此等症候皆由毒氣壅盛于內不能宣發所致治此之法須詳審其由不可一槩論也。有毒氣壅盛于內不能宣發于外而驚搐者必痘影紅紫聲音響亮氣粗身熱脈洪而數此毒壅不能發也宜用清解散以宣之

清解散

防風

荆芥

桔梗

川芎

虫退

各四分

前胡

六分

乾葛

五分

升麻

五分

黃芩

黃連

紫草

木通

各六分

牛旁

連翹

各七分

山查

八分

甘草

分

行有為風邪所束痘毒鬱而不宣而發搐者則形色多偏前但

薄重鼻淵或流清涕脈浮而數是為風邪所束也宜用麻黃散以發之

麻黃散

防風 荆芥 桔梗 川芎各四分 前胡 七分 升麻 紫蘇

紫草 木通各五分 牛旁 連翹各七分 出退 三分 白芷 四分

有元氣虛虛送毒不出而發搐者則痘影淡自在皮下唇淡面青氣緩神倦脈又沉細而遲緩是元氣送毒不出也宜用溫中益氣湯以托之

溫中益氣湯

人參 白朮各五分 生芪 八分 當歸 茯苓各六分 麥草 川芎

白朮各五分 生芪 八分 當歸 茯苓各六分 麥草 川芎

分
防風

白芷各三分

木香二分 山查一分

官桂各六分

凡遇驚搐雖要祛風又要顧痘必托痘出其驚乃自退矣

凡驚搐之症必用鎮驚丸

方見三卷九散篇

以燈心草磨金

銀器爲引服之立效百發百中又要用六一散

活石

六兩

甘草

一兩

神砂五錢

加木通六錢

共爲末燈心湯引搐定與服必使小便清長則熱解而驚定

矣蓋心與小腸相連心經火邪須從膀胱瀉之此治驚之要

訣也

當發搐之際危如壘卵救病甚苦救焚恐藥力一時難及須

用火攻以杜散其風痰其效更速燈焙法

先干四肢按骨

之處定有一窩卽于各按骨窩中皆下燈火一盞又于臍下
丹田灸燈一盞但臍上心前則不敢下燈火恐扯痰上行
也。一兒發搐遇一愚僧在心窩灸燈一盞其兒卽斃可不
慎乎

一兒發搐忽然口歪于左余于其右牙交穴下燈火一盞轉
盼間其口旋歪于右余又于其左牙交穴下燈一盞未幾其
口乃漸正矣凡牙關緊閉者亦灸兩牙交穴其口自開

腹痛

初熱無事蓋毒氣發越而腸胃不寧多有作痛然腹中痛者其
毒必重不可視爲尋常但其所痛之故亦有兩端不可不辨有

外感風寒兼飲食停滯而作痛者則其痛多急而啼叫必甚每
在臍以上痛痛時面青唇白而手足冷此感昌積滯而痛也宜
用

升消平胃散

治感昌積滯作腹痛者一劑立愈

川芎

香付炒

蒼朮

紫蘇

厚朴

姜汁炒

藜蘆

砂仁

白芷

半夏

陳皮

名三山

山查

麥芽

各六分

有毒氣壅盛而腹痛者則其痛稍緩有作有止煩煩吐痛移
在臍以下痛又或連腰而痛面赤唇紫手足不冷此毒氣在
內作痛也宜用敗毒散以消其毒必毒清而痛乃愈

敗毒散

升麻 乾葛 紫蘇 川芎 防風 荆芥各一分 前胡 桔梗

只壳各六分 牛旁 連翹錢一 虫退分三 山查錢一 木香三分 白芷五分

地骨皮五分 又方去乾葛加紫草

亦有平日嘗有風疾常常作痛者至發痘之時風疾亦發此不必施治俟痘出其症自平

嘔吐

發熱之初。辨攻胃管。故有吐症。毒氣上逆而吐者。其吐必酸刺。而有聲。吐訖反快。精神不倦。此毒逆上行之吐。因吐而毒亦解。所謂吐為順症者此也。此不必施治。俟痘出而吐自止。然嘔吐之証。自有不同。不可不析。凡吐有聲有物。謂之嘔。嘔者。熱從吐。

解也。有物無聲謂之吐。吐者因有內熱而胃亦稍虛也。有聲無物謂之噦。噦則毒鬱不出矣。此皆熱毒繼逆于胃口。俱不可用。煖胃之藥而與之驟止也。又曰上焦吐者從于氣。中焦吐者由于積。下焦吐者由於寒。上焦吐者胃有痰熱。必心煩作渴。二便不利。此熱症也。宜用 桔梗 陳皮 半夏 香附 藿香

木通 車前 茯苓 甘草

有食積而作吐者。必腹中作脹。隱隱作痛。治當以平胃散。方

見前 兼四苓散 白朮 茯苓 豬苓 澤瀉 圭之

若胃氣虛弱而作吐者。其人必面青唇淡。精神困倦。不思飲食。或食下卽吐。其吐亦順快而無聲。此胃寒之吐。宜用參砂

胃散主之

參砂和胃散

人參

砂仁

半夏

藿香

各四分

陳皮

三分

白朮

茯苓

各五分

炙草

一分

乾嘔

乾嘔之症乃毒火內鬱不得外宣故時時張口似吐非吐如見此症其臟已敗其毒內攻最爲危險若咽喉作癢不能納物再加失聲其死必矣但初見卽宜解毒兼利小便用被蓮二陳湯陳皮 桔梗 茯苓 花粉 黃連 山枝但地 龍葵 木通 乾嘔者火 于中上不能吐必須引之下行故治乾嘔以利

小便爲至若利之不下則難救矣

初熱惡心是毒氣上攻亦其常也候毒出則愈痘未見標一切嘔吐網莫驟止恐閉毒也惟虛寒鬼症者乃不容不止耳

嘔吐黃水

吐不痛則無事腹痛則凶不痛則內無蓄熱必數日未進氣脾胃空虛本色形于精液而然也稍與和胃平脾飲食得進自無事矣若腹痛則毒留脾胃爲禍不淺宜寬胸解毒或可救也然此必大熱薰灼口中作臭唇皮硬舌有苔乃爲毒循子內也

須用

陳皮 厚朴 山查 牛旁 慈姑 石羔 石斛 甘草

黃連

木通

白芷

吐清水

無事此胃寒而肝盛也。治法宜煖胃平肝而即止矣。須用

砂仁

藿香

陳皮

白朮

茯苓

白芍

炙草

煨薑引

吐濃痰

無事痰雖火結吐則內寬不必治也。

吐臭痰

難治痰氣若臭則胃中毒火難堪。急與清胃解毒藥止而或可
生或痰中帶血者亦然。須用 生地 牛蒡 慈姑 人中黃
天花粉 與服

性喉

性喉者食則必噎飲則必噎飲食不能下咽也初執有此多凶蓋毒氣壅盛上逆咽喉故飲食難下也急宜解毒利咽為玉失此不治恐變爛咽失音之症則難療矣須用

甘桔湯加減

桔梗 陳皮 牛子 玄參 黃芩 慈姑 甘草 射干

泄瀉

初執作泄乃毒氣奔越從泄而解既泄其毒痘出必輕故痘前泄瀉是為順症不必施治俟痘出其症自平但泄瀉之症脾經受傷最為小兒痘科所忌其虛實寒熱之異不可不為詳辨而

此爲調治之方也。夫泄瀉有水瀉者，有滑泄者，各有寒熱之分。若小便清利，其發或白或青，或食物不化，其氣腥，其泄則滑瀉。自下而無聲者，虛泄也，宜用參苓白朮散。

參苓白朮散

治虛泄甚效

白朮

一錢

人參

茯苓

以仁

蓮子

山查

神曲

各五分

肉蔻

去油

柯子

煨用

陳皮

各四分

白芍

五分

木香

炙草

各三分

右方健脾去積，治虛泄者，莫此爲妙。若服此不止，又用

九味肉蔻丸

方見三卷九散篇

若小便赤而不利，其發或黃或赤或黑，其氣甚臭，泄時有聲，直射而遠者，是熱瀉也。蓋熱蓄於中，水道不分，故作泄耳。治

當分清濁利陰陽用加味四苓主之氣弱者加肉桂則名五苓散

加味四苓散

治水瀉熱者加神

白朮

一錢

茯苓

用赤者

猪苓

澤瀉

各七分

木通

車前

牛子

各六分

黃芩

三分

腹瀉

加木香

厚重

出腸

加升麻

若素有食積而作泄加厚朴 陳皮 山楂 神曲 丁香

胡迺 若泄帶紅色加百草霜

若身熱煩渴加柴胡 黃芩 麥冬

若瘧隱隱不起在皮間而不見加升麻以提氣上升若泄

瀉不止男左女右在肩角上有一竅即止瀉之火穴也其法

用本人之手。下垂肚角。然後將其手曲轉。令手背動。以曲。下爲度。此處必有一高。卽于窩中。用燈火速灸三醜。其泄自止。但痘前吐瀉。總勿亂治。恐滯毒氣。若痘出不止。則宜施治。慮中氣虛。則痘難起脹矣。

又有一等。自首至尾。終日泄瀉。而不能止。亦無恙者。必結痂。而泄乃定。但知此之症。雖曰泄瀉。而精神如故。飲食如常。痘亦紅活。起脹。灌濃。俱無變症。此毒少氣旺。故無恙耳。又痘出。脾經必毒化痂成。而脾症乃寧。

閉結

閉結者。大小二便不通也。初熱之時。凡有此症。俱是內熱。若小

便不利則是熱蘊膀胱宜用六一散以利之

石見驚指條或于

清毒湯中加車前木通活石等藥以利之而小便自清長矣若大便不通雖是熱注大腸然亦只可于解毒湯中加只亮以破其滯黃連以條其熱已耳切不可用大黃苦楝斬開之藥而猛下之蓋小兒全以脾胃爲本若催動脾胃將何以爲行漿起脹之基乎卽熱結之甚亦不過于解利劑中加酒製大黃少許而已兒內而熱者火灼食消糞自無多倘能清解則火息而便自行矣余思一方用未去油之豆蔻以治閉結既能清腸又不傷脾最得計也若便秘而能食則雖秘亦無妨也切不可

妄下

泄紅。此熱發于腸胃也。宜解腑內之毒。用黃連、牛旁。

一慈姑。人中黃。一服立平。

泄白。此脾胃寒涼也。宜溫脾胃為主。用參、苓、白朮散。方見前。

瀉黑瀉及赤黑水。此膿瀉已敗不治。

發熱

毒發則火動。火動故身熱。初起之時。毒火方張。宜平身熱。但熱微則痘輕。熱大則毒重。必痘出而熱漸除。出齊則熱自退矣。若當減不減。當退不退。則速宜解毒。然初熱宜表散。只標宜清解。總以清利爲要。蓋便利則火從下瀉。切不可用補滯之劑。

寒熱並作

夫火動則熱火鬱則寒痘欲出而不能出氣血與毒火相攻故乍寒乍熱在宣毒發表俟痘出而自定矣宜用蘇解散 或加減升麻湯 方見前

痘已出則用調元化毒湯 方見五卷 行漿時則內虛而毒不能出也用內托散 方見五卷 痘後亦作虛看寒多則用理中湯

口濕

初起潮熱而渴無妨若渴甚則毒必盛治在解毒不在止渴蓋毒火清而渴亦自止也

煩燥

初熱湧火。壅滯五臟。不寧。宜生煩燥。然甚則其毒必盛。須用解毒湯。方見上。

亂語

初起重。益毒氣壅盛。眩迷心竅。致亂語也。宜解毒宜毒清心。降火兼之。消痰用解毒湯加花粉。硃砂。又兼用定心散。方見丸散篇。以鎮心利水毒清。水利而心自寧。

頭痛

初熱輕。多因感冒風寒所致也。用升麻。川芎。白芷。防風。蒿本。薄荷。起發時亦是感冒風寒。治同上。收斂重是餘毒將攻目。宜解餘毒用羌活。川芎。連翹。牛旁。

防風 荆芥 黃芩 黃連

目閉

初起又治 蓋精神已衰不能逆勢也。急用內托之劑。痘若將出則可救。又痘將出時忽爲風寒所束而目閉者。用升提透毒之藥爲之法。寒發痘或用推拿法以疏通寒邪。再用頂方以生雞剖敷臍上。令痘出而目自開。八九日起脹而閉。是眼胞腫脹不能開也。吉若驟開則凶。毒未外化而腫消。則必入爲內攻矣。十三四日痘毒已退。則宜開矣。宜開而仍閉者。毒未盡化也。亦凶。

咳嗽

初起無事然咳嗽之症多出肺經非肺受風寒即肺留毒火也
火薰蒸液液化爲痰故有嗽耳治嗽必以清火消痰爲主初發
用蘇解散加黃芩花粉痘出齊而嗽漸止者吉毒毒已盡出
皮毛之外而不少留于內也若七八日不止而愈甚者毒火
內留必凶亦有先前不嗽六七日偶感風寒而嗽者表散其邪
則無事矣但治嗽消痰六日以前宜于清解方中加花粉七日
以後宜于補托方內加款冬而牛夏兩星則惟收斂時痰重者
方敢用也而桔梗陳皮自始至終俱敢用

喘氣急

初熱凶毒氣內壅也宜解毒八九日無事凶痘升脹阻寒氣

道也。收醫凶痘若陷場氣將絕也。

聲啞

初起不治。丹田肺氣預敗也。然有喘叫而失聲者。則無妨。又有感冒風寒而失聲者。則必有嗽而音啞。不清者。宜用甘桔湯加防風。刺芥以疏其風寒。則音亮矣。七八九日而失聲者。痘若起脹紅活。則息內痘起脹。閉塞肺竅。故失聲也。俟內痘醫而聲自開。若痘伏陷。倒靨而聲啞者。則毒陷內攻。肺氣已絕。其死必矣。

一兒痘出稠密。胸背甚多。至七八日而漸聲啞。初見面部痘好。不以爲意。及見胸背之痘。盡皆自陷。恐無預兆。余始驚慌。急用

黃氏當歸鹿茸人參肉桂付片川芎柯子連進三四劑其痛起而聲亦開矣及至收醫其音復啞余見其喉中痰重而氣又微弱乃用人參黃芪陳皮桔梗半夏椰子炙草與服乃有痰吐連服二三劑其聲清亮而愈

喉痛

初起難治 是毒鬱之甚其火上炎故也宜用

敗毒和中

連齋 牛旁二錢 黃連 只壳六分 防風 荆芥 桔梗

川芎 紫葢四分 虫退三分 前胡八分 麥冬八分 加元參黃芪

以解其毒 又用理咽散頻頻噙服以滋咽喉但初噙二三

日恐有火毒宜吐之

種咽散

治喉痛

桔槓 牛旁 玄參 山豆根 黃芩 甘草

至起脹時喉痛鼻咽中有痘而痛也雖痛無妨仍用理咽與
噙俱不可服此際臟腑空虛咽喉雖痛亦敢用補不敢進涼
俟內痘盛而喉自不痛矣

或咽爛成坑者以前失于解毒毒火薰蒸所致痘好可救仍
用理咽散與噙復用吹喉丹吹入若痘陷則難救矣 若落
痂則凶蓋毒火未化在胃口薰蒸而元氣又虛難于清解甚
可危也宜酌服人參解毒湯仍將理咽散與噙但治咽喉

宜引利蓋痰瀉乃不上炎也

人參解毒湯

人參 玄參 牛蒡 石膏 知母 黃芩 豆根 甘草

吹喉丹

黃連 青黛 兒茶

心胸痛

內

初發若心胸突起而高此毒填胸膈凝而不出其兩莖旁宜寬胸解毒痘出而痛定者可救用解毒湯方見前多用桔槓陳皮加鬱金亦有誤服熱物或傷力傷異助素有風疾者則無妨痘出而痛自止矣

腰痛最危

痘毒發自命門。初起腰痛。是腎虛不能透毒。或毒盛先敗腎經。故形于腰痛也。痘原于腎。而腎已敗。豈不危乎。若連背髓骨尾而痛者。尤危也。急與扶腎之劑。用人參。生芪。當歸。元支。牛旁。一連喬。續斷。故芷。杜仲。枸杞。知母。炙草。與服。又外用頂方。將生雄雞剖開。即敷于腰上。須連用二三隻。若痘出痛止可救。若出齊猶痛。更凶。須用人參。豬尾血。加冰片。少許與服。蓋人參補氣。尾血從髓而來。是入腎者也。且冰片直射臟腑。其方最妙。余嘗用之。果效。服此而效。則可救也。其後總以內托。滋腎為主。若諸方不效。則必死矣。至十三四日。痘

痛者則是血虛補血養腎自可無虞

遍身痛

無事

此必平日傷風傷寒至痘發之時一齊攻作所以痛也與之桂風發汗則無事矣

手足搖

不治

蓋手足屬脾胃此風生脾胃乃驚風死症。况痘發之時豈不厄

平
十指冰冷不治 此氣血敗絕不能灌溉四肢也

足冷

初起陽氣攻毒未達四肢冷亦是其常也痘將齊手足乃溫但

冰冷過勝則不治矣。蓋陽氣幾絕也。急宜用參芪桂附歸芍鹿
茸大補血氣。或可救也。

手心痛用一芍散。

手足痛

初起面

惡毒氣留滯筋骨。不得盡宣于肌肉。而氣血又不能活。故痛也。
用桂枝芍藥湯。桂枝。芍藥。柴胡。防風。獨活。羌活。
川芎。當歸。芍藤。牛旁。白芷。與服。失此不治。日後雖
生必致風痺。亦有素受風寒而痛者。則以薑葱灰芎共搗爛。用
酒炒溫而敷。擦痛處。以散其風邪。或加蒼朮。兼除濕氣。更妙。
凡九日。遊行痲痛。是其常也。若筋骨痛者。則是風疾。姑且置之。

候愈然後以驅風兼行氣血于四肢之藥治之自落痂後
然一若止一二處肉中如有核者此疔結于內也。用艾火灸
之或燈火焰之其痛立除。

眼出血

不治

蓋毒氣橫肆上攻而暴烈于精華其後安可治乎。

耳出血

不治

耳爲腎之竅毒氣橫烈而腎已敗故逆而上攻出于其竅安可
救乎。

大便血

可治

此熱注大腸也。用

川連

半旁炒

黃芩炒

厚朴

香附

貝壳 紅花 生地 地榆 木香 百草霜 或用香薷亦
亦可此首尾俱可用

小便血 不片

毒撲命門則膀胱溺血見此之症虛爲難醫痘必焦枯而腹必
脹八九日間決死也

口吐血

血鮮而一二口者無妨若不止者初起用犀角地黃湯方見前
起脹時亦宜清毒涼血引火下行蓋血熱則妄行火炎則上
逆也若吐而不止則凶黑血則不可救問或一二口者可治

鼻衄血 可治

此邪毒肺竅將達皮毛也。而隨出而隨止者，不必施治。衄而不止者，仍用犀角地黃湯。至之外，以髮灰散吹入鼻，血卽止。將無病婦人頭髮用皂角煎水洗淨，然後將髮燒灰，名曰髮灰散。又見一切男婦衄不止者，用線在小指甲邊着力重扎，竟札盡其指，其衄立止。但男左女右，各有分別。此奇方也。余試屢驗。

諸失血

熱毒之氣泛濫無拘，而血亦隨之走泄。故或吐或衄，或便或從陽竅而出者，皆惡候也。若瀉膿血如死肝豆汁者，胃爛也。從瘡鼻而出血者，肉分空虛，元氣爲之走泄也。俱不可治。惟衄血乃毒氣斬關而出，爲可治耳。但不可峻用寒涼之藥，恐冰伏其血。

使痘不能成漿則爲害不淺矣。嘗見一人口鼻出血數碗以
韭菜汁半碗與服即愈。

厥冷

此元氣虛弱不能送毒毒鬱于內而陽氣不升故厥冷也。急宜
以人參 黃芪 當歸 鹿茸 肉桂 附片 川芎 炙草
薑汁引。若緩而不救毒在內攻其見必斃于三四日內矣。
然此脫陽之症必唇淡面青氣冷身涼而腹甚。

眼露白

目爲五臟精華所萃睛若上戴不能運動則元神將散又烏能
送毒乎。此最危之症若失智無藥則決死矣。無論前後皆不預。

也若必欲強而治之則總以內托扶元爲主。惟痘前發插
此插後人醒而卽定者則以風論痘出而症自平。

唇舌

夫唇與舌五臟皆通內臟虛實皆形于此故熱毒輕者其唇不
紫其舌無苔而口不臭若熱毒盛者至二三日間其唇必紫黑
或硬或裂兼之口內又或腥臭難聞此皆毒火內熾所致也急
宜解毒爲主其唇之硬裂者最凶宜清脾胃之火解毒湯內須
加石膏又以石膏甘草牛蒡連翹煎水時擦唇上口鼻者亦是
胃熱其治亦同若滿口俱白而生口瘡者用清胃散敷之卽止
散也痘後亦同夫舌有白苔其毒已重若生黃苔其毒更重

黃苔轉黑則不可救矣。故舌有黃苔時須急爲之解毒。此際猶可救也。又舌捲囊縮亦是火鬱火經而難治矣。然亦有啼叫火動致舌捲而不能食乳者。其舌下之筋必弦緊也。須用指頭從筋上重按之。使舌筋不弦。自不捲矣。小兒不能言語醫者又不可不詳審也。

又或舌有黑點。是舌上生疔。必主遍身痘皆焦黑而死。急宜銀針剔破去其惡血。剔去後不復生疔。猶或可救。

中風

發熱之時腠理開張。或中風邪。忽然直視。張口吐舌。不能言語。是中風也。宜用參蘇飲。或消風散。一時無藥。則以薑汁灌下。且

用推拿法又用頂方以櫻桃皮薑葱豆豉川烏共搗煉酒炒濃
敷臍及頤門二處汗出自愈。若起眼濃膿與瘡後有中風之
症則用 人參 黃芪 乾薑 附子 桂枝 麻黃 羌虫
炒防風 炙草 若牙開緊閉則于兩牙交穴各下燈火一燂
其口自開

參蘇飲

嗽皮 半夏 桔梗 茯苓 紫蘇 干葛 前胡 甘草
人參 宜加麻黃 薑葱引

消風散

羌活 獨活 姜虫 防風 天麻 白附 蟬退 柴胡

花粉 川芎 人參 炙草 生薑引

中痰

發熱之時。或有毒火薰蒸痰涎壅盛。滯于咽喉。不能言語。其狀與中風同。但喉內痰鳴。是中痰也。最爲危急。須以生薑汁灌下。若不能進藥。須用鴨翅毛透入喉中。攪出痰涎。令其自吐。先去咽內痰涎。乃可進藥。然後用 陳皮五分 桔梗五分 半夏錢 南星八分 花粉七分 天麻分 竹黃分 硃砂 濃煎與服。或加蒙石 或用鎮驚丸薑汁引。

此急則治其標也。若痘欲出不出。急用頂方。剖生雞以敷其臍。連用二三隻。將痘托出。庶幾可活。凡痘欲出而不能出者。

此方最妙。余試屢效。不可忽也。

噤口

此熱氣鬱于胃中。欲出不出。故噤也。宜用 香附 陳皮 桔梗

茯苓 黃芩 木香 山查 生薑引 若不止加朱砂

澤瀉 木通 導熱下行

不食

夫發痘之初。熱鬱于內。必然作飽。不思飲食。此時不可驟用煖胃之藥。以滯其毒。若無泄瀉。而痘紅活。雖出齊之後。不食亦自無妨。俟水足。漿行。毒氣盡出。腸胃無熱。乃欲食也。不必施治。惟吐瀉後。而痘淡白不振者。乃胃弱不食也。宜用 人參 白朮

茯苓 砂仁 丁香 陳皮 山楂 神曲 芩草 煨姜引
亦有。雖焦陷而飲食如常者。是毒火內燥。易于剋化。雖能
多食。亦必死矣。總在看痘。吉凶而食與不食。豈足定其生死
哉

汗

初熱之時。身有微汗。其毒乃出。有汗則不宜發散。然有自汗。有
盜汗。自汗者。不發而汗自來。乃腠理不秘也。盜汗者。汗出其人
不知。乃表虛也。其痘未出之先。縱有自汗盜汗。而皆不可驟止。
恐閉其毒氣也。但不敢用表散之藥。而復傷其表耳。如痘既
出之後。或盜汗如雨。自汗如淋者。恐表虛後必漿清而過。汗痘

必皮薄慎勿袖手旁觀急宜用 人參 炙芪 當歸 白芍
桂枝 麥膚炒 以斂汗固表 若身冷惡寒則宜用 人參
炙芪 當歸 川芎 白芍 肉桂 附子 炮薑 炙草 起
水後加白朮 淮山服此若仍大汗如珠寒戰不已加之昏沉
不醒及汗流煩渴者俱屬亡陽之症不可救也

〔腹脹〕

初起重中後難救 俱是熱鬱脾胃不能發泄而然也治法宜
升發解毒而消導之 大便秘而脹者用只亮湯 只亮三錢
生地一錢 紫葑二錢 酒製大黃八分 小便秘澀而脹者用四聖散
紫葑 黃芪 木通 甘草加澤瀉 猪苓 車前 此皆痘

色紅紫寔熱秘結者方可用。若二便清利手足冷痘淡白而
脈微緩者則勝寒不能發毒而脹也。宜用理中湯。人參 白
朮 黃芪 附子 炮薑 炙草 茯苓 或用異攻散。人參
白朮 當歸 陳皮 半夏 厚朴 茯苓 丁香 木香
豆蔻 附子 若痘陷伏不起喘急神昏則毒在內攻而脹也
治之亦無益矣。

二便

人身之有二便猶天地之有江河也。江河不可壅塞而二便不
可不通。若或不通則腸胃壅滯而毒邪鬱內滯矣。然便之所以不
通者亦因火閉而然也。治宜清火解毒而便自行。故大便秘者

須解火毒而苓連在所必用。既有苓連以蕩除腸胃之垢而毒
火自不內攻。慎勿用大黃芒硝之藥。峻下以取速效。蓋火便秘
者其毒必甚。一切解毒涼血之藥。又皆滑利。大陽脾胃堅固則
涼血補血任意施為。若預以下藥傷其脾胃。則其毒血解毒之
劑及滋陰養血之品皆畏首畏尾。而不敢用。致後日之束手莫
措者。皆前此悞投下藥之弊也。况痘家全以脾胃為至。脾胃若
損則泄瀉伏陷不旋踵而至矣。其害豈勝言哉。余滯閉結所以
在解利而不在斬關也。

治人便秘而潤腸湯間或用之。歸尾 生地 桃仁 或蜜

導法煉蜜二兩滴水成珠入于皂末攪勻俟冷作條置冷水中

令硬乃將蜜條插入穀道須臾蜜融而便自通。又用麻油以竹筒灌入穀道卽通。又火結者取猪胆一個將竹筒入胆內以線繫之然後以竹筒插入穀道令胆汁射入卽通。又方用猪膏一塊煮熟連汁服之以潤大腸亦通。如此之類不傷脾胃是可用也。至下小便利或用導赤散益元散俱可利矣。

吐瀉蛔虫

蛔虫在脾胃之間。消化食物。初熱毒火易動。虫不能安。故逆上。胃口或因吐甚而觸動。其虫者。出二三條無妨。若滾滾而上。則火灼內傷。脾胃已壞。不能療矣。其後則臍膈寒涼。虫亦不安。皆不可治。故曰吐蛔者死。世有以川椒與連等藥以安蛔者。誠

知其本既敗。縱定其標。亦何益。若蛔從便出。少則無妨。多亦因。

寒戰咬牙

小兒素受風寒。當發熱之際。毒出而寒邪亦出。固有惡風惡寒者。所謂傷寒也。傷風則惡風也。表散其邪。則無事矣。若寒甚而作戰慄者。則其寒也。出于肺臟。六日以前。多屬肺熱。熱極而生寒也。然肺熱之症。必唇紅脈數。痘紫舌苔。治宜以清毒涼肺爲主。不可誤投辛熱之劑。七日以後。多屬肺寒。肺寒之症。必唇淡脈緩。痘色亦白。治當以辛補之藥。以回陽。咬牙之症。亦如此辨。但咬牙屬胃獨見症者。用藥宜從經絡。但此二症初起。難治。八九日後。可治。蓋至此毒出厥寒。則用補可救也。

初熱逆症

初熱頭面一片紅如胭脂者六日後死

初熱身如熨斗眼紅唇裂而紫黑者凶

初熱腹中疼痛及腰痛如杖連尻骨俱痛者不治如痛不甚而

有止者解腎邪可治

初熱時心窩中及遍身皮內有成塊紅者不治

初熱時七孔二便出血不止者必死

初熱時遂見紫黑瘰者不治

初熱自閉無魂昏睡不醒者不治然有或為風寒所閉而昏

昏好睡者宜散其寒邪宜其毒氣則愈矣

初熱寒戰咬牙者凶

口吐蛔蟲而不止者死

初熱舌頭紫黑者死

聲啞神昏者不治

初熱口吐臭痰或腹脹痰鳴者不治

初熱胸高而突者不治

初熱四肢厥冷舌捲囊縮者凶

初熱口中常如食物者凶

初熱目閉咬牙鼻生黑氣者不治

初熱飲食不化形色青藍者不治

初熱唇頂硬腫或神氣昏暗者不治

未熱先出賊瘧數粒至熱時而異沒者不治

種痘新書卷之四終