

胤產全書

胤產全書卷三

金壇王肯堂字泰父

海陽張受孔心如父叅定

海陽姚學顏伯愚父校閱

大小便類

夫妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不通大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而治之

葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小

便不利安胎除熱

葵子

二升

滑石

四兩碎

右水五升煮取一升去滓盡服須臾下即愈

又方

利大腸

葵子

一合

川朴

兩

每服三錢水煎溫服

六聖散 妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇脹悶妨

害飲食

大黃

木通

檳榔

各一兩

枳殼

七錢半

大腹子

二兩

訶子

四制去核
半生半熟

右爲末以童便一盞葱白二寸同煎至六分調下

二錢

又方

車前子

一兩

大黃

炒半
兩

右爲細末每服三錢空心蜜湯調下

大腹皮湯 治妊娠大小便不通

枳壳

大腹皮

赤茯苓

各一兩

甘草

二兩

右爲末葱白湯調下二錢

吐血衄血咳嘔血類

妊娠吐血者皆由臟腑有傷凡憂思驚怒皆傷臟腑氣逆於上血隨而溢心悶胸滿久而不已心悶甚者死妊娠病此多墮胎也

必勝散 妊娠血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟地黃

小蓟

并根用

人參

蒲黃

微炒

當歸

芎藭

烏梅肉

各一兩

右各藥搗羅爲粗散每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

又方 治吐血不止

馬氣勃用生布擦爲末濃米飲調下

又方 治鼻衄

用白茅花濃煎汁服

胎自墮類

陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病原乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也

濟生芎藭補中湯 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮服此安全

芎藭

五味子

阿膠

蛤粉炒

乾姜

炮各一錢

黃芪

蜜炙

當歸

酒浸

白芍藥

白朮

各錢半

杜仲

炒去絲

人參

木香

不見火

甘草

炙各五分

本作一服水二鍾煎至一鍾服

阿膠湯

妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍

阿膠

炙燥

熟地黃

焙

艾葉

微炒

芎藭

當歸

切焙

杜仲

去粗皮炙判

白朮

各一兩

右每服四錢水一盞半束三枚劈破同煎至八分
去滓食前溫服

杜仲丸 治妊娠三兩個月胎動不安防其欲墮宜
預服之

杜仲

爰製炒
去系

續斷

酒浸各
二兩

爲末煮束肉杵丸梧子大每服七十丸米飲下

四製艾附丸 治婦人數墮胎由氣不升降所以胎
氣不固猶宜服此

香附

并去毛淨一斤分四分一分酒浸一分醋
一分童便一分鹽水各浸七日取去焙乾

右爲細末醋煮糊和丸梧子大每服七十九空心
溫酒下肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各
二兩

刪繁方

治妊娠數落而不結實或冷或熱百病之

源

甘草

黃芪

人參

川芎

白朮

地黃

吳茱萸

各等分

一方有乾姜當歸

右爲末空心溫酒調二錢忌菰菜桃李雀肉醋

安胎湯

治胎氣不固常得小產

當歸 地黃 川芎 芍藥 阿膠 黑香附

白朮 黃芩 砂仁 糯米 水煎服

安胎飲 妊娠五七個月前有小產症者服此可保

全產

白朮 錢一 人參 分五 當歸 錢一 川芎 分五

熟地 錢一 白芍藥 錢一 陳皮 分五 甘草 分二

紫蘇 分二 炙黃芩 分五

右件姜三片水煎食前服 若是八九個月內加

大腹皮黃楊腦七個猶妙

小產類

夫妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊娠衝任脉虛不能滋養於胎胎氣不固或顛撲閃墜致氣血損動或因熱病溫瘧之類皆令半產俗呼爲小產小產不可輕視宜將養十倍於正產半產重於大產大產如栗熟自脫半產如生採破其皮殼斷其根蒂故半產肥肉皆腐爛當補其虛損生其肌肉益其氣血去其風邪養其臟氣故宜十倍正產將養

人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目暈眩
或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參

麥門冬

去心焙

生地黃

焙

當歸

洗焙

芍藥

黃芪

白茯苓

去皮

甘草

炙各一兩

右件每服三錢水一盞煎七分去滓食前溫服

生地黃湯

妊娠胎氣損動血氣不調或顛撲閃墜

以致胎墮胎墮後惡滯不盡腹中疼痛

生地黃

焙一兩

玄黃

泡

芍藥、白茯苓

去黑皮

當歸

切炒

細辛

去苗

甘草

炙

黃芩

桂

去粗皮
各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半人生姜大棗拍碎同煎至一盞去滓服

人參黃芪湯

治小產氣虛血下不止

人參

黃芪

當歸

白朮

白芍藥

炒

艾

各一錢

阿膠

二錢

右作一劑水煎服

又方 治妊娠損動下血不止

甘草

一兩

阿膠

二兩

鷄子

一箇

右以水二大盞煮甘草一盞三分去滓下鷄子膠
候膠烱攪勻分三服

又方 妊娠胎墮下血不止

丹參

十二兩

細切酒五升煮取三升分三服

止痛飲 小產後心腹疼痛

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

玄胡索

桃仁

紅花

香附

青皮

炒黑

澤蘭

牡丹皮

白水煎入童便酒各小半盞煎服

當歸酒 治墮胎後血不出

當歸

炙令香

芍藥

炒各二兩

咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁一合銀器內慢火煎至七分去滓溫服惡血下爲度

羚羊角散 小產後血不出小腹滿痛

用羚羊角燒灰細研如麵每服三錢不拘時以豆

淋酒調下

烏金散 妊娠墮胎後惡血不下兼治諸疾血痛

好墨

二兩折二寸按子燒通赤用好醋一盞燒七遍夕丹燒通赤放冷另研爲末

茂藥

研

麒麟竭

各二錢半

麝香

一錢

右爲細末每服溫酒調下一錢七如血迷心用童便加酒調下二錢

豬膏飲

治墮胎血不出上搶心疼痛煩憤

豬膏

七合

白蜜

三合

生地黄

切二兩

右先將豬膏地黃相和煎令赤色去地黃內蜜膠攪勻溫分二服相次再服

白蜜湯 墮胎後惡血不出

白蜜

二兩

生地黄

取汁一盞

酒

半盞

右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩服三劑百病可愈

牛膝湯 治胎墮胞衣不下

當歸

切炒

牛膝

酒浸切炒焙各兩半

木通

剉

滑石

研各二兩

冬葵子

炒二合

瞿麥穗

一兩

右每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服未下再服以下爲度

澤蘭湯 治墮胎胞衣不下

澤蘭葉

切研

滑石米

各半兩

生麻油

少許

石水二盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末并油再煎三沸頓服之未下更服

生羊飲 治妊娠胎死腹中胞衣不下及產後卒有別病欲至狼狽

刺熱羊血飲一小盞極効

胎不長類

妊娠不長者因有宿痰或失調理以致胎動不安損氣血虛弱而胎不長也當治其痰痰益其氣氣旺則胎自長矣

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎痿不長或失於將理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣

白朮

川芎

各一兩

吳茱萸

湯泡半兩

甘草

炙一兩半

爲細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果實

黃芪散

主妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃芪

白朮

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參

各七錢半

川芎

甘草

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片末一枚煎至七

分去滓溫服

人參丸 主妊娠胎不長宜服養胎

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺藜 厚朴

葉寄生

各一

枳壳

七錢

甘草

半兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食前溫

水吞下

集驗良方 治婦人懷胎不長

鯉魚

長一尺者
去腸肚鱗

以水漬沒內鹽及束煮熟取汁

稍稍飲之當胎所腹上當汗如牛鼻狀雖有所

見胎雖不安者十餘日輒一作令胎長甚平安

婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而
日月未足欲產過期不產類

產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後
法治之

集驗知母丸 治日月未足而痛如欲產者兼治產
難及子煩

知母不拘多少爲細末煉蜜丸如鷄豆大溫酒嚼

下日三服

柳子丸 妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃

各等分

爲細末蜜丸梧子大溫酒下二十丸痛止爲度

治過期不產方

生地

當歸

芎藭

芍藥

香附

莢仁

枳壳

硝砂

紫蘇

水煎服卽生

鬼胎類

夫人臟腑調和則氣充實風邪鬼魅不能干之若
榮衛虛損則精神虛弱妖魅鬼精得入於臟狀如
懷娠故曰鬼胎也

雄黃丸

治妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃

研細

鬼臼

去毛

莽草

丹砂

研細

巴豆

去皮心油

獺肝

多令黃各半兩

蜥蜴

一枚炙黃

蜈蚣

一條炙黃

右爲細末蜜丸梧子大空心溫酒下二丸兩服當

利如不利加至三丸初下清水次下重如馬尾狀

無數病極者下蛇虫或如蝦蟇卵鷄子或如白膏

或如豆汁其病卽除

延胡散

治婦人鬼胎血氣不可忍方

蜜蟄

去頭
足炒

延胡索

炒各
三錢

右爲細末再研如麵溫酒調服半錢胎下爲度

補遺方 治婦人鬼胎如抱一甕

吳茱萸 川芎 秦艽 柴胡 僵蚕 巴戟

巴豆

不去
油

芫花

醋煮各
二兩

右爲末煉蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下卽出惡
物而愈 右方俱犯毒物非鬼胎不可輕用

孕癰類

按孕癰卽是腹內患癰

立安散 治孕癰立驗

烏藥 用五錢水一盞牛皮膠一片煎至七分
溫服

又方 薏以仁者煮汁飲之

子啼並腹內鍾鳴類

是症子在母腹中臍帶上疙瘩兒含口中者因
妊婦登高舉臂脫出兒口以此作聲

一法用空房中鼠穴土或黃連濃煎汁飲之卽止
一法令妊婦曲腰就地如拾物狀仍入兒口卽止

孕婦腹內鐘鳴

用鼠竈前後土爲細末研麝香酒調二錢立愈

臨產須知類

一臨月斷不可洗頭以免橫生逆產

一臨產月須要緊梳頭以候一月之後

一月數滿忌總覺腹痛驚動不可太早太早則大

小霍亂信卜筮彌說神鬼多方恐怖則氣怯氣

怯則上焦閉下焦脹氣乃不行致產不利犯此

宜服紫蘇飲

方見子懸條內

一外來閑雜婦人喪孝穢濁等人預宜杜絕勿令觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主害子
一未產一月以前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有正產之候卽不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却教產母虛亂用力兒身終方轉動却被產母用力一逼使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆由產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒

子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此
產毋用力之當也若未有正產之候而用力傷
早并妄服藥餌令兒生下譬如揠苗而助長無
益有害

凡十月未足臨產腹痛或止或作或痛不甚名
曰弄痛非正產之候或腹痛甚而腰不甚者非
正產之候胎高未陷下者非正產之後穀道未
挺逆者非正產之候水漿未破血未出者非正
產之候漿水雖出而腹不痛者非正產之候凡

有正產候且令扶行熟忍如行不得或凭物坐之或安卧之或服安胎藥三服得安卽止慎勿服催生藥餌愴惶令產母憂恐務令安心存養如覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先因其母直待子逼門戶腰至痛極眼中如火穀道挺逆時是正產方所用力并服催生藥

一正產十月滿足忽腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀道挺逆繼

之漿破血出兒子遂生名曰正產

一凡催生妊婦欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺逆已見正產之候兒却未生卽可服藥催之或有經及數日產母困苦已見正產之候但兒難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下

一產當盛暑要令溫涼得所不可恣意取涼傷胎損氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事

荷葉散 盛暑臨產三日發大熱其脉虛疾而大惡

露不行敗血攻心狂言呌呼奔走拏捉不住

乾荷葉 生地黃 牡丹皮

濃煎湯調下生蒲黃二錢一服卽定惡露卽下遂

安

一冬月天冷產母經血得冷遂凝以致兒不能生
下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣
不可坐卧寒處當蒲房着火常有煖氣令產母
背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散

使子易生

羊肉湯

寒入產門臍下脹滿手不可犯此寒疝

當歸

錢二

生姜

兩一

精羊肉

兩四

陳皮

兩半

水三碗酒少許煎至二碗分二服或少入葱鹽亦

佳

一腹痛繞作便謂生產坐婆踈狂不候時至便言

試水試水併胞漿先破風入產門以致腫脹門

戶狹小乾澁難產

一及產產母忍痛不肯舒伸行動曲腰眠嚙胎元

轉動尋至生門被遮閉又轉又尋至三胎已無力
央主難產

一產母如覺飢餓可進以軟粥飯勿令飢渴恐致
產時困乏無力若不飢渴不須強與飲食

催生類

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生
滑胎等藥或勢不得已則服之凡服催藥必候
腰痛甚胎陷下漿血破方可服切不可坐早及
令坐婆亂動手

大法用藥滑以流通澀滯 苦以驅逐閉塞

香以開竅逐血 氣滯者行氣 胞漿先破疲

困者固血

佛手散 丹溪云催生只用此散最穩當又効捷

川芎

二兩

當歸

三兩

右爲細末每服二錢水一盞酒二分同煎七分溫服

生如聖散

滑劑

歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調

濟君急若遇臨危產難時免得全家俱哭泣

黃蜀

葵子

小半合一
方二錢重

研爛以酒濾去滓溫服神

効或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久腹中
氣寬胎滑卽產須見正產候方可服之

又方 以香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末
服

又方 治橫倒生者

明阿膠

炒

滑石末

各一兩

葵子

二兩

右水一盞半煎至一盞去滓分二服

催子柞木飲子

苦

治產難或橫或倒死胎爛脹腹

中此方用之神効

大柞木枝

一大握長一尺寸
剉洗淨生用

甘草

大者五寸
剉作五段

右用新汲水三升半同入新磁瓶中以紙三重封
緊文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐
草時溫飲一小盞腰未重痛勿服便覺心下開豁
如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最
穩最驗

乳珠丹

香劑

用通明乳香研細以豬心血爲丸梧子大硃砂爲

衣日乾每服一粒催生冷酒化下良久未下再服
一粒若大段難產以蓮葉心蒂七個水二盞煎至一
盞放溫化下一粒若久未下再服其驗如神如胎
下胎衣不下者服此便下若胎橫逆不順卽先服
神應黑神散再服此藥催之令藥時要五月五日
午時極妙

又方

通明乳香

如皂角子大

爲末腰痛時新汲水一小盞入

醋少許同煎令產母兩手提兩石燕坐婆調藥飲

冰須臾坐草便生無痛楚神方

開骨膏

五月五日
午時作

乳香研細滴水丸如芡實大每服一粒酒吞下

催生丹

治產婦生理不順產育艱難或橫或逆十

二月兔腦髓

去皮膜
研如泥

母丁香

一錢
細末

乳香

二錢半
另研

麝香

另所
一錢

右三味持勻以兔腦髓和丸鷄頭實大陰乾油帛
裹每服一丸溫湯下卽產兒手握藥出

如意散

臨產腰疼方可服之

人參

爲木

乳香

各一錢

朱砂

二錢

右同研臨產急用鷄子清一個調藥末再用生姜

自然汁調開冷服如橫倒等即時端順子母無恙

易產天麻丸

行

天麻

卽益母草六月間帶根
花葉採曬乾不以多少

爲末煉蜜丸龍眼大臨產熱水嚼一丸能除產後

百病

聖散 專治孕婦難產

紫蘇葉

當歸

各等分

右咬咀每服三五錢用長流水煎服如無流水以水順攪動煎服卽下

又方 用紫蘇煎湯調益元散服之卽產

無憂散 治胎胞氣逆臨蓐難產

當歸

酒浸

川芎

木香

不見火

白芍藥

枳殼

去白鹽炒

甘草

炙各一錢半

乳香

另研

血餘

燒存另研

右作一服水二鍾煎至一鍾入乳香血餘和服

固血催生方 治胞漿先破惡水來多胎乾不下時

先與四物湯

當歸 川芎 地黃 芍藥

水煎服補養血氣次更濃煎葱湯放冷令坐婆洗
產戶須是款曲洗令氣上下通暢更用酥調滑石
末塗產戶裡次服神妙乳珠丹或葵子如聖散

催生百靈散

治逆產橫生疲胎

百草霜

香白芷

不見火
爲末

右二味等分研勻每服二大錢以童便并少米醋
打爲膏沸湯調下集驗用酒童便各半盞同煎幾

沸卽熱服不過再服卽產

半夏湯

破血

治胎乾而不能產

半夏麴

一兩半

大黃

五錢

肉桂

七錢半

桃仁

三十個微炒

右爲粗末先服四物湯一二服次服半夏湯姜三

片水煎

滕金散

治難產逐敗血卽自生順逆則轉正子死

腹中則胎軟膨寬卽產千金不授

王不留行

酸漿草

虎胎
焙用

芫蔚子

白茯苓

去刺

五靈脂

行血宜生用各等分

右爲散每服三錢取利方水一盞半入白花劉寄

奴子一撮同煎溫服大効

至寶催生丸

何首烏

白色者二兩酒洗淨去皮搗碎乾末

川烏

四兩溫甘草湯洗淨取出

皮苗待草烏同製

兩頭尖

草藥勿認作鼠蜚條去黑皮淨二兩

大當歸

酒洗四兩

草烏

四兩先洗淨去黑毛同用烏俱切爲片用无灰酒煮

一日爲度餅晒乾爲末

前三烏俱不可犯鉄器

蒼朮

四兩米泔水浸洗粗皮換酒浸切

一宿刮去片晒乾

人參

去蘆四兩

桔梗

甘草

白芷

白朮川芎 天麻 茴香 麻黃 防風

荆芥

已上各四兩

木香 細辛

血竭

各一兩

右製爲極細末煉蜜丸如粟子大每重二錢二分
臨產紅花當歸煎酒化服如難產胞衣不下進三
次服三丸卽下

如聖膏

外取

治產難併治胞衣不下兼治死胎

蓖麻子

七粒

去殼細研成膏塗脚心胞卽下速

洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腹自縮入

萬金不傳遇仙丹

草麻子

十四粒
去壳

硃砂

雄黃

研各一錢半

蛇蛻

一尺燒存性

一方草麻子

三粒

右爲末漿水飯爲丸彈子大臨產時先用椒湯淋
深臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上濶
帛束之頭生下急取去藥一丸可用三次

立聖丹

治產難危急者

寒水石

四兩生用二兩
兩煨赤二兩

右同研細入朱砂同研如深桃紅色每用三分并
花水調如薄糊以紙花剪如杏葉大攤貼臍心候

乾再易不過三上便產橫逆惡候死胎不下並治
神驗

神母散 產難經日不生

雲母粉

半兩

溫酒調服入口卽產萬不失一

神驗散 治催生果効靈妙之理人所難通用實殊
効臨產時令人路上尋破草鞋一隻取耳燒灰溫
酒調下三錢匕得左足者男右足者女覆者死側
者有驚果是神竒用此送催生丸猶妙

交骨不開類

交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調
攝以致血氣不能運達而然也交骨不開者陰氣
虛也用此湯主之

加味芎歸湯

川芎

當歸

各一兩

自死龜板

一個酥炙

婦人髮

生男女勿者一握燒存性

右爲散每服五錢水煎約人行五里卽生如胎死
亦下灼過龜板亦可

諸產逆類

橫產

橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一遍遂至身橫不能生下當令產母安然傾卧後令看生之人先推其手令入直止漸漸逼身以中指摩其肩推上之正之或以指攀其耳而正之須是產母仰卧然後推兒直上徐徐正之候其身正煎催子藥一盞吃了方可用力令兒下生此名橫產

倒產

倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令
兒子不能廻轉便直下先露其足當令產母仰臥
令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力
亦不得驚恐使兒自順云

蛇蛻散 治妊婦欲產時不肯伸舒行動多曲腰眠
臥忍痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生
須臾不救母子俱亡

用烏蛇蛻

一條

蟬蛻

十枚

血餘

一握用
胎髮

並燒灰存性研分二服溫酒調連進之仰臥少頃

或用小線針於兒腳心刺三五刺用鹽少許塗刺處卽時順生母子俱活

又方 橫倒難生

蛇蛻

一條全者

蠶故帛

一張

右二件皆入新瓦瓶中鹽泥固濟燒存性爲末煎榆白皮乳香湯調下一錢二服出

又方 橫倒先露手足

阿膠

炒

滑石

一兩

黃葵子

一合

酥

一兩

每服四錢水一大盞煎至一盞一二次服

又方 橫逆不順子死腹中

伏龍肝

卽灶心多年
土紅者佳

右研細末溫酒調下一錢其藥兒頭戴出妙

偏產

偏產者兒身未正產母用力一遍致令兒頭偏挂
左腿或偏挂右腿故頭雖露偏挂一畔不能生下
當令產母仰卧次令看生之人輕輕推兒近上以
手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送
卽便生下若是小頭頭後骨偏挂穀道只露其顙

當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外方輕
輕推兒頭令正便令產母用力送兒生下

礙產

礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身
圓轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產
母仰卧令看生之人輕推兒近上徐徐引手以中
指按兒肩下扒其肚帶仍須候兒身正順方令產
母用力一送使兒生下 以二四產看生人非良
手不可輕用

坐產

坐產者兒將欲生其母疲倦久坐椅褥祇其生路急於高處繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也

盤勝產

盤勝產者臨產母勝先出然後兒生產後其勝不收其法以盆着溫水盛其勝令產母仰卧與說不妨以安其心却以好米醋半盞新汲水七分調勻與產母面一啜一縮三啜收盡或背側打猛省而

收

又古方

以草脉子仁

四十粒

研塗產母頭頂腸收上卽急洗

去其腸若乾以磨刀水少許濕潤之內用磁石煎湯飲之卽收上磁石須陰陽家用有驗者若以水濕母面恐驚則氣散

又方

產後腸不收

香油五斤煎熱盛盆中候溫坐油盆中約一食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙

又方

半夏爲末搐鼻中則腸上矣

又方

以大紙撚蘸香油點燈吹滅以烟薰產母鼻中腸
卽收上

又方

腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸卽上

又方

用枳殼煎湯溫服良久卽入

子死腹中下死胎類

產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難胞胎已破無血養胎枯涸而死故也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急毒藥下之

熱劑

烏金散

治難產熱病胎死腹中或因顛仆或從高

墜下或房室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或

產時未到經血先下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產婦面赤舌青是其候也面青舌赤毋死子活唇青吐沫子毋俱斃又有雙胎或一死一活其候難知臨時觀變

濟生散

熟地黃

洗切焙
乾酒炒

真蒲黃

大當歸

交趾桂

楊芍藥

軍姜

去皮

粉草

各一兩

小黑豆

四兩

百草霜

五錢

右爲末每服二錢半醋半合許沸湯六七分浸起

溫服疑二之際且飲佛手散酒水合煎二三服探之若未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後更服香桂散須臾如手推下

香桂散 下死胎

桂枝三錢

麝香當門子一

個

用研煖酒服須臾

如手推下 一方單用桂末一錢痛時重便調下
名救苦散

寒劑

大腹子飲

大腹子

赤芍藥

榆白皮

各三兩

當歸

一兩

滑石末

七錢半

瞿麥

葵子

炒

茯苓

粉草

子芩

各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

朴硝散

療胞胎不出

用朴硝

半兩

細研以溫童便調服屢効

又方

于苑腹中不出

用辰砂一兩水煮四五沸爲末取酒調服立止

滑劑

千金方 治子死腹中

用葵子末酒服方寸匕若口緊不開格口灌之藥下卽活

又方 療妊娠胎死腹中或母疾欲下胎

榆白皮煮汁服三升

回生飲 子死腹中或半生不下或半着脊骨在草不產血氣上盪母心面無顏色氣欲絕

猪脂

斤一

白蜜

升一

淳酒

升二

右三味合煎取二升分為二服不能飲隨量服

毒劑

一字神散 治子死胎不下胞破不生此方屢効救

人無量

鬼臼

黃色者不拘多少去毛張爲末極細如粉不用羅以手指擦之

右每服二錢用酒一盞同煎八分通口服神効

雜方 治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急

神龍散

蛇退

一條全者香油灯上燒研

麝香

許小

右爲末童便酒各半盞調一服卽生下

楊氏方 療有孕月數不足子死腹中毋欲悶絕取

大豆

一方黑豆

三升醋煮濃汁二升頓服立効

又取死胎法

用烏鷄一隻去尾細切以水三升煮取二升去鷄通手用衣帛蘸磨臍下胎自出

又方 子死腹中不出

用黃牯牛糞塗母腹上立出 熱佳

一方以牛屎炒大熱入醋半盞以青布包於臍上下熨之立下

牡丹丸 生子下血過多子死腹中增寒手指甲青
面色黃黑胎上搶心悶絕欲死冷汗自出喘滿不
食或食毒物或誤服草藥傷胎下血胎尚未損可
安已死腹中卽下胎死腹中危甚亦用

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁 赤芍藥

右等分爲末蜜丸彈子大每服一丸細嚼淡醋湯
送下連進數丸

千金神造湯 妊有兩子一死一活服此死者出生
者安

蟹瓜

升一

甘草

兩三

阿膠

兩三

右用東流水一斗先煮蟹瓜甘草得三升去滓次入阿膠令烊頓服之不能盡分二三服若妊母因弱仰口納藥藥入卽活藥用東向竈以蒿薪煮之至穩方胎死不出以此下之

先用平胃散以酒煮二服服之次研細朴硝二錢以童子小便調服卽下

霹靂奪命丹

須至誠修合勿令婦人鷄犬見

蛇蛻

一條入瓦罐內服

千里馬

路上拾左腳舊草鞋洗淨燒灰一錢

金銀箔

各七片

髮灰

二錢

馬鳴退

即垂退燒灰

乳香

半錢另研

黑鉛

三錢半溶開水銀七錢半共攪炒成研用

右用獾猪心血丸如梧桐子大倒流水灌下二丸

如灌不行化開灌救

產後調養法

一凡生產畢飲熱童便一盞不得便卧且宜閉目而坐須臾上床宜仰卧不宜側卧宜堅膝未可伸足高倚牀頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更

以手從心掣至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆不問腹痛不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服妙酒強行血亦不可多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄仍慎言語七情寒暑梳頭洗足以百日爲度

若血氣索弱不計日月否則患手足腰膝酸痛等証名曰瘵勞最難治療初產時不可問是男是女恐因言語而滯氣或以愛憎而動氣皆能

致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐動心氣
不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事不
可房煮粥煎藥動其虛熱犯時微若秋毫成病
重如山嶽

一凡產後百日乃可會合不爾至死虛羸百疾滋
長慎之

凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也
產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散
乃進羊肉湯

產後調理類

丹溪云產後以大補氣血爲先雖有雜症以末治之產後一切不可發表產後戒用芍藥以酸寒伐生發之氣也

加味理元湯 新產之後雖無疾故宜將息調理脾胃美飲食則臟腑易平復氣血自然和調百疾不生

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮 藿香

確砂仁

黃芪

各等分

右劉散每服四錢姜三片棗一枚煎溫服

四順理中湯 治新產血氣俱傷脾胃不調百日內

宜服

人參

乾姜

炮

白朮

各一兩

甘草

炙半兩爲細末

右煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心米飲下

四味湯 治產後一切諸疾總方分娩一服尤妙

當歸

心膈煩加半錢

玄胡索

氣悶喘加半錢

血竭

惡露不快加半錢

沒藥

心腹脹痛加半錢

右等爲細末每服二錢食前以童便一鍾煎至六

分溫服

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏眩大便澀滯此藥涼膈壓熱下乳

人參

白茯苓

甘草

各半

川芎

苦梗

炒

白芷

各一兩

當歸

二錢半

芍藥

七錢半

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分溫服如煩

熱甚大便秘者加大黃二錢半

地仙煎

治產後諸疾

生地黃汁

生姜汁

各一升

藕汁

半升

大麻仁

三兩去
壳研

右和勻入銀器內慢火熬成膏溫酒調服半匙更
以北朮煎膏入半匙尤佳

梔仁煎

療產後百病諸氣

梔仁

一千二百枚去皮尖
及雙仁熬令黃色

右搗令極細以上等酒一斗五升同研三四遍如
作麥粥法以極細爲佳入小長頸甕瓶中密塞以
麵封之納湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使
瓶口常出在湯上勿令浸之候熱取出溫酒服一

合日再服

產後醋墨

松烟細墨

不拘多少用炭火煨通紅以米醋淬之再煨燂如此七度

童

右研令極細用絹羅過終產了服二錢以產便調

下

琥珀散 治產後一切危急之疾

琥珀

硃砂

麝香

香墨

醋炙

僵蚕

當歸

各二錢半

鯉魚鱗

炒焦

桂心

百草霜

白附子

梁上塵

炒令烟出篩淨各半兩

細末之炒生姜熱酒調服二錢効

千金增損澤蘭丸 療產後百病理血氣補虛勞

澤蘭

甘草

當歸

川芎

各一兩
七錢半

附子

炮

乾姜

白朮

白芷

桂心

北細辛

各一兩

北防風

人參

牛膝

各一兩
二錢半

栝子仁

熟地黃

石斛

各一兩
兩半

厚朴

藁本

蕪荑

各五錢

麥門冬

去心
二兩

共爲細末煉蜜如梧子大溫酒下二十丸

黑神散

治產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胞痞

滿或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後
瘀血諸疾並皆治之

又名烏金散治產後十八証 一曰因熱痲胎死

腹中二曰產難三曰胎衣不下四曰血暈五曰口

乾心悶六曰乍寒乍熱七曰虛腫八曰乍見鬼神

九曰月內不語十曰腹痛泄瀉兼服止瀉調氣藥十一曰

遍身疼痛十二曰血崩十三曰血氣不通咳嗽十

四曰寒熱心痛月候不來十五曰腹脹滿嘔逆不

定次服硃砂九二三日妙生姜醋湯下七九十六曰產後口鼻黑色起

及鼻衄

不可治

十七日喉中氣喘急

死不治

十八日中

風

兼荆芥散

熟乾地黃

蒲黃

炒

當歸、乾姜

炮

桂心

芍藥

甘草

各四兩

黑豆

炒去皮半升

右爲細末每服二錢酒童便各半盞同煎服

黑龍丹

治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡

疾垂死者但權藥得下無不全活

當歸

五靈脂

川芎

良姜

熟地黃

各一

右細剉以沙合盛赤石脂泥縫紙筋鹽泥固濟炭火十斤煨令通赤去火候冷開着成黑糟色取出

細研却入後藥

百草霜

五兩

硫黃

乳香

各一錢半

花蕊石

琥珀

各一錢

右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以
米醋煮糊丸如彈子大每服一丸炭火燒令通赤
投於生姜自然汁與童便入酒漉出控乾研細只
用此酒調下

胞衣不下類

胞衣不下者母生子訖流血入衣中爲血所脹故

不得下治之稍緩腹脹滿以次上衝心胃疼痛喘
急必致危殆急服奪命丹逐去衣中之血血散脹
消胎衣自下又兒產出胎衣不落世謂之息胎由
產初時用力比兒出體已疲憊不復能用方產胞
經停之間而外冷乘之則血道澀故胞衣不出急
須以方藥救治不妨於兒所柰者胞繫連兒臍胞
不出卽不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒卽成病也
舊法胞衣不出恐損兒者急宜斷臍帶以少物繫
墜繫墜切宜用心先繫然後截斷不爾則胎上掩

心而死繫墜則使其子血脉不潮入胞中則胞衣
自當癆縮而下縱淹延數日亦不害人須令產母
安心

奪命丹

附子

半兩
煨

牡丹皮

一兩

乾漆

二錢半
之炒烟盡

右爲細末以醖醋一升大黃末一兩同熬成膏和
藥丸如梧子大溫酒吞五七丸不拘時服

花蕊石散

治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈

惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭煖

急以童便調一錢取下惡物如豬肝終身無血風
血氣疾膈上有血化爲黃水卽吐出或小便中出
若先下胎衣則泛泛之藥不能達若先治血悶則
尋常之藥無此功無如此藥有兩全之妙

花蕊石

一斤

上色硫黃

四兩各
細研

右二味相拌令勻先用紙和膠泥固瓦礮子一個
內可容藥候泥乾入藥在內密泥封口了焙籠內
焙令透熱安在四方磚上

磚上書八
卦五行字

用炭一秤籠疊周匝自己午時從下生火漸漸上

微有墜下火放夾火上直至經宿炭消火冷又放
經宿冷定取出細研以絹羅至細磁合內盛依法
用之

芎藭榆白湯 治胎衣不下

芎藭

當歸

焙各半兩

榆白皮

一兩剉

右爲細末每服三錢食前用生地黃汁同溫酒調
下

必効牛膝湯 治胎衣不出臍腹堅脹急痛卽殺人
服此藥胞卽爛下死胎

牛膝

瞿麥

各四兩

當歸

三兩

通草

六兩

滑石

八兩

葵子

五兩

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下服此藥衣卽爛出

千金急備丸 治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊

以錦文大黃

一兩

爲細末用醎醋半升同煎如膏丸

如梧子大溫醋湯吞五丸或七丸須臾惡血卽下愈

下胎丸

半夏

白蘇各半
兩

右爲細末丸如梧子大食後半夏湯下三十丸漸
加至五十丸

又方 胎衣不出若腹脹則殺人

黑豆

三合炒
令熟

入醋一盞煎三五沸去豆分三

服酒煮亦可

廣濟治胎衣不出方

用龜突中土三指撮以水服之

又方

鷄子

一枚

苦酒

一合

和飲之立出

又方

紅花

一兩

酒煮濃汁服

又方

皂角刺燒爲末每服一錢溫酒調下

一法

欲產時先脫所着衣以籠灶旣易產胞衣易

下

一法

取夫單衣蓋井上立出

血暈附厥逆類

產後血暈者由敗血流入肝經眼黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調

黑神散。寢佳。庸醫或作暗風中風治之。誤矣。凡血
暈。熱乘虛逆上。塞心。故昏迷不省。氣閉欲絕。是也。
其由有三。有用心使力過多。而暈。有下血多。而暈。
有下血少。而暈。暈雖不同治。當詳審下血多。而暈。
症。但昏悶煩亂。宜補血清心藥。下血少。而暈。乃惡
露不下。上搶於心。心下滿急。神昏口噤。絕不知人。
當用破血行血藥。郭稽中論產後氣血暴虛。未
得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者。
令人悶絕。不知人口噤。神昏。氣冷。醫者不識。呼爲

暗風若作此治病必難愈宜服清魂散即愈

清魂散

表

澤蘭葉

人參

各二錢半

川芎

半兩

荊芥

一兩

一方有甘草

二錢

右爲末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽
眼即開氣定即醒

保命荊芥散 治產後風虛血暈精神昏昧

荊芥

一兩三錢

梔仁

炒五錢

右細末熱水下三錢微喘加杏仁

炒甘草

各三錢

又方 產後血暈神妙

用荊芥穗爲末童便調下二三錢

右荊芥利氣虛人不可服

來麴散

裏

治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香

不見火

神曲

炒

陳皮

去白

白芍藥

阿膠

蛤粉炒

麥蘖

炒

黃芪

去芦

生姜

炒黑各一錢

糯米

撮一撮

苧根

洗淨一錢半

甘草

炙半分

右作一服水二鍾煎至一鍾幹開口灌下卽愈

歸元湯

治產後去血過多血暈不省

川芎

當歸各等分

右作一服水二鍾煎至七分食前服腹中刺痛加

白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加白芍

水停心下加茯苓生姜虛煩不得眠加人參竹葉

廣濟方 治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急

欲絕

芍藥

甘草

各一兩

丹參

七分半並為咬咀

生地黄

斤一

生姜汁

白蜜

各二合

右水二升先煎前藥取八合下二汁及蜜和勻分

兩服

又方 產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷
氣欲絕 新羊血一盞飲之妙日三服

又方 產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也

破鷄子三枚吞之便醒若未醒可與童便一升其
驗若產後去血多者又增此疾與鷄子不醒者可
急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頻與
三五服瘥

獨龍散

下血少而暈者宜破血行血

婦人產後血暈此乃虛火載

血漸漸暈將上來

用鹿角燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下
一呷卽醒此物行血効

單行散 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈脂

二兩半
生姜炒

爲細末每服二錢溫酒調下口噤者拗開口灌之
入喉卽愈

一方加荊芥爲末童便調服如崩不止加當歸酒
童便煎不拘時服

復生散 治下胎或血上衝心已死

用鬱金燒存性爲末二錢醖醋一合調灌活

奪命散 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失

志及產後百病

沒藥

血竭

各等分

右研細爲末纔產下便用童便細酒各半盞煎一兩沸調下二錢良久再服其惡血自循下行更不衝上免生百疾白湯調下亦可

保命紅花散 治產後血昏血暈血崩及月事不勻

遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川當歸 紅花

蒲黃

炒各等分

右細末每半兩酒煎和渣溫服如胎衣不下榆白皮湯調下半兩

花蘆石散 治產後氣欲絕惡血奔心欲死者但以

童便調一錢服之取下惡物爲妙

見胎衣不下

又方 治產後血暈心悶亂恍惚如見鬼

生益母草汁

三合如無根亦可

生地黃汁

二合

童便

合一

鷄子清

一枚

右前三味煎三四沸後入鷄子清攪停作一服

張氏方

治產後血暈全不省人事危極者

右切韭菜入有嘴磁瓶內煎熟醋沃之便密繫瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人起坐惡血衝心故有此症韭能去血中之滯血加以醋氣運達之用無不効

血不下類

夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞

絡挾於宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏於血血壅滯不宣積蓄在內故令惡露不下也

芍藥散 療產後三四日惡露不下

芍藥

十分

知母

八分

生姜

當歸

蒲黃

各四分

紅花

二分

荷葉中心蒂

七枝

生地黃汁

二合

右細切以水二升煎至七合去滓服

荷葉散 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉

二兩

鬼箭羽

桃仁

劉寄奴

蒲黃

各一兩

右爲粗末每服三錢以童便一大盞姜二片生地黃一錢搗碎同煎至六分去滓無時熱服

沒藥丸 治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脉皆痛如錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所擁遏血蓄經絡

當歸

一兩

桂心

芍藥

各半兩

梔仁

去皮尖炒研

沒藥

研各二各半

蜜虫

去足炒

水蛭

炒焦各三十枚

右爲末醋糊丸如豌豆大醋湯下三九

千金保產方 治婦人惡血不下

當歸炒

芫花炒等分

右爲細末每服三錢酒下

又方 用好米醋淬末以童便酒下妙

黑龍丸 見前

蒲黃散 治產後血不下

蒲黃三兩

水三升煮取一升頓服

血不止類

夫產後惡露不絕者由產後傷於經血虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿

令致氣血不調故令惡露淋瀝不絕也

川芎芍藥湯

虛者補之

治產後血崩眩暈不知人事

川芎 芍藥

當歸 各等分

右咬咀每服四錢水鍾半煎至七分去滓熱服

又方 療產後七八日惡露不止

敗醬草

當歸 各六分

芍藥 續斷 各八分

川芎

竹茹 名四

生地黄 炒乾十分

右細剉以水二升煮取八合空心頓服

神功散

熱者清之

治產後忘血過多心腹微痛然後血

下久而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能療者

貫衆

狀如蜈蚣刺者一個全用只
揀去毛花蔓用之不剉斷

右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷爲細末米飲
調下二錢空心食前服

千金獨聖方

陷下者
舉之

治產後惡血不盡或經月半

歲者

升麻

三兩

清酒

五升

煮取二升半分溫再服

牡蠣散

脫者
澁之

治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四

肢乏弱頭目昏重煩熱不思飲食面黃體瘦

牡蠣煨

川芎 熟地黃 白茯苓

龍骨各兩

續斷 當歸 艾葉酒炒

人參

五味子

地榆各半兩

甘草二錢半

右爲末每服二錢水一鍾生姜三片棗一枚煎至六分去滓食前服

豆淋酒

汚血

產後猶有餘血水氣者

黑豆五升熬令烟盡於磁器內以酒一斗淬之蓋豆淋酒治汚血又能發表也

廣濟神方 治產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞

痛氣息急治蓐中三十六疾

亂髮

燒存性
一兩

阿膠

二兩

代赫石

乾姜

各二兩

馬蹄壳

一個
燒

乾地黄

四兩

牛角鯁

五兩
醋炙

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三四十九空心

米飲日二服

秘錄

治胎落下血不止

桑木中蠶垂燒末酒服方寸匕日二服

心痛類

產後心痛爲陰血虧損隨火上衝心絡名曰心膈

絡痛宜犬岩蜜湯治之若傷寒心痛名曰真心痛
朝發夕死夕發朝死無藥所救

犬岩蜜湯

生地黃 當歸 獨活 吳茱萸 芍藥

乾姜 甘草 桂心 小草 各一兩 細辛 半兩

右爲散每服半兩水三盞煎一盞去滓稍熱服

七氣手拈散 治產後心氣攻痛

玄胡索 小茴香 白芍藥 乾漆 炒

枳殼 各二兩 黃連 石菖蒲 香附子

蘓葉

各一錢半

沒藥

乳香

各一錢

甘草

六分

右剉散分作二服每服用水一盞半姜三片煎至七分空心服

失笑散 治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈

五靈脂

蒲黃

各等分

右爲末先用醖醋調二分熬膏入水一盞煎七分食前熱服良驗

腹痛類

產後小腹作痛俗名見枕塊兒枕者因母胎中宿

有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患矣若
產婦臟腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則
令結聚痛疼名之曰兒枕也

延胡索散 治產後兒枕腹痛

延胡索

當歸

各一兩

真琥珀

蒲黃

炒各二錢半

赤芍藥

半兩

桂心

半兩

紅藍花

二錢

右爲細末以童便合酒溫溫調三錢食前服

又方 產後三日血塊痛發熱

五靈脂

炒

牡丹皮

沒藥

滑石

右研細分五帖豆淋酒調之食前服

失笑散 行散之 見心痛

四汁飲 治血瘕痛無定處

童便

三升

生地黄汁

生藕汁

各一升

生姜汁

二升

右先煎三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀
餒每取一合溫酒調下

黑神散 治產後血塊痛經行腹痛經脈不調

熟地黄

一斤

陳生姜

半斤

右二味同和炒乾爲末每服二錢烏梅湯調下常服酒調經脈不通烏梅荊芥酒調下

又方 用山查濃煎汁入砂糖少許再煎熱服

當歸血竭丸 治婦人產後惡露不下結聚成塊心
胸痞悶及臍下堅癰

當歸

血竭

芍藥

蓬朮

炒各二兩

五靈脂

四兩

右細末醋糊爲丸梧子大每服五十丸食前溫酒送下

產寶方

產後血下不盡腹中痛無計

青木香 當歸 牛膝 川芎 黃芪

芍藥

各八分

大黃

十三分浸

芒硝

十二分

細切水七升煮二升半入大黃更三沸分三服

金匱方 產後腹痛煩滿不得卧

枳實

炒令黑勿太過

芍藥

各等分

右二味杵爲散服方寸匕日三服并生癰膿以麥粥下之

千金桃仁散 治產後腹痛

桃仁

半升

芍藥

川芎

當歸

桂心

乾漆

熬碎

甘草

各二兩

細切水八升煮二升半分三服

脇脹痛類

產後兩脇脹滿氣痛由膀胱宿有停水因產後惡露下不盡水壅痞與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣水相擊故令痛也

經効方 治產後血氣脹脇肋痛

當歸

十二分

芍藥

苦梗

檳榔

枳殼

各八分

桂心

青木香

柴胡

各六分

右咬咀以水二升煎取八合去滓空心分溫二服
當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸

乾姜

等分

右爲末每服三錢水一盞煎八分入穀醋少許食
前熱服

選勝方 產後惡露不下血氣壅痞脇肋脹痛不食

蘓木

紫葛

各十分

芍藥

當歸

各八分

桂心

蒲黃

各六分

生地黃

汁三合

右咬咀以水二升煎取七合下蒲黃分兩服

又方 理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥

六分

蒲黃

延胡索

各四分

當歸

六分

荷葉蒂

炙三十分

右水二升煎取七合後入蒲黃空心分作兩服

腰痛類

腎主腰脚產後腰痛者爲女人腎位繫胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也

千金大豆酒

產後中風腰背強痛煩熱苦渴頭身

皆重此因風冷及傷寒所致

用大豆

五升炒令烟出

以酒一升投之密蓋令溫去豆服

一升日夜數服卧取微汗避風有加羌活服尤妙

救急方

療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛

胞滿氣急兩脇癢

生姜

一斤

淡竹葉

一斤切

右二味以水二升煮取一升去滓分溫二服

廣濟方

治產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬

當歸

各八分

川芎

桂心

芍藥

各六分

右咬咀水二升煮取八合分溫二服忌葱

當歸黃芪湯

治產後腰痛不可轉側自汗壯熱身

體強氣短

黃芪

芍藥

各二兩

當歸

三兩

右剉每服四錢姜四片水煎溫服

頭痛類

頭者諸陽之會也產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上凑於頭陽實陰虛則令頭疼也

川芎散

行氣

治產後頭痛

真天台烏藥皮

大川芎

等分

右爲細末每服三錢燒紅秤鍾淬酒調服

二奇散

行血

治同前

當歸

川芎

右爲細末每服二錢水一盞煎七分溫服

加減四物湯

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛

蒼朮

一兩六錢

羌活

川芎

防風

香附

炒

白芷

各一兩

石膏

二兩半

細辛

一兩

當歸

甘草

各半兩

右粗末每用一兩水煎不拘時服 如有汗知氣

弱頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半生姜煎

如痰癖頭痛加半夏三兩茯苓一兩生姜煎 如

熱痰頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩 如

寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生姜三片煎

遍身疼痛類

產後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡肉分之

間血多流滯累日不散則骨節不利筋脉急引故
腰背不得轉側手足不得動搖身熱頭痛醫以傷
寒治之則汗出而筋脉動搖手足厥冷變生他病
趁痛散 產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭痛

牛膝 當歸 桂心 白朮 黃芪 獨活

生薑 各半兩 甘草 薤白 各二錢半

右艾咀每服半兩水三盞煎一盞半去滓食前服
又方 治產後遍身青腫疼痛及衆疾

牛膝 大麥蘖 各等分

右爲細末以新瓦礮中填一層麥蘖一層牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煨通紅放冷研爲散但是產後諸疾熱酒調二錢下

中風類

產後中風者由產時傷動血氣勞損臟腑未曾平復起早勞動致令氣虛而風邪乘虛入之故中風風邪客於皮膚經絡但痛痺羸乏少氣筋脉挾寒則攣急喝僻挾溫則縱緩虛弱若入諸歲恍惚驚悸隨所傷府藏經絡而治

防風湯 治產後中風背項強急胸滿短氣

防風

獨活

葛根

各五兩

當歸

人參

白芍

甘草

炙各二兩

右爲呔咀每服八錢水二盞半束子二枚劈破同煎至一盞去滓溫服

經効茯苓湯 治產後風虛頭痛語言蹇澀

茯苓

防風

乾薑

各八錢

麥門冬

去心一兩

芍藥

黃芩

各六錢

犀角屑

四錢

甘草

炙二錢

右呔咀每服一兩水一大盞半煎一盞去渣溫服

雲岐方 治產後中風半身手足不遂言語蹇澁恍惚多忘精神不定

獨活 當歸 芍藥 防風 川芎 玄參

天麻 各五錢

桂心 三錢

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺効更作一劑又作丸每服二十九如有熱加葛根五錢有冷加白朮五錢若有氣症加生姜一兩半若手足不遂加牛膝一錢半草薢三錢黃芪四錢若腹煎加當歸芍藥各七錢半若不食加人參五錢玄

參一兩若寒中三陰所患必冷小續命湯加生姜煎若暑中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷煎

保命血氣湯 治產後諸風痿攣無力

秦艽 羌活 防風 白芷 川芎 芍藥

當歸 白朮 茯苓 熟地黃

各等分

右爲末一半蜜丸一半散酒調下五七十丸妙

華陀愈風散 治婦人產後中風口噤手足痙癱如角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒

築吐瀉欲死

用荊芥穗

微炒爲末

每服三錢豆淋酒調服或童便服之口噤則挑
灌之斷噤則灌入鼻中其効如神大抵產後大眩
則汗出而腠理踈易於中風也

乾葛湯

療產後中風口噤不能言

獨活

二兩

乾葛

一兩半

甘草

炙半兩

生姜

二兩二錢半

右咬咀每服一兩水二大盞煎一大盞去滓溫服

天麻散

治產後中風口噤

天麻

七錢半

白附子

炮

天南星

炮

半夏

湯洗七遍去滑姜製

乾蠍

炒各半兩

右爲細末每服一錢生姜薄荷酒調下幹開口灌

當歸散 治婦人產後中風牙關緊急不省人事口

吐涎沫手足痙攣

當歸

荆芥種各等分

右爲細末每服二錢水一盞酒半盞煎一盞灌之

如牙關緊急幹開微微灌之但下咽卽生屢用救

人大有神効

羚羊角散 治產後中風身體反張

羚羊角屑

當歸各七錢半

獨活 防風

麻黃

去節各一兩

人參 赤芍藥 細辛

桂心

各半兩

右吹咀每服八錢水一大盞半生姜五片煎至一

大盞去滓溫服

羌活防風散 中風口噤四肢痺麻不仁或角弓反

張

羌活

防風

二兩

大烏豆

一升炒

右以酒五升先浸二味經宿大豆乘熱投中攪勻
密封一日以湯煮瓶良久服八合覆衣取汗累累
却急速以豆淋酒服之卽愈