

脉

訣

彙

辨

脉訣彙辨卷五

趙郡辰山李延是期叔父輯著

四明陳久登仲先父叅閱

小序

病有不盡憑於脉者。然憑脉以斷者十居其九。  
乃取其宜忌者而標示焉。使不啻影之隨形。以  
戒世之僥倖於萬一。遺師其咎者也。

脉之主病有宜不宜陰陽順逆吉凶可知

有是病則有是脉。與病相宜則順。不相宜則逆。  
之與順何從區別。是又在陰陽耳。如表病見表脉。

裏病見裏脉實病見實脉虛病見虛脉陽病見陽脉陰病見陰脉之類皆順而相宜者也反此則逆逆順一分而病之吉凶從可推矣

中風之脉都喜浮遲數大急疾兼見難支

中風之脉各有所兼蓋新風挾舊邪或外感或內傷其脈蹠之忽變兼寒則脉浮緊兼風則脉浮緩兼熱則脉浮數兼痰則脉浮滑兼氣則脉沉濶兼火則脉盛大兼陽虛則脉微亦大而空兼陰虛則脉數亦如細絲陰陽則微數或微細虛滑爲頭中痛緩遲爲營衛衰大抵陽浮而數陰濡而弱浮滑

沉滑微虛散數皆爲中風。風性空虛中之於表虛浮遲緩。雖爲正氣不足。猶可補救。急大數病邪不受制。必死無疑。可見大數而猶未至。急疾者尚不可謂其必死也。

傷寒熱病。脉虛浮澀。沉微楷小。證反必衄。汗後脉靜身涼則安。汗後脉動熱甚必難。陽證見陰。命必危殆。陰證見陽。雖困無害。

素問辨論曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也。又曰人之傷於寒也。則爲病熱。熱雖甚不死。觀此則知傷寒雖是陰寒之邪襲人。正氣與之抗拒鬱蒸成熱。

亦理勢之必然者。抗拒在表。故脈滑鬱蒸。成熱。故  
脈澀。熱病得此陽脈。知正氣不勝。而邪氣鼓發。勝  
邪必矣。故喜焉。若沉微澀小。是皆陰氣。證陽脉陷  
表。病見裏溢。與脉反邪盛。正衰。凶之兆也。至若汗  
後。邪解正復。此時脉躁盛者。亦應寧靜。身體自然  
涼和。設脉仍躁。而熱加甚。是正氣已衰。邪氣更進。  
必難乎。其爲生矣。卽素問評熱論所謂有病溫者。  
汗出。輒復熱而脈躁疾。不爲汗衰。狂言不能食。病  
名陰陽交者。陽病見陰者。見陰脈也。卽上文所云。  
熱病而得沉微澀小之類。言證與脉反故。亦危殆。

陰病多陽者見陽脈也亦似與證相反惟傷寒則不然傷寒自表入裏從陽之陰刻刻侵轉層層漸入今陰病得陽脉是轉寒變而變溫和起深沉而出浮淺死陰忽作生陽病雖困篤自當無害故仲景云陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

傷暑脉虛弦細芤遲若兼滑實別證當知

經曰脉虛身熱得之傷暑甲乙經曰熱傷氣而不傷形所以脉虛者是也若難經四十九難曰其脉浮大而散殊有未然夫脉大而散乃心之本脉非病脉也故仲景不言但補其偏曰弦細芤遲芤即

虛豁也弦細遲卽熱傷氣之應也統而言之曰虛分而言之曰弦細芤遲其不以浮大之脉混入虛脈之中稱爲病暑之脉慮何周耶若而垢身熱傷暑之證已見而脉反滑實將兼痰與食矣

勞倦內傷。脾脉虛弱。汗出脉躁死證可察。

動而生陽身固不宜太逆東垣論升陽益胃湯方後云小役形體使胃氣與藥得以轉運升發此卽動而生陽之義也若煩擾而過於勞則肢體轉旋四肢舉動陽氣張亂無往非脾氣之傷故脾脉虛弱爲順也如汗出而脉反躁疾則爲逆矣安得不

死。

瘧脉自弦弦數者熱弦遲者寒代散者絕

素問瘧論曰夫瘧瘧皆生於風故瘧因風暑之邪客於風木之府木來乘土脾失轉輸不能運水穀之精微遂多停痰留飲弦應風木又主痰飲無痰不成瘧故曰瘧脉自弦數熱遲寒自然之理獨見代散之脉則正氣虛脫不續不歛之象邪盛正衰定主凶折

洩瀉下痢沉小滑弱實大浮數發熱則惡

洩痢見於下部無論因之內外總屬傷陰耗裏之

虛證沉小滑弱乃爲相宜若實大浮洪則惡矣實大與虛反浮洪與裏反邪盛正衰不言可喻再加發熱則陰氣彌傷而裏氣彌耗不至躁亾不已嘔吐反呴浮滑者昌弦數緊濇結腸者凶

嘔吐反胃上焦之病也浮爲虛滑爲濇是其正象可以受補故曰昌也脉弦者虛也木來乘土胃氣無餘土將奪矣數則爲焚熯當消穀而反吐穀乃知數爲虛數虛則不運數則氣促嘔吐不止胃將漸敗金匱要畧云陽氣微膈氣虛脉乃數緊則爲寒無陽以運故上出而嘔吐濇脉枯澁吐亾津液

之所以水穀之源枯。遂致羸如。羊、尿必死不治。  
霍亂之候。厥代勿訝。厥逆遲微。是則可曉。

霍亂之證。揮霍撩亂。不能自持。因一時清濁混亂。  
卒吐暴下。暫時不能接續。非死脈也。微細而舌卷。  
叢縮。脉至遲微。陽衰陰盛。真元漸絕之象。暴脫者。  
能漸生而漸絕者。又何能不起哉。

歟脉多浮。浮濡易治。沉伏而難死。期將至。

歟乃肺疾脉浮爲宜。兼見濡者。病將退也。沉則邪  
已入裏。緊則寒邪不散。均主病危。

喘息擡肩。浮滑是順。沉濁肢寒。皆爲逆證。

喘證無非風與痰耳。浮爲陽爲表爲風，滑爲陽中之陰，而爲痰爲食。若能散其邪，則機關可利。推其物則否。塞可通，故曰順脈。沉爲陰爲裏，爲下部濁爲陰爲虛，乃元氣不能接續，豈能充四肢乎？是以喘息擡肩，而四肢又寒也。若更見散脈，則元真將隨喘而散，死亡必矣。故曰逆。

火熱之證，洪數爲宜。微弱無神，根本脫離。

病熱而有火證，火則脈應洪數。若得沉微之陰脈，是無火矣。無火而仍病熱，則知爲無根之陽虛，見熱象也。故主危殆。

骨蒸發熱脉數為虛熱而濶小必頤其軀

骨蒸為虛弱為邪火借土虛鼓二脉是其本脉

濶小之脉濶則精血少小則元氣衰正

氣日損邪火日增所謂發熱脈靜不可救藥耳

勞極諸虛浮軟微弱土敗雙弦火炎則數

勞極損傷氣血日耗形體漸衰所見之脉隨病呈

象如空虛之浮不鼓之弱欲絕之微無力之弱雖

云病脉然與病猶相宜也至若雙弦乃知土敗急

數定爲火炎蓋弦爲肝木雙弦則木太盛久病之

土何堪其侮故知其必敗也數已爲熱急數則躁

卷五  
大  
疾直強畧無半點和柔邪火炎炎真陰自絕六至  
以上便不可治

失血諸證脉必現芤緩小可喜數大堪憂

芤有中空之象失血者宜爾也緩小脉順爲可喜  
脈數而大邪盛正衰爲火燥真陰誠爲可憂

畜血在中牢大却宜沉澑而微速愈者希

血畜於內瘀凝不行瘀凝則脉大不行則脉牢亦  
因病呈象也逐之使去巢穴一空而致新不難矣  
設脉沉小澑微是病有餘而脉反不足病有物而  
脉若無物既不能自行其血又難施峻猛之劑安

望其速愈耶

三消之脉浮大者生細微短濶形脫堪驚

三消皆燥熱太過惟見浮大之脉爲吉耳若脈細小浮濶則氣血之虛衰枯槁不言可知再加身體瘦悴是謂形脫即戴人所云燔木則爲炭燔金則爲液燔石則爲灰煎海水則爲鹽鵝水形氣兩敗豈直可驚已哉

小便淋閉鼻色必黃數大可療濶小知亡

熱乘津液則水道不利水道不利而有熱必鬱蒸而外發黃色見於鼻者以鼻爲肺竅耳數大爲火

象火證見之、又何妨乎、若逢濇小、爲精血敗壞死亡將亟矣。

癲乃重陰、狂乃重陽、浮洪吉象、沉急凶殃。

癲狂既分陰陽、而脉皆取浮洪者、蓋浮洪者屬陽在陽轉陽、自裏達表之象、故均爲吉兆、若沉而急沉則入陰迫裏、急則強急不柔、是無胃氣之脉也、不論狂癲凶殃立至。

癰宜虛緩、沉小急實、或但弦急必死不失。

癰本虛痰、脉來虛緩、自應然也、若沉小急實、或虛

而弦急者肝之真藏脉見矣安望其生耶

痛屬肝病脉必弦急牢急者生弱急者死

痛爲肝病弦急肝脉之常也况弦急直氣不鼓暢者咸主痛脈痛則未有不痛不脹者故弦急而牢見積聚之有根亦見原本之壯實痛係陰寒之咎牢主裏寒之脉最爲相合若急則邪盛弱則正衰必有性命之憂矣

脹滿之脉浮大洪實細而沉微岐黃無術

脹滿屬有餘之證宜見有餘之脉浮大洪實是也沉細而微知元氣已衰證實脉虛無復他望矣

心腹之痛其類有九細遲速愈浮大延久

心腹痛而脉見細遲是氣械舒徐厥邪欲退理應從吉設或浮大重則邪氣方張裏證而得表脉大非所宜輕亦爲中虛之證不能收捷得之妙也

頭痛多弦浮緊易治如呈短濶雖救何及

弦爲陰脉乃陽虛不能張大或致外邪所乘况頭乃諸陽之府而爲邪束於外使陽氣遇鬱故脉多近弦或浮或緊不出風寒初起者散之則愈若短  
脈陽脫于上滯脉陷衰於下至於手足厥寒至節者與真心痛無異必死不治

腰痛沉弦浮緊滑實何者難瘳兼大者失

足三陰從足入腹脉來沉弦者沉爲在裏弦爲主  
痛然何以又兼浮象乎乃沉弦者中有泛泛欲上  
之勢因風厥陰所謂腰中如張弓弦者是也故狀  
其風邪虛浮之性非言在表之浮也緊則兼寒滑  
爲痰氣實因脉挫本乎外因雖困無害如房室過  
度煩勞不節以致精力耗竭腰脊空虛夫腰者腎  
之府力出于督而腰者督所系其爲痛也轉側呻  
吟屈伸不得膝瘦脛冷腰寒而黑行則僵硬不能  
久立此腎藏虛衰之極無可收斂反見空鬆故按

之豁然而大。自不作靖。咎將誰執。壯盛者猶可挽。  
週中年已後。最爲難治。

脚氣有四。遲數浮濡。脉空痛甚。何可久持。

脚氣發于三陽者輕。發于三陰者重。以三陰屬藏。  
經絡居裏。若非藏氣大虛。邪不易及。陳無擇謂風  
寒暑濕四邪。皆能成病。則遲數浮濡。猶與證合。痛  
則日盛。而脉乃空虛。邪盛正衰。比之傷寒。身涼脈  
躁。勢則相反。而咸非吉兆。總以病脉皆馳耳。

五藏爲精。六府爲聚。實強可生。沉細難愈。  
積也聚也。皆實證也。實脉強盛。邪正相搏。一以微

元本之壯實從府從陽。故曰可生其脉。沉細者陰脈也。一以微邪氣之深人故曰難愈。

中惡腹脹。緊細乃生。浮大維何。邪氣已消。

人之正氣。自內達表。自胸腹而達四肢者。其常也。卒中外邪。則正氣不能遠外。而反退縮于內。則氣機歛實。而緊細之脉象見矣。腹安得不脹。藥力一助。正氣必張。邪氣必散。緊者仍筋。細者仍充。而本來之面目可還也。故知其生。若脉浮大。則正先散。越散越於外。則裏更虛。裏更虛。則邪必深入。而欲爲之治。不亦難乎。

鬼祟之脉。左右不齊。乍大乍小。乍數乍遲。

鬼祟犯人。左右二手脉象不一。忽大忽小。忽數忽遲。無一定之形也。

五疸實熱脉必洪數過極而亢渴者爲惡。

五疸實熱濕與熱鬱外不得通內不得泄。會蒸成黃。故曰實熱脉來因應洪數然洪數太過則必發渴。黃爲表蒸渴爲裏熱。表裏亢熱陰何以堪。亢爲濕鬱而汗溺不通渴則更加之飲愈增其病矣。水病之狀。理必兼沉浮大出厄虛小可驚。

水病有陰有陽諸種不一。而沉則在在皆兼卽氣

水風水之在表而脈應浮者亦必有沉沉欲下之勢蓋沉下者水之性也此則專以欬言如指浮者則以位言耳水脈浮大知水氣漸散災厄將出之象若脈虛小則正衰邪存誠可驚也

癰疽之脈浮數爲陽遲則屬陰藥宜酌量癰疽未潰洪大爲祥若其已潰仍舊期殃

具脈浮數者以血泣而氣復從之邪與正鬪鬪則化熱故數也在表在陽故浮也正爲邪搏則宣暢外衛之力薄故復惡寒據脉證似與傷寒表證無異但傷寒雖有痛或在頭或在身體或在骨節未

有痛止於一處者今痛止一處而脉數此處必化  
熱爲膿正癰疽所發之處也卽傷寒論辨脈洪所  
謂諸脉浮數當發熱而酒淅惡寒若有痛處飲食  
如常者蓄積有膿是也如此者乃爲陽毒若脉不  
數身不熱所患之處不疼是邪客陰分不能鼓發  
多致內陷然必兼有煩懊嘔逆胸膈不安等證否  
則不熱不疼脉又不數是一不病人也何得謂之  
陰瘡而反重於陽證耶方癰疽之未潰也無論成  
膿與否熱邪鬱蓄外不疏通脉之鼓湧洪大是其  
宜也至于已潰則熱泄邪解而洪大之脉宜衰矣

潰而不衰一派熱邪正從何復誠爲大可懼者與  
素問評熱病論所謂病淵者汗出輒復熱而脉躁  
疾不爲汗衰病名陰陽交盡而陽乘越雖治無益  
肺癰已成寸數而實肺痿之形數而無力肺癰色白  
脈宜短濶浮大相逢氣損血失腸癰實熱滑數可必  
沉細無根其死可測

肺癰而寸口數實知膿已成矣肺葉焦瘦火乘金  
也是以鼓而無力肺癰幾作則肺氣虛耗白者西  
方本色所謂一藏虛則一藏之本色見也短濶者  
秋金之素體若逢浮大是謂火來乘金尅我者爲

賊邪。血氣敗壞之證也。陽癰實也。沉細虛也。證實

脉虛死期將至矣。

喉痺之脉遲數爲常。纏喉走馬微伏則難

十二經脉與經別多過於此卽不然亦在其前後左右其脉多數數則爲熱故耳間遲脉者乃是外邪襲經經氣不利鬱滯於所過之處故亦爲痺脉來或遲亦與病合若腫痛癰瘍之纏喉風須臾閉絕之走馬痺二者俱火中挾風內暴急烈脉應浮大洪數而反見微伏是正衰邪盛補瀉附從不亦

難乎

中毒之候。尺寸數緊。細微必危。旦夕將殞。  
數緊者。因毒氣盤鬱而搏擊也。一見細微。知其正  
氣已虛。毒邪深入。其能久乎。

金瘡出血。脈多虛細。急實大數。垂亡休治。

受創血去已多。脉空自宜沉細。而反見急數。陰欲  
盡矣。治之何用。

婦人之脈。以血爲本。血旺易胎。氣旺難孕。少陰動甚。  
謂之有子。尺脉滑利。妊娠可喜。滑疾不散。胎必三甲。  
但疾不散。五月可別。左疾爲男。右疾爲女。女腹如筭。  
男腹如盆。

此言女人胎前之脉也女爲陰陰主血故女人以  
血爲本本足而成胎亦易氣旺則血反衰是爲本  
不足未有理失常而能孕者也少陰動甚者心手  
少陰之脉動甚也心主血動甚則血旺血旺易胎  
故云有子卽素問平人氣象論所謂婦人手少陰  
脈動甚者姪子也心藏主血故胎結而動甚乃往  
來流利之義非厥脈如豆之動也尺脉者左右腎  
脉也腎爲天一之水主子宫以繫胞孕胎之根蒂  
也滑利則不枯滯而且有替替含物之象故喜其  
妊娠卽素問陰陽別論所謂陰搏陽別謂之有子

蓋寸爲陽尺爲陰言尺陰之脉搏指而動與寸陽之脉迥然分別也卽此滑利之脉應指滑而不散滑爲血液疾而不散乃血液歛結之象是爲有胎三月矣若但疾而不散是從虛漸實從柔漸剛血液堅凝轉爲形體故不滑耳此妊娠五月之脉其疾左勝于右是爲男孕以男屬陽居左胎氣鍾于陽故左勝右勝于左是爲女孕以女屬陰居右胎氣鍾于陰故右勝勝者甚不甚之謂非左疾右不疾也更祝其腹如箕者爲女胎如釜者爲男胎蓋男女之孕于胞中女則面母腹男則面母背雖各

肖父母之形亦陰陽相抱之理女面腹則足膝抵  
腹下大上小故如箕男面背則背脊抵腹其形正  
圓故如釜

按男女之別叔和脈經曰左疾爲男右疾爲女又  
曰左手沉實爲男右手浮大爲女又曰尺脉左偏  
大爲男右偏大爲女又曰得太陰脉爲男得太陽  
脉爲女太陰脉沉太陽脉浮自後凡言妊娠脉者總  
不出此及滑伯仁則曰左手尺脉洪大爲男右手  
沉實爲女近代徐東臯則曰男女之別須審陰陽  
右脉盛陰狀多俱主弄瓦左尺盛陽狀多俱主弄

璋備察諸義固已詳盡然多彼此矛盾難爲憑據  
若其不易之理則在陰陽二字以左右分陰陽則  
左爲陽右爲陰以脈體分陰陽則鼓搏沉實爲陽  
虛浮沉澁爲女諸陽實者爲男諸陰虛者爲女乃  
爲一定之論更當察孕婦之強弱老少及平日之  
偏左偏右尺寸之素强素弱斯足以盡其法耳

叔和云遣姪娠南面行還復呼之左廻首者是男  
右廻首者是女又云看上圍時夫從後急呼之左  
廻首者是男右廻首者是女婁全善云蓋男受胎  
在左則左重故廻首時慎護重處而就左也女胎

在右則右重故廻首時慎護重處而就右也推之於脉其義亦然亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脉鼓搏有力而於陽之寸脉殊別也 丹溪以左大順男右大順女爲醫人之左右手以此診男女之病原不診產婦須知之

欲產之脉散而離經新產之脉小緩爲應實大弦牢其凶可明

此言產中之脉也其脉與十月懷妊平常見者迥異假如平日之脉原浮臨產則脉忽沉平日之脉

遲臨產則脈忽數至如大小滑濶臨產皆忽然而  
異蓋十月胎氣安定一旦欲落氣血動蕩胞胎迸  
裂自與經常離異而脉亦非平昔之狀貌矣及其  
已產也氣血兩虛其脉宜緩滑緩則舒徐不因氣  
奪而急促滑則流利不因血去而濶枯均吉兆也  
若脉實大弦牢非產後氣血俱虛者所宜實爲邪  
實大爲邪進弦爲陰歛而宣布不能牢爲堅着而  
瘀凝不解是皆相逆之脉設外有證又豈能順乎

小兒之脉全憑虎口風氣命關三者細剖

虎口者食指內側連大指作虎口形故曰虎口此

處肌皮嫩薄文色顯明卽肺手太陰經脉之盡處諸脉大位之地也雖無五部之分而有三關之別指初節曰風關二節曰氣關三節曰命關男左女右側看之文色見風關者輕再進則上氣關爲重再進則直透命關爲最重甚則主死由風邪而干正氣正氣不能勝而迫使于命漸進漸深之象也其色維何色亦爲熱在脉則緩色白爲寒在脉則遲色黃爲積在脉則緩色青黑痛在脉沉弦

三歲以下小兒純陽之體形質小脉之周行駛而應指疾故若大法則以七至爲平其太過爲數爲

熱不及爲遲爲寒此其大較矣然而脉至七八人來  
往速而數息難恐醫者一時不能得病之精狀在  
五藏之列於面各有定部如左腮屬肝右腮屬肺  
額上屬心鼻屬脾頰屬腎是已諸邪之見于三關  
亦各有定色如上所列識本知源錯綜體認存乎  
其人耳

紫熾傷寒青則驚風白爲疳病黃乃脾困黑多赤痢  
有紫相兼口必加渴虎口紋亂氣不調和紅黃隱隱  
乃爲常候無病之色最爲可喜至夫變態由乎病甚  
因而加變黃盛作紅紅盛作紫紫盛作青青盛作黑

黑而不雜藥又何及

此以色合病也

三歲以上便可懸脉獨以一指按其三部六至七至  
乃爲常則增則爲熱減則爲寒脉來浮數乳癟風熱  
虛濡驚風緊實風痛弦緊腹痛弦急氣逆半實便祕  
沉細爲冷乍大乍小知爲祟脉或沉或滑皆由宿食  
脉亂身熱汗出不食食已即吐必爲變蒸浮則爲風  
伏結物聚單細疳勞氣促脉代散亂無論此所最忌  
百難必一

三歲已上便可切脉斷證但小兒正屬純陽陽盛

必數故以六七至爲常也。小兒三部狹小故以一指診之。

所有死證雖治無成。眼上赤脈下貫瞳神。

赤脈屬心。瞳神屬腎。乃心火勝腎水。水乾則不生木。致腎肝皆絕也。

顙門腫起。兼及作瘡。

顙顙者精神之門戶。關竅之橐籥。氣實則合。氣虛則開。諸陽會于首。外生風邪。而乘諸陽。所以腫起。風氣乘於陽。陽極則散。散則絕。所以陷者死。

鼻乾黑燥。

鼻者肺之竅。肺金燥，則不能生腎水。故鼻乾黑燥，則死。

肚大青筋。

土被木尅，以致脾虛而欲絕。故腹脹現青筋者，死目多直視，覩不轉睛。

戴眼者，精不轉而返視。此是太陽已絕。

指甲青黑。

肝之合筋也。其榮爪也，爪甲乃肝之華。肝絕而不能榮，故色黑。

忽作鶴聲。

人之言語出于肺。肺屬金。抑之則響。肺金既絕。故  
欲語而不成聲。但如鴟鳥之啞啞而已。

虛舌出口

舌者心之前。心氣已絕。故舌縱而不收。

齶齒咬人

齒者骨之餘也。腎藏精而主骨。腎氣已絕。齒多咬  
齶。心爲陽。腎爲陰。陰陽相離。安得不死。

魚口氣急。呻不作聲

魚口張而不合也。是謂脾絕。氣急作喘。哭而無聲。  
是謂肺絕。

蛔蟲既出必是死形

蛔蟲生於胃藉穀食以養胃絕而穀食不食蟲乃  
出也

按素問通評虛實論帝曰乳子而病熱脉懸小者  
何如岐伯曰手足溫則生寒則死

此競言小兒之內外證也病熱

脈懸小者陽盛陰脈本爲大禁但小而緩者陽之微也其愈則易小而急者邪之甚也爲可慮耳脉雖小而手足溫者以四肢爲諸陽之本陽猶在也故生若四肢寒冷則邪勝其正元陽去矣故死

帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脉何如岐伯曰喘

鳴肩息者脉實大也緩則生急則死

此言小兒之外感也風熱

中於陽分爲喘鳴肩息者脉當實大但大而緩則胃氣有邪漸退故生實而急則真藏見病日進故

經文二節之義可見古人之診小兒者未嘗不重  
在脉卽雖初脫胞胎亦自有脉可辨何後世幼科  
如水鏡訣及全幼心鑑等書別有察三關之說及  
徧考內經並無其名惟靈樞經脈篇有察手魚之  
色者若乎近之乃概言診法非獨爲小兒也然則  
三關之說特後世之別名耳夫三關又爲手陽明  
之浮絡原不足以候藏府之氣且凡在小兒無論  
病與不病此脉皆紫白而兼乎青紅雖時有濃淡  
之異而四色常不相離何以辨其紫爲風紅爲寒

青爲驚白爲疳又何以辨其爲雷驚人驚水驚獸  
驚之的確乎此說自正但余見富貴之家兒女嬌  
弱一見醫者動輒喊哭若將握手診視勢必推阻  
百端宛轉悲啼汗流浹背父母姑息惟恐因哭受  
傷不覺從旁蹙額况因近來止看虎口一法相沿  
成俗則病家反以診脉爲迂總之幼科大者曰痘  
曰痧雜證曰吐渴驚疳之類其發也莫不先有昭  
然之形證可據不須布指切脉而用藥未致懸殊  
則虎口一說原可借用正不以古今爲限也因備  
錄虎口之說以通診法旁門云耳

脈之指趣吉凶先定更有圓機活潑自審從證舍脈從脈舍證兩者盡然藥無不應

脈之合證是其常也又有不當熱者更不可不知於傷寒尤爲喫緊如脈浮爲表治宜汗之是其常也而亦有宜下者焉仲景云若脉浮大心下硬有熱屬藏者攻之不令發汗是也脈沉爲裏治宜下之是其常也而亦有宜汗者焉少陰病始得之反發熱而脉沉者麻黃附子細辛湯微汗之是也脈促爲陽當用葛根芩連清之矣若脈促厥冷爲虛脫非灸非溫不可此又非促爲陽盛之脉也脈遲

爲寒當用乾薑附子溫之矣若陽明脉遲不惡寒身體濶濶汗出則用大承氣此又非遲爲陰寒之脉矣四者皆從證不從脈也世有切脉而不問證其失可勝言哉表證汗之此其常也仲景曰病發熱頭痛脉反沉身體疼痛當救其裏用四逆湯此從脉之沉也裏證下之此其常也日晡發熱者屬陽明脉浮虛者發汗用桂枝湯此從脉之浮也結胸證具當以大小陷胸下之矣脉浮大者不可下下之則死是宜從脉而治其寒也身疼痛者當以桂枝麻黃解之矣然尺中遲者不可汗以營血不

足故也是宜從脈而調其營矣此皆從脈不從證也世有問證而忽脈者得非仲景之罪人乎

脉訣彙辨卷六

趙郡辰山李延是期叔父輯著  
檇李朱茂暉子若父叅閱

小序

奇經爲十二經之總持故云醫不知此罔探病  
機誠墮之也誠難之也茲編洞若觀火學者能  
精求之進乎技矣倘曰吾問病而發藥稱良工  
焉母雖論脉又何有於奇經則非予所知者予  
知有其道而已

別有奇經常脉之外無與配偶所當細察

奇經者在十二經脉之外無藏府與之配偶故曰  
奇夫藏府之脉寸闊尺有定位浮中沉有定體弦  
鈎毛石有定形此則另爲一脉形狀並異而隧道  
亦殊病證不同而診治自別

奇經之數共得其八陰維陽維陰蹻陽蹻衝任督帶  
諸脉所决

時珍云人身二十七氣相隨上下如泉之流不得  
休息終而復始其流溢之氣入於奇經轉相灌溉  
而奇經八脉陰維也陽維也陰蹻也陽蹻也衝也  
任也督也帶也不拘制於十二經正經之脉隆盛

則溢於奇經故秦越人比之天雨降下溝渠溢溝  
溝沛妄行流於河澤醫而知乎八脉則十二經十  
五絡之大旨得矣仙而知乎八脈則毫毛十降玄  
牝幽微之竅妙得矣陰維起於諸陰之來可內踝  
而上行於督分陽維起於諸陽之會由外踝而上  
行於衛分所以爲一身之綱維也陰蹻起於跟中  
循內踝上行於身之左右陽蹻起於跟中循外踝  
上行於身之左右所以使機闢之蹻也衝脈起  
於會陰夾臍而行直衝於上爲諸脉之衝要故曰  
十二經脉之海任脉起於會陰循腹而行於身之

前爲陰脈之承任故曰陰脈之海督脈起於會陰循背而行於身之後爲陽脈之總督帶脈則橫圍於腰狀如束帶所以總約諸脈是故陽維主一身之表陰維主一身之裏以乾坤言也陽蹻主一身左右之陽陰蹻主一身左右之陰以東西言也督主身後之陽任衝主身前之陰以南北言也帶脉橫束諸脈以六合言也

尺外斜上至寸陰維尺內斜上至寸陽維胸脇刺痛寒熱眩仆

從右手手少陽三焦斜至寸上手厥陰心胞絡之

位是陰維脈也從左手足少陰腎經斜至寸上手太陽小腸之位是陽維脈也斜上者不由正位而上斜向大指名爲尺外斜向小指名爲尺內陰維爲病心痛胸腹刺築者以陰維維絡一身之陰陰主榮主裏不能維陰則陰無約束而榮氣因之不和故在裏則心痛又榮主血血合心故心痛也其脈氣所發陰維之郄名曰築賓足少陰內踝上一寸半與足太陰會於腹哀足太陰乳下又與足太陰會於府舍足太陰小腹下與任脈會於天突任脈喉下廉泉觀此則知本脈之維於胸腹諸陰無一不到其脉不榮則

不能維在胸膈失所維則動築而刺痛矣陽維絡一身之陽陽主衛主氣主表病則不能維陽是陽無護持而衛氣亦因之不固故在表而生寒熱其脈氣所發別於金門在足太陽外踝下以陽爻爲郊足少陽外踝上與手足太陽及蹠脉會於臑俞手太陽肩後與手足少陽會於陽白足少陽眉上上於本神及臨泣足少陽側角足少陽眉上至正營足少陽目窓上及腦空足少陽枕骨下下至風池足少陽眉後與督脉會於風府督脈風府後髮際嘔門督脈風府後觀此則知本脈之維於頭目手足頸項有背諸陽無一不到其脉不榮則不能維在頭目無維則眩在頸

項肩背無維則僵在手足無維則仆矣

尺左右彈陰蹻可別陽緩陰急寸左右彈陽蹻可夾  
陰緩陽急二蹻同源病亦互見癲癩瘧癰寒熱恍惚  
難經二十八難曰陽蹻脈起於眼中陰蹻亦起於  
眼中而又同終於目靈樞脈度篇曰蹻脈者少陰  
之別起於然骨之下上內踝之上直上循陰股入  
陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入頤屬目內  
皆合於太陽陽蹻而上行氣并相還以爲濡目濡潤  
榮養  
于目又曰男子數其陽女子數其陰當數者爲經  
不當數者爲絡觀此則知二蹻之脉雖以男女分

陰陽而實則迭爲經絡是一本也故其爲病亦不似他經逐經分屬本文以癲癇瘓癥寒熱恍惚總系二經之下以二經均可病此證雖云四而病機可分爲八陰陽緩急之義自是顯然夫人之身背爲陽腹爲陰開爲陽闔爲陰外爲陽內爲陰熱爲陽寒爲陰癲則目閉俛首陽緩而陰急也癇則目直僵仆陰緩而陽急也筋脉掣向裏拘陽緩而陰急也筋脉縱從外弛陰緩而陽急也寒則氣收歛從裏從陰陽緩而陰急也熱則氣散漫從表從陽陰緩而陽急也靈樞謬刺論曰邪客於足陽躡之

脈令人目痛從內背始且合太陽上行而並濡於目病屬目而從外陽蹠之病陰緩而陽急也惚者胸中慄愞若有所失妄樞脉度籥曰蹠脈者少陰之別起於然骨之後循陰股入陰上循胸裏入缺盆二十八難曰陰蹠脈者亦起於眼中循內踝上行至咽喉交貫衝脈病屬胸腹而從內陰蹠之病陽緩而陰急也二脉一爲經一爲絡病在經則經急絡緩病在絡則經緩絡急總之皆可言經皆可言絡但以男女分陰陽之所屬緩急證病邪之所在則得其義矣

直上直下尺寸俱牢中央堅實衝脉昭昭胸中有寒逆氣裏急痛氣攻心支滿溺失

衝脈起於胞中後行於背前行於上上行於頭下行於足以至谿谷肌肉無處不到誠十二經內外上下之要衝也爲經絡之海亦名血海其浮而外者亦循腹上行會於咽喉別而絡唇口脈平與任脈同素問骨空論曰衝脈者起於氣衝並足少陰之經挾脅上行至胸中而散難經二十八難則曰起於氣衝並足陽明之經挾脅上行至胸中而散痿論亦曰衝脈者經脈之海主滲灌谿谷與陽明

合於宗筋二論所並雖有少陰陽明之不同要知  
自臍至胸與陽明則並於前與少陰則並於後也  
故與陽明皆得稱五藏六府之海脈來直上直下  
弦長相似尺寸俱牢亦兼弦長氣不順血不和則  
胸腹之氣循經壅逆而裏急矣病氣攻心正逆急  
也支滿者脹也溺失者衝脈之邪干腎也

按督任衝三脉直行上下發源最中故見於脉亦  
皆直上直下也直上直下者卽三並俱長透之義  
若直上下而浮則氣張揚陽象也故屬督若直上  
下而繁則勢歛束陰象也故屬任若直上下而牢

則體堅實有餘之象也故屬衝

寸口丸丸緊細實長男疝女瘕任脈可詳

任脈總諸陰之位其脉起於胞中循腹裏爲經絡之海其浮而外者循腹裏上行於咽喉別而絡唇口難經亦云起於中極之下以上毛際循腹裏上開元至咽喉蓋七疝之發多起於前陰少腹之間任脈所經之地卽或屬他經未有不以任脈爲原者瘕乃女子之病發亦在任脉界分此云寸口者統寸開尺三部言也丸丸動貌緊細實長寒邪盛而實也男疝女瘕則苦少腹達臍下引陰中切痛

筆證

直上直下。尺寸俱浮。中央浮起。督脈可求。腰背彊痛。  
風癟爲憂。

潔古云。督者都也。爲陽脉之都綱。其脈起於少腹。  
以下骨中央。女子入繫庭孔之端絡。陰器繞篡。繞  
臂至少陰。其男子循莖下至篡與女子等。其少腹  
直上者貫臍中央。上貫心入喉。上頤環唇。上繫兩  
目之下。中央其脈之別名曰長強。挾脊上項。散上  
頭下當肩脊抵腰中。入循膂絡腎。自目內眞上額。  
下循膂絡腎。皆合太陽而並行者也。與太陽少陰。

合入股內、貫脊屬腎、與太陽起目內皆上額交巔、  
上入絡腦、還出別下項、循肩胛內夾肺左右、別走  
太陽、入貫膂、二十八難亦曰、督脈者、起於下極之  
俞、並于脊裏之上、至風府、入屬於腦、由是觀之、則  
督亦與太陽合行者、十九、故邪客則脊強、以其貫  
脊也、督與太陽皆主表、而督爲諸陽之總、太陽爲  
諸陽之長、又曰、巨陽風邪從類傷陽表必先受、故  
留則爲癲癇疾也、癲癇時發時止、或筋脉牽引、或  
項背反張、雖云風傷督脈亦太陽主筋故耳、脈來  
直上直下、則弦長矣、尺寸俱浮、中央亦浮、則六部

皆浮又兼弦長故其兒證皆屬風家大抵  
裏督脈主表也

帶脈周廻開左右彈帶下臍痛精失不固

帶脈起於季脇廻身如帶在人腰間故居于關藏  
府十二經絡皆過於此或濕熱下流或風入胞宮  
帶脈不任與邪俱滯則赤白之證見素問痿論曰

帶脈起于季脇竇門前則當臍上故或爲臍痛靈  
樞經脉篇曰腎足少陰當十四椎出屬帶脈蓋腎  
主藏精帶固腰脊虛則一不能藏一不能固而精  
有自失者矣

喻嘉言曰人身有經脈絡脈直行曰經旁支曰絡絡者兜絡之義卽十二經之外城也經凡十二手之三陰三陽足之三陰三陽是也絡乃有十五者因十二經各有一別絡難經以陽蹻陰蹻及脾之大絡足成之後世遂爲定名反遺內經胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺繫緊一段人知之而不敢翻越人之案遂曰宜增爲十六絡是十二經有四大絡矣常謂難經以二蹻爲絡之名原誤當是胃之一大絡脾之一大絡共指奇經八者爲一大絡配爲十五絡始爲確耳如十二經旣各有一絡共十

二絡矣此外有胃之一大絡繇胃下直貫膈肓統絡諸絡脈於上復有脾之一大絡繇脾外橫貫脇腹統絡諸絡脈於中復有奇經之一大絡繇奇經環貫諸經之絡於周身上下總之十二絡以絡其經三大絡以絡其絡也何以知陽蹻陰蹻之不當言絡也蓋常推奇經之義督脈督諸陽而行於背任脈任諸陰而行於前不相絡也衝脈直衝於胸中帶脈橫束於腰際不相絡也陽維陰維一起於諸陽之會一起於諸陰之交名雖曰維乃是陽自維其陽陰自維其陰非交相維絡也至於陽蹻陰

蹠同起於足跟一循外踝一循內踝並行而闊其捷全無相絡之意設陽蹠陰蹠可言二絡則陽維陰維何不可言二絡乎推廣之而督任衝帶何不可言八絡乎况難經有云奇經之脉如溝渠滿溢流於深湖故聖人不能圖細推其意乃則以奇經明等之一大絡不然夫豈有大經如江如湖之水而反擬之溝渠者哉又云人脉隆盛入於八脉而不環周故十二經亦不能拘此全是經盛入絡而其溢畜者止在於絡不能環溉諸經也合兩說而通會其意竒經乃自共爲一大絡更復何疑若時

珍以任督二絡爲據者恐亦未當

張紫陽云衝脈在風府穴下督脈在臍後任脈在臍前帶脈在腰陰蹻脈在尾閼前陰囊下陽蹻脈在尾閼後二節陰維脈在頂前一寸三分陽維脈在頂後一寸三分凡人有此八脈俱屬陰神閉而不開惟神仙以陽炁衝開故能得道八脈者先天大道之根一炁之祖採之惟在陰蹻爲先此脉纔動諸脉皆通陰蹻一脉散在丹經其名頗多曰天根曰死戶曰復命關曰生死根有神王之名曰桃花上通泥丸下徹湧泉倘能知此使真炁聚散皆

從此開竅則天門常開地戶永閉尻脈周流于一身和炁自然上朝陽長陰消水中火發雪裏花開身體輕健容衰返壯昏昏懶嘿如醉如癡要知西南之鄉在坤地尾閭之前膀胱之後小腸之下靈龜之上乃天地逐日所生炁根產鉛之地也醫家不知有此

按丹書論陽精河車皆以任衝督脈命門三焦爲說未有專指陰蹻者而紫陽八脉經所載經脈稍與醫家不同然內景惟返觀者能知或不謬也脉有反關動在臂後別由列缺移于外絡兄乘弟位

反開者非無脉也謂寸口脉不應指而反從尺傍遇肺之列缺大腸之陽谿刺斜出于外絡其三部定位九候淺深俱與平常應見于寸口者無異若兄固有之位弟竊而乘之以其不行于關上故曰反開在于萬中僅見一二令人覆手診之方可見耳一說男左女右得之者貴試之勿驗也

病脉既明吉凶當別常脉之外又有真肺真象若見短期可夾

已上正文之論脉首先源流次及流行次則左右男女定位次則五臟陰陽合時寒熱則屬之遲數

內外則別之浮沉以至虛實異形正邪各狀因脈  
知病因病識脈病則該于瘡癆女幼脉則窮于奇  
經反關可謂明且詳矣然而諸脉之外更有所謂  
真脉者大關生死故又審別于卷末焉夫人稟五  
行而生則五行原吾身之固有外與天地通內與  
穀神合得以默運潛行而不顯然彰露設五歲之  
元真敗絕穀神不將則五行之死形各隨歲而見  
矣死亡之期可計日而斷

心絕之脉如操帶鉤轉豆躁疾一日可憂

素問平人氣象論曰死心脉來前曲後居如操帶

鉤曰心死前曲者謂輕取則堅強而不柔謂重取則牢實而不動如持革帶之鉤全尖冲和之氣但鉤無胃故曰心死轉豆者卽素問玉機真藏論所謂如循薏苡子累累然狀其短實堅強真藏脉也又曰心絕一日死又曰壬日驚癸日死死于亥子時水能冠火也

肝絕之脉術刀責責新張弓弦死在八日

素問玉機真藏論曰真肝脉至中外急如循刀刃索問平人氣象論曰脉來急益勁如新張弓弦曰肝死又曰肝絕八日死又曰庚日驚辛日死死于

申酉時金能尅木也

脾絕雀啄又同屋漏一似水流又同杯覆

素問玉機真藏論曰死脾脈來銳堅如鳥之喙如星之漏如水之流謂歇歇而再至如鳥喙之啄狀其硬也或良久一至有如屋漏狀其不能相接至如水流杯覆則精氣已脫往而不返傾而不扶其可生乎又曰脾絕四日死又曰甲日爲乙日死死于寅卯時木能尅土也

肺絕維何如風吹毛毛羽中膚三日而號

素問平人氣象論曰死肺脉來如風吹毛曰肺死

素問玉機真藏論曰真肺脈至如以毛羽中人膚皆狀其散亂無緒但毛而無胃氣也又曰肺絕三日死又曰丙日篤丁日死死于午未時火能尅金也

腎絕伊何發如奪索辟辟彈石四日而作

素問平人氣象論曰死腎脈來發如奪索辟辟如彈石曰腎死索如相奪其勁必甚辟辟彈石其堅必甚又曰腎絕四日死又曰戊日篤己日死死于辰戌丑未時土能尅水也

命脈將絕魚翔蝦遊至如湧泉莫可挽留

浮時忽一沉譬魚翔之似有似無沉時忽一浮譬  
蝦遊之靜中一躍狀類如泉之湧浮數于肌肉之  
上而垂遠其就下之常神已欲脫何恃而能生乎  
統而論之使其在心則前曲後居柔滑全無如轉  
豆躁疾則所謂累累如連珠如循琅玕者無有也  
使其在肝則強勁弦急按之切手如循刀責責則  
所謂軟弱輕虛而滑端直以長者無有也使其在  
脾則堅銳連屬如雀啄粒許久一滴二脉乍數乍  
疎如屋之漏去而不返如水之流止而不揚如杯  
之覆所謂和柔相離如雞踐地者無有也使其在

肺上則微茫下則斷絕無根瀟索所謂厭厭聶聶  
如落榆葉者無有也使其在腎解散而去欲藏無  
入去如解索彈搏而來所藏盡出來如彈石則所  
謂喘喘累累如鈎按之而堅者無有也在命門右  
腎與左腎同但內涌相火故其絕也忽爾靜中一  
躍如蟬之遊如魚之翔火欲絕而忽煽之象也在  
膀胱泛濫不收至如湧泉以其藏津液而爲州都  
之官故絕形如此蓋脈之和柔得體者胃氣與之  
俱耳胃氣若少卽已成病何況于無則生生之根  
本先絕而五臟其能持久哉再察色證以決之理

當不爽也見真藏之脉可夾短期者是矣而素問  
玉機真藏論篇曰急虛身半卒至五藏絕閉脉道  
不通氣不往來譬於墮溺不可爲期其脉絕不來  
若人一息五六至其形肉不脫真藏雖不見猶死  
也乃知有急病不必真藏脉見而望其死者可拘  
於時日哉

按難經十五難所載平脉死脉與本經互有異全  
如以厭厭聶聶如循偷葉爲春平如雞舉足爲夏  
病藹藹如車蓋按之而益大曰秋平按之蕭索如  
風吹毛曰秋死上大下兌濡滑如雀之啄曰冬平

啄啄庭屬其中微尚曰冬病來如解索

平石

曰冬死此皆與本經之不同者也至于如引葛如  
奪索如鳥之喙如鳥之距更弱招招如揭長竿末  
梢端端累累如釣而堅之烈又皆不載難經之義  
原出本論而異同若此意者必有誤與

醫之診脈將決死生展轉思維務欲其精窮搜博采  
靜氣凝神得心應手澤及後昆勉哉同志相與有成  
熟讀深思如見古人

此言醫者之得失報應而總結也夫人命至重故  
醫者非仁愛不可托也非聰明不可任也非淳良

不可信也古之爲醫必上通天道使五運六氣變化  
變復之理無一不精中察人身使十四經絡內  
而五臟六府之淵涵外而四肢百骸之貫串無一  
不徹下明物理使昆蟲草木之性情氣味無一不  
暢及平診視之際滌除嗜慾虛明活潑貫徹達幽  
不失細小其智能宣暢曲解既如此其德能仁恕  
博愛又如彼而猶不敢以爲是諭察深思務期協  
中造次之際罔敢或肆者也學者肯虛衷求益則  
承蜩運斤許入岐之室而陰食其報蓋亦不爽  
當共勉其志以克底於大成也