

衛

生

寶

鑑

衛生寶鑑卷之十九

名方類集

小兒時氣溫疫外傷風寒

升麻葛根湯治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼

升麻

甘草

白芍藥

各半兩

葛根

十五兩

右四味剉碎每服三錢水一盞半煎八分稍熱服不以時

日二三服

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澁多睡咳嗽喘

愈瘡清潔

人參

細辛

瓜萎根

桔梗

茯苓

甘草

桔梗

各一兩半

右七味為末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎至四分溫服如要和氣人生薑煎服不以時。一法加防風川

芳谷一分同煎

人參生犀散解小兒時氣寒壅嗽咳痰逆喘滿心忪驚悸臟腑或
秘或濁調胃進食又主一切風熱服尋常涼藥即濁而減食者
蘇氏方

前胡七錢 杏仁去皮尖炒 炙梗各五錢 人參三錢
甘草炙二錢

右為粗末每服二錢水一盞煎至六分去相溫服食後

大青膏治傷風吐濁身溫涼熱

七謂匙也應服量多少遵方說不
足並臨時以意加減之歲氏方

天麻一分末

白附生末一錢半

青黛一錢研

蝎尾去
毒

半錢

天竺黃一字

烏梢蛇肉

酒浸焙末半錢

麝香一字

珠砂一宇

右再研細和勻生蜜和成膏每服半皂角子大至一皂角子

大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄苛水化一處服之五匙
以上同其露散服之

天麻防風丸治一切驚風身壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎不利及風濕邪熱

乾蝎少

白僵蚕

炒各半兩

天麻

防風

人參各

硃砂兩

雄黃

麝香

甘草各一分

牛黃一錢

右十味為末蜜丸梧子大每服一丸至二丸薄苛湯化下

不以時

全頤法治傷寒

錢氏方

麝香研一字

牛黃末一

青黛末一字七

蛤粉末半錢

蝎尾去毒炒末

薄荷半字七

右同研匀熟棗肉剝成膏新綿上塗內貼頤上四方可出

一指許火上炙手熱頻熨百日裏內外兒可用此塗

浴體法

錢氏方

青黛三錢

天麻末二錢

烏梢肉酒浸焙末三錢

蝎尾

去毒炒

硃砂研各半錢

白礬三錢

麝香一字

右七味同勻研入白礬末三錢和勻每用三錢水三碗挑枝一握并葉五七枚同煎十沸溫熱得所浴之勿浴背上紫霜丸治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心或大便酸臭

乳食不消

代赭石

醋淬細研

赤石脂

各一兩

杏仁

去皮尖炒別研五十枚

巴豆

去皮心出油炒研三十粒

右為末和勻湯浸餳丸如黃米大兒生三拾日外可服
丸一歲至三歲可服二丸至三丸皂角子煎湯送下米

飲亦得微利為度未利再服更量虛實加減

消積丸

禾氏方

砂仁

十二个

丁香

九个

烏梅

三个

巴豆

二个去心臍出油

右為末糊丸如黍米大三歲以上三五丸以下二三丸溫水送下無時

厚腸丸治小兒失乳以食飼之未有食腸不能克化而生腹脹四肢瘦弱或病色無常

蒼术

三钱炒

神曲

五分炒

大麥蘖

五分炒

橘皮

去白

半夏

湯洗

枳壳

各三分炒各三分

人參

-

厚朴

薑製

青皮

各二分

右為末糊丸如麻子大每服二十丸溫水送下食前忌飽食

卷之二十一

五臟熱及肌熱

瀉青丸治肝熱生風一名瀉肝丸若斑後眼有翳膜亦可作湯使
同微利為度錢氏方

當歸 川芎 草龍膽 羌活 山楂仁 川
大黃溫紙裹煨 防風各等分

右為末練蜜丸如雞頭大每服一丸至二丸煎竹葉湯同
砂糖化下

錢氏導赤散治大人小兒小便赤澀脣下滿痛

木通

生甘草

生乾地黃

各等分

右㕮咀每服三錢水一觔竹葉少許同煎至六分溫服不
以時

瀉黃散治脾熱目黃口不吮乳

名瀉脾散

錢氏方

甘草
失三刃

石膏半刃

山梔仁一刃

防風四刃

藿香七子

右剉用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一錢煎至五分溫服清汁無時

鴟白散治肺熱盛

一名鴟肺散王氏方桑白皮地骨皮各一刃

桑白皮
外黃三刃

地骨皮一刃

甘草
失半

右為末每服二錢水一中碗粳米百粒煎至六分食後溫服之

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

王氏方

人參

知母

赤茯苓去

紫胡

甘草
失

地骨

皮

半夏

湯泡七次各等分

右七味為末每服二錢水

一錢生薑三片煎至六分去粗

卷之三十一
四
溫服食後疊大小加減

生犀散治小兒骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五
心煩熱 王氏方

生犀 錢末二分 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛
各一分 甘草 炙半斤

右為粗末每服二錢水煎至七分去枳食後溫服
大小加減

○雲岐子論宣風濕白散

雲岐子云錢氏用宣風散三味俱無治風之藥惟有治風之名合
加防風一味譬如用軍先鋒辨證以大便殼泄為熱大便散中有
結以宣風散下太過為寒各認其寒熱而再詳合用藥耳濕白散
三味亦无濁肺之理合加黃連一味為濕肺是也內經云肺苦氣

上逆急食苦以瀉之由是錢氏自言煎入臘君臣藥是包藏
法而言之也

喘促宣劑

寒熱散治肺脹喘滿胸高氣急兩脢扇動鴟下作坑兩鼻竅張悶
亂嗽渴聲嘔不鳴痰涎潮塞若不急治死在旦夕

川大黃

白牽牛

黑牽牛各一兩半生半熟

大桔

枳榔一箇

右為末三歲兒服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許利

下涎為度出楊氏逐濟方

無價散治風熱喘促悶亂不安

辰砂

二錢半

輕粉半錢

甘遂一錢半

蕤墨微煮焙

右為末每服一字溫水少許滴下香油一點炒藥在上沉

下脚以漿水灌之立效如神

簡孝忠辨急慢驚風

小兒急慢驚風者古無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可悞也急驚由有熱熟即生風又或因驚而發則目為連劄潮涎擣擗身躰與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其擣擗漸咸時與鎮心治熱之劑一二服候驚勢已定須臾以藥下其痰熱利下瘀熱心神安寧即愈慢驚得於大病之餘吐瀉之後或悞導轉致脾胃虛損風邪乘之似搐而不甚搐此名瘞癥似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如鴟聲此證已危蓋脾胃虛損故也

卷之三
古老人辨急慢驚風

急慢陽證小兒咳嗽發熱積於胸膈屬少陽 膽經受病也謂之
即生風或因聞大驚而作謂東方震卦得火氣而發搐火本不動
而湊風而動當用利驚丸與導赤散鴻青丸地黃丸搐止服安神
丸

慢驚陰證小兒吐瀉病久脾胃虛損大便下痢當去脾胃間風先
以宣風散導之後用史君子丸益黃散其痢即止若不早治即成
慢驚癲癇者似搐而不甚搐脾胃虛損致被肝木所乘屬諸臟受
病也用溫補羌活膏主之

急驚

利驚丸

錢氏方

天竺黃

二錢

青黛

輕粉各一錢

黑牽牛

生頭末半分一方用

右同研勻煉蜜丸如豌豆大一歲兒一丸薄荷溫水化下
食後服

地黃丸治腎虛

錢氏方

熟地黃八錢

山藥

山茱萸各四錢

白茯苓去皮

澤瀉

牡丹皮

各三錢

右六味為末煉蜜丸如桐子大三歲已下一丸或三丸

溫水化下食前服

安神丸治心虛寐熟面黃煩赤壯熱驚啼

錢氏方

山藥

麥門冬去心

馬牙硝

甘草

白茯苓去皮

寒水石

研各半兩

硃砂

一兩研

龍腦

一字七

右為末煉蜜丸如雞頭大每服半丸砂糖水化下不拘時

妙香丸治小兒驚癇

巴豆

三百一十五枚去皮心膜妙熟研如麵油

牛黃

別研

龍膽

別研

臘粉

麝香

研各三兩

辰砂

九分

金箔

九十九片

右合研勻煉黃蜡六兩入白沙蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十九小兒驚癇急慢驚風潮搐搗審湯下兼互大二丸

小抱龍丸治小兒傷風瘧疾身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚

風潮搐中暑

天竺黃

一兩

雄黃

二分

辰砂

麝香

各半兩

天南

星

四兩臘月臘牛膽中陰乾百日

右為末煮甘草膏子和丸如皂子大每服一丸溫水化下
一法用漿水或新水浸南星三日候透軟煮三五沸取出

乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末八兩

甘草一兩半拍破用水二碗浸一宿慢火煮至半碗去粗漸

漸酒入天南星末慢研之令甘草水浸入餘藥亦治室女

白帶伏暑用鹽少許細嚼

二丸新水送下

亦載子氏方

鎮肝丸治小兒急驚風月直上視潮搐昏亂不省人事是肝經風

熱狀

當歸

天竺黃研

生地黃

川芎

竹葉

龍

膽草

去芦

防風

川大黃煨

川羌活

各等分

右九味為末煉蜜丸如雞頭大每服二丸砂糖冰化下無

時大人服鎮肝丸三五丸次服天麻散

天麻散治小兒急慢驚風其效如神及大人中風痰盛半身不遂

言語雖不省人事

半夏七分

老牛薑

白茯苓去皮

白朮各三分

甘草

草灸三分

天麻二分半

白朮各三分

白朮各三分

甘草

右剉用水一錢磁器內同煎水乾焙為末每服一錢半生

薑棗湯調下無時大人三錢

灸法治小兒急驚風前頂一穴在百會前一寸若不愈須灸有頭
兩處及鼻下人中一穴各三壯炷如小麥大

慢驚

宣風散。錢氏方 梅榔用一箇

甘草炙

橘皮各半分

牽牛

四兩半生半炒

梅榔二分

右為末三三歲兒每服半錢蜜湯調下年已上者一錢食
前服。慢驚既謂吐瀉病久脾胃虛損復用牽牛之藥以

未穩當

史君子丸治小兒五疳脾胃不和心腹滿時復疔痛不進飲食

史君子

一兩

厚朴

去皮

陳皮

去白

川芎

各二分

右為末煉蜜丸如皂角子大三歲已上一丸以下半丸陳
米飲化下大治小兒腹痛

羌活膏治脾胃虛肝氣熱盛而生風或取轉道多或吐瀉后為慢
驚者用無不效。錢氏方有防風無乾葛

天麻

一兩

人参

羌活

去芦

川芎

赤茯苓

去皮

白附子

炮各半兩

沉香

木香

母丁香

脣香

肉豆蔻

各三分

麻黃

去節

乾葛

一本有防風无葛葛

川附子

炮去皮鹽各二分

真珠末

麝香

所

牛黃

各一分

半錢

雄黃

所

辰砂

研各二分

乾蝎

炒去毒

白僵蚕

各一分

夢去絲

白花蛇

酒浸焙各一分

輕粉

一字所

龙胆草

解

右同為末入研藥和勻煉蜜和成劑旋丸如大豆大每服一二丸食後前薄奇陽化下或麥門冬湯亦得實熱忌薑勿服性溫故也

鈎麻飲子治吐鴻脾胃氣弱虛風慢驚。錢氏方

人參

蟬殼

竭尾去毒炒

麻黃去節

防風去毛

白僵蚕炒

天麻各半兩

麝香一錢研

鈎麻三分

甘

草炙

川芎各一分

右為末每服二錢水一盞煎至六分溫服量大小加減寒多者加附子末半錢無時

異攻散溫中和氣治吐利不思食凡治小兒虛冷病先與數服以

正其氣。錢氏小兒方

人參

去芦

茯苓去皮

去毛

白朮

甘草炙

陳皮各等分

右為細末每服一錢水一牋生薑半片棗子二箇煎至七分食前溫服量多少與之

大人小兒口噤牙關不開服諸藥不效者此藥用之立開以生

天南星末一錢腦子少許相和研匀用指蘸生薑自然汁搽於左右大牙根上擦之便開神效

慢驚風及脣風撮口癲癇風癲等疾

小兒慢驚風灸尺澤穴各七壯在肘中橫紋約上動脈中炷如小麥大

初生小兒脣風撮口卷舌谷穴三壯在內踝前起大骨下陷中鍼入三分不宜見血立效

小兒癩癇疎瘻脊強互相引長強穴三十壯在脊底端踏地取之乃得

小兒癩癪驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻直入髮際一分

小兒風癇先由手指如數物乃發也灸鼻柱主髮際穴中灸三

壯炷如小麥大

小兒驚癇先驚怖啼叫乃發也後灸頂上旋毛中一壯及耳后青絲脉炷如小麥大

癬積症瘦

燒青丸治小兒食癬乳癬每日午後發寒熱咳嗽脇下結硬並背治之。錢氏方

玄精石

燒赤

輕粉各一升

粉霜

石砂各半升

各半升

右先將硝砂研細入三味研勻更入寒食麵一錢半研勻滴水和成餅再用麵裹了慢火內煨黃取出去麪將藥餅再研為細末滴水和丸如黃米大一歲五丸二歲十九夜

卧溫藥水送下至天明取下惡物是效如不下漸加丸數
如妳癬未消盡隔三兩日又一服癬消盡為要

三棱前羌治小兒食飲過多痞悶疼痛食不消化久而成癬也此
藥專治婦人血積血塊

廣茂黑角者 三棱二味溫熱煨薑為末各一兩

大黃炭

入兩
薑末

右將大黃銀石器內以好醋浸令平慢火熬可以二味為
丸如麻子大或棗豆大每服十九至二十九食後溫水送
下虛實加減大人如桐子大每服四十九

青礞石九治小兒妳癬

硫黃

三味

青礞石

五靈脂

鍋底墨

各一兩半

白丁香

一錢去子

右為末米飯為丸如棗豆大搯作餅子每服三十餅子溫水送下食前

鼈甲猪肚丸治癥積發熱

柴胡一兩黃連

鼈甲九肋者醋煮黃色各力錢

枳實
麸炒

木香青皮各半兩

右入乾青蒿七錢同為末以棕猪肚一箇去脂盛藥蒸熟同搗和為丸如桐子大每服一二十九煎入參湯送下食後

冠效聖餅子治癥積

陳皮去白十兩

巴豆一百箇去殼切同陳皮炒黃色去巴豆

香附子炒去毛

廣茂楂

京三棱泡各半兩

右為末糊丸如棗豆大搯作餅子每服三十餅子溫水送

下

廣茂化癖丸治乳食不消心腹脹滿壯熱喘篘嘔吐痰逆腸鳴泄
利米穀不化完出下痢赤白腹痛裏重及食癥乳癖痃氣痞氣
並皆治

硃砂

研水飛

當歸炮

代赭石

醋燒洋

枳殼炒

炒

廣茂炮

京三棱炮各半兩

麝香研

巴豆霜各一分

木香

一兩

右為末入研藥勻糊丸如麻子大一歲兒二丸溫米湯送
下食後量虛實大小加減

橘皮丸治癖積堅硬不消

陳橘皮

二兩

巴豆半兩去皮

右將橘皮剉碎以巴豆同炒令重黃色揀去巴豆不用只

搗陳皮為末，軟爛飯研為丸，如篆豆大，每服二十丸，用蜜湯送下。食前量兒歲數旋丸大小加減。

廣茂瀆堅丸治小兒癖積腹脇滿發熱咳嗽喘促不思飲食。

木香

青皮

陳皮

廣茂

烏梅

京三錢

各一兩

大椒

巴豆

去心膜各半兩

石八味為末糊丸如麻子大，每服五七丸，溫米飲送下。食遠量小兒大小為丸加減服。

聖效透肌散治小兒欬癖食癖時發寒熱咳嗽，脇下堅硬結塊。

桑皮

荆芥

各三錢

雄黃

研二錢半

粉霜

研二錢半

蒺藜

當歸

礪砂

研

豆蔻

川山甲

炮各二錢

輕粉

一早半研

海金沙

一字

石十一味除研藥外餘揀淨為末，入研藥和勻，令將獨科。

大蒜去皮研如泥入頭醋和如稀糊謂藥如膏約麝積大小攢在紙上貼病處用新綿一葉覆之以三襟緊繫待二時辰覺疼痛無妨只待口鼻內蒜香為度其效不可具述麝消為度趙黃姑十三歲麝積甚大以至危篤予以此貼之得效如神

中脘一穴章門二穴專治小兒麝氣久不消者中脘從膚下臂取之各灸十壯脾後脊中灸二七壯禹講師用灸之經驗脾俞二穴治小兒脇下滿鴻溝體重四肢不收麝積聚腹痛不嗜食痰壅寒熱又治腹脹引背食飲多漸七黃疸在第十一推下兩旁相去各一寸五分可灸七壯若黃疸者可灸三十壯

麝積治驗

真定總管董公長孫年十一歲病癰積左脇下硬如覆手壯火青筋發熱肺熱咳嗽自汗日晡尤甚牙齦臭惡宣露出血四肢困倦飲食減少病甚老篤召太醫劉仲安先生治之約百日可愈先與沉香海金砂丸一服方在溫中正門下微物兩三行次日合塌氣丸服之十日復以沉香海金砂丸再利之又令服塌氣丸如此互換服至月餘其癰減半未及百日良愈近年多有此疾愈之者多錄之以教將來之病者也

塌氣丸治中滿下虛單腹脹滿虛損者

陳皮

蘿蔔子

炒各半兩

木香

胡椒

各二錢

草

荳蔻

去皮

青皮

各三錢

蝎梢

去毒二錢半

右為末糊丸如桐子大每服三十丸米飲下食後日三服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑白皮湯下十九

日三服大人丸如桐子大每服四十丸如陰囊汗腫水冷
用滄盐乾薑白麪為末各三錢水和膏子搘紙上塗小兒

陰囊上

○斑瘦

丹砂丸治小兒五疳八痢

麝香

一錢研

硃砂

研各一分

青黛

各半錢

丁香

半錢

肉荳

蔻

一枚

沒食子

一枚

右用乾大蝦蟆一箇去頭足酥炙黃同為末糊丸菉豆大

每服三十丸米飲下空心服

神效荳蔻丸治小兒脾疳瘦弱或泄利無度

神鴉

心一錢半研

麥糵

心各半兩

肉荳

蔻三錢研

黃連

半兩

黃連酒

薺

二錢半研

史君子

十箇去皮

右為末。棕猪腰汁丸如黍米大或桐子大。每服二三十丸。水飲送下。空心食前。

蘆薈丸治小兒脾疳瘦弱面色痿黃。

蘆薈

蟾酥

麝香

硫砂

黃連

枳榔

鶴虱

史君子

肉豆蔻

各等分

黃連

枳榔

肥兒丸治小兒蒸熱腹脇脹滿面色痿黃飲食遲化大小便不調。

麥蘖

炒

川黃連

大蕪荑

神曲

炒

胡黃連

兩半

右為末。棕猪腰汁丸如麻子大。米飲送下。三十丸。食前乳母忌酒麵生冷。

橘連丸治疳瘦久服消食和氣長肌肉。錢氏方。

陳皮

一兩

黃連

一兩半

去須半米泔浸一宿。

右為末另研麝香半錢和勻用豬膽七箇分藥入膽內漿水者候曉熱時以針微割破以熱為度取出粟米丸如棗豆大每服十九至二十丸米飲下量大小加減之

黃帝療小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形谷瘦率諸方不瘥者尾翠骨上三十陷中灸三壯炷如小麥大岐伯去薰三伏內用柳水治孩兒止午時灸之當自灸之後用綿紙上見有疳蟲隨汗出此法神妙不可具述

章門二穴治小兒身羸瘦貫豚腹脹四肢懈惰背不舉依前禹講師父癖處取之

咳嗽

辰砂半夏丸治小兒肺壅痰實欬嗽喘急胸膈痞滿心忪煩悶

硃砂

五靈脂

各一兩微炒

赤朮

杏仁

半夏

右為末薑汁煮麪糊為丸如小麥子大每服五七丸
湯下食後

潤肺散治小兒寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急語聲不出痰涎壅
塞胸膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛

貝母 杏仁各二分 麻黃去根節 人參各二分 阿

膠 桔梗各半分 陳皮一分 茯草一分

右粗末每服一錢水八分煎至六分去渣溫服食後
人參半夏丸治肺胃受冷欬嗽氣急胸膈痞滿喉中呀呻嘔吐涎
沫乳食不下

半夏 厚朴 丁香各四分 陳皮 人參 細

辛各二分

右為末薑汁糊丸麻子大三歲兒每服二十九丸薑湯下食

後服量兒大小加減

金匱膏治癰保小兒咳嗽吐乳久不愈

右燕子一味為末每用一捻蜜少許調金匱膏上日三五
次不拘妳食前後

○吐利痢疾

丁香散治胃虛氣逆嘔吐不止

人參半分 丁香 蘆薈各一分

右為末每服一錢水半盞煎五七沸入乳汁少許去粗稍
熱服不以時

玉露散治小兒吐瀉

名甘露散李氏方

石膏

寒水石

各半分

甘草生一分

右為末每服一

字或半錢一錢溫湯調下食後立夏已後

立秋已前宜用餘月不可用

益黃散治小兒脾胃虛弱腹痛泄痢一名補脾散

丁香四錢

陳皮二兩

甘草

訶子

青皮各一兩

益黃散治吐利腹脹煩渴小便少○錢氏方

肉豆蔻

丁香各伍分

桂府滑石三分

舶上硫黃一分

右為末每服一字至半錢米飲湯調下無時

白朮丁香散治小兒吐利不止煩渴小便少

丁香

白朮

舶上硫黃

肉豆蔻各三錢

參

二錢

桂府滑石

二兩

右為末大人每服二錢小兒一錢溫米飲調下食前

立效散治十六般風治熱吐不止累經效

川薜硝一錢

桂府滑石末

三錢

右二味研勻每服半錢漿水少許生油一兩點打勺同調
服極者三服必愈大人每服一錢忌生魚果實
玉液散治小兒嘔逆吐利霍亂不安煩燥不得卧及腹脹小便赤
煩渴悶亂或傷寒霍病

丁香

一錢

藿香半刃

桂府滑石

四分

右為末每服一錢清津水半盞調下冷服大人霍亂吐利
水打臘茶清下三錢立效

如聖丸治冷熱霍亂

胡黃連

川黃連

白無羨

史君子

各一刀去皮

麝香半分研

乾蛤蜊

五箇剉酒熬成膏

右為末與蛤蜊膏子為丸如麻豆大每服一二丸人參湯

下二三歲兒六七丸以上十九十五丸

中庭一穴治小兒吐乳汁灸二壯在膻中穴下一寸陷中炷如小

麥大

黃蔻香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛此

方用之如神

黃連

三分炒

南木香

肉荳蔻

各一分

右為末粟米飯丸如米粒大每服十九至二十丸米飲下
日夜各四五服食前

附子香連丸治腸胃氣虛傷乳哺冷熱相雜下痢赤白裏急
後重腹中撮痛日夜頻併乳食減少。錢氏方

木香

黃連各一分

白附子大二箇

右為末粟米飯丸如棗豆大或黍米大每服十九至二三十

十九食前清米湯送下日夜各四五服

小香連丸治冷熱腹痛水穀痢滑腸。錢氏方

黃連

半兩

木香

呵子肉

各一分

右為末粟米飯丸如棗豆大米飲下每服十九至三十五丸食前頻服之

沒食子丸治泄瀉白痢及痔瘡滑腸腹痛。錢氏方

木香

黃連

各一分

呵子

去核三分

沒食子

一箇

肉豆蔻

二箇

食前服

右為末飯和丸如麻子大米飲下十五丸量兒大小加減

赤石脂散治小兒因痢後驅氣下推出肛門不入。錢氏方

赤石脂

伏龍肝

各一分

右為末每用半錢傅腸頭上每日三次用之

城伯灸法療小兒脫肛鴻血秋深不效灸龜尾一壯炷如小麥大乃脊端窮骨也

小兒脫肛灸腰中三壯千金云隨年壯

小兒脫肛又不羞及風癩中風角弓反張多哭語言不擇發無時
節盛則吐沫灸百會穴七壯在鼻直入髮際五寸頂中尖旋毛
中可容豆炷如小麥大

小兒諸雜證方

黃芪散治虛熱盜汗

牡蠣

燒

黃芪

生地黃各一兩

右為末每服一二錢水一錢小麥二三十粒煎至七分去

粗食後溫服

猪尾骨治瘡倒黓黑膿用小猪尾刺血三五點入生腦子少許研
勻新汲水調下立效

治斑後小兒眼有翳膜煎竹葉湯同砂糖化下鴉青丸三丸微利
為度

白菊花散治參豆瘡後眼內生翳膜者病淺二十日見效深者一
月必效一日喫三服

白菊花 菟豆皮 穀精草

去根各等分

右為末每服一二錢乾柿一箇生粟米泔一錢熬半泔盡
將柿去蒂核食之無時

黃連散治小兒眉癬

黃連

大黃

黃芩

蜜陀僧

百藥煎各等分

輕粉

少許

右為極細末每用不以多小油蜜調搽神效咤僧有砂土
則度之

瀝青膏治小兒粘瘡

黃蠟

瀝青各一兩

園荽子

黃丹各三錢

右為末木油三兩熬搽不須洗

絳玉散治小兒頭上并身上溫毒時復痒痛皮膚溫爛又不可

黃丹

炒紅二兩重

兼豆粉

炒黃三兩重

右為末清油調雞翎掃於瘡上後搽勝金散覆之大有神

效

勝金散

石膏

黃芩一兩

右為末先搽于絳玉散後不以多少覆之神效不傳

前半部

卷之三

四

十九

千金膏用蠟如神一名蠟姑又治多日諸般惡瘡

歷青

四兩

黃蠟

三兩

散綠

三錢研

先用香油三兩熬溫入歷青黃蠟化開攪勻入散綠取下火攪勿濾入水中磁器內收之每用時將藥入水搯作餅於絢綿上貼之

軟青膏治一切風熱瘡又治小兒頭瘡

歷青

黃蠟

脂麻油

各十兩

巴豆

十四箇

右先將歷青麻油黃蠟熬成汁次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑去巴豆不用次入膩粉一錢再攪極勻放冷傅瘡

上神良

牛蹄散治小兒頑癬久不瘥

白朮

半兩

牛蹄根

四兩剉

右二味爛研入米醋小半錢同搽不住搽之候有解極痒至痛即止隔日洗去再搽

麝香散治小兒白疕唇齒皆蝕損真爛

硼砂四錢

砒三字

麝香少許

右各研細和勻先以帛抹口每用少許付之應是口齒疕瘡皆可用不可嚥子嚥子只是吐人耳用之無有不效大人用一字

小兒季夏身熱發黃治驗

小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如潰瘍之黃眼中白睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以溫火而蒸熱搏於經絡入於骨髓使臟氣不平故脾逆乘心溫熱相合而成此疾也蓋心火實則身熱熱胸膈煩滿脾過則皮膚如潰瘍之黃有餘之氣必

乘已所勝而侮不勝是腎肝受邪而筋骨瘦弱不能行立內經言脾溫者色黃而肉蠕動又言溫熱成癆信哉斯言也此所謂子能令母實上則鴻其子也若脾土退其本位腎水得復心火自平矣文內經曰治癆獨取於陽明正謂此也予用加減鴻黃散主之加減鴻黃散方此藥退脾土復腎水降心火

黃連

茵陳各五分

黃芩

黃芩各四分

桔梗

梔子各三分

澤鴻二分

右㕮咀都作一服水一大盞煎至六分去相稍熟服食前一服咸半待五日再服而良愈

論曰內經云土位之主其屬以苦又云脾苦濕急食苦以燥之故用黃連茵陳之苦寒除溫熱為君腎欲堅急食苦以堅之又用黃芩之苦辛寒強筋骨為臣溫熱成癆多苦

鴈之故以黃芩梔子之苦寒止煩除滿為佐溫溼於內以
淡泄之故以茯苓澤鴈之甘淡利小便導溫熱為使也

衛生寶鑑卷之十九終

衛生寶鑑卷之二十

北方下疰脚氣論

內經云太陽之勝火氣內鬱流散於外足跗跗腫飲發於中跗腫
於上又云脾脉搏堅而長其色黃當病少氣其更而散色不澤者
當病足跗腫若水狀也脾病者身重肉痿足不收行善蹶脚下痛
此穀入多而氣少濕居下也故濕從下受之如上所說謂脾胃
濕氣下流乘其肝腎之位由是足胫疼痛而跗腫也夫五穀入胃
糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺
而行呼吸焉營氣者祕其津液注之於脈化而為血以營四末內
注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出悍氣之樞疾而先行於四末
分肉之間行而不休者也又宗氣之道內穀為寶谷入於胃乃傳
之於脈流溢於中布散於外精專者行於經隧常營無已終而復

始是謂天地之紀或飲食失常胃氣不能鼓舞脾氣不能運化行於百脉其氣下流乘其肝腎土木水相合下疰於足跗跗腫而作疼痛晉蘇敬號為脚氣是也凡治此疾每旦早飯任意飽食午飯少食日晚不食亦佳恐傷脾胃營運之氣失其天度况夜食則血氣壅滯而行陰道愈增腫痛古之人少有此疾自承嘉南渡水纓士人多有之大唐開闢水牙之士作鎮於南極其地卑濕霧露所聚彼不襲水土往者皆遭之關西河北人皆不生此疾外莖祕要總錄亦說江東嶺南大率有此蓋清濕入內故也 經云感則害人皮肉筋骨者也故制方立論皆詳其當時土地所宜而治之今觀此方藥愷謂寒明溫燥也出左傳而無卑濕之地况湊裏緻密外邪過度以滋其濕水之潤下氣不能响之故下疰於足跗積久而作

腫滿疼痛此飲之下流所致也豈可與南方之地同法而治哉當察其地勢高下詳其飲食居處立為二法一則治地之濕氣一則治飲氣之下流隨其氣宜用藥施治使無疾之苦庶幾合軒岐之旨哉孫真人云醫者意也隨情增損藥無定方真知言哉

北方脚氣治驗

中書舍公年四旬軀幹魁梧丙辰春從征揚州脚氣忽作遍身肢體微腫兼痛手不能近足胫尤甚履不任穿跣以騎馬空兩蹬而以竹器盛之以困憊來告予思內經有云飲發於中附腫於上又云諸痛為實血實者宜決之以三稜針數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如線流於地約半升許其色紫黑頃時腫消痛減以當歸拈痛湯重一兩半服之是夜得睡明日再服而愈本草云宣可去壅通可去滯內經云濕淫於內治以苦溫羌活苦辛透關節而去壅

勝濕防風甘辛溫散經絡中流濕故以為君水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和中勝濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能去皮膚腠裏間濕故以為臣夫血壅而不流則痛當歸身辛溫以散之使氣血各有所歸人參甘草甘溫補脾胃養正氣使苦劑不能傷胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之也凡酒製衣炒以為因用治濕不利小便非其治也豬苓甘溫平澤鴻鹹寒平淡以滲之又能導其流飲故以為佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宣通也

當歸拈痛湯治濕熱為病肢體煩疼肩背沉重脣脴不利下症
於脰腫痛不可忍

甘草

茵陳蒿酒炒

酒黃芩

羌活各兩

防風

知母

豬苓

澤瀉

當歸身各等分烹

升麻 苦參

黃芩炒

人參

葛根

蒼朮各末

白朮已上俱炒

人參

葛根

蒼朮各末

右㕮咀每服一兩水二觔半先以水拌濕候少時煎至
一觔去粗溫服食前

少時以羹餳壓之

病有遠近治有緩急

征南元帥辛酉八月七日東征南面諸路迎接多受酒禮因而過飲
遂腹痛腸鳴自利日夜約五六十次咽嗌腫痛耳前後赤腫舌本
強涎唾稠粘欲吐不能出以手曳之方出言語艱難反側悶亂
夜不得臥使來命予診得脈浮數按之沉細而弦即謂中書公

曰仲景言下利清穀身體疼痛急當攻裏後清便自調攻裏而溫陽
散表桂枝湯總帥今胃氣不守下利清穀腹中疼痛雖宜急治之比
之咽嗌猶可少待公曰何謂也答曰內經云瘡發於咽嗌名曰猛疽
此疾治遲則塞咽塞咽則氣不通氣不通則半日死故宜急治於
是遂取刺腫上紫黑血出頃時腫勢大消遂用桔梗甘草連翹一粒
子酒製黃芩升麻防風等分㕮咀每服約五錢水煮清令熱漱冷
吐去之噬之恐傷脾胃自利轉甚再服涎清腫散語言出後以神
應丸辛熱之劑以散中寒化解宿食而燥脾濕丸者取其不即施
化則不犯其上熱至其病所而後化乃治主以緩也不數服利止痛
定後晉中閉塞作陣而痛予恩靈樞有云上焦如霧宣五穀味
薰膚充身澤毛若霧露之既是有氣也今相公年高氣弱自利
無度致胃中生穀之氣不能滋養於心肺故閉塞而痛經云上

氣不足推而揚之脾不足者以甘補之再以異功散甘辛微溫之劑
溫養脾胃加升麻人參上升以順正氣不數服而胃中快利而痛止
內經云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治微者調之其次平
之勝者奪之 萬舉萬全又曰病有遠近治有緩急無越其製
度又曰急則治其標緩則治其本此之謂也

附寒治驗

征南元帥六旬有八戊午秋征南過揚州時仲冬病自利完穀不化
臍腹冷疼足跗寒以手搔之不知痛痒嘗燒石以溫之亦得緩予診
之脈沉細而微予思之年高氣弱深入敵境軍事煩冗朝暮形
寒飲食失節多飲乳酪積於卑湿陽不能外固由是清濕襲虛
病起於下故附寒而逆內經云感於寒而受病微則為咳盛則為
泄為痛此寒溫相合而為病也法當急退寒濕之邪峻補其陽非

灸不能病已先以大艾炷於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里灸各三七壯治腑寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交二穴以散足受寒濕之邪遂慶方寒淫所勝治以辛熱濕淫於外平以苦熱以苦散之以附子大辛熱助陽退陰溫經散寒故以為君乾姜官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以為臣人參草豆蔻炙甘草甘辛大溫溫中益氣生姜大辛溫能散清湿之邪葱白辛溫以通上焦陽氣故以為佐又云補下治下制以急急則氣味厚字故大作劑服之不數服鴟止痛減足腑漸溫調其飲食逾十日平復明年秋遇裏陽值霖雨閏旬餘前症復作再依前灸添陽輔各灸三七壯再以前藥投之數服良愈

加減白通湯治形寒飲冷大便有利完穀不化臍腹冷痛足跗寒而逆

附子

乾姜

官桂

甘草

半夏

草豆蔻

人參

白朮
李子

右八味每服五錢水二盞半生薑五片葱白五莖煎一觔三分去粗心宿食消盡溫服

氣海一穴在臍下寸五分任脉所發

三里二穴在膝下三寸腓外廉兩筋間舉足取之足陽明脈所發合也可灸三壯鍼入五分

三陰交二穴足內踝上三寸骨下陷中足太陰少陰厥陰之交會可灸三壯鍼入三分

髓會絕骨鍼經云腦髓消腫酸耳鳴絕骨在外踝上輔骨下當胫中是也髓會之處也繫古先師云頭熱如火足冷如冰可灸陽輔穴又云肺酸冷絕骨穴取之

陽輔二穴在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脉之所行也可灸三七壯鍼入五分由是副帥疾愈以簡道珍重

肝勝乘脾

真定路總管劉定羨年六旬舊有脾胃虛寒之症至五月初天氣陰寒因勞役渴而飲冷夜半自利兩行平旦召予診視其脈弦細而微四肢冷手心寒唇舌皆有褐色腹中微痛氣短而不思飲食予思內經云色青者肝也肝屬木唇者脾也脾屬土木來尅土故色青見於唇也舌者心之苗水挾木勢制火凌脾故見青色於舌也難經有云見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣今肝已受肝之邪矣潔古先師云假令五臟勝各刑己勝補不勝而鴻其勝重寘其不勝微鴻其勝而以黃芪建中湯加芍藥附子主之

且芍藥味酸濡其肝木微濡其勝黃芪甘草甘溫補其脾土是重實
其不勝桂附辛热濡其寒水火助陽退陰鈐糖甘溫補脾之不足肝
苦急急食甘以緩之生姜大棗辛甘大溫生發脾胃升騰之氣行
其榮衛又能緩其急每服一兩依法水煎服之再服而愈
黃芪建中湯婦人門內有不錄於方中倍芍藥量虛實加附子

風疾治驗

秦政楊公七旬有風疾至春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂
兀兀欲吐復不吐心中如懊憹之狀頭偏痛微腫而赤色腮頰亦
赤色足脣冷命予治之予料之此少壯之時喜飲酒又積濕熱於
內風痰內作上熱下寒是陽不得交通否之象也經云治熱以寒
雖良工不能廢其繩墨而更其道也然而病有遠近治有輕重秦
政今年高氣弱上熱雖盛宜敢用寒涼之劑損其脾胃經云丸則

疾之又云高巔之上射而取之予以三棱鍼約半餘處刺之其血紫
黑如霧銖之狀少頃頭目便覺清利諸證悉減遂處方云眼黑
頭旋虛風內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草此草獨不
為風所搖故以為君頭偏痛者乃足少陽膽經所屬也非柴胡
黃芩酒製不能治黃連苦寒之物以治上熱又以為引用故以為臣
橘皮苦辛溫久其草甘溫補中益氣為佐生姜半夏辛溫能治
風痰茯苓甘平利小便導濕熱引而下行故以為使服之數服
邪氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作脣脴不利頭旋眼黑兀兀欲吐上熱下
寒不得安臥

黃芩 半夏
甘草 白茯苓 柴胡
前胡

黃連

右九味㕮咀都為一服水二錢生姜三片煎至一錢去粗溫服
食後忌酒麵生冷物

衛生寶鑑卷之二十一

雜方門

八毒丸治鬼疰病。入國信副使許可道到雄州請予看脉。予診之脉中乍大乍小乍短乍長。此乃血氣不和邪氣傷正。本官說在路到鄚甘驛中夜夢一婦人着青衣。不見面目。用手去脇下打了一拳。遂一點痛。吐水不止。兼之寒熱而不能食。乃鬼擊也。予曰可服八毒赤丸。本官言嘗讀名醫錄中見李子豫八毒赤丸為散鬼杖子。遂与藥三粒。臨卧服明早下清水二斗立效。又述白海村陳慶玉第三子因晝卧於水仙廟中。夢得一餅食之。心懷憂思。心腹痞滿。飯食減少。約一載有餘。漸漸瘦弱。腹脹如鹽甕。易醫藥及師巫禱之皆不效。又不得安眠。召予治之。不診之間。其病始末因思之。此疾既非外感風寒。內傷生冷。將

何據而腎子思李子陳八妻亦尤頗有相當遂合與五七丸服
之下清黃涎斗餘漸漸氣調而以別藥理之數月良愈不二年
身躰壯實如故因錄之此藥可謂如神合時宜齋戒沐浴淨室
志心修合方

雄黃

礬石

硃砂

附子炮

藜蘆

牡丹皮

巴豆各一兩

蜈蚣一條

右八味爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸冷水送下無時

蠅花散治夏月犬傷及諸般損傷蛆虫及盛臭惡不可近者晉州
吳權府佃客五月間收麥用螺旋車般載一小廝引頭被一螺旋
倒又咬破三兩處痛楚不可忍五七日腹水臭惡難近又兼蛆
蠅極盛藥不能救無如之何卧於大門外車房中一化飯通人

見之云我有一方用之多效。我傳授汝修合既得方合服之。蛆皆化為水而出蠅亦不敢近。又以寒水石為末傅之旬日良愈。衆以為神故錄之方。

蟬退

青黛各半兩

華陰細辛

二錢半

蛇退皮

一兩
燒

勝

右為末和匀每服三錢酒調下。如駢馬牛畜損傷成瘡。用酒催之。如犬傷用磚子和與喫。蛆皆化為水蠅不敢再近。又以生寒水石末乾摻上。

定風散治風狗咬破先口含漿水洗淨用綿紙揩乾貼藥更不再發無膿大有神效。凡患犬傷人咬破多或一年二年三年四五年至七八年被大傷咬破處或發疼痛或先發憎寒或甚至發風遍身搐搦數日不食而死半死八九余觀見死者數人此藥

但凡大傷咬破無有不愈。申顯卿傳

防風

去芦

天南星

生用各半分

右為細末乾上藥更不再發無膿不可具述

治食諸魚骨哽久而不出以皂角末少許吹入鼻中得噴嚏出多效

烏白散治蝎螫痛不可忍

烏魚骨

一两

白礬

二錢

右同為極細末不少多猶鼻如在右臂者左鼻孔內揣之在左掌者右鼻揣之

雄黃消毒膏治蝎螫痛不可忍

礬

一两生

雄黃

信客半两

巴豆

三钱

黃蠟

半两

右為末溶開蠟入藥末在內攪勻為錠子如棗子大每用

時將銀子於燈燭上爻開滴於患處其痛立止
聖欽子治蛇咬蝎螫大有神效五月五日不聞雞犬及孝子婦人
見之修合

雄黃三錢 信一歲 皂角子四十九箇 巴豆四十九粒

耳塞少許 醒香少許

石為末入在合子內封之用時針挑出上病處
復生散治卒病死溺死壓死一切橫死但心頭溫者救之

半夏一味為細末心頭溫者用一字許吹入鼻中立活良
法

衣香方

烹香到處妙 本使香各二兩 香白芷 芫松醋土各一
檀香五錢 三顆七步燒酒未製

石件為粗末入麝香少許和勻以紺囊盛之

八白散治勞汗當風寒搏為皴齶乃瘡變野點之癩

白丁香

白芨

白僵蚕

白牽牛

杜蒺藜

新升麻

內白者佳
各三兩

三顆子

白欒

白芷各二兩

白附子

白茯苓

各半兩

白欒

白芷各二兩

右為末至夜津調塗面明日以瑩肌如玉散治之

瑩肌如玉散治黑點粉刺之類并去垢膩潤澤肌膚

舊實五兩

白芨肥者一兩

升麻內白者半斤

甘松七

白丁香

連皮砂仁各半兩

糯米一升二合半

三顆

子三錢

秉豆五兩另用紗羅紙羅過

用一升

皂角三

水研成漿乾研入水中再燒乾去粗皮
子可得一斤半為末另用紗羅紙羅過

右六味為末入糯米秉豆皂角末一處攪勻用

之

可心陷中屈足蹠指陷中是腦昏目赤瀉攢竹以偏宜續竹膀胱
陷但見若兩肘之拘攣仗曲池之平掃輔骨屈肘屈骨之中牙齒
痛呂細堪治呂細膀胱經一名太溪頸項強承漿可保承漿任脉在太白宣
導如氣衝骨下陷中治腹脹滿腹經在足內側陰陵開通於水道陰陵泉脾經
輔骨下陷中治腹脹滿脾經在足內側陰陵開通於水道陰陵泉脾經
治小便不利腹脹而脹奪內庭以休遲內庭胃經在足大指外間陷中筋轉而
疼馮承山之在耳際山膀胱經膀胱經在足外踝後大抵脚腕痛崑崙解愈崑崙
跟骨上陷中股膝痛陰市能醫陰市胃經在膝上三寸伏兔下癰發癩狂憑
後谿而料理後谿小腸經在手小指外側本節後陷中瘡生寒熱芳仗間使以扶持使間
抱絡經在掌後三期門罿胸滿血瘤而已期門肝經在不容筋第二指一寸五分直乳第
兩筋間陷中

勞宮退胃

心經

心痛以何疑

央包絡經

經在掌中

指取之

稽夫大敦去七

指取之

之偏疼王公謂

此大敦肝經在足大指

指取之

三里却五勞之羸瘦華

言斯三里胃經在膝下三寸

固知腕骨祛黃外側腕前起骨下

附然谷瀉腎然谷腎經在足內行間治膝腫腰疼
手尺澤去肘疾筋緊尺澤肺經在目不見二間
指尺脉本鼻室無間迎者可引迎者大腸經在手大腸經在手
前以三指按取之當中指下陷者是經在手大腸經在手
焦經在眉咳嗽寒痰列缺堪憑後一寸五分
後陷中臨泣膽經在直
入髮際五分寬骨將服疼以祛殘寬骨膀胱經在腕踝骨上腎俞把腰疼
而鴻盡腎俞膀胱經在十四頭
下兩旁各一寸五分以見越人治刃顯於維會維會督脈
手而甦文伯瀉死胎於三陰交應鍼而墮三陰交腎經在足內
謂諸竊為實但麻曰虛實則自外而入也虛則自內而出故是故
濟母而裨其不足奪子而平其有餘觀二十七之經絡一一明辨
據四百四之疾證件件皆除故得夫枉都無路斯民於壽域幾微
以判彰往古之玄書抑又聞心胸病求掌後之大陸大陸足少陰經在掌後筋中

間隔

有皆

瘻責肘前之三里

手三里在曲池下二寸大腸經

冷痺腎絶取足陽明

之土

三里

連脇腹痛鴻足少陰之水

陰谷脊間心後者鍼中渚而也

立痊

中渚三焦經在手小腸

指本節後間下肋遙者刺陽陵泉即止

陽陵泉在膝下一寸陽經在手小腸經在側外側本節後隔中腰脚疼在委中

而已矣

委中膀胱經在腹

中約收中動脉

夫用鍼之士於此理苟明者烏收衽邪

之功而在乎然指

离合真邪說

古有離合真邪云者蓋聖人欲使其真邪相離而勿合之謂也

若邪入於真則真受其靈而不遂其純一之真真之不遂則其

所謂真也罹害有不可言者真被乎邪竊其柄而肆其橫逆邪

既橫逆則其為患復可勝言哉嗚呼真邪之不可合也如此

為真胡為邪真之為言也天理流行得与万物万物得以為生

者皆真也聖人保之如持盈邪之為言也天地間非四時五行
之正氣而差臻迭至者皆邪也聖人避之猶矢石其防微杜漸
之弊如是淵有旨哉蓋真立則邪遠邪厲則真殘邪固可除真
尤宜養真之道無須異求但飲食男女節之以門風寒暑溫
禦之以特復能安慈恕以愛人虛中襟而應物念慮必為之防
卒此必為之敬如斯內外交養周備則吾之生不永生而生不
期壽而寿矣不然攝養少或不嚴則六邪乘隙競入諸疾交生
衆害並作則吾之真所能存者幾希故聖人憂之揆度權衡機
宜所任示之以駐邪之方使屏之如沃雪拔刺而無遺者以此
古人有云植德務滋除惡務本亦此意也然去邪之方經旨俱
存再拜遺詮敬為節錄

帝問邪氣在經其病何如取之柰何對曰邪之在經如水滌風波

涌竈起其行脉中循循然其中手也時大時小動無常處在陰與陽不可為度卒然逢之早遏其路吸則內鍼無令氣忤靜以久而無令邪布吸則轉鍼以得氣為故候呼引鍼呼盡乃去大氣皆出故命曰鴈帝曰不足者補之柰何必先搘而循之切而散之推而按之彈而弩之爪而下之通而取之外引其門以閉其神呼盡內鍼靜以久留以氣至為故如待所貴不知日暮其氣以至適而自護候吸引鍼氣不得出各在其處推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補

鴈法先以左手搘按得穴以右手置鍼於穴上令病人咳嗽一聲熱鍼入腠理得穴令病人吸氣一口鍼至六分覺鍼沈澁復退至三四分再覺沈澁更退鍼一旦許仰手轉鍼頭向病所以手搘經絡循捫至病所氣至病已合手回鍼引氣過鍼三十隨呼徐出

鍼勿閉其穴命之曰鴻

補法先以左手埋按得穴以右手按之置鍼於穴上令病人吸數一聲撚鍼入腠理得穴今病人呼氣一口將盡內鍼至八分覺鍼沉緊復退一分許如更覺沉緊仰手轉鍼頭向病所依前循捫至病所氣至病已隨吸而疾出鍼速按其穴命之曰補

春夏秋冬深淺補鴻法

春夏刺者皆先淺而後深秋冬刺者皆先淺而後深凡補鴻皆然
寒熱補鴻法

其補鴻之法皆如前也若病人患熱者覺鍼氣至病所即退鍼三分令病人口中吸氣鼻中出氣依本經生成數足覺鍼下陰氣隆至依前法出鍼若病人患寒者覺鍼氣至病所即進鍼至二三分令病人鼻中吸氣口中出氣依本經生成數足覺鍼下陽氣隆

至儀前法出鍼

灸法補鴻

黃帝鍼經云氣盛則鴻之氣虛則補之以火補者母吹其火湏待自滅也以火鴻者疾吹其火催其炎火滅也

造度量權衡法

丁德用註難經云其升斗秤尺四者先立其尺然後造其升斗秤兩皆以同身寸為法以尺造斗面闊一尺底闊七寸高四寸俱後三分可容十升凡以木之脂脉全者方一寸為兩十六方為一斤此制同身寸尺升斗之度為人之腸胃輕重長短之法也繫古老人云丁公注當

求寸法

黃帝明堂灸經有云岐伯明堂經云以八寸為尺以五分為一寸

人緣有長短肥瘦不同取穴不準秦時扁鵲明堂云取男左女右
手中指第一節為一寸為緣人有身長手短手長身短取穴不準
唐時孫思邈明堂經云取病人男左女右大拇指節橫紋為一寸
以資消詳巧拙在人亦有差耳今取男左女右手中指第二節內
庭兩橫紋相去為一寸自依此寸法導人著灸療病已來多得獲
愈此法有集今已為定矣素問要旨論云取穴之法以從男左女
右以中指與大指相接如環然端寔中指上側兩橫紋之間為一
寸也

御醫寶鑑卷之二十二

藥類法象

哎咀藥類

古人用藥治病擇爭口咀嚼水者服謂之哎咀後人用剉刀細剉桶內剉過以竹篩齊之藥有氣味厚薄升降淳沉補瀉名各不同今詳錄之及揀擇制度修合之法具列于后

風升生

味之薄者陰中之陽

味薄則通酸苦鹹平是也

防風氣溫辛微苦風通用鴻肺竇散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也候服鴻人上焦元氣去斧并火股鉗碎剉桶內剉過竹篩齊之用

升麻氣平味微苦此足陽明胃足太陰脾行經藥也若補其脾胃非此為可用不能補若得葱白香白芷之類亦能走手陽明大陰

解肌肉間熱此手足陽明傷風之的藥也刮去黑皮并腐爛裹白者佳鋸碎剉桶內剉過竹篩齊之用

羌活氣微溫味甘平治肢節疼痛利諸節手足太陽風藥也加川芎治太陽少陰頭痛透關利節去黑皮并腐鋸碎剉桶剉過竹篩齊之用

獨活氣微溫味甘平除虛勞煩熱并肌熱去早晨潮熱此少陽厥陰行經藥也婦人產前產後必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胸膈痛去芦鋸碎剉桶剉過竹篩齊之用

前胡氣微寒味甘平主痰滿胸膈中痞心腹強急治傷寒熱安明目藥精

推陳致新半夏為使剉薑用

葛根味甘治脾胃虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明之經去皮

剉碎剉桶剉竹篩碎之用

葛靈仙

氣溫味甘
作苦

主諸風濕冷宣通五臟腹內癖滯腰膝冷疼及

治折傷鐵足者佳去芦剉細用

細辛

氣溫味辛
大辛

治少陰頭痛如神當少用獨活為使去芦并華州

者佳剉細用

香白芷

氣溫味辛
大辛

治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻

湯中加之通行手足陽明經先剉碎剉桶內剉過竹篩碎之用

桔梗

氣溫味辛苦
利咽潤肺

治咽喉痛利肺氣去芦米泔浸一宿焙乾剉碎剉桶

剉竹篩碎用

秦桔子

氣平味辛

主風毒腫利咽喉吞一枝可止瘡頭搗細用

一枚可止瘡頭搗細用

藁本

氣溫味辛

此太陽經風藥治寒氣鬱結於本經頭痛脣痛大寒

犯腦令人腦痛藁本痛銳細用

川芎

氣溫味辛

補血治血虛頭痛之聖藥也。妊娠動數月加當歸二

味各二錢水二盞煎至一盞服之神妙搗細以紗羅羅過用

蔓荆子

氣清味苦足

太陽頭痛昏悶除頭昏目暗散風邪之藥也。胃

虛人不可服恐生痰揀搗用

秦艽

氣平味苦

主寒熱邪氣寒溫風寒下水利小便療黃病骨蒸治

口噤及腸風鴻血去芦頭鋤碎剉桶內剉竹飾齊之用

天麻

氣平味苦治頭風諸風溫寒四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強

筋骨鋤用苗謂之定風草

麻黃

氣溫味苦治太陽少陰經汗去芦鋤微剉碎者三二沸掠去上末

不然令人心煩

荆芥穗氣溫味辟邪毒利血脉宣通五臟不足氣能發汗除勞冷
搗和醋封毒腫去枝手搓碎用

薄荷苦氣溫味能發汗通關節解勞乏燠薤相宜新病人不可多食
令人虛汗不止去枝莖及葉搗碎用之

熱浮長

氣之厚者陽中之陽

氣厚則發熱

辛其溫熱是也

黑附子氣熱味其性走而不守亦能除腎中寒甚由木為佐謂之
木附湯除寒溫之聖藥溫藥中少加之通行諸經引用藥也次
溫經閑慢火炮裂剝細用

川烏頭氣熱味療風癆血痺半身不遂行經藥也先以慢火炮裂
刮去皮臍鋤細用

肉桂氣熱味補下焦熱火不足治沉寒痼冷之病及表虛自汗漏

夏為禁藥也去殼搗用

桂枝甘熱味仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者乃桂條也非肉桂也取其輕薄而能發散本又有一種柳桂乃嫩小桂條也尤宜入治上焦藥用也以剝碎用

木香氣熱味辛苦除肺中滯氣若療中下焦氣結導瀉用枳榔為便廣州者徑剝細用

丁香氣溫味辛溫脾胃止霍亂消痃癖氣脹及胃腹內冷痛壯陽暖腰膝殺酒毒搗細用

白芷氣熱味大辛蕩散肺中滯氣主積冷氣寬膈止反胃吐逆消穀下氣進食去皮搗細用

草豆蔻氣熱味大辛治風寒邪客在於胃口上善去脾胃客寒令人心胃痛麵裹煨熟搗細用

益智仁氣熱味治脾胃中受寒邪和中益氣治多哩於肺中藥內
兼用不可多服去皮搗細用

川椒朱辛性溫主邪寒溫中除寒癆堅齒髮明日利五臟凡用炒去汗

及合口者手搓細用

縮砂仁氣溫朱辛治脾胃氣結滯不散主虛勞冷鴻心腹痛下氣消食

搗細用

乾薑大辛氣熱味甘治沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子為引用水

同煎薑附湯是也亦治中焦有寒水洗慢火炮裂後剉細用

玄胡氣溫辛破血治氣婦人月水不調小腹痛溫暖腰膝破散癥瘕

搗細用

乾生薑氣溫主傷寒頭痛鼻塞上氣痰嗽止嘔吐生薑同治與半

夏等分治心下急痛剉用

良薑味辛主胸中令霍亂腹痛及胃嘔食轉筋鴻利下氣消宿食

剝細用

吳茱萸苦辛氣熱味

治寒在咽喉塞胸中經言咽膈不通食不下食則嘔令人口閉目瞪寒邪所結氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣用之如神諸藥不可代也洗出苦味照

乾鵝用

厚朴味辛氣溫

能除腹脹若虛弱人雖腹脹宜斟酌用之寒脹是也大

熟藥中煎用結者散之神藥也誤服脫人元氣切禁之紫色首

佳去皮剝碎薑製微炒剉桶剉竹篩研用

茴香氣平味辛破

一切臭氣調中止嘔下食炒黃搗細用

紅花氣溫味辛

主產後口噤血運腹內惡血不盡絞痛破留血神驗手

搓碎用

濕化成

中方

戊溫其本氣平 其薰氣溫涼寒熱在人以胃應之
己土其本味鹹 其薰味辛甘鹹苦在人以脾應之

人參味溫氣平治脾肺陽氣不足及肺氣促短氣非升麻為引用不能
補上升之氣升麻一分人參三分可為相得也若補下焦元氣
渴腎中火邪茯苓為之使甘草甘平生用為君此藥能補中緩
中短氣少氣渴肺脾胃火邪善去溼中痛或加苦練酒煮玄胡
為王尤好尤效去苦剝細用

黃芪味溫性平治虛勞自汗補肺氣實皮毛鴻肺中火脉弦自汗善治
脾弱血虛血脉不行瘡瘍內托陰證瘡瘍必用之去苦皴剝碎剉

補剉竹節齊之用

甘草

氣平味甘

生用大涼鴻熱火灸則溫能補上中下三焦元氣調和

諸藥共為力而不爭性緩善解諸急故有國老之稱去皮剉碎

剉桶剉竹節齊之用

當歸

氣溫味甘

和血補血尾破血身和血用以溫水洗去土酒製焙晒

乾去芦剉細用

熟地黃

氣寒味苦

酒晒蒸如烏金假酒力則微溫大補血虛虛損血衰

人須用善黑髮髮忌蘿蔔剉用

半夏

氣散味辛平

治寒痰及形寒飲冷傷肺而咳大和胃氣除胃寒進

飲食太陽痰厥頭痛非此藥不能除也湯泡七次剉細用

白朮

氣溫味甘

能除湿益燥和中益氣利腰膝間血除胃中熱搗碎細

羅紙羅過用

蒼木根圓主治與白木同若涂上溫發汗功最大若補中焦除溫力不如白木泔浸刮去皮搗細用

橘紅辛溫味苦能益氣加青皮減半去氣滞推陳致新若補脾胃不去白理胸中肺氣去白搗細用

青皮氣溫味辛主氣滯消食破積結膈氣去穰搗細用

藿香氣溫味甘辛療風水去惡氣治脾胃吐逆霍亂心痛去枝葉用葉以手搓細用

枳榔氣溫味辛治後重如神性如鐵石之沉重能墜諸藥至於下極搗

細用

廣茂氣溫味平主心膈痛飲食不消破痃癖氣最良火炮剉開搗細紗羅上過用

京三核氣辛味苦主老癥癥瘕婦人血脉不調心腹刺痛火炮剉

開搗細紗羅上過用

阿膠氣微溫味甘平主心腹痛血崩補虛安胎堅筋骨和血脉益氣止痢
慢火炮肥撲細用

詞子氣溫味苦主腹脹滿飲食不下消痰下氣通利津液破胸膈結氣
治久痢赤白腸風去核剝用

桃仁氣溫味甘苦治大便血結血祕血燥通潤大便七宣丸中用之專
療血結破血湯中去皮尖研如泥用

杏仁氣溫味甘苦除肺燥治氣燥在胸膈炒去皮尖用

大麥氣溫味甘苦補脾胃虛寬腸胃先搗細炒黃色取麪用
紫草氣寒味苦主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹脹
滿去土用茸剝細用之

蘇木氣平味甘酸主破血產後血脹癰欲死排血正痛消癰腫瘀血月

標不調及血運口噤鍼細用

燥降收

氣之薄者陽中之陰

氣薄則發泄

辛甘淡平寒涼是也

茯苓氣平朱能止渴利小便除溫益燥和中益氣利腰膝間血為
主治小便不通濁黃或赤而不利如小便利或數服之則大損
人目如汗多人服之損元氣大人壽醫云赤利白補上古無此
說去皮搗細紗羅過用

猪苓

朱氣平

大燥除溫比諸淡滲藥大燥津液無溫證勿服去黑

皮裹白者佳搗羅過用

琥珀

朱氣平

安五臟定魂魄消瘀血通五淋搗細紗羅過用

澤瀉

朱氣平

除溫之聖藥也治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令

人目盲搗碎紗羅過用

滑石氣寒性沉重能泄氣上令下行故曰滑則利竅治前陰竅溢

不利利竅不比與滲淡諸藥同白者佳搗水飛用

瞿麥

氣寒味苦主開格諸癃結小便不通治腫癰排膿明目去翳破胎

墮子下閉血逐膀胱邪熱去枝用穗鋤細用

車前子氣寒味甘主氣癃閉利水道通小便除溫暉治中風熱衝目赤

痛搗細紗羅過用

木通

氣平味甘

主小便不通導小腸中熱去龜皮鋤碎剉桶剉竹篩齊

用

燈草

通草氣平味甘

通陰竅澁不利利小水除水腫治五淋閉鋤細生

用

五味子

氣溫味酸

大益五臟之氣孫真人云五月常服補五臟氣遇夏

月季月間人困乏無力乃無氣以動也以黃芪人參麥門冬少

加黃芩生煎湯服使人精神倍加兩足筋力湧出生用

白芍藥

氣微寒
味酸

補中焦之藥得炙甘草為輔治腹中痛如夏月腹

痛少加黃芩若惡寒腹痛加肉桂一分白芍藥二錢炙甘草一

錢半此仲景神品藥也如冬月大寒腹中痛加桂一錢半水二

錢煎一錢去粗剝碎剉桶剉竹篩齊用

桑白皮

氣寒
味苦

主傷中五勞羸瘦補虛益氣除肺中水氣止哩血

熱渴消水腫利水道去皮剝碎剉桶內剉竹篩齊之用

天門冬

氣寒
味苦

保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加黃芪人參用之

為主如神湯浸去心曬乾用

麥門冬

氣寒
味苦

治肺中伏火脉氣欲絕加五味子人參三味謂之

生脉散補肺中元氣不足湯浸去心用

犀角

氣寒
味苦

主傷寒溫疫頭痛安心神止煩亂明目鎮肝治中風

失音小兒癰豆風熱驚癇鏹為末用之

烏梅

氣平
朱砂

主下氣除熱煩渴安心調中治痢止渴以鹽豉為白梅

亦入除痰藥去核銅細用

牡丹皮

氣寒
朱苦

治腸胃積血及衄血吐血之要藥犀角地黃湯中之

一味也銅細用

地骨皮

氣寒
朱苦

解骨蒸肌熱主消渴去風濕痺堅筋骨去骨用皮剉

細用

連翹

氣平
朱苦

主寒熱瘰疬諸惡瘡腫除心中客熱去胃虫通五淋以

手搘碎用

枳殼

氣寒
朱苦

治胸中痞塞泄肺氣炒去穰搗細紗羅過用

枳實

氣寒
朱苦

除寒熱破結實消癰癧治心下痞逆氣脢痛炒去

搘羅過用

寒沉藏

味之厚者陰中之陰

味厚則泄

酸苦鹹氣寒是也

大黃氣寒味苦其性走而不守濕諸實熱大腸不通蕩腸胃熱專治不
大便去皮剝碎竹篩齊用

黃芩氣寒味苦治腎水膀胱不足諸痿厥腰脚無力於黃芩湯中少加
用之使兩足膝中氣力湧出痿軟即時去也蜜炒為細末治口
瘡癰瘍必用藥也去皮剝碎剉搗剉竹篩齊用

黃芩氣寒味苦治肺中溫熱療上熱日中赤腫脰肉壅盛必用之藥
泄肺受火邪上逆於膈下補膀胱之熱水不足乃滋其化源去
皮并黑薦剝細剉搗剉竹篩齊用

黃連氣寒味苦瀉心火除脾胃中溫熱治煩惡心鬱熱在中焦元元欲
止治心下痞滿仲景云治九種心下痞瀉心湯皆用之去須剝

碎用之

石膏氣寒味甘辛治足陽明經發熱熱燥熱潮熱自汗小便濁亦大渴引飲身躰肌肉壯熱苦頭痛白虎湯是也善治本經頭痛若無此證醫者誤用有不可勝救也搗細羅用

草龍膽氣寒味大苦治赤目腫痛睛脹肉高起痛不可忍以桑胡為生治眼疾必用之藥也去芦剝碎剉搗剉竹節齊用

生地黃氣寒味苦涼血補益腎水真陰不足此藥大寒宜斟酌用恐傷人胃氣剝碎用

知母氣寒味大苦治足陽明火熱大補益腎水膀胱之寒刮去黑皮苗裏白者佳剝細用

漢防己氣寒味大苦療腰以下至足溫熱腫盛脚氣補膀胱去蓄熱行十二經去皮剝細剉桶剉竹節齊用

商陆高氣微寒
苦平除煩熱主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃
便不利去核用葉手搘碎用

朴硝氣寒味苦辛除寒熱邪氣逐六腑積聚結固血癖胃中飲食熱結
血閉去停痰痞滿消毒生用

旋覆根氣寒味苦主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫毒
血及熱狂瘲瘍搗細羅過用

牡蠣氣寒味平主傷寒寒熱溫瘧女子帶下赤白止汗心痛氣結溢
大小腸治心胸下痞燒白搗羅用

苦參氣寒味苦足少陰腎經之君藥也治本經須用剝細剉搗剉竹

節齊之用

地榆氣寒味苦主產乳七傷帶下月經不止血崩之病除惡血止痛
一治腸風泄血小兒痘瘡性沉寒入下焦治熱血痢用

川練子

氣寒味苦平

主傷寒大熱煩躁殺三虫疥瘡通利大便小便搗

細用

山梔子

氣寒味微苦

治心煩懊憹不得眠心神顛倒欲絕血端小便

不利

搗細用

香豉

氣寒味苦

主傷寒頭痛煩燥滿悶生用之

氣味白

厚薄之

寒熱其

陰陽桂

升降之

之圖耳

升降者天地之氣交

茯苓味淡為在天之陽陽也陽當上行何為利水而泄下經云氣之運者乃陽中之陰所以茯苓利水而泄下然而泄亦不離乎

調胃之甘之榮胡

之氣

中厚

生陽

至陰

味之厚

冬陰

氣之薄

夏陽

氣之薄

春陽

氣之薄

秋陽

氣之薄

夏陰

氣之薄

春陰

氣之薄

秋陰

氣之薄

冬陰

陽之體故入手太陽也

麻黃 苦為在地之陰也陰當下行何謂發汗而升上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而升上亦不離乎陰之體故入手太陰也

附子 熟氣之厚者乃陽中之陽故經云發熱

大黃 苦味之厚者乃陰中之陰故經云泄下

粥 淡為陽中之陰所以利小便

茶 苦為陰中之陽所以清頭目

清陽發腠理 清之清者也

清陽實四肢 清之濁者也

濁陰歸六腑 濁之濁者也

濁陰走五臟 濁之清者也

○藥性要旨

藥平升微寒平亦升甘辛藥平降

甘寒瀉火苦寒瀉溫熱苦甘寒瀉血熱

用藥升降浮沉補瀉法

肝膽味辛補酸瀉氣溫補涼瀉

肝膽之經前後寒熱不
同逆順互換入求責法

心小腸味鹹補甘瀉氣熱補寒瀉

三焦命門補瀉同法

脾胃味甘補苦瀉氣溫涼寒熱補瀉

各從其宜道從互換入求責

五臟更相平也若一臟不平所勝平之此之謂也故云安穀則

曷絕穀則亡神無所居仲景云水入於經其血乃成穀入於胃
脉道乃行故血不可不養氣不可不溫血溫氣和榮衛流行常

保斯命

臟氣法時補瀉法

肝苦急上食甘以緩之

心苦緩急食酸以收之

肺苦氣上逆急食苦以泄之

脾苦濕急食苦以燥之

腎苦燥急食辛以潤之

開腠理致津液通氣也

肝欲散急食辛以散之

以辛補之以酸瀉之

心欲軟急食鹹以軟之

以鹹補之以甘瀉之

脾欲緩急食甘以緩之

以甘補之以苦瀉之

肺欲收急食酸以收之

以酸補之以辛瀉之

腎欲堅急食苦以堅之

以苦補之以鹹瀉之

此五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或軟或堅四時五臟病隨五味所宜也

君臣佐使法

帝曰方有君臣何謂也岐伯曰主病之為君佐君之為臣應臣之

萬便非上下三品之為也帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊質也

凡藥之所用者皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣主病者為君假令治風者防風為君治上焦熱黃芩為君中焦熱黃連為君下焦溫熱防已為君治寒附子之類為君看熱見何證以佐使藥分治之此制方之要也本草說上品藥為君各從其宜

治法綱要

氣交變論說五運太過不及云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣

失常之理則天地四時之氣而所運行故動必有靜勝必有復乃天地陰陽之道也

抑舉辨

假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使下若本高何抑之有
假令下者舉之非下者固當舉也以其本高而失之太下故舉之而使高若本下何舉之有

用藥用方辨

仲景表虛制桂枝湯桂枝味辛熱發散為陽體輕本乎天者親上故桂枝為君芍藥甘草佐之陽脉滯陰脈弦法當腹中急痛仲景制小建中湯芍藥味酸寒主收補中本乎地者親下故芍藥為君官桂甘草佐之一則治表虛一則治裏虛各言其主用也後之人用古方者觸類而長之則知其本而不至終之悞矣

藥味專精

聖尤與辰六月中許伯威五旬有四中氣本弱病傷寒八九日醫者見其熱甚以涼劑下之又食梨三四枚傷脾胃四肢冷時昏憒請予治之診其脈動而中止有時自還乃結脉也亦心動悸吃噫不絕色青黃精神減少目不欲開啞卧惡人語予以灸甘草湯治之成無已云補可去弱人參大棗耳補不足之氣桂枝生薑半益正氣五臟衰弱榮衛潤溫以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復肺通心加桂枝人參急扶正氣減生地黃恐損傷氣到一兩服之不效予再思脉病對莫非藥陳腐而不效率乎再於市鋪選當氣味厚者再煎服之其病減半再服而愈凡藥昆蟲草木生之有地根葉花實採之有時失其地性味少異失其時氣味不全又况新陳不同精粗不等倘不擇用用之不效醫之過也內經云司歲備物氣味之專精也修合之際宜加意焉

衛生寶鑑卷之二十三