

衛

生

寶

鑑

○腹中積聚

真定路惠民司令張君傳硝砂煎丸香綴丸木香硝砂
丸三方多效

硝砂煎丸消癰積塊痃癖一切凝滯老人虛人無妨

黑附子

一箇各重五錢半已上正坐
安者炮去皮脐剔作丸子

木香

三錢

破故

紙捲箱內炒

真者各一兩
草撥

硝砂

三錢

右先將硝砂用水一盞續化開於瓮內熬乾為末安在
附子瓮內却用剜出附子末蓋口用和成白麵裹約半指
厚慢灭火內燒勻黃色去麪同木香等藥為細末却用元
果附子執黃麵為末醋調漿糊九桐子大每服十五丸至
三十丸生薑湯送下此藥兼有神功

仙方奇拔丸破瘀癬消癰塊及冷熱積

木香

丁香各五錢

京三棱切酒浸一宿

青皮去白

枳殼

炒熟炒

川煉子

茴香炒各一兩

廣茂

浸一宿切酒

三棱

廣茂用去皮巴豆三十粒同炒巴豆黃色去巴豆不用

右為末醋糊丸如桐子大用硃砂為衣每服二十九炒生薑盐湯下溫酒亦得食後日進三服

木香

礪砂官桂附子炮乾漆炒去炮

消久不差者

木香

礪砂

官桂

附子炮

乾漆

炒去炮

猪

牙皂角

細墨

乳香研

京三棱炮

廣茂炮

木

黃芩

炒令黑未

沒藥研

乾薑炮

青皮各兩

巴豆霜兩

右除研藥外同為末以好醋一升化開礪砂去粗脚銀石

器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末膏內
和丸如桐子大每服三十九食後溫酒送下

鹽

白丸治心腹積聚久癥癥塊大如杯碗黃疸宿食朝起嘔吐支
滿上氣時太腰脹心下堅結上來捨心傍攻兩脇十種水病八
種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消
化或瘧疾連年不差又療一切諸風身躰頑痺不知痛痒或半
身不遂或眉鬚落及療七十二種風三十六種遺刀疰忤及
癩癪或婦人詣疾斷續不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意
思不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年
累月羸瘦因勞或歌或笑如鬼所使但服此藥無不除愈

川烏去皮二兩半

柴胡去芦

吳茱萸湯泡七次擦淨

桔梗

童菊

紫苑

去苗葉及土

黃連去須

乾薑炮

肉桂

去龜皮

茯苓

人参

蜀
叔

司及閉口燐用

厚

朴去皮薑汁製

皂莢 去皮子名

巴豆

去皮心膜出
油炒研各半兩

右為細末入巴豆一勺煉蜜為丸如梧桐
薑湯下食後或臨卧服漸加至五七丸

雞爪三錢丸治五臟痃癖氣塊年深者一月取效

卷八

石三稜

京三稜

青皮

陳皮去白

雞爪三稜

各伍錢

欒柳

肉首麌

合二两

利潤
三錢

右九味為末薑汁打糊丸如桐子大每空心臨卧各一服忌一切生冷硬粘物

服二十九劑湯小

青盐丸治一切冷积作痛，无时宿食不消。又治一切酒食所伤。

致

音盤

礪砂各一錢

細麪末三錢

鹽政六十四

大板二十副

巴豆三十粒去皮

心腹出油

右入掠葵三十箇同末入巴豆一勺醋糊丸桐子大每服三十丸溫薑湯下積在上食後

玄胡九解化傷帶內消飲食治吐利夢寐氣結痰煩不安心腹脹

痛順三焦和脾胃

木香

當歸

玄胡索

青皮去白

雄黃飛另研

廣茂炮

梅榔各四兩

京三棱炮六兩

右八味為末入雄黃勾糊丸如桐子大每服三十九生薑

湯下不拘時

破積道飲丸治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

楂榔

陳皮去白

廣木香

青皮去白

枳殼熟炒

枳實炒

廣茂炮

半夏炮十次

京三棱炮

神曲炒

麥蘖炒

乾生薑

茯苓去皮

甘草炙

澤鴻各五錢

牽牛

研末二錢
一方六錢

巴豆

去心膜三十箇取霜

木香三棱湯和脾胃進飲食消化生冷物治心腹刺痛霍亂吐利

膈脹悶

木香

神曲炒各一兩

京三棱炮

甘草炙各二兩

陳皮

去白

益智各四兩

廣茂六兩

右為末每服二錢入鹽一粒沸湯點服空心食前

乾柿丸取虛實積下膈長妙

硃砂

研為衣

沒藥研

猪牙皂角

去皮弦子為末

乾漆

碎炒研末

京三棱

炮為末

青礞石

為末

乾薑

末各一錢

水銀

外帶紙手

輕粉二分

巴豆

三十粒
去皮鹽

醋蓼十
佛研

右件各研勻軟飯和丸如棗大煎柿蒂湯冷下二五丸
加減用婦人有胎勿用

神效五食湯丸取虛實積食氣盛脹滿積塊水氣年深癖癥並皆

治之

大戟

去皮

甘遂生各半錢

猪牙皂角

去皮子
主用

胡椒

生各一錢

大黃

米醋

芫花炒黃研一宿

巴豆

去心鹽醋煮二十盞
研半錢

右除巴豆外杵為末入巴豆再研勻糊丸如棗大每服
五七丸氣實者十九夜卧水一錢用白米白麵黑豆生米
豬肉各少許煎至半錢去粗用湯溫下藥取下病忌油膩

粘滑物婦人有胎不可服之

磨積三錢丸治遠年日近諸般積聚脾虛氣塊或氣積酒積諸服

所傷無問男子婦人老幼並宜服之常服進飲食

木香

麥蘖

京三稜炮

廣茂

枳殼炒

石三

稜去皮

杏仁

麴炒各半兩

乾漆

炒烟不三錢

雞爪三

稜半兩

葛根

三錢

官桂

二錢半

黑牽牛

半兩半生半熟

丁香

換擗

青附子

青皮

去白各二錢

縮砂

三錢

白牽牛

半錢半生半熟

陳皮

去白三錢

右為末醋糊丸如桐子大每服二十丸生薑湯下食後日二服病大者四十日消溫水送下亦得

聖散子治遠年積塊及婦人乾血

硼砂

川大黃

各一錢

麥蘖

六兩

乾漆

三兩炒烟不

萹蓄

茴香炒

換擗

瞿麥各一兩

如治婦人乾血氣加川山甲二兩炮

右為末每服五錢臨睡溫酒調下仰卧此藥只在心頭至明大便如爛魚小便赤為驗取出藥無毒性如君子有神效小兒用一錢十五以上伍錢或七錢空心服之更效荆蓬丸破癰癥消癰塊及冷熱積聚胸膈痞悶通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿食

木香

青皮去白

川茴香
微炒

枳殼
麸炒

梅榔各一

京三棱

二兩酒浸冬三日夏一日

廣茂

二兩醋浸冬三日夏一日

同炒令乾黃色

以去皮巴豆二十箇銚器內去巴豆不用

右件七味修事畢為末水糊丸如棗豆大每服三十丸溫生薑湯送下食後

醋煮三棱丸治一切積聚遠年日近皆治之如神效

川芎二兩醋煮熟切作片子

京三棱四兩醋煮熟切片子向乾

大黃半兩醋蒸熟火燶過切

右三味為末水糊丸如桐子大每服三十丸溫水下無時病甚者一月效小者半月效

疏氣丸治五積六聚散痕塊僻留飲以上之疾皆係寒氣客搏於腸胃之間久而停留變成諸疾此藥能消導滯氣通和陰陽消舊積雖年高氣弱亦宜服之

木香

川茴香

紅橘皮去白

菖蒲

青皮去白

蘿蔔子

廣茂泡

梅榔

補骨脂

菖蒲

神曲

枳殼

姜炒去廢

草澄茄

縮砂

麥蘖麴

各一斤炒

牽牛

炒一斤半

右為末水糊丸如桐子大每服五錢細嚼白豆蔻仁一

枚白湯送下食後

廣茂瀆堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不安

半夏泡七次

黃連六分

當歸梢

厚朴

黃芩各五分

廣茂

麵各三分

甘草生三分

益智仁七分

紅花

橘皮去白

升麻各二分

紫胡

澤鴻

吳

朱萸各三分

青皮三分

如虛渴加葛根二分

右咬咀都作一服水二錢先浸藥少時煎至一錢去粗稍熟服食前忌酒溫麵

○治積要法

許李士云太抵治積或以所惡者攻之或以所喜者誘之則易愈

如硝砂水銀治內積神麩麥蘖治酒積水蛭車虫治血積不香枳

榔治氣積牽牛子逐治水積椎黃膿粉治泄穢礞石巴豆治食積

各從其類也若用群隊之藥分其勢則難取效須是認得分明是何積聚兼見何證然後增減酌量使之藥不爾反有所損要在臨時通變也

○養正積自除

真定王君用年一十九感病積脅左連脇如覆杯腹脹如鼓多青終脈端不能卧時值暑雨加之自利完穀日晡潮熱夜有盜汗以君急來求治予徃視之脉得浮數按之有力謂病家曰凡治積非有毒之劑攻之則不可令脉虛弱如此豈敢以常法治之遂投分添益胃之劑數服而清便自調雜以外降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以削之不用餘良愈先師嘗曰索古老人有云養正積自除譬之蒲坐皆君子縱有一小人自無容地而出今全真氣實胃氣強積自消矣索古之言豈欺我哉內經曰大積大聚裹

其大半而止。蒲实中治積氣大溫之劑尚不可過。況虛中有積者乎。此亦治積之一端也邪。正虛實宜精審焉。

○腹中諸虫

烏梅丸治藏寒蛔虫動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止得食即嘔常自吐蛔有些證候謂之蛔厥此藥主之又治久痢。

烏梅三百个

黃藥炙

細辛去苗

去粗皮

肉桂去粗皮

附子

炮去皮脂

人參

去芦各六兩

乾薑炮十兩

當歸去芦

蜀椒去目及閉口者微炒出汗用四兩

黃連去浙

十六兩

當歸去粗皮

四兩

附子

右共搗篩合治之以醋浸烏梅一宿核蒸之五斗米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與煉蜜杵二斤下丸如梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前服

鴟

去上

枳榔

苦練根

浮皮

胡粉

炒各一兩

白藜

布二矛半

右為末水糊丸如麻子大小兒疾病多有諸虫或因臟腑虛弱而動或因食其肥而動其動即腰中疼痛發作積聚往來上下痛無休止亦攻心痛則哭不休合眼仰身撓心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌肉或寒或熱沉上默不的知病之處其虫不癥則子母相生無有休止常一尺則能害人一歲兒服五光溫漿水入生油一两点行下之溫米飲亦得不拘時候其虫細小者皆化為水大者自下

補金散治諸般虫

鴟風生

雷丸

定粉

錫灰

各等分

右為末每服三錢空心食前香油調下又用豬肉一兩
乾擦在上細嚼亦得每服藥時用雞頭甘遂末一錢与
前藥一處服之其虫自下矣

雷金散治諸虫

雷丸末八分

鬱金末七分

黑牽牛末一茶半

大青根末一茶半

右三件末和匀以生油調下三兩匙飯壓之

化虫散取寸白虫

黃丹

半兩炒

錫灰

一又四分

定粉

二又四分

右同研極細末每服一錢先燒豬肉伍文吃了後以生油
一口許調藥服至晚取下婦人有胎不可服李副統女子
菊花茶十三服取虫一抄終算不差

○諸溫腫痛

沉香海金沙丸治一切聚積散脾溫腫脹肚大青筋羸瘦惡證

沉香

二两

海金沙

輕粉各一两

牽牛頭末一两

右為末研細頭赤如泥瓦如桐子大每服五十粒用灯草
湯送下量虛实加減丸數取利為驗大便利止後服

海金沙散治脾溫大過遍身腫滿

不得卧及腹脹如鼓

牽牛

半生半熟

白朮各一两

甘遂

半两

海金沙三钱

右為末每服一錢煎倒流水一錢調下食前待利止後

服已上二方係太醫劉仲安傳用之累上獲効如神尤速

故錄於此

續隨子丸治遍身腫滿喘悶不快

人參

木香

漢防己

赤茯苓

研末

大枳榔

海金沙

各五分另研

續隨子

四两

牽牛

四两九分

右為末棗肉丸如桐子大每服三十丸至三十九煎桑白皮湯送下食前

聖靈丹治肺肺有濕喘滿腫盛小便赤澀

人參

去芦
三分

木香

漢防已

苦參

寒食面炮
一錢

桔梗

木通

名二升半
一分半

苦參

四兩炒
四兩炒

右七味為末棗肉和丸桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下食前

赤茯苓丸治肺溫太过四肢腫滿腹脹逆氣不宣通小便赤澀

木香

半两
半两

赤茯苓

二两一方一两
一两

防已

二两
二两

苦參

食前

右為末棗肉丸如桐子大每服三十丸煎桑白皮湯送下

人參熟地黃丸治一切水腫及喘滿不可當者

人參

一兩去皮

熟地黃

四兩炒

右為末棗肉丸如桐子大每服三十丸煎桑白皮湯下食前

海藻散治男子婦人遍身虛腫喘滿悶不快

海藻

大戟

錦紋大黃

續隨子

去穀各一兩

石剉碎用好酒二錢淨碗內浸一宿取出晒乾後用

白牽牛

頭末兩生用

桂府滑石半兩

甘遂數粒炒黃一兩

蜀葵

青皮去白

陳皮去白各半兩

右共煎藥一處為細末大人每服二錢氣實者三錢平明
冷茶清調下至夜時取下水三三行腫減五七分隔二三
日平明又一服腫消治急魚肉百口小兒腫服一錢五

歲以下者半錢婦人有孕不可服

白丸子治通身腫及單腹脹滿喘悶不快小便赤澀神效

輕粉

半升
研少

桂

府滑石

研細
并如米炒真者

粉霜

研細炒各四錢
寒水石大塊研細各三錢

硇砂

白丁香

并如米炒真者

寒水石

大塊研細各三錢

右先將輕粉滑石二味研勻用江紙裹了却更和白麵作餅再裹合藥用桑柴火燒以熟為度取出與前四味一處研勻水浸缸餅搗乾為丸如棗豆大第一日每服二丸煎生薑湯送下食前一日三服第二日三丸三服第三日四丸三服第四日五丸亦三服如覺小便多時腫漸減便休服白丸子如小便未多更服一日至兩服加作六丸做一日亦三服腫消為效如服藥至第三日齧牙縫內痒痛口氣時使用漱口藥

黃連
大酒
貫衆
名半分

右為散每用一錢水一錢煎至七分入龍膽少許攪勻溫
漱之每日煎一錢漱口如腫消忌鹽魚肉冷硬果食只吃
粥百日永差如臍脣秘澁氣實人先服治腫海藻散此藥
執用救人甚多神效

除濕丹治諸溫腫客擗腰膝重痛足腫浮腫

乳香

研末

沒藥

研末

牽牛

頭末半兩

枳榔

歲

靈仙

研末

赤芍

桑

澤鴻

草薢

甘遂

各二兩

大戟

炒三兩

陳皮

去白四兩

右為末糊丸如桐子大每服伍十九至七八十九溫水送

下食前得大便止後服如服藥前後忌酒二日濕麵兩三

日食後溫淡粥補胃尤佳

五花神祐丸治中滿腹脹喘熱渴諸症
積發生疾病久病不已或因血氣壅滯不宜通或風熱燥
嚮肢節麻痺走疰疼痛風寒咳嗽頭目旋盪氣不順或痰積
聚堅硬舌悶酒積食積一切於飲嘔逆溫熱腹滿尖痛並宜服
之

輕粉

一升

大黃

一兩為末半兩

牽牛

二兩

芫花

細拌炒

甘遂

大戟

名半兩

右為末酒煎如小豆大初服五丸每服加五丸溫水送
下無時日三服加至快利後却常服病去為度

羚羊湯治太陽中風下利寒逆知氣不寒寒熱汗出每作消時
頭痛心下痞硬引脇下痛兼下水腫脹并酒食積脅近積滯
痃癖堅積畜熱甚隨氣久不已或表之正氣與邪抗爭甚於

裏挑極似陰爻寒戰邪氣入裏陽氣不升肺微而絕并風熱煩
甚結於下焦大小便不通矣熱證病

井遂

芫花

僵火炒紫色仲景与俗異炒作灰下凡言熟
青同炒各半分

大戟

名半分

右為末水一大錢棗十枚切開煮取汁半錢

調半錢蜜水

更加一錢量虛实加減

亨蘇木香丸治水氣通身虛腫

人參

漢防已

各一兩

苦葶藶

炒四兩

木香

一枚

木通

白茯苓

去皮麪裹搗各一兩

右為末棗肉和丸如桐子大每服三十丸溫水送下食前

木香通氣丸導滯氣膈堵腫進食

南木香

茴香

各一兩炒

一枚

二兩

海金沙

破

故紙

陳皮

去白各四兩

牽牛

半斤半生半熟

右為末清酒為丸如桐子大每服三十丸熟水送下食後
神祕湯治病人不得卧上則喘水氣逆行上乘於肺得水而
停氣不通六脉洪大

白茯苓

云皮

木香各半兩

桑白皮

紫蘇葉

硝

艾叶

人參各半兩

右㕮咀水三升入生薑七片煎至一升半去粗淨分作五
服食後

消痞丸治積濕熱毒證者身麻面目黃腫心脇腹滿嘔吐不誠飲
食廢弱難以運動咽嗌不利肢體焦枯悴槁坐卧不寧心火有
餘而妄行上為咯血衄血下為大小便血腸風痔漏三焦壅滯
關塞或中消渴轉化失常小兒疥積熱

木香

官桂各一分

青黛

牽牛

黃連

芳

拳參

大黃

黃芩

葛根

梔子

薄荷

蔓荆

苗香少

厚朴各半兩

無礙丸治脾病橫流四肢脾蕩

木香

半兩

蓬莪朮

炮

京三棱炮

枳榔生

郁李仁

去皮各一兩

大腹皮

二兩

右六味為末炒熟藥杵為粉為糊丸如桐子大每服二十

丸生薑湯送下午時

香蘇散治冰氣虛腫小便赤澁

陳皮

去白一兩

防已

木通

紫蘇葉各半兩

右四味為末每服二錢水二瓶生薑三片煎至一盞去相

溫服食前

五皮散治諸病瘥後或久痢之後身面目四肢浮腫小便不利
脉虛而大此由肺脾虛弱不能運行諸氣氣虛不理散漫於皮
膚肌腠之間故令腫滿也

大腹皮

生薑皮

赤茯苓皮

桑白皮

陳皮各等分

右㕮咀每服五錢水一盞煎至八分去粗溫服無時日式
服此方異於苟方載中藏經

牡蠣澤鴻散治脾胃氣虛不能制約腎水水溢下焦腰已下有腫

也

金匱要略曰腰已下有腫當利小便

牡蠣

澤鴻

蜀漆

洗去腥

赤蘆

芍藥根

商

陸根

海藻

以上各等分

右七味共搗篩為散更入臼中杵之白飲和服方寸大小便利止後服

內經云鹹味湧泄牡蠣澤鴻海鹹之鹹以鴻水氣溫浮於內平以苦佐以酸辛以苦鴻之蜀漆蕷蘆括萎商陸之酸辛與苦以導腫利小便以散水

○胃氣為本

至元戊寅五月間霖淫積雨不止魯齋許平仲先生時年五十有八面目肢脉浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩先生曰年壯時多胃服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養臟府經絡皮毛氣行而澁為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆溫氣勝也四時五臟皆以胃氣為本

五臟有田月氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動以養五臟則五臟脉不和平本臟之氣盛者其脉獨見輕則病甚過則必死故經曰真臟之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快不知其為人身之害也遂用平胃散加白朮茯苓草豆蔻仁數服而腹脹肚滿腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢體浮腫以導端通經湯主之良愈

導端通經湯治脾溫有餘及氣不宣通面目手足浮腫

木香

白朮

桑白皮

陳皮

各五分

旋冬去皮一两

右㕮咀每服五錢水二觔煎至一觔去粗溫服空心食前內經曰溫溼所勝平以苦熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦

溫理肺氣去氣滯故以為主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫滿脹利水道故以為佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮

苦甘溫能除溫和中以苦燥之白芍苓甘平能止渴除溫利小便以淡泄之故以為使也

○黃疸

寸口脉浮而緩薄則為風緩則為寒匕非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行趺陽脉緊而數匕則為熱匕則消穀緊則為寒食節為滿尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀則敗氣不消胃中苦濁匕氣不流小便不通陰被其寒熱流膀胱身病尺黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱壅暮即發膀胱急小便自利名曰水勞疸腹如冰狀不治則心下懊憹而熱不能食時匕欲吐名曰酒疸

陽明病脉遲者食難多飽匕則發煩頭眩心煩小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

大病酒黃疸者必小便不利其候心中熱足下熱是其證也
酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉
弦者先下之

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜韭狀大便正黑皮
膚爪甲不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時須劫其汗而苦
然黃皆從溫得之必身發大而黃散退若在裏當下之

脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃也

腹脹滿面發黃躁不得睡 黃

師曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上宜瘥反劇為難
治又曰疸而渴者其痘難治痘而不渴者其痘可治發於陰部其

人必嘔發於陽部其人振寒發黃也

茵陳蒿湯治穀疸為病寒熱不食及頭眩心胸不安又久發黃

茵陳蒿六兩

大黃三兩

梔子十四箇擘

右參味㕮咀水一斗二升煮茵陳減一半內二味煮至三升去粗分溫三服大便利渴如皂莢色汁狀其手足胷腹減黃音旨小便去也

消石礬石散治黃病日晡所發然而反惡寒此女勞疸也得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腰脹如冰狀大便必黑或時溏此女勞之為病非水也腰滿者難治

消石

礬石燒各等分

右二味為末以大麥麩粥和服方寸大日三服病隨大小便去大便色黑小便赤是其候

枳實破大黃湯治酒黃痘心中懊憹或熱痛宜服此方主之

梔子

十四個擘

枳實

五枚炙

破

一兩
非綿裹

大黃

一兩

右㕮咀以水陸升煮取二升去粗分溫三服無時

茵陳五苓散治黃疸病一本茵陳湯及五苓散

五苓散局方角

右用五苓散五分茵陳蒿末十分和勻先食飲服方効七

日三服

大黃上連梔子硝石湯治黃病腹滿小便不利而赤自汗出此表
和裏實當下之

大黃

黃蘗

硝石

各四兩

梔子

十四個擘

右㕮咀水六升煮取二升去粗內消石煮一升頓服之

黃連散治黃疸大小便祕壅熱累效

川大黃

好望洋

半錢

黃連各二兩

甘草

炙黃

黃芩一兩

石四味為末每服二錢食後溫水調下日三服

噙鼻瓜蒂散治黃痘遍身如金色此方累經效

瓜蒂

十四個

母丁香

九個

黍米

四十九個

右先將瓜蒂為細末次入二味同研羅為末每於夜卧令病人先含水一口兩鼻孔內噙入半字以下坐了水便睡至半夜或明日取下黃水旋用紺綿揩了直候取水定便服前黃連散病輕五日見效重者半月取效

○食勞疳黃

腊馨丸治男子婦人食勞食氣面黃虛腫痃癖氣塊

腊馨

瓦石者三枚

黃蠅

二只

青州肥棗

五十個

右以沙鍋或石器內用頭醋三升先下腊馨共棗子慢火熬半日取出棗子去核次下蠅二兩再慢火熬一二時辰

如膏火好蠍茶二兩同和為丸桐子大每服二十丸水一
下日三服食後如火年腸風痔疾陳米飲下日三服一月

見效

棗葵丸治食勞黃目黃鼻黃者

皂莢

不以多少沙鍋子木炭燒通赤用米醋內盪之赤紅

右為末棗肉丸如桐子大每服二三十丸食後生薑湯下
五劑止治小兒疳瘦面黃眼澀羞明好喫泥土乳食不消化常服
退黃化虫

碌礬

成塊者燒通赤出一兩

蜜陀僧燒赤取出一兩

夜明砂

燒過秤二两半

右為末棗肉丸如麻子大每服五七丸溫米飲下量大小
加減日三服不計時

茯苓湯治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲冷身熱面目俱黃小便不利全不食不得卧

防風六分

白茯苓五分

木猪苓

澤瀉各三分

黃

連

黃芩生

梔子

漢防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮各二分

右十一味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服空心

方尤二奇服之效

食前

穀疸治驗

元顏正卿丙寅二月間因官事勞役飲食不節心火乘脾上氣虛弱又以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡味飲食遲化時下完穀小便癃閉而赤黑尿已間發熱日暮則止至四

月令盛其子以危急求請治之具說其事診其脉浮而緩全體要略云寸口脉浮為風緩為薄非中風四肢苦煩脾色必黃脈熱以行趺陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦渴上氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身無虛黃名曰穀疸宜表芩梔子茵陳湯主之

茵陳葉

一升

大麥

去皮五分

梔子仁

蒼术去皮剉

白朮

各三升

黃芩

生六分

黃連去頭

枳實

各一分

芩皮

澤鴻

陳皮

漢防已

各二分

青皮去白一分

右十三味㕮咀作一服用長流水三觔烈至一觔去祖溫服食前一服減半二服良愈

內經云熱淫于內治以鹹安佐以苦又溫化于大熱反勝之治以苦寒以苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能

鴻濕熱而退其黃故以為君雞經云井主心下滿以黃連
枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身体麻木
以黃芩苦寒鴻火補氣故以為臣二木苦甘溫青皮苦辛
溫能除胃中湿熱泄其壅滯養其正氣漢防己苦寒能去
十二經黃溫澤鴻醜平伏陰清苓甘平導膀胱中濕熱利
小便而去癃閉也

衛生經鑑卷之十四終

衛生寶鑑卷之十五

名方類集

諸腰痛筋骨冷疼

木瓜虎骨丸治風寒濕合而成痺脚重不仁疼痛少力足下癰痛
不能踏地腳膝筋痺不能屈伸及項背拘急手背無力耳內蟬
鳴頭眩目運諸證脚氣行步艱難並皆服之

木瓜

駢鱗竭即

虎胫骨酒炙

沒藥研

自然銅醋

七次

楡香脂

敗龜附灸去臘

骨碎補去毛

甜瓜

千

當帰切焙

桂巴上各一兩

乳香研半兩

木香

一兩

安息香童備酒煮入藥

地龍去土各二兩

石為末入研藥和勻酒糊丸如桐子大每服三十九溫酒
送下前木瓜湯送下亦得漸加至五十丸空心食前

客寒尤治寒溫筋骨冷疼不能牽動

川烏

去皮尖生

黑牽牛

頭末

鹽豉

各三錢

乳香

研

右為末入研藥勻用肥葱一握洗去土淡醋一升不犯銅
鑄於文武火熬葱醋一半龐去粗慢火再熬成膏滴水中
不散為度將前藥末為丸如桐子大每服一十九加至二
十九溫酒送下大便微利則愈

沾血癟痛丸治風濕為病血脈凝滯腰腿重疼身肢麻木頭面虛
腫下注脚膝重痛行醫銀朱

狗脊

六兩半

桑木

十兩

香附

十二兩

陳皮

九兩

沒

藜

一兩二錢

威靈仙

三兩

草烏頭

二兩半

右七味為末酒糊丸梧子大每服二三十九溫酒或熟水
任下不以時

左經丸治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動但不會鍼灸傷筋
脉者四五丸必效此藥尤能通行榮衛導經絡專治心腎肝三
經服後小便少淋澁乃其驗也

木蠟半子去殼別研

白膠香研

五灵脂各三兩

當帰

去土一兩

草烏頭生去皮梢三兩半

斑蝥

一百個去頭足鬚少蟲蟲蟻

右後四味為末與前二味和停用黑豆去皮生梓粉一斤
醋煮為糊和藥丸如雞頭大每服一丸酒磨下

神應丸治一切腰痛

富帰

肉桂各十兩

威靈仙二十兩

右為末酒煮麵糊為丸梧子大每服十五丸溫酒下
烏靈丸久患風虛麻痛行步艱難正宜服之

川烏去皮一兩

五靈脂二兩

石為末酒糊丸如桐子大每服十九丸加至五十丸空心溫酒送下忌一切冷物

愈效餅子治腰痛及腿膝累效

甘遂

炒黃

喬麵各一兩

黑牽牛

淨四兩半生半熟取頭末二兩半

右為末每服三錢夜卧滴水和成餅慢火燒黃色取出氣
火者作一股爛嚼後烈半生半熟葱白酒送下氣虛人作
兩服先喫一大半至明日又嚼一小半亦用半生半熟

葱白酒送下微利一行如婦人有胎不可服之

獨活寄生湯治腎氣虛弱冷臥溫地腰背拘倦筋骨痺痛或當风
取涼風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引脚重

行步艱辛

獨活

寄生

杜仲

牛膝

細辛

秦艽

桂心

茯苓

防風

川芎

人參

甘草

兩半

當歸

熟地黃

芍藥各一兩

獨活湯治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活

肉桂

大黃酒燜

防風

獨活

澤瀉

各三錢

當歸

連翹各伍錢

桃仁十五箇

甘草二

錢

黃藥酒燬

防已各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半酒半錢煎至一盞去粗熱服食前立愈

薏苡仁湯療病者一身盡痛發熱所劇者此名風溫此病傷於汗出當風或久傷寒冷所致也

麻黃六錢去節 薏苡仁二錢

杏仁六箇炒去皮

甘草二錢炙

右㕮咀作一服水三錢半煎至二錢去粗分溫二服

防已黃芪湯療風濕脉浮身重汗出惡風

防已二錢 黃芪二錢半 甘草一錢炙

白朮

生薑

各二錢半 大棗一箇擘

右㕮咀作一服水三錢煎至一錢半去粗溫分作二服

○灸腰痛法

腎俞二穴在十四椎下兩傍各寸半陷中灸五壯主腰痛不可俛仰轉側難身寒熟食倍多身羸瘦面黃黑目睭七又主丈夫婦

人冷積氣勞病

中膂俞二穴在二十椎下兩傍各寸半灸五壯主腰痛不可俛仰

夾脊齊痛上下按之應手者從項後始至此穴痛皆灸之立愈也

腰俞一穴在二十一椎節下間陷中灸五壯主腰疼不能久立腰已下至足冷不仁起坐難腰脊痛不能立急強不得俛腰重如石難舉動也

張仲文傳神仙灸法療腰重痛不可轉側起坐難及冷痺腳筋挛急不可轉側屈伸灸曲踇兩穴頭左右腳四處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至火滅午時着灸神定氣來臟腑自動一两行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也

疝氣痛及腰痛膝無力及控睾證啓玄子云控引也睾陰

丸也

至真大要論云小腹控睾引腰脊上衝心哩出清水爻為噫噦甚則入心善悲善忘甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥之證上衝肝肺客冷散於胸結於臍控引睾丸上而不下痛而入腹甚則衝心胸蓋其經絡所屬所係也

控引睾丸治小腸病結上而不下痛引心腹

茴香炒

練實剉炒

食茱萸

陳皮

馬蘭花各兩
醋炒

芫花

五錢醋炒

右為末醋糊丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒送下空心食前

陰疝足厥陰之脉環陰器抵少腹或痛腎虛寒水涸竭鴻邪補肝宜以

茱藜湯治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也喜怒勞痛不可忍
也

茱藜

炒去夫

附子

炮去皮脐

梔子

去皮各等分

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去粗溫服食前
茴香練實丸治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練實炒

茴香炒

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

青皮

去白

馬蘭花

茺蔚

炒

陳皮

去白各等分

右為末醋糊丸如桐子大每服三十丸溫酒送下食前

丁香練實丸治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主
陰經也乃腎肝受病

治法同梔子一

當歸

去芦剉

附子

炮去皮脐

川練

剉

茴香炒

右四味各一兩以好酒三升同煮酒盡焙乾為細末每秤

藥末一兩再入下項藥

丁香

木香各一錢

全蝎十三箇

玄胡索五錢

右四味同為末與前項藥末拌和勻酒糊丸如桐子大每服三十丸至一百丸用酒送下空心食前凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥茴香川練皆入小腸經當歸玄胡索止疝氣帶下皆積寒邪入於小腸之間故用附子佐之丁香木香為引導也

沉香鹿茸丸大補益脾胃強壯筋骨辟除一切惡氣令人內竇五臟外充肌膚補益陽氣和暢榮衛

沉香

一兩另為末

麝香

一兩研

鹿茸

一兩先用草火燒去毛為末

右三味同研勻水糊丸如桐子大每服三十丸至五十丸暖酒送下空心食前

三白散治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛

二兩

桑白皮

白朮

木通

去節

陳皮

右為細末每服二錢薑湯調下空心服未覺再進
葫蘆巴丸治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有物如卵上下去來痛不堪忍或絞結連躰攻刺嘔惡悶亂

葫蘆巴

一斤炒

吳茱萸

十兩洗炒

川練子

炒一斤二兩

川練子

巴戟

去心炒

川烏頭

炮去皮各六兩

茴香

炒十二兩

右為末酒糊丸梧子大每服十五丸空心溫酒下

川苦練散治小腸氣痛

木香

一兩另為末

茴香

一兩鹽炒黃去鹽

川練子

一兩制用

巴豆十箇搗碎與川陳皮炒黃去巴豆

右為末每服二錢溫酒一盞調下空心食前許學士方大

抵此疾因虛得之不可以虛驟補亟云邪之所湊其氣必
虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之是
以諸方多借巴豆氣著蓋謂此也

○疝氣治驗

癸丑歲奉詔至六盤山上命治小兒赤紐隣久病疝氣復因七月
間飢飽勞役過飲潼乳所發甚如初面色青黃不澤脛腹陣痛拘
撮不忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脉得細小而急予恩雖經
云任之為病男子內結七疝皆積寒於小腸之間所致也非大熱
之劑即不能愈遂制一方名之曰

沉香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不羨氣不調和退陰助
陽除臟腑積冷心腹疼脇肋脹脹腹中雷鳴面色不澤手足
厥冷便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛小腹不忍腰屈

不能伸喜熱熨稍緩方

沉香

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍各一兩湯浸去苦

乾薑

炮

良

薑炒

面香炒

官桂

吳茱萸

炮各一兩湯浸去苦

乾薑

炮

良

右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸至七八十丸熱米
飲送下溫酒吞下亦得空心食前日二服忌冷物間服
天台烏藥散治小腸疝氣牽引腰腹疼痛

烏藥

木香

茴香炒

良薑炒

青皮

去白五錢

梅榔

剉二箇

川練十箇

巴豆

七十箇微行破同川練實
用鐵炒候熟黑色去殼不
用

右為末每服一錢溫酒調下癟者炒生薑熱酒調下亦
得服此二藥旬日良愈明秋王征班師遂遠迎拜精神如
故上大悅輒錄於此

○陰毒傷寒

王裸肚

川烏

細辛

良薑

乾薑

天仙子

牡蠣粉

肉桂

胡椒

各等分

廻陽丹治陰毒傷寒手足厥冷

川烏

炮

壯蠅燒

不灰木

燒

良薑

炒

白芍藥

各二錢

麝香

少許

右為末每用一錢男病女津哩調塗外腎上女病男津哩
調塗乳上

手陽丹治陰毒傷寒手足逆冷指甲青色體冷脉沉細而微神效

方

右用熟艾五枝陳蜂窩四五箇燒存性爲末用葱薑搗如泥和丸如彈子大手心內捲定用手帕緊扎定須臾汗出以綿被覆蓋如手心熱甚休解開如服藥時先服升麻湯五錢出子葱連須三枝生薑五片水二大盞煎至一盞去粗溫服以被覆之汗出而愈

王海藏已寒丸治沉寒痼冷脾腹冷疼廻陽逐陰

附子炮

乾薑炮

茴香炒各一兩

良薑七錢

茯苓五錢

桂三錢

右爲末醋糊丸如桐子大每服三十九溫酒送下食前

○白疕諸證

齊論云思想無窮所願不得意坐于外入房太甚筋弛縱發為癩及爲白疕夫督脈天一以經爲事志意內治則精全而癩去

思外淫於房室大甚則固有淫泆不守隨漫溺而下也然本於筋
萎者以宗筋弛緩也

內補鹿茸丸治勞傷思想陰陽氣虛益精止白溼

鹿茸

酥炙

兔絲

酒浸

蒺藜

炒

紫苑

酒浸

白蒺藜

肉苁蓉

酒浸

官桂

炮

附子

炮

陽起石

酒浸

蛇床

酒浸

桑螵蛸

等分

黃芪

各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸溫酒送下食前
茯菟丸治小便白濁及夢泄遺精

菟絲子

五兩

白茯苓

三兩

石蓮子

二兩

右為細末酒糊丸如梧子大每服三十丸空心鹽湯下
金鎖丸治下焦虛小便白濁夜多異夢遺泄

華子

炒

原蚕蛾

各一兩

破故紙

炒各一兩

牛膝

酒浸

肉

旋參

山茱萸

龍骨

兔絲子

桑螵蛸
兩

右為朱煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒送下空心食

前

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

真蛤粉

一斤

黃藥

一斤新瓦上炒赤

右為朱滴水丸如桐子大每服一百丸空心溫酒送下去陽盛陰虛故精泄也黃藥降心火蛤粉鹹而補腎陰補真玉露丸治陽虛陰盛精脫溼藥腰痠

白茯苓

去皮

白龍骨

火飛

華子

僵蠅

兔絲子

酒浸各等分火日滿合

右為朱醋糊丸如桐子大每服五十丸溫酒送下鹽湯不得空心食前持少時以飯裹壓之

主羸散治小便自利如泔色耳腎虛也

王瓜根

桂心各一两

白石脂

兔絲子

酒浸

牡蠣

鹽泥裹燒赤候冷去泥各二两

府判補藥方

兔絲子

三冬酒浸

肉蓯蓉

三宋酒浸

牛膝酒浸

巴戟

去心酒浸

沒藥

研各二冬

麻黃

去節一条半

川山甲

酸炙

鹿茸

研各二冬

乳香

研

麝香

研各一冬

甘

草頭

天、五冬

通草

三冬

海馬

二對酥各

石為末煉蜜丸

衛生寶鑑卷之十六

名方類纂

泄痢論

泄痢論并方

論曰臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不舷久也故曰暴泄非陰久泄非伏論云春宜緩形形緩動則肝木乃榮若靜密則是行秋令金能制木風氣內藏甚至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則飧泄身熱脉洪穀不能化重則下痢膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經曰瀉而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則泄其子未能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏為飧泄此逆四時之氣人所自為也有自太陰脾經受濕而為水泄虛滑身重口渴不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄

之法云宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則呵子湯久則防變而為膿血是脾經傳受於胃謂之賊邪故難愈也若先利而後渭謂之微邪故易痊也此皆脾土受濕天之所為也雖聖智不能逃口食味鼻食氣從鼻而入留積於脾而為水泄也有厥陰經動下刺不止其脉沉而遲手足厥逆膿血稠粘此為難治宜麻黃湯小續命湯汗之法云謂有表邪縮於內當散表邪而自愈有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脈微嘔吐急以重藜溫之漿水散是也故法云後重者宜下腹痛者當和身重者除溫脉弦者去風膿血稠粘者以重藜竭之身冷自汗者以熟藥溫之風邪內縮者宜汗之則愈驚瘧為刺當溫之而已又云在外者發之在內者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法有云辟其

來銚擊其情歸泄之謂也古出活法機要

芍藥黃芩湯治泄痢腹痛後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿

血稠粘

黃芩

芍藥各一兩

甘草半兩

右㕮咀每服半兩水一盞半煎至一盞去粗溫服不拘時
大黃湯治鴻廄久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度

右用大黃一兩剉碎好酒二大盞同浸半日許再同煎至
一盞半去粗將酒分作二服頓服之痢止勿服如未止再
服取利為度後服芍藥湯和之痢止再服白朮黃芩湯蓋
微其毒也

芍藥湯行血調氣經曰瀉而便膿血須氣行而血止止血則便自
食調氣則後重除

芍藥

一兩

當歸

黃連

黃芩

各半兩

大黃

三錢

生

一錢半

甘草

根

梔榔

各二錢

木香

一錢

如便後膿毒加黃藥半兩

右九味㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服如痢不減漸加大黃食後

白朮黃芩湯服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮

一兩

黃芩

七錢

甘草

三錢

右三味㕮咀作三服水一盞半煎一盞溫服清

漿水散治暴泄如水周身汗自出一身尽冷脉微而弱氣少不能語甚者加吐此為急病

半夏

二兩泡

附子

泡

桂

乾姜

炮

甘草

灸各五錢

良姜

二錢半

右六味為末每服三伍錢漿水二錢煎至一錢和粗熟服
甚者三四服微者一二服太陽經傷動傳太陰下痢為聲
瘡大腸不能禁固卒然而下下成小油光色其中或有硬
物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜溫之春
夏宜桂枝湯秋冬宜白朮湯

桂枝湯方

桂枝

白朮

芍藥

各五錢

甘草

炙二錢

右四味㕮咀每服五錢水一爵煎七分去祖溫服

白朮湯方

白朮

芍藥

各三錢

乾薑

五錢炮

甘草

二錢炙

右四味為劑散如前煎甚者去乾薑加附子三錢謂辛能
發散也

○溢飲

水漬入胃名為溢飲滑泄渴能飲水水下復泄而大渴此無藥
證當灸大顙

大椎一穴一本作項此第一椎下陷中手足三陽督脈之
會鍼五分留三呼泄五吸灸以畢為壯

○濡泄

內經云濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳心濡泄夫脾為
五臟之至陰其性惡寒濕今寒溫之氣內犯於脾或不能補助胃
氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能納故洞泄如水隨氣
而下為之濡泄法當除濕利小便也

醫金飲子主之

平胃散

五錢

五苓散

二錢半

草荳蔻

炒黑研五錢

右相合作四服水一煎半

一劑半

一劑半

一劑半

服食前上齋七月間史丞相有此疾三服而愈

○飧泄

內經云清氣在下則生飧泄又曰久風入胃中則為腸風飧泄夫脾胃土也其氣冲和以化為事今清氣下降而不升則風邪久而干胃是木賊土也故冲和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消冠之也以

加減木香散主之

木香

良薑

升麻去腐

人參去芦

梅榔各二錢

神曲

炒二錢

肉蔻

煨

吳茱萸

泡

縮砂仁

乾薑炮

陳皮

各半錢

右十一味為粗末每服四錢水一盞半煎至一盞去相溫
服食前宜加白朮

○痢疾

內經曰：膿血稠粘皆屬於火。夫太陰主瀉少陰主痢，是先泄而亡
津液，火就燥，腎惡燥，居下焦，血分其受邪者，故便膿血也。然青
白為寒，赤黃為熱，宜須兩審治。熱以堅中丸、黃連丸治寒，
以白膠香散或多熟少寒水煮木香膏，虛滑頻數宜止瀉丸，宜養
臟湯，病氣大退，正氣未復，當補。

且如鵝翎止脾胃虛難任飲食不可，一槩用冠伐之劑，若補養耳。
脾胃氣足，自然能飲食。宜錢氏方中異功散，設或喜嗜飲食，太過
有傷脾胃，而心腹痞滿，嘔逆惡心，則不拘此例，當權用橘皮枳木
丸，一服得快，勿再服。若飲食調節無傷，則胃氣和平矣。

右治脾胃受湿滑泄注下

黃連去須

黃藥

赤茯苓去皮

澤瀉

白朮各一
兩

陳皮

肉荳蔻

人參

白芍藥

官桂

半夏

麴谷半兩

右十一味為末湯燙蒸餅丸如桐子大每服五十九溫

米飲送下食前

絕陽真人卷藏湯治下痢赤白

人參

當歸

白朮各六錢

官桂

甘草各八錢

肉豆蔻

半兩

木香

一兩六錢

呵子

一至二兩二錢

白芍藥

一兩六錢

瞿麥殼

三兩六錢

右㕮咀每服四錢水一錢半煎至八分去粗食前溫服

水煮木香膏治脾胃受湿藏腑滑泄腹中疼痛日夜無度腸鳴水

癮不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白或便膿血並皆治之

米穀蜜水浸炒黃六兩

乳香肉荳蔻

縮砂各半兩

附半兩

當歸

白芍藥

木香

丁香

硝子皮

藿香

黃連

去須

青皮

去白各一兩

乾薑

炮半兩

甘草

厚朴

薑製

陳皮

各一兩

枳實

炒半兩

右十七味為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一盞
一枚擘開煎至七分和粗稍熱食前服

丁巳年八月從軍過鄧時值霖雨民多痢疾遂得白朮安胃散此
餅子於高仲寬處傳之用之多效故錄于此

白朮安胃散治一切瀉痢無問膿血相雜裏急後重窘迫日夜無
度又治小腸氣痛婦人臍下虛冷并產後而枕塊痛亦治產後

虛弱寒熱不止者

米穀

三兩去頭葉炒

茯苓去皮

車前子

白朮

各一兩

烏梅肉

五味子各半兩

右六味為粗末每服五錢水二錢煎至一錢去粗空心鍋
服之

聖餅子治鴻列赤白脾腹撮痛久不愈者

定粉

蜜陀僧

船上硫黃

各三錢

黃丹二錢

輕粉

少許

右五味為末入白麵四錢用滴水丸如指頭大捲成餅陰
乾食前溫藥水磨下大便黑色為效

南白膠香散治脾胃虛寒滑腸久鴻臚腹疼無休止

米穀

四兩蜜炒

龍骨

南白膠香

各三錢

甘草七錢

乾薑半兩炮

右五味為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服

食前忌冷物傷胃

荳蔻燥勝尤治沉寒痛冷泄痢腹痛後重

附子

炮去皮

赤石脂各一兩

舶上硫黃

良薑功炒

肉荳蔻

乾薑各半兩炮

右六味為末醋糊尤如桐子大每服三十九米湯下食前
忌生冷硬物及油膩物

王粉散治冷極泄濁久作滑腸不禁不思飲食宜服神效

紅豆

撲冲

大附子

炮去皮勝

乾薑炮各半兩

舶上硫黃

黃另研二錢半

右四味為末入研藥勺每服二錢空心半稀半稠米飴

下至膈又一服重者十服必效輕者三五服安

王粉丹逐化虛中積止脹血兩根痛裏急後重並皆治之

定粉

半兩

粉霜

三錢

延胡

三錢

膩粉

一錢

石燕

子一箇半

右先杵石燕延胡為末入乳鉢內共粉霜等一處研如粉
雖清丸如豌豆大每服三丸至五丸溫米飲下食前晚卧
不論老弱妊婦產人皆可服之粥飲下五丸或另丸一等
麻子大量小兒大小夜卧溫米飲下五七丸漸服十九忌
油膩粘滑冷硬等物

桃花丸治腸胃虛弱冷氣乘之脾腹癟漏下痢赤白

赤石脂

乾薑

炮各等分

右為末糊丸梧子大每服三十丸溫米飲下空心食前日

三服一方治禁口利驗梨一枚去心入好蜜一匙煨過食

玄青丸治下痢勢惡頻併窘迫或久不愈諸藥不止須吐下之以

開除湿熱痞閼積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱

酒食積黃瘦中滿水氣腫脹兼治小兒驚癇積熱乳癧等證

牽牛

頭末二兩

青黛

一兩

黃連

黃芩

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各半兩

輕粉

一錢

右九味為末研匀水丸小豆大初服十九再服加十九空心日午臨卧三服以快利為度後常服十五丸數日後得食見効病未痊者徐加再取利後却常服以意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米大退驚癇積熱不須

下者常服十九

阿膠梅連丸治下痢無間久新亦白青黑疼諸證

阿膠

爭草及炒透明白研
不細者再炒研細末

烏梅肉

炒

黃連

赤芍藥

當歸

赤茯苓

乾薑

黃芩

右八味為末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服十九溫

米飲送下食前

○四時用藥例

洩而便膿者小腸泄也脉以五至以上洪大者宜以七宣丸脉平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥蘖皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸證候者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣

胃氣

芍藥蘖皮丸方

芍藥

黃蘖各等分

右為末醋糊丸如桐子大每服五七十丸溫米飲送下食

前

加咸平胃散細曰四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損而血不流於四肢却入於胃中而為血瘀一服此藥食脾胃

木香

梅榔各二錢

白朮

厚朴製

陳皮各一兩

甘草

七錢

人參

黃連

白茯苓

阿膠沙

桃仁

各半兩

右十一味為末每服五錢水二盞生薑三片棗子一箇至一錢去粗溫服無時

加減法血多加桃仁氣不下後重加梅榔木香膿多加阿膠腹痛加官桂芍藥其草溫多加白朮脉洪大加大黃熱泄加黃連小便澀加茯苓澤瀉

萬運阿膠丸治痢

阿膠

一两

黃連

三分

茯苓

二分

右各為末以水調阿膠末為丸梧子大每服二十丸溫水下食前服

阿膠丸治休息痢日夜無度腥臭不可近腰腹撮痛諸藥不效者

呵子

去核半两

母丁香三十箇

椿根白皮一两

右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸陳米飲送下空心食前

鞠窮丸治中風或中風濕臟腑滑濁

附子

芎藭

白朮

神曲

各等分

右四味為末麵糊丸如桐子大每服三五十丸溫米飲送下此亦治飧泄甚妙素問云春傷於風夏必飧泄米

不化蓋春木旺肝生風邪淫於脾經夏飲冷當風故多飧泄也

陳麵丸磨積止瀉利治腹中冷疼

陳麵

一刃半

官桂

人參

乾薑

白朮

當

歸

葛草

灸

厚朴各半刃

右八味為末煉蜜丸如桐子大每服二十九溫酒或淡鹽湯任下食前日二服

蒼朮丸治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麴

炒

蒼朮

薄皮一箇炒各等分

右為細末麵糊為丸梧子大每服三十九溫米飲下不拘

時

防風湯治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛痛脇

鴨疔瘡及腸胃溫毒下如豆汁或下瘀血

白朮

川芎

白芍藥

人參

當歸

官桂

茯苓各等分

右七味剉每服二錢水一觔粟米百粒同煎至七分熱服空心食前量小兒加減服之

當歸和血散治腸澼下血及溫毒下血

升麻

各六分

當歸身各一錢

槐花

荊芥各四分

青皮

熟地黃

白朮

各六分

川芎

荊芥各四分

右八味為末每服二錢清米飲調下空心食前

○陰陽皆虛灸之所宜

至元己亥薦臺五千戶年四十有五領兵鎮漣水此地卑溫因勞役過度飲食失節至秋深瘡癰併作月餘不愈飲食全減形容羸

瘦乘馬輜以歸時已仲冬求治之具陳其由診得脉弦細而微
如珠絲身軀沉重手足寒逆時復麻痺皮膚瘡疥如疠風狀有時
以致心腹痞滿嘔逆不止此皆寒溫為病久寇真脈衰弱形氣不
足病氣亦不足陰陽皆不足也鍼經云陰陽皆虛鍼所不為灸之
所宜內經曰損者益之勞者溫之十刺云補可去弱先以理中湯
加附子溫養脾胃散寒溫濕可去泄養臟湯加附子固腸胃止瀉
痢仍灸諸穴以併除之經云府會太倉即中脘也先灸五七壯以
溫養脾胃之氣進羹飲食次灸氣海穴百壯生發元氣滋榮百脉充
實肌肉復灸足三里胃之合也三四壯引陽氣下交陰分亦助胃
氣後灸陽輔二七壯接續陽氣令足腫溫暖散寒溫之邪迨月餘
病氣去漸平復今累遷侍衛統軍都指揮使精神不減壯年

○結陰便血治驗

真定盜管史使男十歌年四十有二肢體本瘦弱於至元辛巳因
收秋租佃人致酒味酸不欲飲勉飲三兩盃少時腹痛久傳泄氣
無度日十餘行越十日便後見血紅紫之類腸鳴腹痛求醫治之
曰諸見血皆以為熱用芍藥皮丸治之不愈仍不欲食上則嘔
酸形躰愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得
安卧請予治之具說其內証得脉弦細而微遲手足稍冷內經云
結陰者便血一升再結二升三結三升經云邪在五臟則陰脉不
和陰脈不和則血留之血流之則陰氣內結不得運行無所通易
入腸間故便血也宜以

平胃地榆湯治之

荳木一錢 升麻一錢 黑附子炮一錢 地榆七分
陳皮 厚朴 白术 乾姜 白茯苓 葛根

各半水

甘草炙

益智仁

人參

當歸

麴炒

白芍藥各三分

右拾六味作一服水二

錢生姜三片棗子二個前至一

錢去粗溫服食前此喫溫中散寒除溫和胃服之數服病

減太半仍灸中院三七壯乃胃募穴引胃上升滋榮百脉

次灸氣海百餘壯生發元氣灸則強食生肉又以還少舟
服之則喜飲食添肌肉至春再灸三里二七壯上脾溫胃
生發元氣此穴乃胃之合穴也改服芳香之劑戒以慎言
語節飲食良愈

○慈慰法治驗

元在十三卷尾今寫在此

真定一秀才年三十有一其體本弱左脇下有積氣不敢食今物
得寒則痛或嘔吐清水眩運欲倒目不敢開惡人煩冗靜臥

日及服辛熱之劑則病退延至甲戌初秋因勞役及食冷物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色青黃不澤全不得臥扶几而坐又兼咳嗽咽膈不利故內經云寒氣客於小腸膜原之間終血之中血濁不得住於六經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣又寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也諸寒在內作痛得灸則痛立止予與藥服之藥不得入見藥則吐無如之何治之遂以熟艾約半斤白紙一張鋪於腹上紙上搘艾令勿又以熟卷數枝批作兩半鋪於熟艾上數重再用白紙一張覆之以慢火熨斗熨之冷則易之若竟腹中熱腹皮暖不禁以綿三疊多縫帶繫之待冷時方解初熨時得暖則痛減太暖則痛止至夜得睡翌日再與對證藥服之良愈故錄此熨法以救將來之痛也

霍亂吐瀉

沾人百問云問嘔吐而利者何也此名霍亂也嘔吐而利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸若夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷散并中沉冷頓服乃效

香薷散治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為霍亂此皆因飲食或風冷傷於脾胃食結不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脉混亂榮衛俱虛令氣搏筋轉皆宜服此

厚朴

二两

黃連

二两

朱入生姜四两

半炒令黃色

香薷

一两半

右三味為末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去粗新汲水頻換浸令極冷頓服之藥冷則效速也

增損縮脾飲解熱躁除煩渴消暑毒止吐利霍亂後服執禁太多者尤宜服之

草果

烏梅

縮砂

甘草

各四兩

乾葛

右㕮咀每服五錢水一碗生薑半片煎至八分水漫令極冷旋上服之無時

累老人云霍亂轉筋泄利不止者其病在中焦也陰陽交而不和發為疼痛也此病最急不可食分毫粥飲穀氣入胃則死矣治有所種渴欲飲水者陽氣多也五苓散主之不欲飲水者陰氣多也理中丸主之只待吐盡多時啜以粥飲漸上養之以運為妙也半夏湯治霍亂轉筋吐利不止

茯苓

白朮

半夏

各半升

甘草

一錢半

淡味

桂一錢半

右為未渴者涼水調下不渴者大溫水調下三錢無時
中暑霍亂吐利治驗

提學侍其公年七十九歲至元丙寅六月初四日中暑毒霍亂吐
利昏冒數日不省人事時夜方半請予治之診其脉洪大而有力
一息七八至頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊急予思內經
五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽營氣順脉胃氣逆行亂於胸中
是謂大慘云亂於腸胃則為霍於是霍亂之名自此而生蓋因
年高氣弱不任暑氣陽不維陰則濁陰不維陽則吐陰陽不相維
則既吐且瀉矣前賢見寒多以理中丸熱多以五苓散為定法治
之今暑氣極盛陽明得時况因動而得之中渴明矣非其辛大寒
之劑則不能瀉其暑熱墮浮陷之火而安神明也遂以其露散其
辛大寒瀉熱補氣加白茯苓以分陰陽約重一兩水調灌漸止

省事而諸證悉去後偶言護節飲食三月以參木調中湯之劑增
減服之理正氣愈一日後方平復

○內傷霍亂治驗

戊午春攻襄陽廻住夏禹州界有蒙古百戶昔良海因食酒肉飲
產乳得霍亂吐鴉從朝至午精神昏憒甚以因急後請予視之脉得
浮數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂苓白朮
散七服之稍安又於審陰揪地一穴約二尺許貯以新汲水在
內攬動待一時澄定名曰地漿用清者一錢再調服之漸七氣調
吐利遂止至夜安眠翌日微燥渴却以錢氏白朮散時七服之良
愈或問用地漿者何也予曰坤為地之屬陰土平曰靜順感至陰
之氣又於審陰貯以新水取重陰之氣也陰中之陰能鴻陽中之
陽今霍亂因暑熱內傷而得之故辨論云陰氣者靜則神藏躁則

消亡又加以暑熱七神迷亂非至陰之氣則不愈乎用之者此也或曰內經福万世之書豈不信然

桂苓白朮散治冒暑飲食所傷傳受溫熱內盛霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿悶小兒吐瀉驚風宜服

茯苓

去皮一兩

白朮

桂各半兩

甘草

澤瀉

石

膏各

一兩

滑石

二兩

寒水石

一兩

石八味為末熱湯謂下三錢喜冷新水調薑湯亦得小兒服一錢

桂苓甘露飲疏溫潤燥治痰涎止咳嗽調臟腑寒熱嘔吐服之令人遍身氣痛俱平及治水腫泄痢

官桂

藿香

人參

名半兩

木香

一分

茯苓

白不

甘草

澤瀉

葛根

石膏

寒水石

各一兩

滑石二兩

右一二味為末每服三錢白湯調下新水或薑湯不得

宣明益原散又名天水散

滑石六兩 炙甘草一兩

右為末每服三錢蜜少許溫水調下日三服新水亦得欲

解肌發汗者前葱白豆豉湯調無時

附錄聖惠治霍亂吐瀉

厚朴

生薑汁灸

右為末新水調下一錢無時如神

○瘧病脉證并治

師曰瘧脉自弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可溫之弦緊者可發汗及鍼灸也浮大者可吐之弦數者風疾

發也以飲食消息之間曰癰以月一日變當十五日愈設不差當
月盡可解也如其不差當治何薄白此結為癰散名曰瘡母急宜
治之可用

鹽申煎丸

鹽申十二分灸

赤硝十二分

蟻娘六分灸

瘡虫熬

牡丹皮

去心各五分

蜂鴟蟬四分

烏羽燒

黃芩

胡

乾薑炮

大黃各三分

甘藥五分

桂枝

厚

朴

炒紫菀

一作紫葳

阿膠各三分

桃仁

去皮尖

瞿

麥

鼠婦熟

夢巖炒各二分

石葦去毛

一半夏洗各一分

人參

去芦一分

右二十三味為末先取鍛竈下灰一斗清酒一斛伍升浸
灰候酒浸一半著鹽申於中煮令泛爛如膠糜絞取汁內
死候酒浸一半著鹽申於中煮令泛爛如膠糜絞取汁內

諸藥煎為丸如桐子大空心服七丸日三服干金用鹽

十二片海藻九分大戟一分桑虫五分無鼠婦赤硝以鹽

甲煎和為丸

小柴胡去半夏加旋覆花根湯治癰瘍發渴者

外甚細心錄治兩肩
木妙金匱方

柴胡八兩

人參

黃芩

甘草炙各三兩

生姜

刀各三兩

旋覆花

四兩

大棗

十二枚兩破

右六味㕮咀以水一斗二升煮取六升去粗再煎至三升
溫服一升日三服

紫胡桂薑湯

三因方

柴胡八兩

桂枝去皮各二兩

芍藥各三兩

牡蠣

炙甘草各一兩

乾薑炮各二兩

旋覆花四兩

右以水一斗二升煎六分去粗再煎三升溫服一升日三

初服微湏牙出愈

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而瘈氣煩滿手足熱而欲嘔名曰
瘈瘈若但熱不寒者邪氣內藏於心肺外舍於分肉之間令人脫
肉消爛

溫瘈者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時止嘔逆以白虎加桂
枝湯主之方

石膏

一斤碎薄裹

知母

六兩

桂枝

三兩

甘草

二兩

粳米

六合

右㕮咀水

斗二升煮米熟去粗殼三升溫服一升日三

汗出而愈

瘈瘈多寒者名曰牝瘈蜀漆散主之

蜀漆洗去腥

雲母

瘦三兩三夜

龍骨

各等分一方

右為末瀝作煎漿水半解服一錢溫覆加蜀漆半分臨卷時服一錢已上

牡蠣湯治牡瘡

牡蠣熱

麻黃

去蘇各四兩

蜀漆洗去腥

甘草

炙各二
丙子

右㕮咀以水八升先煮麻黃蜀漆至六升去上沫內諸藥煮取二升去粗溫服一升吐則勿更服

剪金治瘡寒熱乃瘡中聖藥

硫黃

信各等分

右同研末用鮮紅綃子手捻藥一捻放於綃上裹如豆大上用細絲線緊繩繫數道繫定用剪子剪下切須緊繩如不緊恐藥有失每服一丸星宿全時新汲水送下空心服無得人知如服藥先一月夜服至明日早去淨身久

避不令人知廣宇亦得

丸効餅子治一切瘧疾

左腦

麝香各半兩

硃砂一兩一分

荷葉

菉豆

粉

朱芷草各五兩

信陽灸二兩半

定粉半兩

金箔

二十五片為衣

右細末煉蜜丸每兩作二十九捏作餅金箔為衣每服一
餅以新汲水磨化每日發者未發前服間日發者隔夜
服即止

溫脾散治癰瘍寒熱發歇多時不差者

甘草

生半兩

荳豆一兩

紫河車一兩

砒一兩半另研

右先杵紫河車等為末入砒和勻羅為末每服半錢新汲
水少許送下如是偶日發須好日夜服如頓月發只夜

除腥服忌重腥瓜菜酒麵魚肉生冷硬物三兩日如受病
氣篤者只一服便定十歲以上服一字十歲以下至三五

歲服半字婦人有胎不可服但請放心修合與人服切勿
畏縮不敢用予用此藥三五年救人甚多雖有一味有

菉豆等三味性涼解得新汲水亦解此藥並不吐人有人

一種積寒痰癰每發時自吐食感延不曾服藥亦吐非藥
力也假令金液丹用硫黃紫霜丸用巴豆杏仁有大毒子
熟製了服之皆有效小兒亦可服恐不合此藥故論及此

常山飲子治癰疾

知母

常山

草薑各二兩

甘草

烏梅各三兩

良薑

二兩三十克

右剉每服三錢水一盞生薑三斤棗一枚煎至八分去粗

無時溫服

草果飲子治脾寒瘡疾

草果

川芎

紫蘇葉

白芷

良薑

灸甘

草

青皮

去白

陳皮

去白

右等分為粗末每服一錢水一錢煎至七分去粗溫服留粗兩服併一服當發月進三服不以時

治瘧疾辟瘴氣神效方

肉豆蔻

草荳蔻

各二個
用鹽裹煨赤色去壳

厚朴

二寸生
十錢製一寸

甘草

大者二寸生
一寸灸

生薑

棗仁二粒生
一塊溫酒裹煨一塊

右咬咀勾分二服水一碗入磁器內煎至一大錢去粗發日空心帶熱服未效再一服必效兩粗併為一服煎

瘧瘧治驗

號南河北道提刑按察司書吏高士謙年踰四十至元成寅七月
間暑氣不退因官事出外勞役又因過飲午后大發熱而渴水水
不能解其病早晚稍輕減服藥不效召亨治之診其脉弦數金匱
要畧云瘧脈自弦弦數者多熱瘧論曰瘧瘧脉數素有熱氣盛於
身厥逆上衝中氣突而不外泄因有所用力腠裏開風寒舍於皮
膚之内骨肉之間而發上因邪氣盛而不衰則病矣元氣不及即
生故但熱而不寒者邪氣內藏於裏而外舍於肌肉之間令人消
蠶脫肉故名曰瘧瘧月令云孟秋行夏令民多瘧瘧索古云動而
得之名曰中暎以白虎加梔子湯治之士謙遠行勞役又暑氣有
傷酒熱相搏午后時助攻大熱而渴如在鍋中先以柴胡飲子一
兩下之後以白虎加梔子湯每服一兩數服而愈

征南副帥大威不兒已未奉敕至易州其地卑溫軍多病瘧痢子

合張砂丹白术安胃散多產效

辰砂丹治瘧疾大有神效

硫砂

一半入藥一半為衣

信砒

雄黃各五分

右三味杵為末入白麵六錢同研匀滴水丸如桐子大味
少為衣每服一丸星宿全時用元根水送下忌溫麪鹽物

衛生寶鑑卷之十六終