

衛

生

寶

鑑

眼目諸病并方

上命周都運德甫諸路求醫治眼名方得

金露膏於濟南劉太醫用之多效此藥除腎退翳截赤定痛治一切眼神効

滑州黃丹

蕤仁

搗碎各一兩

黃連

半兩

蜜

六兩

右先將黃丹鐵鍋內炒紫色入蜜攪匀下長流水四升以嫩柳枝五七條把定攏之次下蕤仁滾拾數沸又下黃連以柳枝不住手攏熬至二升竹簾內傾藥在紙上慢上滴之無令塵汚如有瘀肉加礪砂末一錢上火煨開入前膏

子內用此藥多效故錄於此

加味春靈膏治風熱上攻眼目昏暗痒痛癰癧難開多淚疼痛或

生翳膜

黃連

四兩洗淨用童便二升浸一宿去粗  
用汁拌砂其石汁尽留石為用

南爐甘石

十二兩

好黃丹

六兩木飛

烏魚骨

燒存性

乳香

當歸各三錢

調研細水

白丁香

半錢

麝香

輕粉各少許

乳香

調研細水

瓶中候乾為度

右十味各為末另裹起用白砂蜜二十兩煉去蠟下爐耳  
石末不住手攪次下黃丹及諸藥末不住手攪至紫色不  
粘手為度搓作梃子每用一粒新汲水少許化開時上點  
洗之忌酒溫麵猪肉喬麵

上清散治上熱鼻壅塞頭目不清利此二方予從軍征南數年有

病眼者用之多效

川芎

薄荷

荆芥穗各半兩

益硝

石膏

桔梗各一兩

右為末每服一字口噙水鼻內滴之神效加龍腦三分妙

重明散治一切風熱之毒一衝眼目暴發赤腫疼痛或生翳膜  
肉癰遊盪明兩臉赤爛

礞石一斤火燒用黃連水淬為末

川椒

二錢熬膏子入礞石末以火

銅綠各半兩

硝砂

三錢蒲黃

雄黃

二錢

荳豆粉

四兩

右上六味同礞石末密羅上過乳細齒上嚼不參為度

後用脑子一錢南鵬砂一錢研細用大豆卷之每用少許  
以骨筋乾點臥少時忌酒溫麵諸雜魚肉辛熱等物此方  
得之路大夫數口為生

夜光散治赤眼翳膜腎花

宣黃連

阿子各二兩

當歸一兩

銅綠一錢

右咬咀以河水三升同浸兩晝夜於銀石器熬取汁約一大碗內八分來得所看粗黑色為度生絳紐取汁再上文武火熬槐柳搗滴水成珠為度

從猪胰子

二箇先去脂以和搗藥搗裹於水內燒光令  
睛盡細切以黃連膏內者黑色取出用之

礞石

一兩童便一大碗炭火燒紅碎之令小便尽  
白為度研細末

黃丹

四兩新水消淨飛細焙乾

鵝梨

箇竹刀切去皮心牛布取汁用

青鹽

六錢研細

蜜一斤煉去蠟相

一沸止

右將梨汁礞石膏子內熬五七沸入青鹽以楊柳枝搗至褐色傾入磁瓮冷水浸後去火毒月合為妙正月十一月次之餘月各不可合每用銅筋蘸藥點入眼大皆內

碧霞丹治目赤腫癰竇難開

銅綠

三末

枯白礬

三末

乳膏

一末

石為末將黃連熬成膏子入藥丸如雞頭大水浸開洗之  
魚膽丸太醫太史齐正臣傳大效

黃連

秦皮

當歸

石以參味淨水洗去泥土剉碎用溫水二升安置盆中  
宿於淨室中用鐵鍋內熬到一半藥力盡在水中新綿  
纏去粗換綿瀘防遍再熬至無水如稀糊狀取出銀器中  
灰火上熬成膏子入腦子藥盒中粉和成膏用紙卷之旋  
丸豆大用淨几上搓成細條子竹刀切如米大點之

飛雲散治眼因於溫熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明癰竇難開

川芎

猪寶

龍膽草

羌活

薄荷

石决明

蒼术

大黃

荆芥穗

甘草

木賊

蜜蒙花

連翹

川椒

草决明

桔梗

石膏

甘菊花

白芷

地骨皮

白蒺藜

檳榔

石燕

各半刃

還晴散治眼翳膜底滌淚出瘀肉攀睛  
右淨為末每服參錢茶清調下食後日參服已雜魚肉馬

喬麵辛熟之物

龍膽草

川芎

草決明

石決明

楮實

升麻

野菊花

甘草

野葛子

白茯苓

川椒炒去目

仙靈皮

白蒺藜

木賊

茵陳蒿

各半刃

右為末每服二錢食後茶清調下日三服忌雜魚肉及茶

麵熟物

甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服明目活血

駐顏暖水臘

甘菊花二兩

枸杞子四兩

熟地黃三兩

乾山藥半兩

右為末蜜丸桐子大每服三十丸至五十丸空心食後各

一服溫水送下

五秀重明丸治翳膜遮睛癰癤昏花常服清利頭目

甘菊

開頭者伍百斤

荆芥穗

五百穗

木賊

去節五兩至

楮實

五百克

川椒

五百粒炒去目

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼時噙下噙化

不得食後忌酒麵熟物

養肝散治小孩辨眼翳膜羞明不見物服十日必退下大人雀盲

服取效

夜明砂

青蛤粉

穀精草

各一兩

右為末每服一錢五十歲以上二錢施猪肝一匙大一片  
批閱參茶在內搗勻麻糬定米泔水半碗煮肝熟取出肝  
順湯碗內薰眼分肝作三次嚼喫却用肝湯下一日三服  
不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時不效  
日二服

龍膽飲子治疳眼濺瘡主疳翳溫熱為病神效不治寒濕為病者

青蛤粉

穀精草

各半兩

龍膽草

各三錢

麻黃

二分半

黃芩炒

各二錢

升麻

各二分

蛇退皮

川

鬱金

甘草

炙半兩

右為末每服二錢食後茶清調下忌辛熱物

助陽活血湯治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而腫  
症難開因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼昏花而不  
明宜助陽和血補氣

黃芪二錢

甘草免

蔓荆子各一錢

防風七分

白

芷

升麻

當歸

紫胡各伍分

右㕮咀作一服水一觔半煎至八分去粗熱服臨卧忌風  
寒食冷物避風處睡

○灸雀目癰眼法

小兒雀目夜不見物灸手大指指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際  
各一壯炷如小麥大

小兒癰眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指西骨

間陷中者是

卷之十  
五  
○鼻中諸病并方

論曰膽遺熱於腦則嚏頻而鼻淵腦熱濁涕不止如湧泉不常而下久不已成衄血之疾宜

防風湯主之

防風去芦一兩半

人參

黃芩

麥門冬去心一兩

甘草炙一兩

川芎各一兩

右為末每服二錢沸湯點服食後日三服

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血甚治瘡疹出得太盛以此解之

犀角一兩研無以升麻代之

生地黃半斤

牡丹皮一兩去心

芍藥七兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞服有熱加黃芩二  
兩脉大來連腰不痛自言痛為無熱不加黃芩也

生地黃湯治鼻衄昏迷不省以生地黃三五斤不暇取汁使患衄  
者生喫吸汁一二升許又以粗筆鼻頭更血止取汁服尤佳一  
婦人病經血半年不通因見塗中餘根為棄去甚可憐輒相  
言其經即通乃知地黃之治血其功如此

地黃散治衄血往來久不愈

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

各等分

右四味焙乾為末每服二錢蜜湯調下日三服不拘時  
三黃補血湯治六脈俱大按之空虛必面赤驚上熱乃手少陰  
心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮降之劑為火補氣以降  
氣後以甘溫微苦酸補其血

生地黃

熟地黃

川芎

當歸

柴胡各

半升麻

黃芩

牡丹皮各一錢

芍藥半兩

此藥補之以防血溢止渴

右㕮咀每服五錢水二觶煎至一觶去粗稍熱服食前  
凡兩寸脉兩頭則有中間全無曰芤以血在上焦或衄血或嘔血  
以犀角地黃湯則愈

清肺飲子治衄血吐血久不愈服此藥以三稜鍼於氣衝穴出血  
立愈

五味子十箇

黃芩一錢

當歸身

麥門冬去心

生地黃

人參各伍分

右為粗末都作一服水二觶煎至一觶去粗溫服不拘時

候

治鼻衄不止或素有熱而暴衄諸藥不効以白紙一張作八疊或十疊極冷水內浸溫紙置頂中以熱熨斗熨至一二重紙乾立愈

寸金散治鼻衄不止

甘草生

土馬驥

蜀上有者是各一分

黃藥子

半兩

右為末每服二錢新汲水調下未止再服立止

麥門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參

去芦

麥門冬

當歸身各五分

五味子

五箇

黃芪

甘草

芍藥各一錢

紫苑

一錢半

右咬咀分作二服水二錢煎至一錢去粗溫服食後

離澤通氣湯治鼻不聞香氣服之忌一切冷物及風寒處坐卧行

黃芪

四錢

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

蒼朮

各三錢

甘草

二錢

白芷

麻黃

不去節

川椒

各一錢

輕黃散治鼻中瘻肉

輕粉

一錢

砒黃

半兩

杏仁

一錢湯浸去皮尖并双仁

麝香

少許

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁合蓋定每有患者不間深淺夜卧用骨筋或竹筋點如粳米大紙裹中頭肉上隔一日夜卧點一次半月取效

懿紅散治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺疼疹俗呼肺風以肺而淺在皮膚也

舶上硫黃

白礬

灰名半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液之洗漱罷及臨卧再上薰服升麻湯下瀉青丸服之除其本也

○耳中諸病方論

黃帝鍼經云精脫者則耳聾夫腎為足少陰之經而藏精氣通乎耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎臟強盛耳聰五音若勞傷氣血兼受風寒損於腎臟而精脫精脫則耳聾也然五臟六腑十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則臟氣逆名之曰厥氣搏於耳之脉故今聾其腎病精脫耳聾者其候頰顏色黑手少陽之脉動其氣厥逆而耳聾者其證耳內燁燁也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣痛也宜以

燒腎散治耳聾

附子炮去皮一兩

川椒一兩去目砂

磁石

一兩搗碎七  
遍研水飛

右為末用猪腎一枚去筋膜細切葱薑白各一分入藥末一錢益花一字和令匀以十重溫紙裹於塘灰火內燒熟空心細嚼酒解薄粥下之十日效

羣角散治風毒熱壅心胸痰滯兩耳虛聾頭重目眩神效

羣角脅一兩去心或作二兩

甘菊花

前胡去芦

枳殼

翻炒黃各半兩

菖蒲

澤鴻

羌活

木通

生乾地黃

各半兩

麥門冬

一兩去心或作二兩

甘草

一寸多

右為末每服三錢水一錢煎至五分去渣食後溫服

扶神散治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急胸膈痞滿昏悶不利

扶神

一兩

羌活

蔓荆子

防風

葛蒲

葛根

苡仁

黃芪各半升

五味子半月

麥門冬一升

甘草一兩

右為末每服三錢水一中錢生薑半片煎至五分去粗食

後溫服

○耳卒聾并治法

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經絡隨其血脉上入耳正氣與邪氣相搏故令耳卒聾也宜以

蒲黃膏治卒聾也

細辛一錢

蒲黃各一分

麵末三分

杏仁三分

湯浸去皮尖及双仁

右為末研杏仁如膏和勻捻如棗核大綿裹塞耳中一日

一易以瘥為度

龍腦膏治卒聾

龍腦

半分研

椒目

五分

杏仁

一分湯浸去皮尖及壳

右爲末研杏仁膏和如棗核大綿裹塞耳中日二易之

○聰耳諸方

夫耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰腎經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁謂之聰耳也禹餘丸治聰耳有膿水塞耳

禹餘丸

燒醋淬七遍

烏魚骨

金底墨

伏龍肝各

附子

一箇去皮臍生用

右爲末以綿裹如皂角子大安耳內日再易之如不瘥者內有虫也

松花散治聰耳膿水不絕

白藜

半分搗

麻勃

木香

松脂

花胭脂各一

右為末先用綿淨拭膿盡後以藥涌耳填取效

白連散治聰耳出膿汁

白礬枯

烏賊魚骨

黃連 龍骨各一兩

右為末以綿裹裹核大塞耳中日三易之

紅綿散治聰耳出膿以白礬枯成白灰每用二錢入胭脂二字研  
勻用綿杖子纏去耳中膿及黃水盡即用別綿杖引藥入耳中  
令到底捲之即乾如壯盛之人積熱上攻耳中出膿水不瘥用  
局方無憂散送雄黃丸鴻三五行瘥

○耳中生瘡諸方

夫耳內生瘡者為足少陰腎之經其氣通於耳其經虛則風熱乘  
之隨尿入於耳與氣血相搏故令耳內生瘡也

曹青散治耳內有惡瘡

雄黃 七分半

魯青 五分

黃芩 二分五

黃連散

半刀

白礬 七分半

右為末每用少許綿裹內耳中

黃芪丸治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳內風吹四肢抽掣

疼痛

黃芪去芦一兩

白蒺藜 炒

羌活各半刀

黑附子一個  
大者

羯羊腎

對培乾用

右為末酒麪糊丸如桐子大每服三四十丸空心晚食燙

葱薑湯下

薑蒲挺子治耳中痛

菖蒲

附子宿去皮臍

右為末每用少許油調滴耳中立效

又方治耳癟倉鹽不以多少炒熟用棗麵蒸物青花布包定枕之  
其効如神

通耳丹治耳聾

安息香

桑白皮

阿魏各一兩半

硃砂半錢

右用巴豆七箇草麻仁七箇大蒜七箇研爛入藥末和勻  
棗核大每用一丸綿裹內耳中如覺微痛即出之

治蟬蚰入耳方溫生虫研如泥攤在紙上撲成紙然安耳中即出  
又方蠅牛虫去殼研爛滴水五七點再研勻灌耳內無活者乾者

研末可

治蠅蛇入耳灸豬肉掩兩耳即出

又方用生薑汁灌耳中即出

治飛蛾入耳薑汁灌入耳即出

又方擊銅器耳邊即出

治蟻入耳以大蒜搗取汁灌耳中

又方蝦蟆甲燒灰水調濃清者滴耳中即出

又方豬脂一指大灸令香安耳孔邊即出

一切虫物入耳用口氣盡力吸出最妙

衛生寶鑑卷之十終

衛生寶鑑卷之十一

名方類集

咽喉口齒方

龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉癰或  
結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡飲食難  
嚥並皆服之

南鵬砂

研

川芎各一兩

生地黃

犀角屑

羚羊

角

南琥珀

研

南玄參

桔梗

升麻

鉛白

霜

研

連翹各五錢

馬牙硝

赤茯苓

去皮

人參

船子

研各三錢

硃砂

飛

牛黃

研各二錢

麝香

三錢研

右十八味為末煉蜜丸每兩作十九金箔五十片為衣每  
服一丸用薄荷湯或新汲水化下若細嚼并噙化津液嚥  
下皆可食後臨卧服

祛毒牛黃丸治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬口內生瘡涎潮而急胸膈不利不欲飲食

人參

犀角取末

南琥珀研

桔梗

生地黃

熟水者佳

南鳩沙各半兩

牛黃

研三錢半

雄黃一兩

飛

南玄參

升麻各三錢

蛤粉四兩

水飛

硃砂研七錢

雄黃一兩

腦子

鉛白霜各一錢

寒水石燒去火毒二兩

右為末入研藥勻蜜丸如小彈子大金箔為衣磁器內收  
每服一丸濃煎薄荷湯化下或新汲水化服亦得食後日  
三服噙化亦得

殊砂膏鎮心安神解熱又虛損嗽血等疾

金箔一錢半

硃砂研

真珠末

生犀

人參

甘草炙

玳瑁各一兩

牛黃

麝香

龍膽

禹

鴻臚

羚羊角

遠志

西琥珀

安息香

赤茯苓

去皮各半兩

蘇合油

和藥亦得

鐵粉

各一分

右為末煉蜜破蘇合油和劑為小錠子更以金消為衣磁  
合內密封每服一皂角子大食後噙化漁翁藥承得效并  
阿膠丸相雜服此藥活血安神更勝如至寶丹每兩作伍

錠子

碧玉散治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或喉瘡重舌  
木舌腫脹可服

青黛

益硝

硫黃

甘草

各等分

右為末和勻每用少許乾繖於咽喉內細上噙津綿裹噙  
化亦得若作丸用砂糖和丸每兩作五十丸每服一丸噙  
化噙津亦得

發聲散治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜用寒涼藥過泄之此妨悶明熱也

茶葉

一兩

白殼桑

半兩炒

桔梗

新白者七錢半炒

甘草

二錢炒

右為末每用少許乾參治懸雍腫痛不可食  
右為末每服三錢水一盞半煎至八分放溫時口含嚥良  
一壁紅紫長大而水米不下用此藥一錢朴硝一錢調和  
勺乾參喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥  
一錢加白參半錢細研如粉和勺乾參之

玄參散治懸雍腫痛不可食

玄參

一兩

升麻

射干

大黃

各半兩

甘草

半錢

右為末每服三錢水一盞半煎至八分放溫時口含嚥良

驗

增損如聖湯治風熱上攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並宜

治之

桔梗

二兩

甘草

炙各一兩半

防風

半兩

枳殼

湯浸去皮

半

右為末每服三錢水一大盞煎至七分去粗入酥如棗許  
撓勻溫服食後

三奇湯感寒語聲不出

桔梗

三兩蜜拌飴煎

甘草

二兩半生

詞子

四個去核

時細呷

一日服盡其聲速出

右為末每服一錢加入砂糖一小塊水五錢煎至三錢時

時細呷

一日服盡其聲速出

玉粉丸治冬月寒痰結咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於會  
厭然如痘宜服玉粉丸

桂

一字

烏

一字炒

牛蒡

五錢

右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸雞頭大每服一丸至夜含化多年不愈者亦效

開閑散治癰喉風氣息不通

白僵蚕

直者炒去絲管

枯白藥

等分

右二味為末每服三錢生薑蜜水一錢調下細匕服之不拘時候

備急如聖散治時氣經喉風漸入咽喉閉塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃

研生用

白藥

飛

藜蘆

厚者去皮用仁生用

猪

牙皂角

去皮弦各等分

右四味為末每用一丘大鼻內搗之立見效

鮮毒雄黃丸治喉風及急喉痙

桔金

椎黃各一分

巴豆

去皮膜此酒十四粒

右為末醋糊為丸菉豆大用熱茶清下七枚吐出頑涎立

便蘇省未吐再服

○肺熱喉腥治驗

梁濟民因膏粱而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭唾涕稠粘口舌乾燥以

加減鴻白散主之難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也方

桑白皮

桔梗

各二錢

地骨皮

甘草

各一錢半

知母

七分

麥門冬

黃芩

各五分

五味子

二十箇

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服食後忌酒麯

辛熱之物日進二服

論曰張氏膏粱之子因多飲大熱之物所傷濁溢心火形於肺金

故以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣用以為君。芩  
知母苦寒治氣息腥臭清利肺氣用以為臣。肺欲收急食酸以收  
之。五味子之酸溫以收肺氣。麥門冬甘苦寒治涕唾稠粘口舌乾  
燥用以為佐。桔梗本輕辛溫治痰。遂利咽喉為使也。

口糜論并治法方

遂調論云膀胱移熱於小腸。膈腸不便上為口糜。心胃壅熱水穀  
不轉下傳小腸以道赤散去小腸熱。五苓散瀉膀胱熱故以遂  
散調五苓散主之。

胡黃連散治口糜麻孝卿傳

胡黃連

五錢

細辛

宣黃連

三錢

藿香

一錢

右四味為末每用半錢乾掺口內漱干漱吐之

綠袍散治老幼口瘡多時不效者

苦參四兩

甘草炙二兩

青黛一兩

右先杵一味為末入青黛同研勻每用半錢乾擦口渴止  
醋晝盃一二日

黃連升麻散治口舌生瘡

升麻

一兩半

黃連

七錢半

右為末綿裹含嚥汁

多効散治唇繫疼及瘡

阿子肉

五倍子

各等分

右為末用少許乾粘唇上立効

紅芍藥散歌曰

心病口瘡

紫桔紅荳

三錢四兩

五服安康

右用紫桔梗紅芍藥荳木等分為末羊肝四兩批開參

藥三錢麻札定火內燒令香熟空心食之大效後用白湯

下

遺山牢牙散王漢卿所傳方云折太守得之於李節使折得此方  
九十餘歲牙齒都不曾陳豁及無疼痛漢卿今八十九歲食肉  
能齒咬之知此方如神也

茯苓

石膏

龍骨各一兩

寒水石

白芷各半

細辛

三錢

石燕子

大者一枚小者用一對

右七味為末早辰用藥刷牙晚亦如之

玉池散治風齧牙疼腫痛

當歸

藁本

地骨皮

防風

白芷

槐花

川芎

甘草

升麻

細辛

各等分

右為末每用少許揩牙痛甚即取二錢水一盞半黑豆

一合生薑三片煎至一觔稍溫漱口候冷吐之

散治一切牙疼及寒風蟬牙疼

川芎

草烏

桂花

良薑

紅豆

胡椒

草薑

細辛

各半錢

石膏

官桂

各二錢

右為末先漱淨裹外乾稼之出涎立愈

草薑散治風蟬牙疼薰治偏正頭疼

草薑

二錢

蝎梢

良薑

各一錢

草烏

去皮尖五分

右為末每用半字先含水

一白應痛處鼻內噙上吐了水

用指粘藥擦牙疼處立定

麝香散治牙疼

麻孝卿傳

銅線

五錢

白芨

二錢半

白斂

三錢半

白礬

二錢半

麝香

一錢

右為末用麝香研細入藥和勻每用少許貼於牙患處  
乳香丸治走馬牙疳如神

明乳香 輕粉 各半錢 砒半錢研 麝香少許

右先將乳香在鉢內令一人執鉢水盆內浸鉢底一人研  
乳香如粉細取出入輕粉麝香砒再細研和勻每用以薄  
紙一張葉潤去藥內按過擣紙少許丸如黃豆大夜用先  
漱口齒淨後以細竹子粘藥丸劄牙疳處至明便効醫齋  
醋盃

衛生寶鑑卷之十一終

衛生寶鑑卷之十二

名方類集

○咳嗽門并論治法方

此論出梁古家作

論曰咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾溫動而為痰也若咳嗽有聲而有痰者因傷肺氣動於脾溫也故咳嗽而兼嗽者也脾溫者秋傷於溫積於脾也故經云秋傷於溫冬生咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾溫而為痰也是知脾無留溫雖傷肺氣而不為痰也若有痰而寒少熱多各隨五臟證而治之假令溫在肝經謂之風痰溫在心經謂之熱痰溫在脾經謂之濕痰溫在肺經謂之氣痰溫在腎經謂之寒痰各宜隨證而治之咳而無嗽者以辛甘潤其肺咳而嗽者治痰為先故從南星半夏勝其痰而咳嗽自愈人參欽花散治喘嗽久不已者予從軍過鄧州儒醫高仲宣傳此

并紫參散其効

人參

欵冬花各五錢

知母

貝母

半夏各三

御米殼

去頭炒二兩

右為粗末每服五六錢水一盞半烏梅一箇煎至一盞去  
粗溫服臨卧忌多言語

紫參散治形寒飲冷傷肺喘促痰涎胸膈不利不得安眠

五味子

紫參

甘草炙

麻黃去節

桔梗各五錢

御米殼

去頭蜜炒黃色二兩

右六味為末每服四錢五分白湯點服嗽住止後服  
九仙散治一切咳嗽太醫王子昭傳甚効此方得之於河中府姜

管勾

人參

欵冬花

桑花

桔梗

五味子

阿膠

烏梅各一兩

貝母半兩

御米皮八兩

去貢蜜炒黃

右為末每服三錢白湯點服嗽住後服

人參蛤蚧散治三年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血蒲面生瘡癰  
身黃腫

蛤蚧

一對全者河水浸五宿逐日換冰洗去腥酥炙黃色

杏仁

去皮尖炒五兩

甘草

炙五兩

知母

辛白皮

人參

茯苓去皮

貝母

各二兩

右八味為末爭磁合子內盛每日用茶送服永除神效  
人參清肺湯治肺感不清效嗽喘急爻治肺癆勞嗽

人參

阿膠

地骨皮

杏仁

知母

桑屑

皮

烏梅

甘草

嬰粟殼

右等分咬咀每服三錢水

一瓣半

烏梅

桑子各一箇同煎至

一錢去粗食後臨卧服

人參款花膏治久新一切嗽疾

人參

款冬花

五味子

紫苑

桑白皮各二  
兩

右五味為末蜜丸如雞頭大每服一丸食後細嚼燙湯  
下或含化亦得

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎不利寒熱往來

紫苑

五錢

紫蘇五錢

半夏泡五錢

杏仁

一兩桂黃  
色去皮尖  
半

陳皮

五錢

五味子五錢

桑白皮

三兩半

一方或用一兩  
炒勻每服三錢水一盞

右為粗末入杏仁壹兩去皮尖炒勻每服三錢水一盞  
半薑三片煎至一盞去粗溫服日三

款花清肺散治咳嗽喘促胸膈不利不得安卧

人參

其草灸

甜葶苈生

白礬苦

款冬花各二  
兩

御米殼

四兩 酒炒

石為末每服一錢溫米飲調下食後息油膩物又多言語  
損氣一方加烏梅一兩去核

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃

去節多黃

木香

當歸各一兩

人參去芦二兩

杏仁

二兩 炙炒

御米殼

去頭炒二兩

右六味為末每服四錢水一錢半煎至一盞去粗溫服食  
後

紫園參丸治肺氣虛咳嗽喘急胸膈痞滿短氣噎悶下焦不利脚  
膝微腫

蛤蚧

一對 鹵灸

人參二錢半

白牽牛炒

木香

甘草

真龜板

一枚

苦參蜜

各半兩

柏榔

五錢

右為末用棗肉為丸如桐子大每服四十九煎入參湯送  
下食後

團參散治肺氣咳嗽上喘不利

紫團參

欵冬花

紫苑草各等分

右為末每服二錢水一盞烏梅一箇煎至七分去粗溫服

食後

安肺散治咳嗽無問新久

麻黃

不去節一二兩

甘草一兩炒

御米殼

四兩去頂炒黃

右為末每服三錢水一盞烏梅一箇煎至七分去粗溫服

臨卧

馬鳴鈴丸治多年喘嗽不止大有神效

半夏

湯泡七次焙

馬鳴鈴去皮

杏仁

各一兩去皮尖缺

巴豆

二十粒研去皮油

右除巴豆杏仁另研外餘為細末用皂角熬膏子為丸如  
右為末薑汁糊為丸梧子大每服十九至二十九薑湯下  
食後臨卧服

化痰玉壺丸治風痰吐逆咳嗽

生南星

生半夏各一兩

天麻半兩

頭白麵三兩

右為細末滴水為丸梧子大每服三十丸用水一大盞先  
煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即濾出放溫別用薑湯下  
不拘時

皂角化痰丸治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利沫唾稠粘噬  
塞吐逆不思飲食或時昏憤

人參去芦

赤茯苓去皮

白藜蘆

半夏泡七次

白

附子 泡一两

南星 泡各一两

枳壳 炙二两

皂角木 白皮 酥

半一两

右為末生薑自然汁打糊丸如桐子大每服三十九溫水送下食後

溫胃化痰丸治膈間有寒脾胃停飲胸膈不快痰涎不已

半下 泡三两

陳皮 去白

乾薑

白术 各二两

右為末生薑自然汁打糊丸如桐子大每服二十九薑湯送下不拘時候

延壽丹

天麻 半两

白礬 一两半 生半桔

枸杞子

半夏 泡七次

乾薑 各一两半

人參 一两

右為末酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去蒸餅攪

藥為丸如桐子大每服三十九溫水送下食後臨卧服

大阿膠丸治咳嗽并嗽血哩血經效

阿膠剉碎炒

卷柏

去土

生地黃

大黃獨翫者日乾

各半兩

乾山藥

五味子

薄荷各一兩

柏子仁

人參

遠志

百部

麥門冬

茯苓去皮

防風各半兩

一方有熟地黃一兩

右十五味為末煉蜜為丸如彈子大不拘時候濃煎小麥  
升麥門冬湯嚼下半丸加至一丸若竟氣虛空心不可服

此

愚抱散治咯血吐血咯血及治煩燥

生蒲黃

乾荷葉

右為末每服三錢濃煎桑白皮湯放溫調下食後

地黃散治一切吐血咳血能解一切毒及諸熱煩躁

黃根

四兩

大豆

三兩

黃藥子

甘草各二兩

右為末每服二錢新汲水調下加入參二兩治癰瘍有血

五味散

治散治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力

黃芪

麥門冬

熟地黃

桔梗各五錢

甘草二錢

白芍藥

五味子

各二錢

人參

三錢

右為粗末每服四錢水一盞半煎七分去相溫服日三服  
透羅舟治痰實咳嗽胸肺不利太醫王子禮傳此方得之於西夏  
下來甚快以透羅名者謂脫羅網之患也

皂角

酥炙去皮弦

黑牽牛

炒

半夏

大黃

溫紙包煨

杏仁

去皮尖皴炒各一兩

巴豆

一錢去油另研

右六味為末生薑自然升丸桐子大薑湯送下三十丸喉

嗽甚者三四服必效

大利膈丸治風熱痰實咳嗽喘蒲風氣上攻

牽牛

四兩防生用

半夏

半兩

皂角

研末二兩

青皮

各二兩

槐角

一兩炒

木香

半兩

薑湯送下

右六味為末生薑打糊和丸桐子大每服五十九食後生

全真丸金朝興定年間宣宗賜名保安丸治五臟積熱洗滌腸垢潤燥利溼風毒攻癥手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利渴哩稠粘胸膈痞悶腹脹脹滿減食嗜卧困倦無力凡所內傷並宜服

之

大黃

三兩米泔浸三日逐日換水焙乾為末

黑牽牛

八兩半兩炒

所生用四兩同取頭末四兩

右以皂角二兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿蔔

兩切片同皂角一處熬至半碗去粗再熬至二碗投藥末

丸桐子大每服二三十丸至五十丸諸般飲下無時

梔角利膈丸治風勝寒實胸膈痞滿及喘蒲咳嗽

牽牛

一兩半

皂角

一兩研末

梔角炒

半夏各五錢

右為末生薑汁打糊丸桐子大每服三十九食後生薑湯送下

滌痰丸治三焦氣滯下痰飲消食利胸膈蒲咳嗽調粘面赤身倦

常服化痰寬膈

木香

枳榔

京三棱

陳皮

青皮

枳殼

半夏

大黃

各一兩

黑牽牛

二兩炒

右為末糊丸如桐子大每服四五十丸食後生薑湯送下

木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰飲寬胸膈

木香七克半

人参

白附子

薑膏

陳皮

草薑蔻

白茯苓

各五錢

半夏

一兩

太白丹治三焦氣滯破飲除痰止嗽開胃此方并木香半夏丸得

之於張文叔

半夏

南星炮

寒水石煅

乾薑

白附子

炮

右為末糊丸如桐子大每服三十丸溫薑湯下

桔梗湯除痰下氣

桔梗嫩炒

半夏

薑制去皮

陳皮

去白各十兩

枳實炒

黃伍分

右㕮咀每服二錢米一觔生薑三片同煎至七分去粗溫

服不拘時

定喘餅子累經神驗孕婦不可服

芫花

硝炭一宿炒

桑白皮

炒

吳茱萸

炒

陳皮

夫白各一兩

寒食麵

三兩一

馬兜鈴

一兩

白牽牛

三兩半生半炒取淨末二兩

右為末入牽牛末和勻滴水和如櫻桃大捏作餅子取熟  
灰半椀於鑄內同炒餅子熱每服一餅爛嚼臨卧馬兜鈴  
湯送下如心頭不快加一餅或二餅至明微利下神效

○盛則為喘治驗

己未歲初秋越三日奉召至六盤山至八月半霖雨不止

元帥夫人年踰五旬身軀肥盛因飲酒吃獐乳過  
度遂癟腹脹喘滿聲間舍外不得安卧大小便滯滯氣口脈大動  
倍於人迎關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱太盛

上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者宜下之故制風平氣散以下之

青皮

去白

雞心

梅榔各三錢

大黃

七錢

陳皮

去白五錢

白牽牛

三兩半生半炒取頭末一半

右為末每服三錢煎生薑湯一盞調下無時一服減半再服喘愈上有胸膈不利煩熱口乾時止咳嗽以加減鴻白散治之

內經曰肺苦氣上逆急食苦以濡之故白牽牛苦寒鴻氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳皮苦溫肺輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中帶氣故以為臣梔榔辛溫性沉重下瘀降氣大黃苦寒蕩滌滯實故以為使也

加減鴻白散方

知母

陳皮

去白各五錢

桑白皮

桔梗

地

骨皮各五錢

青皮去白

甘草炙

黃芩各三錢

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去相溫服食後數服良愈

華佗云盛則為喘減則為枯活人書云發喘者氣有餘也凡看文字須要曉會得本意且盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以火入于肺衰與不足而為喘焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故濁肺用苦寒之劑者非濁肺也濁肺中之火實補肺氣也用者不可不知

○嘔吐吃逆

丁香安胃散治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待燙熟

人參

丁香

各一錢

藿香

七分半

陳皮

二錢半

右為末每服二錢水二錢生薑三片煎至一錢去粗涼服  
食前和粗服亦可

二陳湯治痰飲為患

半夏

橘紅

各五兩

茯苓

三兩

甘草

一兩半

右咬咀每服五錢水一錢半薑五片烏梅半箇同煎至八  
分去粗熱服不拘時嘔吐甚者加丁香一兩

丁香柿蒂散治諸腫吃噫嘔吐痰涎

丁香

柿蒂

青皮

陳皮

各等分

右為粗末每服三錢水一錢半煎至七分去粗溫服無時

義活附子湯治吃逆

木香

附子

炮

羌活

茴香

各半兩炒

乾薑

一兩

右五味為細末每服二錢水一盞半鹽一粒煎二十沸和  
粗熱服一服止

治一切吃逆不止男左女右乳下黑盡處一華葉許灸三壯病甚

者灸二七壯

○消渴治法并方

生津甘露飲子治膈消大渴飲水無度舌上赤澀上下齒皆麻舌  
根強硬腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢  
萎弱無力面塵脫色肠下急痛善噫善怒健忘臀肉腰背夜寒  
兩足冷甚順德安撫張氏夫年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水  
無度小便數多先師以此藥治之旬日良愈古人云消渴多傳醫  
瘡以成不救之疾既效亦不傳蒼鴟享年七十五歲終名之曰生

清甘露飲子方

人參

山梔子

甘草  
炙

知母  
酒洗

薑黃

升

麻  
各二錢

白芷

白荳蔻

麥門冬  
各半錢

甘草  
生各一錢

白葵

蘭香

當歸

黃藥  
酒拌

石膏

各二錢半一方石膏用一兩一錢

連翹

一錢

仁

一錢半

木香

黃連

柴胡

各三分

桔梗  
三錢

全蝎

一箇藿香  
二分

消矣

右為末湯浸餽餅和成劑捻作餅子晒半乾杵飾如米大  
食後每服二錢抄在掌內以舌舐之隨津嚥下或白湯少  
許送亦可此治制之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下  
消矣

論曰消之為病燥熱之氣勝也內經云熱淫所勝佐以甘

苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之  
劑不能故以石膏甘草之甘寒為君啓玄子云滋水之源  
以鎮陽光故以黃連黃芩梔子知母之苦寒瀉熱補水為  
臣以當歸麥門冬杏仁全蝎連翹白芷白芍蘭香甘辛寒  
和血潤燥為佐以升麻柴胡苦平行陽明少陽二經白荳  
蔻木香藿香草澄茄為佐以輔之後用桔梗為舟楫使浮  
而不下也東垣先生嘗謂予曰素老人有云能食而渴  
者白虎倍加人參大作湯劑多服之不能食而渴者錢氏  
白朮散倍加葛根大作湯劑廣服之

黃連丸治 消渴

用黃連半斤酒一升湯內重蒸伏時取出曬乾為末滴水  
為丸如梧子大每服五十九溫水下

飲子治口乾燥生津液思飲食

麥門冬

去心

五味子

白芍藥

熟地黃

黃芪

各三兩

白茯苓

二錢半

天門冬

人參

甘草

各五錢

石為粗末每服三錢水一錢半生薑三片棗子二箇烏梅

一箇煎至一錢去粗溫服食後

冬飲子治膈消胸滿煩心津液燥少短氣多為消渴

人參

茯神

麥門冬

知母

五味子

生

地黃

甘草

桔梗根

葛根

各半分

右㕮咀每服五錢水二觔竹葉十四片煎至七分去粗溫

服無時

麥門冬湯治消渴日夜飲水不止飲下小便即利此方并冬瓜飲

子得之張文叔

麥門冬

黃連

冬瓜乾

各二兩

右為粗末每服五錢水一盞煎至七分去粗溫服如無乾者用新冬瓜一枚重三斤去皮穰子分作十二片為十二服又方冬瓜一片擘破水三盞煎七分去粗溫服日三冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無度

冬瓜

一箇

黃連

十兩為末

右先取冬瓜割開去穰淨移黃連在冬瓜內再將頂蓋熱灰火中煨熟去皮細切爛研用布取汁每服一盞至二盞食前日三服夜二服

。辨六經渴并治法

太陽渴脉浮無汗者五苓滑石之類

陽明渴脉長有汗者白虎涼膈之類

少陽渴脈弦而嘔者小柴胡加爪姜根也

太陰渴脉細不欲飲水縱飲唯思湯不思水四君子理中湯之類  
少陰渴脉沉自利者猪苓湯二黃湯之類

厥陰渴脉微引飲者當少少與之

滑石治渴本為窮不利而用之以其燥而能亡津液也天令溫氣  
太過當用之若無溫而用之是為犯禁假令小便不利或渴或  
不渴知內有溫熱也小便自利而渴知內有燥也溫宜滲泄之  
燥宜潤之則可矣

雜證有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之

傷寒食少而渴者當以和胃藥止之不可用涼藥恐損胃氣愈不  
能食白朮芩苓是也

太陽無汗而渴者不宜白虎汗後脉洪大而渴者方可與之矣

陽明有汗而渴者不宜五苓若小便不利汗少脉浮而渴者更之  
若人病心肺熱而不渴者知不在大陰少陰之本只在標也在標  
則不渴矣若渴者是在本也

膽殼治驗內經曰有病口苦名曰膽殼乃肝主謀慮膽主決斷盛  
升三合為清淨之府肝取決於膽或不決為之恚怒怒則氣逆  
膽汁上溢故口苦或然盛使然也主之以

龍膽瀉肝湯

黃芩七分 柴胡一錢 芫草生 人參 天門冬 黃連  
知母 龍膽草 山梔子 麥門冬各五分 五味子十箇

右十一味㕮咀作一服水二盞煎至一盞去相溫服食後  
忌辛熱物此方因焦秀才病口苦予制此方治之得效又  
名龍膽瀉肝湯 ○衛生寶鑑卷之十二終

衛生寶鑑卷之十三

名方類解

○瘡腫門

丙午歲予居藁城人多患丁瘡縣尹董公謂予曰今患丁瘡者極多貧民無力醫治近於史陘處得數方用之無不效官給藥錢君當捨手醫之遂諾其請董公榜示通衢有患丁瘡者來城中羅謙甫處取藥如此一年餘全活者甚衆保生挺子千金托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方至元戊寅歲董仲拜中書丞兼樞密院事

保生挺子治丁瘡背疽瘰疬一切惡瘡

金脚信

雄黃

硇砂各二錢

麝香一錢

輕粉

半大匣半大盒

巴豆

四十九粒文武火炒研

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥和成挺子令水浸少

時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子  
次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸

藁本

各半兩

沒藥

二錢

黃丹

黃蠟各二兩

乳香

二錢

琥珀

二錢半

白艾

二錢半

膽礬

粉霜各

白膠香

三兩

清油

一斤

木鼈子

五十箇去皮

巴豆

十五箇去皮

槐枝

柳枝各一百二十條

右件一處先將槐柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥  
熬至黑焦亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用紺  
帛攤之立有神效

千金托裏散治丁瘡發背一切惡腫

官桂

人參

甘草

川芎

香白芷

芍藥

各一兩

木香

沒藥各三錢

乳香二錢

當歸半兩

連翹

一兩二錢

黃芪

一兩半

防風

桔梗

厚朴略三

服無時

破棺舟治瘡腫一切風熱

大黃

一兩半  
生半熟

芒硝

甘草

各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任化  
下童便半錢研化服亦得忌冷水

二仙散治丁腫惡瘡太醫院李官勾傳

白礬

生用半兩

黃丹

各等分

一方加雄黃少許更良

右各另研臨用時各炒少許和白礬研細刺瘡見血待血  
盡上藥方燒蓋之不過三湯決愈

曲陽縣慈順里劉禪師善治瘡瘍。慈濟甚効。更捷壬子歲詔到六盤山廻爪忽都地面住。冬朝夕相從傳得四方太一王燭散杖效散翠玉膏用之每有神效。甲寅歲仲秋王師還遣使送禪師廻鄉里賜院門額曰慈濟禪院。

太一膏治瘡子瘡神效

腦子

一錢研

輕粉

乳香

各二錢研

麝香

三錢研

沒藥

四錢研

黃丹

五兩

右用清油一斤先下黃丹熬用柳枝撓又用敗兒葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手撓視冷熱得所入腦子等藥統勻礮器盛之用時旋攤

丸散治瘡子瘡

官桂

硝砂各半錢

赤小豆

四十九粒

粳米

四十九粒

斑狗四十九箇不去無足

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字

煎樟柳根湯送下空心服小便淋瀝為效如要心嘔吐黃

水無妨瘰疬日日自消矣

玉燭散治瘰疬和血通經服之自消日進一服七八日取效

當歸

芍藥

川芎

甘草

芒硝

熟地黃

大黃

黃芩

各半分

右為粗末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去粗溫

服

翠玉膏治膿瘡

瀝青

一兩

黃蠟

銅綠

各

鐵

沒藥

一錢

香油

石先研銅綠為末入油調勻又將黃蠟瀝青火內溶開次

下油調銅線攢勺將浸藥旋入攢勺用河水一椀將藥領在內用手扯拔勺油紙裹視瘡大小分大小塊口嚼捲成餅子貼於瘡上紙封三日一易之

黃連消毒湯治膏梁之變發背膾瘡始愈著能消之

此方乃遺山先生服之大效

黃連

黃芩各一錢

黃蘖一錢

藁本

當歸二錢

梗各五分

生地黃四分

知母四分

防已五分

活

獨活

防風

連翹各四分

人參

黃芪

澤瀉

甘草

蘇木各三分

陳皮二分

六味咀都作一服用水三錢煎至一錢半去粗溫服食後五利大黃湯治人年四十以前血氣壯實多苦患癰疽大小便不通

通出外瘻

大黃煨三兩

升麻二兩

黃芩三兩

芒硝

柏子仁適

右咬咀每服伍錢水一爵半煎至七分去粗稍熟服食

內消非麻湯治證同前

大黃

升麻

各二兩

黃芩

去黑心

枳實

炒去穰

當歸

各一兩半

甘草

炙一兩

芍藥

一兩半

右咬咀每服五錢水一爵半煎至七分去粗溫服食前復元通氣散治諸氣滯閉耳聾耳痛腹癰便癰瘡疽無頭通一切

氣

青皮

陳皮

各四兩

甘草

三兩半生半熟

川山甲

泡

桔梗根

各二兩

加金銀花

一兩

右為末每服二錢熟酒調下如瘡無頭津液調塗此方活血止痛內消瘡腫

乳香消毒散專治惡瘡

錦紋大黃

燬

黃芩

箭桿者各五兩

牛蒡子

炒

牡蠣

鹽泥裹燒

金銀花

各五兩

甘草

三兩炙

沒藥

乳香

各半兩

懸姜

半兩

右九味爲粗末每服五錢水一盞半煎至七分去粗溫服  
瘡在上食後在下食前

內消丸治瘡腫初生及瘰疬結核熱毒鬱滯服之內消

廣殘

炮

三稜

炮各三錢

青皮

去白各一兩去殼

陳皮

各一兩去殼

牽牛

半斤取頭末

薄荷葉

皂角

不蛀者水者軟繩取汁去粗熬成膏各半斤

一方加沉香半兩

右爲末入牽牛頭末和勻用膏和丸如菉豆大每服三十

丸煎連翹湯送下食後

竹葉黃芪湯治發背發渴通治諸瘡大渴

淡竹葉

二兩

生地黃

八兩

黃芪

麥門冬

去心

當歸

川芎

人參

甘草

黃芩

芍藥

石膏

各三兩

右十一味為粗末每服伍錢水一盞半竹葉五七片煎至一盞去粗溫服不拘時候

五香連翹湯治瘰疬癰疽惡腫

沉香

乳香

生甘草

木香

各一分

連翹

射干

升麻

獨活

桑寄生

木通

各三分

丁香

半兩

大黃

一兩

麝香

一粒半

右咬咀每服四錢水二盞煎至一盞去粗空心熱服

五香湯治毒氣入腹托裏

丁香

木香

沉香

乳香

各一兩

麝香

三錢

嘔者去麝加藿香一兩渴者加入參一兩

石為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去粗空心稍熱  
服總錄聖惠子金外臺治諸瘡腫方中皆載與此方大同  
小異大抵此藥治毒氣入腹煩悶氣不通者其餘熱渴或  
胃口燥咽乾大便硬小便澀者皆莫與服之

赤芍藥散治一切惡丁瘡癰疽腫初癰不消憎寒疼痛

金銀花

半兩 大黃

七錢半

赤芍藥

半兩

當歸

枳實

甘草

各三錢

右件入布囊大者一箇同為粗末作四服每服水酒各一

錢煎至一盞去粗溫服不拘時

金銀花散治發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花

四兩去土

甘草

一兩此

右為粗末每服四錢水酒各一盞煎至一盞去粗稍熱服

右二方申顯卿傳

乳香丸治諸般惡瘡毒

乳香

另研

川山甲

當歸

各五錢

猪牙皂角

木

鹽子

各七錢

右用松枝火燒存性為細末入乳香勾煉蜜丸如彈子大

每服一丸溫酒化下食前

水盞膏治熱毒腫痛大效

大黃

黃芩

蔚金

白芨

天南星

朴硝

各一錢

兩

右入黃蜀葵花乾者一兩共煎藥為細末每藥末二錢以

新水一盞半搗勻盞沉底者去浮水以紙花子撲於腫上

貼之如膏燥津唾潤之如皮膚白色者勿用

紫毒散治熱毒赤腫遊走不定

寒水石

生用

石膏

生用各四两

黃藥

各三兩

則水潤之

龍麝追毒丹治一切惡瘡內毒氣未出盡者皆可用之如箭頭針刺癰瘍內有毒氣不着骨者不過一二上藥其針刺自出破傷風惡不痛者亦效

龍腦

三末

麝香

一分

輕粉

粉霜

雄黃

各五分

乳香

砒黃

各一字

巴豆

十個去皮心膜

右研極細麵糊丸如麥粒大每用之先以針撲瘡口入藥量輕重上藥後一兩時辰腫痛盡是應如患下疳瘡餽量或半或盡者用搗磨一兩粒搽之不三上立效

桃紅散飲瘡口生肌肉定血辟風邪

寒水石

塊

滑石

各四兩

乳香

小豆粉

輕粉

各一錢

右為末每用少許乾摻血不止者加燈草貼瘡口上以帛裹之

木香散治多特不歟一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香

南黃連

桉榔

各半兩

白芷

三錢

右為末每日一遍乾貼

又方

地骨皮

右為末先口噙溫漿水洗瘡口上揩乾貼藥及治下疳瘡

神效

玉龍膏摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡腫

赤蘆

大者一錢去核

黃蠟

一兩半

白芷

半兩

麻油

謂真者

麝香

可一錢

松脂

研一錢

零香

藿香各二  
兩

杏仁

去尖

升麻

黃芪

赤芍藥

白芨

白

欽

其草

各一分

右以油浸七日却取出油先煉令香熟放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去渣入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以銚合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癬痒瘡腫痛並塗磨令熱頻貼用之如耳鼻中肉鈴用紙燃子每日點之至一月即愈如治灸瘡及小兒癰瘡塗之甚減殺痕神效

司馬溫公解毒膏治諸瘡及杖瘡尤宜貼之

乳香

三錢

木鼈子

二十四箇去皮

杏仁

四十八箇

草麻子

三十四箇

巴豆

十四箇

槐枝

四兩長四指

柳枝二两

桃枝三两

黃丹春秋三两半夏四两冬三两

右件用清油一斤下諸藥熬黑滴水內不散成也用好綿  
纏過用時於水內浴貼之

善應膏

黃丹二斤細上等者

沒藥三兩研

白礬二兩生

官

桂一兩三分

乳香研

木鼈子生

白芨生

當歸

白芷

杏仁生各一兩

榔枝

二兩如筋條長

右除黃丹乳香沒藥外餘藥用麻油五斤浸一宿於炭火  
上鐵鑄內然至變黑色濾去藥不用將黃丹入油內上炭  
用榔條如小錢粗凹指長攪令微變褐色出火再用榔條  
攪令出烟盡入乳香沒藥再用榔條攪令勻俟冷傾入磁  
盞內用刀子盞內切成塊油紙裹之後用如常法

大紅膏治從高墜下及落馬墮車筋骨疼痛

當歸

赤芍藥

烏藥各一兩

小油半斤浸上藥

七日七夜

沒藥

一兩研

乳香二兩研

二兩研

琥珀二兩研

十兩

瀝青

一片

右將瀝青於銀石器內燉開入油視令熱硬軟滴水不散  
用綿濂在銀石器內入黃丹并諸藥末用手不住搗令勻  
為度用時攤紙上貼傷處大有神效

消毒膏治一切腫毒結硬疼痛

紫胡

去苗一錢

藁本

牛膝

續斷

丹參

牡丹皮

甘草

細辛

槐白皮

蒼朮各一兩半

羌活

何首烏

天麻

白芷

各二錢

玄參

葛根

升麻

白芍

木通

不香

當歸

洗炮

川芎

白附子

各二錢半

亂髮

水

赤茯苓

各二兩半

木鼈子

去皮三兩

沉香

桃仁

一兩半

杏仁

湯浸去皮尖各三兩半

白芨

四錢

防風

五兩

赤芍藥

五兩

黃芪

五兩

黃丹

培三錢

臘月澄清麻油

一斤四兩

石件藥三十三兩入油內浸七日七夜於淨銀石器內慢火熬候自正焦黃色放溫以白綿纏去粗於磁罐內密封三昼夜候取出傾於鍋內慢火溫再纏去粗傾入好沙鍋中慢火再熬次下黃蠟十五兩用竹籠不住手攏令勻次下黃丹攏勻以慢火再熬候出火攏勻續次再上火三日方欲膏成於磁合子內密封每用時以軟白絹上攤勻貼患處

綠白散治陽瘻火燒疼痛

苦參

不以多少

右細末用香油調搽

冰霜散治火燒燎損湯油熱燒傷皮爛肉大痛

寒水石生

牡蠣燒

明朴硝

青黛各一兩

輕粉一錢

右為末新水調或油調溫則乾貼痛處立止如神  
如神散治凍瘡皮膚破爛痛不可忍

川大黃

右為末新水調搽凍破瘡上

黃連散數多年不効瘡

大黃

枳榔

黃連各等

右為末先洗瘡淨乾貼水出勿憚未效隔三日再用貼之

○瘡總論

大凡瘡疾有五善七惡之證不可不察也燥煩時嗽腹痛渴甚或

泄利無度或小便如淋一惡也膿血大泄腫欬尤甚腹脹臭痛不可近二惡也喘粗短氣恍惚嗜卧三惡也目視不正黑睛緊小白睛反青瞳子上看四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥則嘔食不知味六惡也声嘶色敗口鼻青赤面目四肢浮腫七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調匀二善也膿漬腫消色鮮不臭三善也神彩精明語言清爽四善也肺氣和平五善也若五善見三則瘥七惡見四則危然則病有源同七惡皮緊急者如善病有源同五善皮緩虛者如惡夫如是者豈凡醫之所知哉考五善病至則妙無以加也如七惡並臻則惡之劇矣

汗之則愈已

丁巳春予從軍廻住冬於曹州界以事至州有趙同知謂予曰聚陽半經寒病頭面亦腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關

緊急第哩稠粘飲食難下不得安卧一毒墮於腫上砭刺四五百  
針腫赤不減其痛甚不知所由然願請君一見予遂往診視  
其脈浮緊按之洪緩此證乃寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而  
赤腫經云天寒則地凍水冰入氣在身中皮膚痏密腠理閉汗不  
出血氣強肉堅滿當是之時善行水者不能行水善察地者不能  
鑿凍善用鍼者亦不得取四要必待天溫氷釋凍解而後水可行  
也可穿入脉亦猶是也又云冬月閉藏用藥多而少鍼石也宜以  
苦溫之荆溫經散寒則已所謂寒痏腠理以苦發之以辛散之宜  
以北裏溫經湯麻黃苦溫發之者也故以為君防風辛溫散之者  
也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以為臣  
血留而不行者則痛以耆白芷辛溫當歸身辛溫以和血散諸湿  
熱則腫蒼木辛甘溫肺輕涼力雄壯能泄膚腠間浮熱人參甘草

廿溫白芷味酸微寒調中益氣使托其裏故以為佐依方餌之以  
薄衣覆其首以厚被覆其身卧於暖處使經血溫腠理開寒乃散  
陽氣行大汗出後腫減八九分再服去麻黃防風加連翹秦艽子  
腫痛悉去經言汗之則瘡已信哉斯言或人以仲景言瘡家雖身  
腫痛不可發汗其理何也予曰此說乃營氣不行遂於肉裏而作  
瘡腫作身疼痛非外感寒邪而作疼痛故戒之以不可發汗若汗  
之則成瘡也又問仲景言鼻衄者不可發汗復言脉浮緊必當以  
麻黃湯發之衄血自止所說不同其故何也願聞其說予曰此議  
論血正與瘡家槩同且夫人身血之與汗異名而同類奪汗者無  
血奪血者無汗今衄血妄行為熱所逼更發其汗反助邪熱重衄  
津液必變凶證故不可汗若脉浮則為在表脉堅則為寒裏邪靜  
遏陽不得伸蒸伏榮中迫血妄行土出於鼻則當麻黃湯散其寒

邪使陽氣得舒其効自止又向疑爲或者嘆曰知其要者一言而終不知其要流散無窮學古之學可謂知其要者矣

托裏溫經湯治寒癥毛皮轉過經絡不得伸越熱伏榮中聚而爲示腫痛不可忍寒發熱或相引肢體疼痛

人參

蒼朮各一錢

白芍藥

甘草

灸各一錢半

白芷

當歸身

麻黃

去節根各二錢

防風

葛

根各三錢

新升麻

四錢

右㕮咀每服一兩重水三盞先煎麻黃令沸去黃用下餘藥同煎至一盞去相宜溫服訖卧於溫處以綿衣覆之得汗而散

○凡治病必察其下

戊午冬予從軍住冬於成武縣有賣倉使父卒踰六旬冬至後數

由疽發於背五七日腫勢約七寸許不任其痛乃堅曰視之膿已成可開發矣公惧不從三日醫曰不開恐變證生矣遂以燔針開之膿泄痛減以開遲之故治二日變證果生覺重如負石熱如炳火痛楚倍常六脉沉數按之有力此瘡築積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴凝復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時以從其證可也與那醫議作清涼飲子加黃連糞一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除後月餘平復又僕錄判母年七十有餘亦冬至後胞出疽形有頭面大命蕩醫診視俟瘡熟以鍼出膿因怒笞侍妾瘡輒內陷凹一並葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脈極沉細而遲緩衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已癱肥膿之氣獨存瘦瘠之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也

病與時同與瘡繫議速製五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡  
瘡復大發隨證調治而愈尚經曰凡治病必察其下謂察時下之  
宜也諸瘍瘍皆屬心火言其常也如瘍盛形羸邪甚痛極始熱  
終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用  
也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣

○捨時從證

至元壬午五月二十八日王伯祿半踰五旬有七右臂膊腫盛上  
至肩下至手指色變皮膚紫六脉沉細而微此乃脈証俱寒子半  
瘡醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燭鍼啓之膿清稀  
解次日肘下再開之加吃遂不絕彥和與丁香柿蒂散兩服稍緩  
次日吃遂尤甚自利脾腹冷痛腹瀉飲食減小時發昏憤於左乳  
下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香茴

香薷湯等藥㕮咀一兩半欲與服或者曰諸病非瘡瘍皆屬心火  
又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然  
內經曰脉細皮寒鴻利前後飲食不入此謂五虛况吃逆者胃中  
虛寒故也諸病非瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證内外相反而  
須當捨時從證也非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之  
諸證悉去飲食倍進瘡勢溫爛色正彥和復用五香湯數服後月  
餘平復嘔守常者衆人之見知變者知者之事知常而不知變遇  
事因而取敗者亦多矣况鑒乎哉守常之變豈可同日而語乎哉  
托裏溫中湯治瘧為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿  
賜鳴切痛大便微溏食則嘔逆氣短促吃逆不絕不得安卧時

發悵情

沉香

丁香

益智仁

茴香

陳皮各一錢

木香

一錢半

甘草

二錢

卷活

乾薑

炮三錢

黑附子

炮去皮鹽四錢

右父咀作一服水三錢生薑五片煎至一錢去粗溫服無時忌一切冷物

內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫故以附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表故以為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脉胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒為佐蒼氣內攻氣聚而為涌木香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿為便

也

○打撲損傷從高墜下

繆刺論云人有所墜惡血留內腹中痛脹不得前後先飲利藥此

上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前脉出  
血刺足附上動脈不已刺三毛上各一穴

當歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅腫暗青疼  
痛昏悶蓄血內壅欲死

川大黃

一兩

當歸

三錢

麝香

少許研

右為末入麝香研勻每服三錢搗酒一錢調下食前內瘀  
血去或骨節傷折疼痛不可忍以足痛接骨紫金丹治之  
復元活血湯治從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍

大黃

一兩酒浸

紫胡

五錢

旋覆根

川山甲

炮

當歸

各三錢

紅花

甘草各二錢

桃仁

湯炮去皮尖  
研末五十个

七除桃仁

為咬咀每服一兩用

水二錢半

酒半錢同煎至

古分下桃仁泥再煎

一兩沸去粗大溫服

食前以利為度

利後痛不盡者當服乳香應痛散

黃帝鍼經云有所墜隨惡血留內若有所大怒氣上而不下行於脇下則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽以柴胡為引用為君以當歸和血脉又急者痛也甘草緩其急亦能生新血耳生血陽生陰長故也為臣川山甲䗪蟲根桃仁紅花破血潤血為佐大黃酒製以燙滌敗血為使氣味相合便氣血各有所歸痛自去矣

聖靈丹治一切打撲傷損及傷折疼痛不可忍

乳香

五錢

烏梅

去核五枚

高良姜

八錢

一大瓣炒黃色二兩

白米

一升

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒送下喫一服不痛勿服如痛再服

神效接骨丹治打撲傷損傷筋折骨及寒濕脚氣腿疼或一切惡瘡疼痛不止皆可服之

乳香

沒藥

白膠香

蜜陀僧各

內兩另研

紅豆

青白芷

大豆

貫芎

赤芍藥

自然銅

火燄鵝掌如銀

為炭

當歸洗

三次焙

松子仁

水蛭

各四兩

右先以自然銅火燒紅醋淬燒如銀為度用四兩入前二味藥各等分同為末以黃蠟為丸如彈子大每服一丸

以黃米酒一錢煎開和桓溫服年少者只一服年老者加

添服病在上食後在下食前此藥內去自然銅水蛭底子

加桂花川練子茴香為細末酒麵丸如桐子大每服一五

丸酸石榴湯送下食前日進二服治小腸氣如神一切脣

脣疼痛並醫治之此藥男子婦人老幼皆可服神效不可

具愁

乳香散治破瘡大有神效

乳香

沒藥各三錢

茴香四錢

當歸五錢

自然銅

火燒醋淬七次五錢

右細末每服五錢溫酒調下立效

五黃散治杖瘡定痛

黃丹

黃連

黃芩

黃檗

大黃

乳香分各等

右為細末新汲水調成膏用紺綿紙攤在上貼於瘡上

紫金丹治打撲損傷及傷折疼痛不可忍

川烏炮

草烏炮各一兩

五靈脂

木蠶子

去殼

黑牽牛生

骨碎補

威靈丸

金毛狗脊

自然

銅燬淬七次

防風各五錢

禹餘根

燬淬七次

地龍去

烏藥

青皮去白

茴香炒各五錢

乳香

沒藥

紅娘子

麝香各二錢半

陳皮去白一錢

右為末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九溫酒送下  
病在上食後在下食前

乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

獨科栗子

雄黑豆

桑白皮

乳香

沒藥各一錢

破故紙

炒二兩

右為末每服五錢醋一錢半沙石器內煎至六分入射香

少許溫服

花蕊石散治一切金瘍撲損急以此藥捲傷處如內損血入腸胃  
煎膏便入酒調下一錢服之立效

石硫黃

四兩

花蕊石

兩

右二味為粗末拌勻先以紙筋和膠泥固濟瓦罐子一箇  
內可容藥候乾泥入藥在內泥封口了焙籠內焙乾令透  
熱便安在四方埠上用炭一杆籠蓋周匝自己午時從下  
生火令漸上徹有墜下火旋夾火上直至經宿火冷炭消  
尽又放經宿罐冷定取出細研篋合內盛依前法使用  
湧鐵膏取箭頭一切鍼刺入肉尽皆治之

糞羣頭

一箇

蠟蛇四十九箇

土消虫十箇

芫青

馬肉中蛆

培

臂內蛆

培

蟻娘

巴豆

信砒

硝砂

各一兩

夏枯草

磁石

黃丹

蘇木

地骨

皮

各一兩

石腦油

三兩

喬榮灰汁

三升

右將灰汁石腦油以文武火熬成膏次下諸藥令為磁器

內收貯脣用時看瘡大小點藥良久箭頭自然湧出

萬聖神應丹出箭頭魚骨針麥辛等遠近膚治之隨陝西行省出

軍曾用

良石料 今天仙子筋是也

右於端午前一日持不語尋上頸科取酌中一科要根枝葉實全道先生你這裏那道罷用柴灰自東南為頭閼了用木管撮取子根下上次日端午日未出依前不語用鑊只一下取出用淨水洗了不令雞大婦人見於淨室中石臼中搗如泥丸如彈子大黃丹為衣紙袋內封了懸高處陰乾如有著箭其箭頭不能出者以紺綿袋盛一丸放在膝下用綿裹肚繫了先用象牙末於箭瘡上貼了後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之

神聖膏取針因侵入皮膚

車脂不以多少

右成膏子者好攤紙上如錢大貼之二日一換三五次針  
自出大有神效

烏翎散取針鐵不悞入皮膚

烏翎三五枝火多焦

右為末好醋調成膏塗瘡上紙蓋一兩次其針自然神效  
黃石膏治金瘡深者若以藥速合則潰宜用

黃丹

滑石等分

右研細敷之

又方

降真香一味更好

王合哥刀箭藥方

石灰

四兩

五月五日准備下烏魚骨

一兩

右五月五日平旦本人不語抹地上青薺高者米各一握  
同前搗搗於日未出時摶作餅子曬乾用時旋刮削敷之  
早用並不作膿

○疣瘤疥癬皴揭附

癸丑歲承應冬住於爪忽都有太醫大使顏璣卿傳四方用之常  
效故錄之

井金散治瘡瘍大有神效

土黃

三錢

硝砂

雄黃

各二錢另研

粉霜

輕粉

各一錢

乳香

沒藥

各半錢

石為末假令瘡如胡桃大用藥末少許半錢用唾調如稀  
麵糊得所難於瘡頂上如小錢大哩濕紙花兩重蓋之後

用黃龍膏蓋之間日一慶上藥次添藥胤的周廻大如龜  
葉如此上之無度漸上拆之後根搖自然有裂聲隨後自  
然下來

黃龍膏方

黃藥(不以多少)

右為末唾調攤在紙上

生肌青龍膏

阿子皮

龍骨

牙恭

等分

右為末乾參上

做土黃法

砒黃

研二兩

木鼈子

去殼

巴豆

不去油殼半兩

硼砂

研二錢

右件硫黃一處為末後用木蠶子同石腦油和成一塊油紙裹埋於坑內四十九日取出收於磁器內盛筍作小塊灸瘤子法治果報而生疣瘤

右用艾丸灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如螺旋大貼灸處用膏藥重貼二日一易候痒折出膿如豆粉愈

貼瘡方

草烏半斤

川烏四兩

乾桑耳

朽木各三兩

細白

石灰

三碗  
燒者

桑柴灰

上碗

右朽木等四味燒令存性同二灰研勻用水一桶淋汁如法熬成膏用之

寶金散偏醫癰瘍無不療神妙妙方

猪羊膚

對水洗淨去脂  
腹後兩乾為細末

海藻

海帶各二兩

琥珀

研

麝香

研

木香

各一分

丁香

各一分

直珠

半两研

石件為末入研藥合勻再研極細重羅每服一錢熱酒一  
角調下夜卧服垂頭臥若是在室男女不十服必效如男  
子婦人患一月見效婦人有胎不可服

海帶丸治癰氣久不消

海帶

貝母

青皮

陳皮

右件各等分為末煉蜜丸如彈子大食後噙化一丸大效  
海藻清堅丸治癰氣大盛久不消散

海藻

海帶

昆布

各一两

廣茂

青盐

各半两

右為末煉蜜丸如指尖大每服一丸噙化食後

何首烏散治肺風毒攻衝遍身疥癬痒痛或生癰疹搔之成瘡  
肩背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻面頤生瘡又治癰白

癩頑麻等風

荆芥穗

蔓荊子

威靈仙

何首烏

甘草  
炙

防風

各一兩

右用蛇蠍草乾一兩同爲末每服一錢食後溫酒調下沸

湯亦得

簡茹散治疥經年不瘥

水銀

一兩

好茶

二兩

簡茹

三兩

輕粉

少許

右爲細末每用不以多少油調搽之

苦參散治遍身瘡疥瘡痒經年不瘥

蔓荊子

何首烏

荆芥穗

威靈仙

苦參  
各半分

右爲末每服二錢食前茶酒調下日三服忌發風物甚妙

硫黃散治疥

硫黃

川椒

石膏

白礬

各等分

右為末以生油調搽神驗

狗脊膏治疥

硫黃半刃

雄黃半刃

信一朱

川烏

黑狗脊

白

礬各半刃

巴豆二个

柏脂膏治乾溫癬

右為末先以油熬次下黃蠅調勻搽之效

柏油一片

黃蠅半斤

杏仁

四十五個剉

朴硝一撮

右於鐵器內熬老生葱三根剉煎五七沸濾過成膏

瘡

元顏和卿傳

祛溫散治乾溫癬

牽牛四刃

薄荷半刃

右為末生油調搽之濕者乾摻之

苦參丸治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之

苦參

右為末粟米飯丸如桐子大每服五十丸空心米飲湯送下

土粉散治熱汗浸漬成瘡痏痒痛

粟米粉

二兩

寒水石

服

定粉

各一兩

白石脂

半

生骨

石膏

各半兩

滑石

八兩

蛤粉

九兩半

右為末再研極細每用藥乾搽汗處

麻洗乘七宝散治熱汗浸漬成瘡痏痛不已

黃芩

當歸

防風

木通

荆芥穗

地骨

皮各三兩

右為粗末入白礬生末一兩勿每用一兩水三碗煎五六沸去粗熱洗拭乾避風少時

先師東垣老人路次方城北獨樹店客舍有摧江軸者皮膚破裂不任其痛兩手不能執筆足不能履地停轍止宿因制此方之即效明日遂行

潤肌膏治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能迎風入手屢用奏效故

錄於此

珠子青

四兩

白黃蠟

八兩

乳香

二兩

右於鐵鑄內先下瀝青隨手下黃蠟乳香次入麻油一二匙俟瀝青熔開微上熬動放大淨水盆於其旁以瀝藥用鐵鉗滴一二點於水中試之如硬入香油看硬軟合宜新綿灑於水中擦扯以白為度磁器內盛或油紙裹每用先

火上灸裂口子熟捻合藥亦火上灸軟塗裂口上用紙少  
許貼之自然合矣

煩躁門

發汗吐下后虛煩不得眠若劇者必反覆頭倒心中懊憹梔子豉  
湯主之若汗若下之后而煩熱者胸中窒者亦以梔子豉湯仲景  
云病入舊微溏者不可與之

梔子豉湯

肥梔子

四個碎

豉半合

右水二盞先煎梔子至一盞下豉同煎七分服得吐止后

服

云快利止后腹

殊妙安神丸治心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐胸中氣亂而有熱  
若懊憹之狀皆膈上胃中伏火蒸上而不安宜從確衡法以鎮

陰火之浮行以養上焦之元氣

硃砂

一升另研水飛陰丸

黃連

去頭半一升二分

生地

黃

三分當帰去夢

灸甘草各半錢

右為末酒浸餳餅丸如黍米大硃砂為衣每服十五丸準  
哩送下食后此緩治之理也

內經曰熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去  
心煩除溫熱而為君甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生  
陰血以為臣當帰補血不足硃砂能浮溜之火而安神明  
也

八物定志丸平補心氣安神鎮驚除暯熱痰火

遠志

去心

菖蒲

麥門冬

茯神

白茯苓去核

兩

白朮半兩

人參五錢

牛黃

二錢另研

右為末入牛黃分煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服二三  
十九熟水送下無時

胸膈痞門

人參利膈丸治胸中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯調大便秘結推  
陳致新消飲進食

麋香

一子半

當歸

三末

木香

桔梗

各二子半

人參

三末

甘草

炙五末

厚朴

薑製二刃

枳實

五末

大黃

酒浸培一刃

右為末滴水丸如桐子大每服三十丸食後溫湯送下此  
治膈氣之聖藥也一方湯浸餳餅丸亦可

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸膈欲絕

枳殼去穰炒

桔梗各等分

右咬咀每服一兩水二錢煎至一錢去粗溫服食後

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胸膈宿有水氣頭眩心悸

人參

去芦一

赤茯苓

去皮

陳皮

去白各一刃

白朮

川芎

半夏

湯泡七次各半刃

右為粗末每服四錢水一錢半生薑五片煎至一錢去粗溫服不拘時

通氣湯主胸膈氣逆

桂

去皮三分

生薑

六分

吳茱萸

炒四分

半夏

湯泡八分

大棗

四箇

右咬咀用水一升煎取四合分作三服放溫服之對病增

損

○膈氣噎門

生香散治膈氣反胃諸藥誰堪朝食暮吐暮食朝吐甚者食已轉  
出其效如神

水銀

黑錫各三錢

硫黃五錢

右三味跳內用柳木槌研熬微火上細研為灰取出後入  
丁香末二錢桂末二錢生薑末三錢一處研勻每服三錢  
黃水粥飲調下一服取效病甚者再服

丁香附子散治膈氣吐食

一香半兩

枳榔

一箇重三錢

黑附

一箇重半分  
炮去皮殼

舶上

硫黃去石

胡椒

各二錢

右先將四味為末入研藥和勻每服二錢用飛硫黃一箇  
去毛翅足腸肚填藥在內搘紙五七重裹定慢火燒熟取  
出嚼食後用溫酒送下日三服如不食葷酒粟米飲下不

計時

漢防已散治五噎

官桂去皮

陳皮各一兩去白

漢防已五錢

杏仁浸湯去皮

失一刃

紫蘇

羚羊角

細辛各七半

右七味粗末每三錢水一盞半薑三片煎七分去粗溫服  
忌酸味生冷滑物一日兩服

紅豆丸治諸嘔逆膈氣反胃吐食

胡椒

縮砂

棟丁香

紅豆各二十一粒

右為末薑汁丸如皂角子大每服一丸棗一箇去核填藥  
麵裹煨熟細嚼白湯下每日三服

○心下痞門

大黃黃連湯治心下痞按之濡其脉關上浮者又傷寒天下

後復發汗心下痞寒者表未解也不可攻痞當先用桂枝湯  
解表上解乃可用此湯攻痞

大黃二兩

黃連

黃芩各一兩

伊尹湯液論云大黃黃連黃芩湯三味今監本無黃芩脫落  
之也

右咬咀以煎沸湯二大觥熱浸之一時又絞去粗乘熱  
作二服

大消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

半夏

湯泡十次四錢

乾生薑

炒大黃

砂仁

甘

草各一錢

術苓一錢半

人參

橘皮各二錢

厚

朴製三錢

枳實熟炒五錢

黃連去頭

去焦各六錢

白朮

薑黃各一兩

一方加澤鴟三錢

石為末水浸缸餅丸如桐子大每服五十九至百丸白

湯送下食後

積實理中丸治中脘痞滯氣不宣通積矣停飲食入不化

人參

去芦

乾薑

炮

枳實

麪炒

甘草

炙

白朮

各等分

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯送下湯

化亦得不拘時

三院膈氣丸治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行腸下虛

滿或時刺痛宜服

沉香

大腹子

枳榔

縮砂

各半兩

青皮

去白

陳皮

去白

木香

白芷

蔻

三棱

炮

各一兩

半

夏

湯酒七次一兩

右為末糊丸如桐子大每服三十丸溫水送下陳皮湯亦

得食後

枳實消痞丸治右閏脉浮緊心下虛痞夢食懶倦開胃進食

乾生薑

錢

人參

白茯苓

甘草炙

白朮

麥蘖麴

各二錢

半夏麴

三錢

厚朴

製四錢

枳實

炒黃連

各五錢

右爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸溫水送下無時量虛實加減

○藥戒

客有病瘧者積於其中伏而不得下自外至者捏而不得納從醫而問之曰非下之不可歸而飲其藥既飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘向之掉者柔而不支焦膈導達呼吸開利快然若未始有疾者不數日瘧復作投以故藥其快然也亦如初自是不

過月而痞伍作而伍下每下輒愈然客之氣一語而三引体不勞而汗股不步而慄膚革無所耗於前而其中亦然莫知其所來嗟夫心堵非下不可已予從而下之術未爽也芥然独何如聞楚之南有良醫焉往而問之醫壁曰子無怪是芥然者也凡子之術固為是芥然也坐吾語汝且天下之理有甚快於吾心者其未必有傷求無傷於終者則初無望其快於吾心夫陰伏而陽畜氣與血不運而為痞構于子之胸中者其累大矣擊而去之不須臾而除甚大之累和平之物不能為也必將擊搏震撓而後可夫人之和氣冲然而甚微消乎其易危擊搏震撓之功未成而子之和益已病矣由是覩之則子之痞凡一快者子之和一傷矣不終月而快者五子之和平之氣不既索半故脉不勞而汗股不步而慄芥然如不可終日也且將去子之瘀而無害於和也子歸燕居三月而

後與之藥可為也客歸三月齋戒而復請之醫曰子之氣必後矣  
取藥而授之曰服之三月而疾少平又三月而少康終年而復常  
且飲藥不得亟進客歸而行其說然其初使人願莫因反然而遲之  
蓋三根葉而三反之也然自不見其所攻之效久較則月異而時  
不同蓋終歲而疾平客謂醫再拜而謝之坐而問其故醫曰是醫  
國之說也豈特醫之於疾哉子獨不見秦之治民乎憚不革及性  
而不聽分懼而不勤事故而不畏法令之不听治之不交則秦之  
民嘗瘞矣商君見其瘞也厲以刑法威而斬伐悍厲猛鷙刑利不  
負毫髮彌刺楚限而力鋤之於是乎秦之政如建細幅瓦芦徑流  
通四達無敢或拒而秦之瘞嘗一快矣自孝公以至三世也凡幾  
寤而幾快矣頑者已圯鄙鄙而強者已柔而秦之民無歡心矣史商

公事孝公用商鞅欲變法孝公曰善卒定變法之令令民為什伍  
布相守同連坐不告奸者容與告奸者與斬鷙政同煮鹽者

故猛政一快者歡心一虛積快而已而秦之四支擗然  
徒具其物而已民心日離而君孤立於上故匹夫大呼不終日而  
百疾皆起秦欲運其手足者聳而漠然不我應故秦之亡者是好  
為快者之過也昔者先王之民其初亦嘗忍矣先王豈不知春然後  
擊去之以為遠也惟其有傷於終也故不敢求快於吾心優柔而  
撫存之教以仁義導以禮樂除其亂而除去其滯旁視而薄然  
有之矣然月計之歲察之前歲之俗非今歲之俗也不擊不搏無  
所忤逆是以日去其戾氣而不嬰其歡心於是政成教達安樂久  
而無後患矣是以三代之治皆更數聖人歷數百年而後俗成則  
予之藥終年而愈疾蓋無足恆也故曰天下之理有快於吾心者  
其未也必有傷求無傷於其終則初無望其快吾心雖然豈狃於  
沿天下其客再拜而記其說

○心胃痛及腹中痛

草苴葛丸治因飢餓勞役致脾胃虛而心火乘之不能滋榮心上焦元氣衰敗因過冬天腎與膀胱之寒水大旺子能令母實肺金大旺相輔而來尅心乘脾故胃脘當心而痛此大復其難故經云大乘必大復理之常也故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又以大寒大燥二氣併而乘之其人苦惡風寒耳鳴及腰背相引而鼻內苦息肉不通不聞香臭額寒腦痛目時眩寒水反乘脾土痰哩沃沫飲食反出腹中常痛心胃痛肠下急縮有時而痛脹不能伸大便多泄而不祕下氣不絕或腹中嗚胸中氣亂心煩不安而成霍亂之意膈咽不通極則有聲鼻中氣短遇寒發甚或居暖處方過口吸風寒則復作四肢厥逆身躰沉重不能轉側頭不可以顧小便澀而欠此脾虛之至極也

搗皮

八分

殼麥

八分

草笪蕊

四錢

麴米

熟去皮

澤鴻

一分

青皮

六分

吳茱萸

八分

流去苦焙

半夏

一錢

黃芪

八分

益智仁

八分

人參

八分

麵末

炒四分

當歸身

六分

生甘草

六分

薑黃

四分

桃仁

湯浸去皮去核

一分

柴胡

四分

詳賜下痛多用

大麥蘖

一錢半

炙甘草

六分

右除桃仁另研外餘同為末入桃仁研匀湯浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸熱白湯送下旋斟酌虛實多少用之神保丸治心膈漏腹脹氣痛血積痛

木香

胡椒各一分

乾蝎

七分

巴豆

去心膜油十个

右為細末入巴豆霜令勻湯浸蒸餅為丸麻子大珠砂為衣每服三九薑湯下

止痛散治心氣痛不可忍

良薑

五兩

茴香炒

甘草

各一兩半

丁香

半兩

右為末每服二錢沸湯點服不拘時

失笑散定心氣痛不可忍小腸氣痛

蒲黃

炒香

五靈脂

酒研淘去砂土各等分為末

右先用醋調二錢熬成膏入水一錢煎七分食前熱服  
三薑丸治心脾寒溫養脾胃療冷食所傷

乾薑炮

良薑

右二味等分為細末麵糊為丸桐子大每服二三十丸食

後陳皮湯下妊娠不宜服

七氣湯治七氣為病內結積聚心腹絞痛時發時止

人參

官桂

炙甘草各一兩

半夏五兩

右咬咀每服三錢水一大瓣薑三片煎七分稍熱服

益智散治冷氣奔衝心腸脛腹脹痛絞痛

川烏四兩

益智二兩

乾薑半兩

青皮一兩

右咬咀每服三錢水二錢入鹽一捻薑五片棗二箇同煎至八分去粗溫服食前

茱萸丸治脾胃虛冷嘔逆醋心脹悶不決大效

官桂

二兩

草蔻

草澄茄

各一兩

厚朴

薑製一兩

胡

椒

各一兩

黑附子

炮去皮脐半兩

乾薑

炮一兩

吳茱

萸

陳年三兩半酒少許洗炮

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九食前溫米飲送下

日二服

高良薑湯治心腹疼痛如刺兩脅支滿而悶不可忍

右㕮咀以水一升煎取四合強人分作二服劣人作三服  
一眼痛定后服对病增損

胃脘當心而痛治驗

兩浙江淮都漕運使崔君長男雲卿年二十有五体本豐肥奉養  
膏梁時有熱證友人勸食寒涼物及服完涼藥於至元庚辰秋病  
瘧久不除醫以砒霜等藥治之新吸水送下禁食熱物瘧病不除  
反添吐利脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不  
止其舌萎易醫藥未嘗有效至冬還家百般治療而不瘥延至四  
月間因勞役煩惱过度前證大作請予治之具說其由診得脉弦  
細而微手足稍冷面色青黃而不澤情思不樂惡人煩冗飲食減  
少微飽則心下痞悶嘔吐酸水發作疼痛冷汗時出氣促悶亂不

安須人額相抵而坐少時易之予思內經曰中氣不足便為之  
变腸為之苦鳴下氣不足則謂痿厥心惡又曰寒氣客於腸胃之  
間則卒然而痛得灸則已久者熱也非其辛大熱之劑則不能愈  
遂製一方名之曰

扶陽助胃湯方

乾薑

炮一兩半

棟參

草荳蔻仁

甘草

官桂

白芍

桑各一兩

陳皮

白朮

吳茱萸

各五分

黑附

手炮

去皮二兩

益智仁

五分一方一分

右咬咀都作一服水三錢生薑三片棗子二箇煎至一錢  
去粗溫服食前三服大勢皆去痛減過半至秋先灸中脘  
三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮血脉  
以還少丹服之則喜飲食添肌肉潤皮膚明年春灸三里

二七壯乃胃之合穴也亦助胃氣又引氣下行養以芳薑  
助脾復以育氣湯加白檀香來治之戒以懲忿寧欲慎言  
語節飲食一年而平復

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱  
溫中散寒故以為君草豆蔻仁益智仁辛甘大熱治客寒  
犯胃為佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮橘皮苦  
溫補脾養氣水狹木勢亦來侮土故作急痛桂辛熱以退  
寒水若藥味酸以鴻木來克土吳茱萸苦熱泄氣上逆  
於胸中以為使也