

識

病

捷

法

識病捷法卷之三

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

癆瘵

有七十名不治  
証二十名

勞瘵之證非一端嗜慾不節起居無時七情六慾之火時動於中飲食勞倦之過屢傷乎身體漸而至於真水枯竭陰火上炎發為蒸之熱或寒熱進退似瘵非瘵名曰蒸病是也雖名狀多端大抵不過寒熱來往咳嗽吐痰咯血自汗盜汗在葦不愈

精瘵

為疔羸成癆瘵之候此陰虛之極瘵與血相共病所謂有蟲蠅者有傳尸者身體羸瘦者屬淫火肉脫憊虛者屬氣衰共難救古有云傳變二十四種或三十六種及九十九種等皆是也今夫七十名不治証二十名以證之

○總脈

凡此病先診胃氣和緩脈為第一義古人之神氣是也

生脈

八道

寸口脈浮而遲浮則為虛遲則為勞虛則銜

氣不足浮則榮氣衰脉脉直上衝者逆虛

惡脈 二道

脉微濡相搏為疴極 微弱相搏為七傷  
皆是不治之惡脉也

○治法

凡疴瘵發熱有氣虛血虛之分晝甚而自汗倦  
怠當補中祐氣 血虛則盛于下午脉救疾  
口燥渴當養血滋陰 今人但見發熱即用  
柴胡不知柴胡走泄之藥惟肝膽有實火者  
宜之哉

腎虛虧骨痿不能行宜加味虎潛丸 氣虛則  
生脉散不言白朮 血虛則三才丸不言四

物湯

凡虛弱人須以人補人河車人乳紅鉛俱妙  
凡緩心和氣人可用租暴菜者恐反助火可謹  
矣

凡虛而熱在外者八物湯加軟柴胡地骨皮  
凡虛而有疼者八物湯加陳皮貝母或姜製羊  
菱花粉類

凡虛而暈不運者八物湯去地黃加陳皮山查

神麴香破之類此治虛勞示其端倪耳臨病  
增損原無一定法

○忘食

濕麵

雞肉

生冷

魚鮮

油膩

狗脊

笋

茱萸

茄子

○不治證

二十名

肉脫骨立癆

抓惑聲啞癆

吐蟲氣少癆

尸瘵脉絕癆

羸倦無智癆  
虛勞吐血癆  
滑泄不禁癆  
精竭血枯癆  
飛尸遁尸癆  
肺癰失音癆  
久嗽肺痿蒸  
噴血虛微癆  
五臟崩損癆  
咯血煤黑癆

亡軀瘦絕穀癆  
脈脫絕汗癆  
喘促脫脈癆  
控手暴熱癆  
聲啞乾枯癆  
上吐下瀉癆

○灸熯法 七條

崔氏四花六穴灸法 見未卷

專治男婦五勞七傷氣血虛弱骨蒸潮熱  
形容憔悴咳嗽痰喘五心煩熱四肢困倦如諸

風體弱諸氣尪羸久病痼疾形體虛弱者並

宜灸之

腎俞二穴

在第十四椎下兩旁各一寸半上痛

小便

好獨身冷如冰遺精溺血五勞七傷脚膝痠疼痺針三分灸三壯

大椎一穴

在第七椎

膽俞二穴

在第十一椎

胃俞二穴

在第十椎

旋俞二穴

在第二十椎

三焦俞二穴

在第十三椎

○方治法

掩殭癆

令人羊卧羊起甚則寒熱往來積聚為痛○服

河澗柴胡飲子

花風病

寒熱進退而不樂或咳嗽時發沉之不語怡顏  
痲或腹中疼○服柴胡仰肝散

火熱癆

熱蒸久不愈遂變骨蒸瘦弱 ○秦艽鱉甲散  
或十味人參散

風癆

感外邪連日不愈發蒸熱生咳嗽聲音不清○  
參蘇飲或加減瀉白散

瘧碎病

瘧疾連歲不愈及骨蒸盜汗壯熱或增寒 ○服  
鱈甲飲或人參狼胃湯

瘧碎病

咳而喘鳴一身麻痺或虛浮時吐痰沫 ○服  
導痰湯或青列白九子

寒熱病

午后潮熱不食時咳嗽夜卧不安 ○服地骨  
皮和穀散

憂思病

思慮傷氣善驚好怒時蒸熱而咳嗽 ○服良方潤神散

酒癖癆

酒客者腸下生酒蟹瘕往來寒熱蒸之不止 ○服葛花解醒湯或枳椇子煎汁

陰虛火蒸

房勞傷精液則虛火每熾而咳唾相粘失精 ○服拯陰理勞湯

肺痿

勞證久嗽不止漸變肺癰肺痿 ○服濟生方

桔枝湯或葶歷散

飲食癆

內傷脾胃之氣憊脫漸為咳嗽生蒸熱者○服  
升陽順氣湯兼保和丸

滯氣癆

一氣不流行則頰下為瘰癧往來蒸熱○服分  
氣紫蘇飲

血痺勞

令人膏腠甲暗類痺骨立脫肉而蒸熱○服全  
置大黃廬虫丸

毛髮癆

血枯血乾骨蒸不治則毛髮禿落而不生古云  
鬼試頭○服人參狼朮湯或髮生地黃丸

蟲蛔癆

唇赤色筋脉掣痺而青筋貫串於小腹好食土  
塊○服理中安蛔湯或三因神授散

徵毒癆

傳染於徵毒不愈筋骨疼痛破爛有日遂為癆  
○服仙異合齋良湯

暑癆

感傷於夏暑不治則生澼蒸咳嗽不止自汗○  
服參朮調中湯

麥煎瘵

兒孩時暴熱俗云夏蒸若不發於此蒸則至成  
童為瘵○服紫圓或蟹甲散

燥瘵

為秋燥所感延至蒸者咳嗽虛羸遂致脫○服  
清燥湯

邪崇瘵

登神廟古塚發狂熱謔言妄語不止往來寒熱

累日不愈○服五蒸湯

肺癆

洒之惡寒甚則蒸燀而咳嗽吐辛酸汁目中如有所見○服清肺湯

心癆

令人煩心欬飲水不渴或狂走發驚而咳嗽小便頻之失○服火劑湯

脾癆

沉之而不樂嘔吐不止日晡所蒸熱腹中鳴動時痛時止○服氣湯

肝癆

令人怒或腰腿痛不能於伏仰小便澀少如癰  
時蒸熱而咳○服秦艽鱉甲散

腎癆

筋骨疼遺精獨因於竅戶好靜或咳而吐血○  
服鱉甲地黄湯

胃癆

舌下苦直不得咽唾或早晨發咳不止十指不  
用○樂令建中湯

小腸癆

忽々驚忘大便苦難卒發煩燥小便頻咳而吐  
苦酸汁○猪苓湯

膽癆

面目慘青口苦精神不守目視不了明時々驚  
恐而咳○服薰甲散

大腸癆

短氣而四肢虛腫鼻不聞香臭時滑泄無度○  
服參苓白朮散

膀胱癆

小腹微痛胞脹癰或小便澀痛餘瀝腰中冷如

望水中○服紫苑湯

三焦癆

咳脹滿不飲飲食氣逆面腫不小便大便滑泄

○服黃耆湯

浮腫癆

經絡既虛受於風濕皮膚膏肉塞榮衛不利○服  
補中治濕湯

秘結癆

腸胃有風熱故也腸裏肥滿則秘結不開時煩  
熱○服潤燥湯

淋閉癆

發達甲膽之氣癢則下流而不升故發淋閉而  
不通令陽氣上昇則癢○服升陽益胃湯  
小便不利癆

膀胱津液之府而主水膀胱虛則胞中冷故小  
便難○服金匱腎氣湯

白濁癆

勞傷於腎則腎氣虛冷故小便數而白赤濁或  
時莖中痛○服草薢分清飲

下血癆

勞憊及於藏腑內崩流傳於下腸則下流於鮮  
血○服槐花散

嘔逆癆

勞傷不安則脾胃失職胃為水穀之海今既傷  
敗不勝水穀故呃逆○服安胃湯

煩悶勞

由陰陽俱虛陰衰陽勝暴則乘於心部故煩悶  
不安○服清心仰瞻湯

舌腫癆

心候舌也血虛為滯熱所乘又脾之大絡出於

舌下心脾有熱故令舌腫○服升麻柴胡湯  
唾血癆

崩損湧噴逆為唾血時煩熱進退不止或咳唾  
帶紅絲血○服花蕊菜石散

凝唾癆

虛勞久則津液凝結於咽喉是腎氣不足故也  
液為唾止焦熱蒸故也○服貝母散

夢泄癆

腎虛為邪所乘邪客於虛夢交接虛憊不制精  
液故泄精○服檉樹根丸

尿精癆

腎氣衰憊故也腎藏精氣從於陰故因小便而  
精漏 ○服金鎖匙丹

尿血癆

勞衰而蘊於蒸熱血滲於胞更濕蒸則為尿血  
且澀痛不可忍 ○服琥珀散

失精癆

腎藏精脫不能藏於精故精自然漏失尤七損  
之一也 ○服秘精丸

目暗癆

肝血虛則目暗或雀目寒熱發作蒸之盜汗或  
善怒時尖明 ○服平肝散

不眠病

藏腑尚虛榮衛不和陰氣虛衛氣不行於陽不  
入於陰故不眠 ○服三因溫膽湯

驚悸病

心者藏神而主血脉勞傷血脉則令心氣悸動  
謂之驚悸病 ○脈天王補心丹

髓筋病

勞傷血脉則膚腠空疎而血筋橫解髓脈敗乏

不能於步履 ○服還少丹

皮剝癩

皮膚粟起而不因於汗孔自汗濡衣夜間盜汗  
腠理麻澁 ○澡洗湯

痺厥癆

一身頑痺痲痺而不知於痛痺漸至勞益羸氣息  
虛微 ○蠲痺湯

疝結癆

疝者少陽甲膽病也不治則勞疝而生血筋  
之病 ○烏苓通氣湯

偏枯癆

勞損人體虛弱感於風邪邪氣乘虛客半身故  
手足不遂云偏枯癆○服人參補氣湯

濡濕癆

感冒於水濕連日不治則蒸鬱而不散或得泄  
滑腸遂變生勞羸○服升陽益胃湯

滯下癆

痢疾二三歲延及數歲不愈遂成勞疾往來蒸  
熱咳嗽云痢癆○伏龍肝丸

羸虛癆

血液乾涸不潤澤四肢柴瘦骨立如鬼能食而不能於坐卧 ○ 癩肝丸還少丹

瘦神癆

謀慮不決而曲蘊神氣善忘古本強而不能言語嗑咽闭 ○ 服天王補心丹

癥瘕癆

積聚盤結而不遷或心下痞塞充脹癆結而墜痛遂發寒熱 ○ 服枳殼散

臌血癆

肺癆連日不治發血不止往來蒸熱咳嗽稠粘

紅疹聲嘔 ○服麥門冬散

陰冷疔

腎虛脫則陰莖濡弱而骨節痿弱步履艱難  
精冷故也

陰痿疔

腎同於亥故陰腎衰則不能於榮琅故陰器痿  
淡而不用婦人陰疔 ○腎氣丸科

陰瘡疔

腎經虛而多含於陰邪或下疳破爛不收故常  
癩疾云陰瘡疔 ○服何首烏湯

瘡瘍癆

瘡癩多日不愈血氣憊虛四肢瘦弱夜則咳嗽盜汗不食之瘵勞○人參熟地湯

小兒疳癆

幼兒疳疾連日不愈漸四肢瘦細腹大頸細遂成疔嗽有五種五歲之月○治法錢長為宜

嬰孩疔癩癆

由哺食過度脾胃衰弱血氣減少不榮就因而

柴碎羸露○癩肝丸

產婦瘵癆

產后虛羸喘促如瘧四肢柴瘦水谷之精減損  
無以榮其血氣○服當歸羊肉湯

崩血瘡

產後敗血壅滯令人浮腫或畜血妄行為崩漏  
不可作水治行其氣血○服猪脰飲

傳症瘡

勞瘵伏匿於腸頃覺憔悴夢寢顛倒尸魂揚之  
傳傍人早不治至○服青桑枝湯

河澗柴胡飲子

治一切積熱及傷寒

柴胡

人參

黃芩

甘草

當歸

芍藥

大黃 各等分 右以咀 每服七錢水三盞煎一盞

柴胡 仰肝散 治癆居多不遂 柴胡 獨陰無陽

蒼朮 香附 山梔 地骨皮 赤芍 丹皮 稽麥

柴胡 檉青皮 二錢 川芎 七分 神麩 生地 連翹 鉉

**煎空** 心温服

人味人參散

人參 白朮 茯苓 半夏 耳草 當歸

赤芍 葛根 柴胡 醋黃芩 羊齒 水煎服

參蘇飲 見未卷 加減瀉白散 見未卷

人參 類胃湯 導痰湯 見痰飲門

青外白九子 見中風門

地骨皮 枳殼散 治肉消瘦壯熱 地骨皮 枳殼

秦艽 柴胡 知母 當歸 鱉甲 等分各

每帖七錢水二盞用桃柳枝頭各七莖蒸二片

烏梅一箇煎八分臨臥服

良方潤神散 治癆瘵增寒 人參 黃耆 桔枝

麥門 淡竹葉 炙耳草 入麥同煎溫服

葛花解醒湯 治飲酒大過 白蔻 砂仁 葛花 等分

木香 者青皮 白茯苓 陳皮 猪苓 大麥 等分

白朮 神麴 澤瀉 乾姜 豉 水煎或為末服

丹溪曰治酒病用痰火消熱藥過多不効者須從

治之用藥中加枳椇子黃連多加薑汁

極陰理勞湯治陰虛火動生地二錢當歸 麥冬

牡丹 陳皮一錢白芍 人參六分薑蔥一錢 蓮肉一錢

五味二分耳草一分 粳米一匙 水煎徐之服

桔枝湯治肺癆咳嗽 桔枝 貝母 薏苡仁 百合

燕當歸 枳殼 瓜蒌仁 桑白皮一錢 黃芪一錢

耳草節 杏仁一錢 附子七分 水二盞 薑五片 煎

葶歷散治肺癆 葶歷 芍藥 百合 白附子 北土

味子 耳草節 人參 欒冬 百葉煎

紫苑

羊蒿

朱砂

二錢半  
另研

右為細末每三錢燻心湯下

升陽順氣湯

見未卷

保和丸

見未卷

分氣紫蘇飲

見未卷

大黃廔虫丸

見未

人參粳米湯

見未卷

髮生地黄丸

見未

理中安蛔湯

見虫門

三因神授湯

治傳屍

川椒

二斤  
去子  
并合

右為

細末米湯下一錢必麻痺暈悶次浸如不能禁

以酒糊丸梧桐子大空心服五十粒

仙果令湯

治癰瘡

毒節骨

土伏

治風

木瓜

木

通 薏苡

白鮮皮

金銀箔

皂子

另水煎服

參朮調中湯 見咳門

千金方紫圓

見未卷

鱉甲散

治虛勞

鱉甲

醋炙

當歸

赤芍藥

紫葳

見未卷

桔校

耳草炙 人參醋 麝香

五分

杏仁

去皮

胡黃連

三錢

官桂

錫砂炙

地骨

一錢

木香

研宣連

一錢

真酥

三兩

白破密配 右為細末 用青蒿乙斤 煮便五升 加

酥戊膏 搜和為丸 梧子大 每十五丸 溫酒下

清燥湯

見未卷

清肺湯

見未卷

五蒸湯

治眉蒸

耳草

銜

蒼苓

二錢

人參

一錢

竹葉

生地黄

葛根

銜

知母

黃芩

銜

梧子

三錢

石膏

三錢

右咀

每八錢

水二鐘

鍾

錢半

溫服

七錢

火劑湯 見未卷

胞氣湯

秦艽鱉甲湯

鱉甲地黃湯

同上

樂令建中湯

治藏腑  
虛損

前胡

細辛

當歸

白芍

人參

橘紅

桂心

麥冬

黃芪

蜜炙

茯苓

耳草

八分

羊復

五分

右作

一服

水二

盞

姜枣

水煎

猪苓湯

見未卷

鱉甲飲

參苓白朮湯

見脾胃

紫苑湯

黃耆湯

補中治濕湯

潤燥湯

升陽益胃湯

金匱腎氣湯

旱藪分消飲

槐花散

治腸風下血  
藏毒

槐花湯

側柏葉

荊芥穗

枳殼

麸炒各等分

為末每服二錢空心茶飲調下

安胃湯

治脾胃虛弱吐瀉

人參三錢藿香

丁香各一錢陳皮

右為細末每服二錢善湯調服

清心仰瞻湯

升麻柴胡湯

花葉石散

治五藏崩損滯血

花葉石

煨為末

右用童便

一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食后服

貝母散

治久嗽虛寒

貝母湯汁

五味子 桑白皮

黃芩

陳皮各一錢羊隻

甘草炙桂心

柴胡

木香

各一錢

杏仁去皮十粒

乾姜

炮

右咀姜三片水煎

櫻樹根丸

治夢遺

櫻根皮 福良姜

三錢 黃蘗

芍藥

破在性  
各二錢

右為末神麴糊丸梧子大每三十九

金鎖匙丹

治男婦  
精池

茯苓

茯神 遠志

龍骨

三錢

左股牡蛎

右為末酒糊丸梧子大每四十九

琥珀丸

治便淋

琥珀

海金沙

沒藥

蒲黃

右為末每服三錢食遠通草湯服為丸可

秘精丸

治之氣  
固遺精

大附子

龍骨

肉從蓉

酒浸

牛膝

酒浸

巴戟 磁石為末煉蜜丸梧子大每三十九

平肝散

見未

三因溫膽湯

天王補心丹

還少丹

見未卷

燥洗湯 治一切風 乾荷葉 蒿本 耳松 白芷

威靈仙 蒼耳草 忍冬藤 煨鹽 每用三

面煎水一桶去滓送服次自愈

蠲痺湯 治手足冷痺 當歸 赤芍 黃耆 羌活

羌活 芍藥 甘草 右水盪羊薑五片紅棗一枚

烏苓通氣湯 人參 粳米湯

伏龍肝丸 獾肝丸

枳殼散 治五種積氣 枳殼 益智 陳皮 三稜

我木 枳郎 肉桂 肉豆蔻 厚朴 青皮

木香 乾薑各五合 作一服 薑枣水煎

麥門冬散

治瘧痢

麥門

生地

白芍

蒲黃

右水二盞姜五片煎八分食后溫服

何首烏湯

當歸羊因湯

猪腰飲

治瘧婦

猪腰

白芍

當歸

水煎

青桑枝散

治蛔取虫

青桑枝

柈枝

桃枝

梅枝

長四寸  
各七莖

青高

石榴皮

赤箭

鬼臼各五兩

右用童便一升羊葱白七莖煎至一羊另入安

息香阿槐旆煎一盞調辰砂一分射香一字服

虛損

# 虛損

有二十二名  
不治証十名

虛損之證多由色慾過度善怒不節起居不時飲食恣飲有所勞傷皆其元氣氣衰則火旺火冷則乘其土而胃氣散解不能滋營百脉灌注藏腑衛護周骸故虛損之証生焉病則百脉橫解腰脚疼軟胸滿氣短必煩不安耳鳴目眩咳嗽寒熱夜作盜汗遺精白濁殮泄食少無味不為肌膚或瘡中驚悸午后潮熱倦怠無力此皆虛損之候也

○生脉二道

緩而有力

緩而有神

○虎脈三道

細而虛

微而濡

弱而微

○不治証十名

百脈至空虛死

血脫兼脈實死

絕穀而脈盛死

卒然發大熱死

脫肉共脫者死

瘦衰骨立者死

臍尻生眠瘡死

大孔如竹筒死

望卧發虛喘死

口鼻氣清冷死

○治法 二十二名

肺虛損 短氣而面虛腫鼻乾不聞於香臭 ○

服十全大補湯

肝虛損 面目乾黑口苦精神不守眼目不明 ○  
服三才丸

心虛損 忽々喜恐大便苦難或時鳴澹口瘡 ○

服天王補心丹

脾虛損 舌本苦不得於咽喉四肢浮腫 ○服

黃耆建中湯

腎虛損 背難以俛仰小便不利色赤黃而餘瀝

○服補腎丸

氣虛極 令人肉虛五藏不足正氣少不欲言語

○服補中益氣湯

血虛極 其人無顏色眉髮墜落忽之善忘 ○

服八物湯

筋極虛 數轉筋十指爪甲皆痛不能於久立 ○

服虎潛丸

骨虛衰 令人瘦瘦無潤澤飲食不成於肌膚 ○

服還少丹

肌虛極 羸瘦無潤澤飲食不為於潤膚 ○服

補肺湯

精虛損 令人少氣喘々然內虛 毛髮禿落 ○

服腎氣丸詳

三焦損傷 虛損及上中下失類 上吐下泄百疾  
生 ○服人參瓊朮湯

病后虛憊 大病之後藏腑尚虛 榮衛不和 生癢  
病 ○服升陽補氣湯

脫汗搔 藏腑損敗 絕汗不止 百脉大虛 ○當  
歸六黃湯

咳嗽損 五藏之虛 咳不止 則皮膚凍漏而自汗

○服蛤蚧散

過食損 過殮於生冷或飽食無置脾胃再敗○  
服調中益氣湯

思慮損 謀慮不決而勞傷心肺則百損時來○  
服歸脾湯

恐驚損 觸事易恐肝虛腎損之脫虛也 ○服  
寧志丸

婦人敗血 產後畜血生病則崩漏帶下之敗虛  
○服蕪芎歸膠艾湯

邪祟傷 被附托鬼魅狐貓漸虛衰則百証隨時  
生○可投大補劑

外傷損 傷損打撲湯火傷之類不愈漸之及脫

虛與內損同治可隨宜

○隨証藥方

十全大補湯

三才丸

天王補心丹

建中湯

補腎丸

黃柏

龜板

各三兩

杜仲

味炙

牛膝

陳皮

乾薑

各五分

五味子

少許

右為

細末

汁補丸或酒糊丸溫酒或白湯下

補中益氣湯

八物湯

虎潛丸

還女丹

補肺湯

腎氣丸

人參養榮湯

升陽補氣湯

當歸六黃湯

人參蛤蚧散

治虛勞

蛤蚧酥炙

人參

百部

欬冬

紫苑各半兩

貝母

黃耆

阿膠炒

鱈甲酥炙

紫朮

半夏

杏仁去皮

肉桂

甘草

以醋

右咀每服五錢水二盞毒三片水煎服

歸脾湯

寧志丸

羌歸膠艾湯

# 吐酸

吐酸

有十名

經云諸嘔吐酸皆屬於熱或云少陽之勝吐酸酸者肝木之味也由火勝金金不能平木則肝木自甚故為酸譬如熱天飲食則易於酸矣是以肝熱則口酸也

○總脈

脈微遲者從寒治

脈數弦者熱之甚

洪而數為熱痞在膈時吐酸水飲或反胃

○治法 十名

火鬱吐酸 火鬱於上部則木邪發動吐酸木味  
一酸故也○服吳茱六乙散

寒鬱酸水 久病脾胃虛弱虛鬱故酸水○服補

中益氣湯

脾胃虛吐水 中脘宿食留飲酸摯心疼而吐酸

○服鞠耒丸

疼逆湧酸 疼飲鬱積於上膈則吐出疼沫○服

二朮二陳湯

傷酒吐酸 一時宿酒吐酸胸痛古云酒客病○

葛花解醒湯

濕蒸吐水 水濕感傷於人則氣怙煩熱而吐酸

○服連苓茱萸湯

氣鬱吐水 鬱胃於六氣則默々不語時煩逆而

吐 ○服大七氣湯

反胃吐苦 頑疼逆於中脘心下盤鬱而吐食及

吐苦汁 ○服半夏瀉心湯

虫蠱吐酸 虫蛔動搖則腹痛發作而吐水 ○服

理中安蛔湯

遠食吐酸 妊娠惡心阻食心下痞亦時吐酸 ○

服安胎散

○治病菜方

丹溪茱萸六乙散治吞酸 吳茱萸 蘇枳 六一散 二

右以粳米飯九梧子大每服五六十九白湯下

補中益氣湯 二朮二陳湯 大七氣湯

半夏瀉心湯 理中安蛇湯 安胎飲

葛花解醒湯

麴末丸治中脘 神麴各三兩 陳皮 蒼朮炒 右為

細末姜汁另煮神曲糊丸

連苓朱萸丸 見末卷

# 疾飲門

有二十二名  
不治証十名

疾之為疾誠多也何則人之血氣流行無一息之間斷絕有壅滯津液積鬱而成熱疾遂生焉因証而觀病則火之變出也明矣未有疾病而不因火而成者也留飲積畜而不散亦為病其証候千百而多端也

○總脈二道

右關脈滑大緩有神  
緩滑而有流理神氣

○惡脈二道

沉滯而澁滑

微芤而湲滑

○不治証 十名

疼咳小便則發微喘  
絕食脈芤大而喘急  
頑疼吐沫淚泪亡者  
疼臨腹中霍絞或疼  
厥疼絕汗眩而脈大

疼中帶敗血脈沉  
卒中作聲如索鋸  
黑疼帶血聲啞  
疼下流為泄脫汁  
肺虛甚自汗下瀉

○治法 二十二名

氣疼 濕在肺經謂之氣疼 ○服小羊芩湯  
火疼 濕在心經謂之火疼 ○服滾疼丸

風疼 濕在肝經謂之風疼。○服化疼湯  
濕疼 濕在脾經謂之濕疼。○服二陳湯  
寒疼 濕在腎經謂之寒疼。○服桂苓木耳湯  
酒疼 因酒飲所得為酒疼。○服青黛二陳湯  
懸飲 喉中有物咯不得謂之老疼。○服瓜蒂湯  
溢飲 飲水流於四肢當汗不出。○服澤瀉湯  
支飲 心下支飲吐涎沫。○服五苓散  
伏飲 振之惡寒身暈惕々然。○服半夏橘皮湯  
留飲 在心下飲癖在脘下疼塊。○服五飲湯  
積痰 留飲積蓄不散心下痞。○服半夏瀉心湯

食積痰 肉厚味多燻過多 ○服茯苓丸

眩運痰 頭眩眼前黑暗如坐舟車 ○服天麻湯

嘈雜痰 凡人胸膈時如火如炙 ○服三仙丸

煩燥痰 似熱非熱似寒非寒心煩伏苓半夏湯

顛狂痰 忽然發狂語言錯亂服麩痰散

小兒驚風 多是痰隨証取宜

中風不語 痰飲流入經脈偏枯麻痺 隨症

婦人驚悸 產后觸事為驚 ○隨証進劑

老痰 頑痰流在周骸為百怪痰 ○滾痰丸

蔚痰 氣滯為結痰宜用蔚噴氣 ○服分心氣飲

○藥方

小羊复湯 治心下

羊复 土麥 生姜 二麥三

水煎入姜

滾痰丸

化痰丸

二陳湯

桂苓木耳湯

青黛二陳湯

瓜蒂枳實湯

澤瀉湯 治支飲

澤瀉五苓 白朮 二麥

右水二盞

煎七方食遠溫服

五苓散

羊复瀉心湯

五飲湯

羊复橘皮湯 治痰飲

陳皮 洋而

羊复 二麥

右水二盞姜五片煎八分溫服有熱加甘草

伏苓丸 治痰飲

羊复 茯苓 二面

枳殼 治痰

風化硝

三麥羊

右為細末，薑汁糊丸，梧子大。

羊隻白朮天麻湯

分心氣飲

三仙丸

治痰飲胃  
膈不刺

南星

羊隻

香附子

鹽酒

右用南星、羊隻泡過，為末，用生薑自然汁和用楮葉或荊葉包住，以蒲包合，於黃色收之，再星二兩，香附一兩，同為細末，煮麩如菜豆大，每服四十丸，食后薑湯下。

茯苓羊隻湯

治胃虛有痰

茯苓

羊隻

白朮

袖翅

母蛤麥芽

去羊

陳皮

天麻

水煎

薑一片

駢痰飲子

治痰飲

南星

羊隻

陳皮

去白

種聚

青皮

藜蘆

鉛五

右毒七片棗

一枚水煎

八味順氣散

通身痲湯

分心氣飲

# 積取水門

有十四名

巢氏曰積聚癰結者是五藏六腑之氣已積聚於  
內重因飲食不節寒溫不調邪氣重沓牢癰堅結  
者也若久即成癥今夫積聚之候因七情五志及  
飲食因飧而成者多矣素難所釋之意蓋以五行  
生剋之理推其理勢之有而者演而成文初不必  
論其情感亦不必論其還不還與其然否也讀者  
但以所勝傳不勝及王旺者不受邪遂留結為積  
治之可矣按有積為積或聚或散為聚有食積有  
痰積有虫積有血積之癖之微之微之塊其大略  
也

○總脈

四道

脈駛而緊者積聚也  
脈弦而緊細癢癢也  
脈浮而牢急亦積也  
脈牢強平者吉脈也

○惡脈

二道

虛弱而沈者死  
沉遲而中散者死

○法則

凡大積大聚其可犯衰其大半而已

凡堅者削之留者攻之結者散之客者除之上者下之摩者活之薄之部之開之發之適事為故

凡治積不可峻用下藥正氣虛者愈損真氣積久不去必先服補藥救次然後攻之或用磨積藥漸而消除融化可也

凡積塊在皮裏膜外須用補氣行氣開之達病加補氣藥先須斷厚味

凡積病下之不退當用消積藥融化開則消

○灸法

命門俞 二穴

期門 二穴

關元 一穴

章門 一穴

氣海 一穴

○治法

肝之積 號肥氣在左脇下如覆杯有頸足久不

愈令人發咳逆痞癥 ○服肥氣丸

心之積 名伏梁起臍上大如臂上至心下久不

愈令人煩心 ○伏梁丸

脾之積

曰痞氣在胃脘大如覆盤久不愈如覆

盤久不愈令人四肢不收發黃

○服痞氣丸

肺之積

號息責在右脇下覆盤如杯久不愈令

人洒淅寒熱喘逆骨痿少氣

○服息責丸

腎之積

稱奔豚發小腹上至心下若豚狀上下

無時久不已令人骨痿少氣

○奔豚丸

食積聚

脾胃不和中滿膨脹或心下上脘時疼

痛

○服三稜丸

酒積癖

口唇乾燥目黃小水不利咽高亦不通

食少

○服草豆蔻丸

氣積聚 噎氣吞酸心下痞結而不通大便亦秘

夜不睡 ○服木香化滯湯

痰僻積 唾沫稠粘肩背痛不能回顧或手足麻

痺 ○服導痰湯

血瘀積

小腹急痛發作有時引脘下 ○服桃核養氣湯

蛟蛔癖

肚腹斗大上膈腹循之戚々隱痛 ○服芫荽湯

茶飲茶癖

心腹脹滿氣刺疔痛 ○服茶癖飲

牙瘕

噎氣吞酸腹急痛瘖作有時 ○服保和丸

鯨魚瘕

腹中瘕結而如鯨形是多食鯨肉及多爛等解  
冷不消故生 ○取白馬尿服之果愈

○附髮瘕 徐文伯序德秀薦好鑿術宋明帝  
宮人患痛牽心祭則氣絕諸醫以為肉瘕文伯  
視之曰此髮瘕也以油灌之即吐物如髮稍長  
引之長三尺頭以成蛇又能搖動懸在水漚盡  
惟餘一髮而已遂愈

○蛇瘕 隋有患者嘗飢而吞食則下至胞便  
即吐也醫作噎疾昂氣翻胃三候治之無驗有  
尤匠任度視之曰非此三疾蓋因食蛇肉不消  
而致斯疾但揣心腹上有蛇形也病者曰素有  
大風嘗求蛇肉食風稍愈後患此疾矣遂以七  
硝大黃合而治之微泄利則愈醫皆請其驗而  
知蛇瘕也

○瓢瘕 果蓏劉子平妻腹中有塊如瓢十八  
年矣經水斷絕諸法不治戴人令一月之內涌  
四次下六次所去瘕約一二穉其中有不化之

物如葵菜者烟魚腸之狀覺病積如割漸之而平及積既盡塊痕如窪如白畧無少損至是而面有童色經水復行

○飲癯 許叔微患飲癖三十年始因少年夜坐寫父左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒救盃又向左卧吐時不覺三五年後覺酒止從左下有聲腹痛食減嘈雜飲酒半盃即止十枚日必嘔酸水救於暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方罔效中病止得月餘後作其補如天雄附子礬石葶和如牽牛耳遂

大戟備嘗之矣。自揣必有澼囊。此水之有科白，不盈科不行。但清者可行而濁者停滯無滲。以決之，故積至五七日必嘔而去。脾胃惡濕而水則流濕，若燥脾以去濕，崇土以填科白，乃悉屏諸藥，只以蒼朮一斤去皮切片為末，油麻羊兩水二錢研濾汁，大棗五十枚煮去皮核，搗和丸梧子大，每日空服，溫服五十九，增至一二百丸。忌桃李雀肉，服三月而疾除。自此常服，不嘔不痛，胸膈寬利，飲啜如故。暑月汗亦周身，燈下能書，細字皆本之方也。初服時必覺微燥，以山胞

子沸湯點服解之久服亦自不燥矣

○藥方

肥氣丸

當歸頭

蒼朮粉

青皮二兩

蛇含石

石七次 醋炙滾 碎

三稜

莪朮

鐵華粉

三四兩 稜朮同入 醋內者

右為細末醋煮米糊丸每四十九 當歸

頭浸湯酒下

伏梁丸

茯苓去皮

厚朴炒

人參

枳殼

炒

三棱煨

羊隻泡

白朮各等分

右為末麩糊

九梧桐子大每服五十九食遠米湯送下

### 痞氣丸

大烏頭

去一分炮

附子

赤石脂

煨

川椒

鹽

乾姜

桂心略羊

右為末煉蜜丸梧桐子

大硃砂為衣每服十九米湯下

### 息貴湯

羊隻

桂心

人參

吳茱萸

泡

桑白皮炙

葶藶

耳草炙各等羊

右水二盞姜五片棗一枚煎一盞食前服

奔豚湯

耳李根皮焙

乾葛

川芎

當歸

桑白皮炙

黃芩

耳草炙

羊棗治二麥

右水二盞姜三片煎一盞食遠服

三稜丸 消積聚去米麩五穀等積

陳倉米一慢 兩巴豆 新者五枚 去去 穀同 陳皮

三稜環 破仁 麥芽略 南木香一棗

右為末醋糊丸菴豆大每服十五丸至二十九

食遠姜湯送下

草豆蔻丸 治酒積胃口痛咽鼻不通

草豆蔻 環 白朮 台二兩 麥芽 破 神麴 破

黃芩 羊糞 池各五錢 枳實 破二 橘紅

青皮 各三錢 乾薑 二錢 破鹽 五分 右為極細

末湯浸蒸餅為丸菜豆大每服百丸煎水下

木香化滯湯 治因憂氣食濕麵結於中脘腹

微痛心下痞滿不思飲食食後不散常之痞氣

木香 茶胡 橘皮 草豆蔻 各一錢

當歸 枳實 各一錢 羊糞 三錢 紅花

甘草 各一錢 右水二盞薑三片煎八分食遠服

導痰湯

桃核養氣湯 見未卷

芫花湯 上羊月頭向上易治下羊月頭向下難

治先以肉汁及糖密食引虫頭向上用芫花湯

苦楝根皮 檳榔子 鶴虱 芫花者

亦分

右水盞羊煎減羊空心溫服

茶癖飲 治茶積

石膏 黃芩 升麻 各等分

右為末砂糖水調下二錢

保和丸 治一切飲食所傷的腹飽悶不安

山楂肉 神麴 羊糞 茯苓

諸氣

陳皮 各五 蘿菔子 破一 連芫

麥蘖 破乙

右為細末神麴糊為丸麻子大每服三五十九  
白湯或清茶飲送下

白馬尿方 治蠶瘦及魚蟹積

用白馬尿汁一升雞子白三枚 煎至二合空

心頓服不移時當吐虫小蠶而瘥

# 諸氣門

有二十一名  
不治二名

人者小周天地也周流于人之一身以為主者氣也陽往則陰來陰退則陽復一升一降無有窮已苟內不傷于七情外不感于六淫其為氣也何病之有今天曰滯氣曰短氣曰乏氣皆是肺受火邪氣得上卷之化有升無降而薰蒸於清道以變現於若干之病魔耳嗚呼氣疾之起種々不同經不言乎九氣之變未嘗不詳豈理之盡歟夫五志過極七情交攻卒戾失常昂清者遽變而為濁行者

抑遏而反常表氣失護衛而不扣內榮無健悍而  
亡降當斯時乎隨其所感疾狀應之為治者須審  
虛實新久或求所起之因滯於何經可施治焉若  
緊以耗氣之藥惟能却氣之標而不能制氣之本  
豈有可治之理乎古所謂氣有餘便成火者以性  
屬陽故也依是以取鉅無誤耳

總脉

五道

下平脉沉便知是氣

長則氣治

緩長而安

短是氣病

實大而輕

所為貴有脉行流理

○息脉 四道

潘短則氣病

大數則病進

形瘦脉大胸中多氣死

形肥脉細少氣不足以息死

○不治証 二名

冷氣之候蔽氣虛生肉寒其形腹脹吐食或腹  
痛氣逆而喘面青慘厥冷脉微潘者死

乏氣之候虛極人榮衛減耗蔽腑敗脫氣不足

呼吸氣短面青黑脈虛弱而時一止危

○治例

原病或曰上氣脈躁而喘者屬肺肺脹欬作風  
水發汗愈

凡氣刺痛皆屬火當降火藥中加枳殼稟受素  
壯而氣結痛加烏藥

凡氣從左邊起者肝火也瀉青丸加青皮主之  
從右邊起者肺火也瀉白散主之

○凡氣不歸元破故帛為主白朮亦可以其能和  
胃胃和則氣歸元

凡氣不升降香附羊斤橘紅六兩耳草一兩為  
粗末姜枣煎湯每服四錢大効

凡肥人氣滯必有痰以二陳二朮香附川芎燥  
以潤之

瘦人氣滯心有火且燥宜降以潤之蘇子萊菔

子梳子婦芍之類

凡婦女性執多儒屬陰氣昂於動如痞悶脹痛  
上凌心胃或攻築脇助腋中結塊月水不調  
或眩運嘔吐往來寒熱一切氣候正氣天香  
湯或四七湯酌用之

凡清濁不分膨脹浮腫二便不利無非破氣分  
利似難執方因時制宜可也

凡陰虛氣滯四物湯加玄參黃柏知母

凡稟壯氣實氣不順而刺痛當用枳殼烏菜不  
己加木香

凡調氣用木香性溫氣上升加氣鬱而不達固  
宜用之如陰火衝上阻塞有如氣滯邪用之  
反助火邪用知母黃柏依木香  
凡七情憂結遂成滯氣者雖治必須自能醒戒

服藥方可

凡諸腹脹大便利小便兼理脾氣之藥不可輕  
用大戟芫花耳逐巴豆牽牛泄瀉耗其正氣  
則邪氣愈勝病必難治

子和治一書生勞苦太過大便結燥欬逆上氣  
時喝々然有聲唾吐鮮血以苦劑解毒湯加  
木香漢防己煎服時已啜之後以木香枳殼  
丸瀉其滯氣不月餘而痊

又治一婦人之思不眠子和令謁其怒婦果怒  
是夕因睡硬于影响喘息低仰其脉滑手足  
溫者生脉滿而四肢寒者死

○治法

喜氣

氣和志達榮衛通利故氣清若滯結而不順流則病 ○服四磨飲

悲氣

心系急肺葉舉而上焦不通榮衛不散流 ○服正氣天香湯

怒氣

上焦氣逆甚則嘔吐及癢泄大僕云怒則陽氣逆而肝木乘脾土 ○服建中湯

恐氣

上焦閉塞則氣亂不下降故氣不流行耳聾頭眩而小便頻之○服治氣湯

冷氣

腠理閉而氣不流理則氣收大僕所謂身冷則衛氣沉○服溫中方氣丸

火氣

腠層開而氣散而衛氣則通身汗出氣泄故津液隨汗脫而氣亂○服三黃湯

驚氣

心無所依神無所歸慮無所定故氣煩亂以不  
歸着 ○三因溫膽湯

### 思氣

心有所思謀則神有所歸藏思氣留而不行故  
因結熱之然 ○服三香正氣湯

### 勞氣

喘息汗出內外皆越故氣耗散神疲勞役久則  
氣奔 ○服調中益氣湯

### 憂氣

思慮過度不置且抱悲則陰結急而為筋寒為

麻痺婦人血崩 ○服大霍香散

鬱氣

六鬱氣滯于胸膈則膨脹發滯于午足則四肢  
浮腫小水赤澀 ○服沉香降氣湯

滯氣

陰陽不和中脘壅塞則五噎吐噫不止不能飲  
食口乾 ○五膈寬中湯

刺氣

氣攻而屬火稟受素拉而氣刺痛肝氣之鬱逆  
也 ○脹指逆七氣湯

上氣

滯結之氣上逆而喘促不安面目虛腫胸中痞悶不致飲食 ○服半夏湯

清氣

經曰清氣在下則生痰泄濁氣在上則生膜脹 ○服升陽順氣湯

少氣

呼吸微弱而少氣胸膈不通者水氣在臧膈陰氣在內故少氣 ○服勝金散

奔氣

肺為五藏上蓋主流行若受邪則氣道不利故  
奔氣 ○服治氣湯

結氣

為憂愁所生也心有所積神亦有所止氣留而  
不行故結於內 ○服分氣紫蘇飲

短氣

無寒熱而短氣不足以息肺虛則氣少弱而令  
息短 ○服紫沉通氣湯

遊氣

五藏不和則三焦氣滿滿則氣逆於內不宜通

其病頑滿虛逆○服小降氣湯

疑氣

七情鬱結於內則肝氣不舒再為謀慮鬱塞心  
氣滯曲狐疑無置○服壓氣散

○考按

○吳括蒼云有一仕子因親賀壽過飲甚醉送  
宿花軒夜半酒渴欲茶門戶深閉彼無奈何遂  
將口噴石礮中喫水破許天明起觀礮中俱是  
小紅蛆心陡然而驚鬱之不散心中如有蛆物  
胃脘便覺閉塞日想月疑漸成痼隔遠請諸醫

調治不愈一日延予診視病者備告予乃悟之  
彼是蠶心遂生意用紅緜線分兩剪斷如紅蛆  
形狀用巴豆二粒同飯搗爛入線丸如十粒丸  
予令病人暗室內服之置宿桶內於水須臾欲  
瀉令病人坐桶內出前物蕩漾如蛆然後用定  
令伊親視其病從此解疑調理半月其患瘳矣  
○吳括蒼云龍泉李廷用曾有一風癩僧至彼  
求食本家施飯僧遂與茶飯廷用從外而入口  
渴欲茶而小蒼頭將僧喫茶碗饋茶捧至廷用  
不悟飲之細觀僧人烈膚眉脫貢麻風也廷用

心疑囊上遂痒擦起紅腫一塊則遍身皆痒憂  
訝快々無奈之何因得明者陳君解其疑症用  
悟其患止矣 辨疑錄

○治方藥補

四磨飲 治諸氣

沉香 烏藥

枳實

檳榔子 各等分

右四味白湯磨服

正氣天香湯 治諸氣滯結

香附子 二錢

陳皮 五白

烏藥

紫蘇 各一錢

乾薑

耳草各三分

右水盞羊愈七分不拘

時空心温服

建中湯

補土氣制風木

赤芍藥

肉桂

飴糖

各五分

右水盞羊加大棗一枚生姜二片煎七分服  
治氣湯

枳殼

青皮

紫蘗

羊芩裝

茯苓各五分

甘草四分

右水盞羊姜三片煎服

○氣鬱作痛加川芎香附厚朴  
○食積氣痛加木香破仁神麴  
○胸膈飽悶加蘿菔子香附  
○

犯寒痛加吳萸茱萸良姜附子。氣鬱成火加黃連山梔子。

溫中分氣湯 治三焦氣不升降胃脘滿悶

南星

半夏略一

香附

二兩三味  
各善製

白朮

茯苓略半

木香

青皮

陳皮

良姜

乾姜

四味各一分共  
醋水各一匙煮

右為細末酒打糊為丸梧桐

子大每服三十九無時善湯下

三黃湯

黃連

黃芩

大黃各等分

右剉碎溫湯

麻空心服無時

三因溫膽湯 治膽虛寒僵仆目黃失精

酸棗各二兩

茯苓二兩

半夏

麥門冬各二兩

耳草

桂心

遠志

黃芩

人參

草薢各二兩

右每服四錢長流水服

三香正氣散

治嘔吐清水胸膈壅滯

木香

丁香各三

香附子

陳皮

厚朴各二兩

益智仁

縮破仁

耳草各六分

烏藥

蓬莪朮

乾姜各四

右水盞羊姜三片冬一枚煎七方

不拘時俱溫服

調中益氣湯

大藿香散 治七情傷感氣鬱

藿香葉

半夏麴

人參

白朮

茯苓各一

木香五分

磨服 桔梗

枇杷葉去

洗

官桂

甘草炙

右水二盞加薑棗煎一

盞溫服無時

沉香降氣湯 治一切氣不升降 一名沉香升麻散

見前

沉香

枳殼各一

人參

大腹皮

洗

訶子各五

白朮

烏藥

香附子各

紫蘇葉

厚朴姜製

神麴各

麥芽各

京三稜

砲

蓬莪朮

益智仁各二兩

陳皮去白

姜黃

甘草

方

右為細末每服二錢食前用沸湯調服

五膈寬中湯

治七情四氣傷于脾胃

香附酒洗

厚朴一斤

青皮

陳皮

丁香

破仁各四兩

木香三兩

生姜水煎或為細末薑鹽

湯點服

指迷七氣湯

治七情相干陰陽不得升降

香附子二錢

藿香

枳椇

蓬朮

青皮

陳皮

因桂

耳草焙五

益智

仁 羊糞各五錢

右水二盞

薑五片煎八分

食遠溫服

羊芩湯 治上氣嘔逆不能食

羊芩

一兩

陳皮

白朮

耳草

並結

桂心

四分

人參

厚朴

並結

右水盡羊芩

五片炙三枚煎八分溫服

升陽順氣湯 治七情取傷及勞役

人參

一兩

黃芪

陳皮

羊芩

升麻

柴胡

當歸

黃柏

草豆蔻

四分

神麴

並一兩

耳草

五分

右水盡羊芩三片炙六一

枚煎七分服 恐則氣下者右宜服之

勝金散

治胃婦五臟諸氣捨心不語故絕

天台烏藥

酒浸一兩

茴香

青皮

良姜

各一兩

右為細末每服二錢空心溫服調服

婦人善湯童便調下

分氣茯苓蘊散

治一切諸留帶氣

枳殼一錢

青皮

紫蘊

羊隻

梨

茯苓各八分

耳草四分

大腹皮

素白皮

麥門

冬

南木香磨汁

厚朴八分

枳殼

桔梗

香附子

藿香

右水盞薑

三片

棗二枚煎

八分食遠服

紫沉通氣湯

治三焦氣滯不能宣通

紫蘇葉

枳殼

陳皮

赤茯苓

耳草

枳郎子各一錢

沉香

木香麝香

麥門冬

五味子

赤白皮

黃芪

乾生薑

薄荷葉

荊芥穗

枳實八分

右水二盞煎八分空心溫服

小降氣湯

治氣不外降上盛下虛痰盛壅滯

家紫蘇

天台烏藥

白芍藥

陳皮

台也麥耳草各五分

右水盞半薑三片粳一枚煎

七分食遠溫服

降氣飲 治上氣呃逆疎利太過虛氣上攻短氣

木香

人參

白茯苓

藿香葉

陳皮

枳殼

耳草

附子一枚炮

右為細末每服二錢煎紫葳木瓜瓜牛弄湯調入  
銀薑內重湯煮五七沸溫服

# 血證門

有三十六名  
不治証四名

經曰榮者水穀之精也和調五臟洒陳於六腑乃能入於脈也源源而來生化於脾充於心藏受於肝宣布於肺施滿於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脈少則瀆充則宏常以飲食日滋故能陽生滋長聚汁

變化稍微而赤為血也生化旺則諸經恃此而長  
養衰耗竭則百脉由此而虛可不謹養哉故曰血  
者神氣也持之則存失之則亡是知血盛則形盛  
血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰  
必衰又何言陽旺則生陰血也蓋謂血氣之常陰  
從乎陽隨氣運行於內苟無陰以系束則氣何以  
樹立故其致病也易調治也難以其比陽常虧而  
又損之則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有  
云陽道實陰道虛陰道常乏陽常有餘陰常不足  
以人之生也年至于四而經行至四十九而經漸

可見陰血之難成易虧如此陰氣一傷所變之證  
妄行於上則吐衄衰涸於外則虛勞忘及於下則  
便紅積熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則為腸風  
陰虛陽痺則為崩中濕蒸熱痰則為滯下熱極腐  
化則為膿血火極似水血色紫黑熱勝於陰發為  
瘡瘍溫滯於血則為痛痒癢癢皮膚則為冷痺畜  
之在上則人喜忘畜之在下則人喜狂隨恐跌仆  
則癱惡內凝惡內凝者分部位身半以上同天之  
陽身半以下同地之陰此特舉其取其所顯之正  
者

○總脈 三道

寸口脈微而弱

血氣俱虛也

關上脈微而芤

血氣俱病也

血病脈沉細者生有神者亦生

惡脈

三道

血病上氣脈致浮大者死

血衰喘氣脈滑實大者危

脈極虛芤蓬為血虛衰敗失精

○不治証 四名

噴血脉實大而濇絕食吐瀉者

咳血脉數大小便不利氣喘乏力者

衄血身大熱脈微細者

亡血身大熱煩而大汗不止脈濇微者

○治例

凡血證上行或壅或咳或吐或吐皆逆也若變而下行為惡痢順也上行為逆其治難下行為順其治易無病人忽然下痢其病進全血証上行而後下行惡痢其邪欲去是知告

也

凡四物湯為治血之總劑而不能治氣虛而不  
生血者。若脾胃虛而血不生當從仲景之補  
以人參氣分之藥。陽旺則生陰血也。

凡國廣嶺南多盡毒中之者下血如雞肝或臍  
臍俱壞惟心未傷用馬蔴根末水服方寸匕  
隨吐毒極神。

凡九竅虫血皆可用墻頭苔蘚可以塞車前草  
汁可以滴火燒連房用水調錫底黑煤可以  
喫石榴花片可以塞生菜菹汁可以滴火燒

龍骨可以吹

凡病後咳嗽吐血脈大而亂屬上焦湯熱傷下  
血瀉血為陰熱傷俱克

世傳經驗方下血用乳香沒藥竭血兒茶各一  
錢巴豆霜五分九菜豆大空心酒下神效不  
可言

凡飲酒人下血日二三次四物加條芩防風荆  
芥白芷槐花升麻不應加椽斗灰二三錢煎  
成菜中調服佳

凡血症不斷酒色厚味縱止必發終成痼疾

凡諸見血皆是陽盛陰虛君相二火亢甚煎逼其血而出諸竅也悉宜血物湯加知母黃柏補陰降火之劑為主

丹溪曰經之人年四十而陰氣自半起居衰矣又曰男子六十四而精絕女子四十九而經斷夫以陰氣之成正供給三十年之運用已先虧美人之情欲無涯此非成易虧之陰氣若之何而可以縱欲也

凡怒氣勞氣皆能致血証但怒氣致血証者則暴甚故經之抑怒以存陰者是矣否則五志

之火動甚火載血上錯經妄行也

凡血証飲食過多嗜炙煇辛熱或墜隨車馬傷損所致者為不內外因

凡上焦一切血症指止即服六味地黃最不可緩庶絕病根有血症者終身不可脫故在澤瀉茯苓淺見者謂瀉腎殊可恨

凡諸失血過多體倦食少及血不止扶正氣為急人參一錢黃耆二錢五味子十三粒芍藥麥門冬車草湯身各五分加薑金末亦可

凡吐血法 吐在水碗內浮者肺血也沉者肝

血也羊浮羊沉者心血也各隨所見以羊肺  
羊肝羊心煮熟蘸白芨末日夕食之

凡氣虛不能模血吐血不止身涼脉微弱丹溪

法用人參一味為末雞子清投新汲水調下

一錢服効一法加四君子芎藭

凡吐血勢不可遏膏中氣塞上吐紫黑血此瘀  
血內熱盛也桃仁養氣湯加嗽下之打搗內  
損有瘀血者必用

凡吐血脉洪大用犀角地黄湯調劑金黑旋子  
灰或荆芥穗灰不已三黃補血湯

○治法

血滑

血脫不止者或因病久而滑或歲久氣衰而滑或因氣虛或因誤用攻繫以致氣陷下而滑凡動血之因多由於火及火邪既衰而仍有不能止者非虛即滑當以固澁為主宜勝金丸

下血

雖因大腸積熱亦當分虛實不可純用寒冷藥血色清而鮮者為腸風屬胃與大腸之積熱○服槐角丸

肥血

血從毛孔出名肥血皮膚虛也 水中白不拘  
多少瓦上用火逼乾研令極細每服二錢入麝  
香少許溫酒下○服三黃補血湯

血汗

病人汗出污衣皆血汗因大喜傷心是喜則氣  
散故血隨氣上或婦人產後多此証治之 服  
葶草汁

大便血

陰結便血非傷寒之比邪在五藏則陰脈不和

脈不和則血留而結陰為內結不得外行無所  
稟滲入腸同為便血

### 瘀血

有暴吐紫黑成塊者是熱傷血結于中吐出

○服黃連湯加桃仁紅花

### 吐血

衄血吐血下血三証雖去多是從脾胃與大腸  
肝藏來也是經氣血俱多身冷脈微為無妨○  
服藕汁飲 ○胸中氣塞上吐紫黑血此瘀血  
之內蓄盛也○服桃核養氣湯

疼涎血

涎唾中有血不嗽或時喉中吐血鮮血古方謂  
少干脾胃是必胃熱所致最多○服一方

溺血

小便痛者為血淋不痛為尿血宜分新久虛實  
不可例用寒冷壯盛人為肝火○服當歸龍薈  
丸○腎虛血隨溺出脈洪數無力○服知柏  
四物湯

咯血

不嗽而咳出血也咯與唾少異唾血出于氣上

無所阻也咯血出于疼腎于喉噁之下滯而不得出咯而自出 ○服救脈散

唾血

出于腎藏之虛疼中帶出血絲二三條是也勞傷之証也 ○服生地黃飲子

衄血

陽熱怫鬱于足陽明而上熱則血妄行血衄 ○服四生丸

咳血

欬血止從肺出他無可言耶曰肺不狂欬血而

亦唾血蓋肺主氣氣逆為咳腎主水水化液為  
唾腎脈上入肺循喉嚨決舌本其支者從肺土  
絡心注胸中故二藏相連病則俱病於是皆有  
欬唾血也亦有可分別者○服是齊白朮散

### 耳衄

耳中出血為陰虛陽盛有升無降血隨氣上出  
耳竅法當補陰抑陽降氣則血歸經 ○服柴  
胡清肝散

### 血淋

多飲之人腎陰虧損血隨溺而出脈洪殺莖中

有痛為淋或屬下焦胞熱赤濁○服五淋散

### 藏毒血

風濕入于腸胃下血不止色清是風如豆汁者  
濕蒸可酌量○服胃風湯

### 腸澼下血

其血另作一派澼也有力而遠射四散如箭腹  
中大痛乃陽明契毒所作○服升陽除濕防  
風湯 或槐花散

### 酒血

酒毒積契結畜大腸而下血者名酒血宜清解

於腸胃

○服枳椇槐角丸

嘔血

脈大澀熱喉中痛者屬氣虛因怒吐血者服槐  
子平肝之藥脾統血肺主氣勞神多言脾肺致  
傷血妄行者忌冷劑 ○服團參丸

血溢

心火燔極則血有餘而熱氣上逆甚則為上下  
血溢勢亢極血變紫黑也 ○服黃連解毒湯

舌衄

舌上無故出血不止名舌衄是心火自灼之候

也 ○服麥門冬湯

### 牙宣血

有三因一因陽明胃熱一因少陰腎虛一因厥陰風壅非此三者牙不宣血也 戴氏曰風壅牙宣消風散搽之腎虛者為下虛上盛宜鹽湯下安腎丸用黑錫丹仍用姜鹽炒附米黑色為末搽擦其效不可言也 ○服消風散 安腎丸 黑錫丹

### 腮中血

呂澹洲治一人偏搔腮中瘡血泊之如湧泉

竟且不止困甚其二尺脈如蛛絲他部皆無示  
曰夫脈氣血之先也余血妄行故榮氣暴衰二  
尺尚可按當益榮以瀉陰火以四神湯加防風  
荊芥連進脈漸生更服十全大補湯遂愈

### 心漏

病後虛弱人物前有一細孔常出血水名曰心  
漏遂敗之 ○服鹿茸丸

### 血滯

畜血滯滯於上部則隨逆氣而越於干上穴敷法  
當補陰抑陽逆氣下降則血歸經 ○服生地

黃飲

痔血

糞前者名近血自大腸也○四物湯加栝椰子  
槐花枳實除苓以瀉大腸 糞後者名遠血自  
小腸也○四物湯加木通黃連以瀉小腸 ○  
或服檉皮湯

肝血

厥陰肝經之熱內畜而不散則風木妄動燔火  
扇熾而肝藏所貯之血液隨上下二竅翻出其  
色深黑或鮮血 ○服當歸厚朴湯

血積

婦人經水不通日久則成癥小腹隱痛或引兩  
脇痛心腹疼痛煩悶黃瘦名之血積 ○服乾  
漆丸

血枯

血液乾涸而皮膚失潤澤生白屑肥媵粟立手  
足麻痺婦人居經寒熱往來 ○服當歸飲子  
婦人崩漏

最為大病年久之久火熾而血熱崩去或房欲  
過多當行經時而交感俱為此疾漸變生赤白

帶下 ○服冷血地黃丸

錯經亡血行

婦人經閉多日隨熱蒸之逆氣而經水翻出干  
口鼻名之錯血 ○服牡丹皮散

膿血

癰疽發背癰瘡黃膿日久四肢懈怠羸瘦如柴  
時發大熱者血虛也 ○服當歸補血湯

凝血

一名畜血人飲食起居失是宜皆能使血凝結  
不流行故名凝血 ○服桃核散

血箭

鬱熱不解生四肢瘡癩瘡口發出鮮血如箭具  
血似煤汁 ○服生地黃飲子

血痣

痰血結滯經脈則肉上生黑子不痒不痛似雀  
瘕之血痣 ○服滑石散

淚堂

肝藏虛則目翳失明眼中多冷淚其淚赤色而  
如舞血不急治當下成音言 ○服助陽和血  
湯兼用六味丸料

○治法藥劑

勝金丸 治男婦血妄行流溢者

小薊

人參

蒲黃

熟地黃

海狗

當歸

烏梅

川芎

右咀作一服水二盞煎一盞不拍時溫服

槐角丸 治腸胃不調下血不止

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼

槐角

烏梅

耳草

右水盞半煎七分食前服

三黃補血湯 治面赤善驚上契六脈大梅之虛

乃手少陰心之脈也此氣虛而亡血瀉火補氣  
以墜浮氣 生地黄 熟地黄 各二錢 黃芪  
當歸 芍藥 各三錢 川芎 牡丹皮 柴胡  
升麻 各一錢 右水盞半煎七分服血不止加桃仁  
十枚 酒大黃量虛實用之減去升麻柴胡

一方 治血汗

律草不拘多少洗名葛勤蔓是蔓生菜以苧麻  
而小薄有細刺花黃白子如麻子

地榆湯 治腸風熱証下血

地榆

黃芩

茜根

梔子仁

茯苓

黃連

各等分

右為粗末每服三錢韭白五寸同煎

黃連湯 治便后下血腹不痛各濕毒下血

黃連

當歸 各等分 耳草 五方

右水二盞煎八

分食遠服或加紅花桃仁

桃核養氣湯 是前

古一方 治疼由有血不嗽者 葛根、黃芩

黃連 芍藥 當歸 沉香 耳草 各等分

右為細末空心白湯送下

知柏四物湯 治腎陰虧損血隨溺出

四物湯加知母黃柏牛膝 水煎空心溫服

救脉散 治吐血虛羸脉虛而洪

人參

黃耆

各一枚

當歸

芍藥

熟地黄

蒼朮

各二錢

陳皮

升麻

柴胡

蘇木

耳草

五分

右水二盞煎八

分食遠温服

生地黄飲子

治諸見血無寒吐衄血溺血屬熱

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮

黃芩

芍藥

天門冬

黃芪

耳草

右咀每服七錢水二盞煎八分去

渣食遠服如脉微身冷惡風加桂五分

四生丸 治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生薄荷葉 生艾葉 生側柏葉 生地黄各一分

右爛搗如雞子大每服一丸水二盞煎一盞瀝

去渣溫服

是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲酒過度

負重傷胃而吐血者忌濕麵煎燒之物

白朮一錢 人參 白茯苓 黃耆

山茱萸 百合各六分 耳草五分 柴胡

前胡各三分 右水盞羊薑三片棗一枚水煎服

柴胡清肝散 治肝膽二經風熱怒火血証

柴胡

黃芩

各一錢

黃連

山梔子

各七分

當歸 一錢

川芎 六分

牡丹皮 一錢

升麻

八分

耳草 三分

水煎溫服若脾胃虛去芩連加茯苓

五淋散 治肺氣不足膀胱有熱水道不利

赤茯苓 六錢

赤芍藥

山梔子

二錢 生甘草

當歸 各五兩

條芩 三兩

水煎空心服

胃風湯 治風濕入于腸胃下血不止

人參

白朮

茯苓

川芎

當歸 酒洗

白芍藥

桂枝 各一錢

水煎服

升陽除濕防風湯 治泄瀉頭痛者

蒼朮四錢 防風一錢 白朮 茯苓

芍藥各一錢 水煎溫服

槐角丸加枳椇子方 治飲酒人下血日二三次

枳椇子 槐花二兩 地榆 黃芩

當歸 防風 枳殼

共為末糊丸桐子大每服五十丸空心下

團參丸 治吐血咳嗽服涼藥不效者

人參 黃耆 飛羅藟各二兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十丸

用葶根湯送下

黃連解毒湯 治一切火熱毒狂躁煩心

黃連

去殼

黃蘗

黃芩

大梔子

右剉如麻豆大每服水一盞煎至四分溫服

麥門冬湯

治思慮傷心吐血

麥門冬

天門冬

遠志

當歸

白芍藥

生地黃

人參

黃芪

蛤粉

阿膠

藕節

車草各二錢

右作

二服每服水二盞

薑一片煎一盞不拘時服

消風散

治諸風上攻頭目昏眩有抽掣

荆芥穗

炙甘草

陳皮

人參

茯苓

白姜蚕 防風 川芎 藿香 蟬退

厚朴 羌活 右水二錢煎一鐘溫服

安腎丸 治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴

桃仁 三五四 肉桂 去粗皮 白茯苓 巴戟天 志

田菘子 酒洗 破故布 女 茯苓 白木 石解

草解 治四十 川烏 炮 右為末煉蜜丸梧子大每

三十九丸空心溫酒鹽湯任下

黑錫丹 治脾元久冷沉寒固冷

金鈴子 去根 胡蘆巴 酒浸 木香 不見天 附子

田豆蔻 破故布 酒洗 沉香 茴香 女 陽起石

研細者

黑錫 去滓

硫黃

透明者

為細末等分和勻

酒糊為丸如梧桐子大陰乾鹽湯或東湯下

十全大補湯 見前

鹿茸丸 治心漏腎虛腰痛

嫩鹿茸

去毛酥炙

附子

炮去皮尖

鹽花

各等分

共末東因丸每服三十九粒酒下

生地黄煎 治衄血從來久不愈甚亦

生地黄

熟地黄

地骨皮

柏枝子

各二錢

右為末每服三錢鹽酒調下日三服

標皮湯 治下血及血癖已經下後不止此藥能

除根 樽根白皮 槐角仁 枯白朮

二兩 本草多 右為細末每三錢清米飲調下

當歸厚朴湯 治肝氣之血虛善怒

厚朴 良薑 各二錢 當歸 因桂

右剉每服三錢水二盞煎八分空心服

通經丸 一名乾漆丸 治婦人室中月信不通

桂心 青皮 大黃 酒濕忍 川椒 莪朮

乾薑 川烏 炮去皮 乾漆 當歸 桃仁

去皮尖 各半分 右為細末老米泔酢丸梧桐子大每服

二十九丸空心以醋湯或溫酒下

當歸飲子 治血熱癰疹疔痛或膿水淋漓

當歸

芍藥

川芎

生地黄

防風

白芷

荆芥 各等分

黃耆 炒

何首烏 各等分 耳草 三分 右水煎空心溫服

結陰生地黄膏 治便血帶下

生地黄汁

小蘗汁

汝糖 煨燂 阿膠 一两

側柏葉 地榆 各等分

右用四味汁熬成膏

方入柏葉地榆末和勻空心米飲調下三匙

牡丹皮散 下血色清而難者為腸風

條芩

升麻

牡丹皮

黃連

槐角

音黛

秦花 各亦方

右列每服三錢水盞羊煎至八分空心溫服

當歸補血湯 治血虛大熱頸白虎之証者

著黃 六錢

當歸 二錢

右以咀每三錢水盞羊煎至七分空心服

越桃散 治下血痢血

槐子仁

槐花

大棗

乾薑

各亦方

右為末每服三錢米飲調下

生地黃飲子

見前

滑石散 治腸下血

滑石

當歸

生地黄

黃芩

蒼朮

車草五分

右水煎服

助陽和血湯

治眼發之後隨有上熱白睛赤色

隱淡難開而多淚眩等証

黃芩

當歸、車草

防風

柴胡各五分

白芷

蔓荊子二分

升麻七分

右水煎食前空心溫服

○灸法

氣海 一炷

灸脫血而色白脈澀手足冷飲食

少思強食即嘔直灸之動如神

命門穴 在脊骨中與臍骨七壯即止

脊中第二十椎下隨年壯灸之

○鑿業

一人年四十二歲政瘦因強飲酸酒火時腹痛  
傳下痢無度十餘日便後見血或紅或黑脈鳴時  
痛諸藥以為血熱用芍藥柏皮凡未病仍不飲  
食則嘔酸政愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷  
口乾有時項蹠不安脈弦細而微虛年足補冷經