

醫
學
綱
目

醫學綱目卷之三十三

傷寒部

勞復門 陰陽易

仲景主
於攻邪

大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

枳實四枚 梔子十四枚 豉一兩

有食者
大黃

右三味以清漿水二盞空煮退一盞內枳實梔子煮取八分下豉更煮五六沸去渣溫服覆令取微汗若有宿

食內大黃量虛加減

有熱者
柴胡

傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉實者以下解之

有水氣
者添之

大病瘥後從腰以下有水氣者牡礪澤瀉散主之

牡礪發

澤瀉

蜀漆洗去腥

商陸

海藻洗

括萎根

葶苈各等

右爲散水服方寸匕小便利止後服日二

附有寒者溫之

大病瘥後喜睡久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜

理中丸

氣逆欲
吐者抑之

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉

一把

石膏

半斤搗碎

半夏

三兩

人參

兩

麥門冬

四兩去心

甘草

一兩炙

姜加生

半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分米熟湯成去渣溫服

診風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

後賢主於補虛

海大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內爲中州調中可已此爲有形病也但見外證則謂之復病非爲勞也如再感風寒是已

勞當補
其子

本記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補予人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗瘥後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

人參

白朮

甘草

橘皮

青皮

去白皮

乾姜

各等分

右爲末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得
治勞復麥門冬湯氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬

兩

甘草

錢二兩

粳米

合

右麥門冬去心爲細末水一盞煎粳米令熟去米約湯
一小盞半入藥五錢七厘二枚去核新竹葉一十五片
同煎至一盞去渣溫服不能服者綿滴口中又治小兒
不能灌藥者宜用此綿滴法此方不用石膏以其三
焦無火熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏
若加人參大妙

大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛
乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期十日

服不住佳

肘治篤病新起早勞飲多致勞復欲死燒鱉甲服方寸七

活雄鼠屎湯治勞復

梔子十四箇

雄鼠屎二七枚兩頭尖者是

枳殼三枚

右爲細末每服四錢水一盞半入葱白二寸杳豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白連葉

乾葛

新豉半升

生姜切一合

麥門冬去心三錢

熟地三錢

流水四升以杓揚之

右七味用清水煎三分減二去渣分二服漸漸服之取

汗

右傷寒勞復莫若仍用丹溪以參芪歸朮加發散之劑汗之爲的當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘掣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脰拘急者燒

棍散主之

燒棍散取婦人中棍近隱處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便卽利陰頭微腫則愈婦人病取男子棍禠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調燒棍散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

陰陽易續法

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰脅連腹內痛名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女竝不自相易所以呼爲易者以陰陽相感動其毒着於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不卽死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節懈離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便恍恍翕翕氣力轉小着床不能動搖起止仰人或牽引歲月方死宜燒褪散假鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯乾姜湯當歸白朮湯選用之海藏云醫者燒褪散竹皮湯者假鼠糞湯當歸白朮湯

至於按正方妙香散下治雜病陰陽易中行牛黃清心之類是治其熱症也

竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮一升

用水三升煮取一升絞去渣分二服立愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣衝胸手足拘急搐搦如中風狀宜此湯

瓜萎根一
方見稿

青竹茹刮半升
淡竹是

右以水二升煮取一二合去渣分二三服

妙香丸熟藥

百一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

溯若陰陽易果得陰脈當隨症用之 若脈在厥陰當歸四逆湯送下燒視散 若脈在少陰通脈四逆湯送下燒視散 若脈在太陰四順理中丸送下燒視散所用之藥各隨其經而效自速也

鐵鼠糞湯療傷寒病後男子陰易

韭白根

一把

獵鼠糞

十四粒

兩半者吳

右二味以水五升煮取半升去渣再煎三沸溫服得效
未汗再服亦理諸般勞復

當歸白术湯治婦人未平復因有所動小腹急痛腰脅四肢不任舉動無力發熱者

白术

當歸

桂枝

附子生

甘草

芍藥

黃芪

人參各二錢半

生姜

半兩

右㕮咀水煎服食項再服溫覆取微汗瘥

李良佐子病太陽症尺寸脈俱浮數按之無力余見其內陰虛與神木加乾姜湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過平必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒

加芍藥茴香等丸五六服三日內約服丸六七百丸服復生又用大建中接之大汗作而解

山因女色病陰証傷寒者用陳皮熱鍋內炒焦以酒烹下濾酒飲之

四時傷寒不同

冬爲傷寒 春爲溫病 夏爲暑病 秋爲瘡

一歲長幼病相似爲溫疫 多眠多汗脈浮爲風溫

身盡痛爲濕 身反張爲痓

寒
四肢傷

陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣令冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬物深藏若能固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病惟傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而卽病者爲傷寒不卽病者爲寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏變

瘧疫

爲暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多日

熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒此時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫病及暑病相似但治有殊者要在辨其病原寒熱溫三者之異則用藥冷熱之品味判然矣

其冬有非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同

冬溫應常犯者
有三歲少陰司

天之政五之氣陽明司天之政終之氣厥陰司天之政終之氣皆病冬溫其不應常紀而反常者則不可候之而隨時變易也

氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或

有至而太過者皆成病氣也

丹溪用補中益氣湯

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯
氣相合
氣虛者四君子湯加發散劑血虛者四物湯加發散劑東海藏用垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏治風濕無汗者用神木湯有汗者用白术湯治剛痉用神溫活用桂心芪术治風濕
氣相合
木湯加羌活麻黃治柔痉用白术湯加桂心芪术治風濕用白术湯隨證加藥治中暘脈弦細芤遲者用黃芪湯此皆與仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒同意也

仲景論不詳
附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同者夫傷寒有卽病有不卽病因其舊有轉熱風寒外束肌

仲景論

腠自密齧發爲熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝草微表而安以病體不甚虛也若中寒則倉卒感受其病卽發而暴因其腠理踈豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此氣大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門

冬爲傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒卽病者謂之傷寒也治法除濕暑瘡疾外皆傷寒法也

春爲溫病

溫病從立春節後其中無暴寒又不冰雪而人有壯熱爲病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變爲溫病春溫應常紅者有四步少陽司天之政初之氣太陽司天之政二之氣皆病溫其不應常紀而政終之氣太陰司天之政三之氣皆病溫其不應常紀而

反常者不可候之
而隨用安易也

冬傷於寒春必溫病全文見治見冬溫太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病

溫毒

陽脈洪數陰脈實大者遇溫變爲溫毒

論見大法治見醫班活人云初

春發斑咳為溫毒

風溫

發汗不解身灼熱爲風溫其證浮汗出身重多眼蓋其

病不獨見於春間故另立風溫門

証

尺膚熱甚脈盛躁者病溫也

全文見証

夫精者身之本也故

藏於精者春不病溫

針灸

凡治溫病可刺五十九穴

成註云所謂五十九穴者刺

兩手內外側各三九十二指五指間各一凡八指足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三凡六指頰上一頰會一髮際一廉泉一風池二天柱二內經云氣口人迎脉者兩之若氣口人迎皆靜者勿刺

也人迎謂結喉對脈也

王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行

五行者以越諸陽之熱逆也

謂頭中行上星經會頭面五穴承光通天絡耳王橫十穴第三行而傍臨泣目窓正營承氣陷空十穴也

大杼膺俞缺盆

背俞此八者以瀉胸中之熱也

氣街三里巨虛上下兼

此八者以瀉胃中之熱也

雲門髃骨委中髓空此八者

以瀉四肢之熱也

五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱

謂背第五行兩傍竅戶神也

堂鏡內意合志室十六也

溫病續法

活夏至前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮緊者溫病也春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發爲溫病蓋因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

煩躁發渴脈實大便秘澀者大柴胡湯微利之虛煩用竹葉湯次第服之

仲景活人論溫病不同
仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒各不同

當以仲景爲正

升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根

兩

黃芩

三

芍藥

各半

甘草

炙

桂心

分

麻黃

二分去

葛根湯泡

右㕮咀每服五錢水一盞半枣子一枚煮八分日三服

三四日不解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之

汗下後經不為病溫病之脉浮在諸經不知何經之動隨其經所在而

經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而

取之如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太

陽溫病也如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺寸脈

汗下後經不為病溫病之脉浮在諸經不知何經之動隨其經所在而

仲景活人論溫病不同

俱長者陽明溫病也。如胸脇痛汗下後過經不愈誇得尺寸脈俱弦者少陽溫病也。如腹滿嗌乾診得尺寸脈俱沉細過經不愈者太陰溫病也。如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也。如煩滿囊縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而取之隨其症而治之如發班乃溫毒也。

夏爲暑病

汗下溫
針

太陽中暘者發熱惡寒身重而頭痛其脈弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身卽熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

寒寒身
汗而渴

太陽中熱暘者其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之

活人云夏月自汗惡寒身熱而渴面垢手足冷脈微無力者中暑也

白虎湯主之

太陽中暘者身熱疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行者一物

皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯用瓜蒂二七七箇以水一升煮取五合去渣頓服

右瓜蒂湯後賢罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者亦宜用之

暑病續法

活中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛又有濕溫與中暑同但身涼不渴爲異耳

丹暑熱病用黃連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪或用清暑益氣湯

活夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者熱病

也冬傷於寒因暑氣而發爲熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月藥性須帶涼不可大溫桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之比夏月服之必有發黃班出之失熱病三日外與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍證用也若三月至夏爲晚發傷寒施子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩爲桂枝證無汗脉緊爲麻黃青龍證

桂枝

半兩去皮

石膏

一兩碎

黃芩

一兩

甘草

一兩

梔子錢

白芍藥

升麻

乾葛

生姜三分
各半上

右咬咀每服五錢半水一盞半煎至八分去渣食頃再

服若得汗卽停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒三月至夏爲晚發

生地半斤

升麻一兩

柴胡

石膏兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分頓服病不解更

作

脈虛身熱
爲中暑

項靜而得之爲中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納

涼於深堂大廈得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱
急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房室之陰寒所遏
使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也海藏云
靜而傳

暑惡寒

脈沉細靜而溫聯屬形者白虎加荅木湯去之大
便散見局方甘草一錢半乾姜杏仁桃桂各一錢是也

大

動而得之爲中熱中熱者陽證爲熱傷原氣非形體受病

也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必

苦頭疼發躁熱惡熱擗之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄

無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之

湯滿云

動而傷

暑身熱脈洪大動而火勝傷

傷

氣者白虎加人參湯主之

活中暑背寒面垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重
其脈微弱按之無力白虎湯主之

方見
發熱

本有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎
湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤
遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而
脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以弦爲陰朱龐
亦云中暑脈微弱則虛可知

海濱虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之雅方見
活酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥可治伏暑發渴者

黃連

四兩以無灰
酒浸蒸藥

右爲末糊丸熟水下三十丸胸膈涼不渴爲驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮

二兩去白

生姜

兩

麥子

五枚去核

甘草

兩半

人參

錢一錢

竹茹

半

右分五服每服水一盞二分煮取八分去渣熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒

方見
芳復

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快

方見
湯

注若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞悶生姜湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

體中痛宜服下方

蒲黃三錢

滑石五錢

生甘草一錢

中暎脈弦細芤遲黃芩湯主之

人參

黃芩

白朮

甘草

茯苓

芍藥各等分

白朮

甘草

右㕮咀每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分去渣溫服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴予曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛遂以人參竹葉作湯調辰砂四分散八貼而安

針灸雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥不能治當灸大椎穴

腰冷腹痛頭痛活濕溫者兩脰逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於

濕而無溫者 濕因而中暑濕熱相搏則發溫溫其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暎如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

乙癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多汗兩足逆冷譖語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈關前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加入參湯次白虎加蒼朮湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪悞用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛邪正邪微邪賦邪從後來者爲虛邪從前來者爲實邪從所不勝來者爲賦邪從所勝來者爲微邪自病者爲正邪又曰役令心病中暑爲正邪中濕得之爲賦邪今心先受耳

而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最
逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽
部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕
相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾
每至暑月兩足汗繁繁未嘗乾每服此藥二三盞卽愈
見海濱溫汗少者白虎加蒼朮汗多者白虎加桂枝
白虎加桂枝方

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見
使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至
膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而
視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五
苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏旣安請孫謝
因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力衆醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也

保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗四肢沉重謂之濕溫蒼朮石膏湯主之卽白虎加蒼朮湯是也

蒼朮

兩

石膏

三錢

知母

二錢

甘草

一錢

右㕮咀水一盞煎至一半溫服謂內有濕也多不欲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜桔梗散此非熱病也

桔梗散

薄荷

黃芩

甘草

梔子

各一錢

桔梗

三錢

連翹

二錢

右剉每服五錢水煮加竹葉如大便滯加大黃半兩

海消暑丹

半夏

伏苓

生甘草

半斤

右以醋五升煮半夏盡醋熬乾姜汁作糊無見生水爲丸每服五十丸熟水咽下精意修治用之極效。中暑爲患藥下卽甦。傷暑發熱頭痛服之尤妙。夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不爲害應是暑藥皆不及此。若痰飲停節並用生姜湯下入夏之後不可缺此。

又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂

荳蔻粉

四兩

石膏

四兩

白礬

一兩

硫黃

各一

兩

水浸鉢餅爲丸彈子大辰砂爲衣用姜汁醋點新汲水化開服之。

丹暑風挾痰挾火實可用吐法

玉龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

硫黃

硝石

滑石

明礬各一

用無根木調丸

秋爲瘡

夏傷於暑秋必病瘡

治法見本門

診脈陰陽俱盛重於陰者變爲溫瘡

一歲長幼疾狀相似爲溫疫

非特之氣爲病
春應緩反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者爲時行瘟疫病也

論見傳寒

瘟疫續法

活一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也

北齊之太醫者
老君神明散治瘟疫

白术

錢一

桔梗分

細辛兩

附子一去黑皮

烏頭

四兩去皮尖

右五味爲羽朱縫絹袋盛帶之居閣里皆無病若有瘦
癩者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄
三十七以水一碗煮令大沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見活人書時毒流行用聖散子者
一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫
之行平旦輒煮一盆不問老幼良賤各一大盞卽時氣不
入

草蓆蔻

十箇熱藥
根去皮

猪苓

去皮

石菖蒲

茯苓

良姜

獨活

去芦

附子

炮製去皮

麻黃

去根去皮

厚朴

去皮姜製

藁本

澤瀉

芍藥

炮製去皮

枳殼

去皮去核

柴胡

細辛

防風去

荆芥

白朮

藿香

半夏

葛根
芩
湯

蒼朮

甘草
硝
半

右㕮咀每服五錢水一盞半煮取八分去渣熱服餘渣再煎空心服之

非時之病者寒之

衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃

黃芩

黃連

人參

桔梗

防風

人中黃

滑石

香附

蒼朮

右麌糊爲丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下氣虛者四君子湯送下血虧者四物湯送下痰多者二陳湯送下熱甚者用清便和前納同送下

本冀清臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾

中毒并惡瘡蕈毒取汁浸皂角甘蔗治天行熱疾

解一切火用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少酒取無灰酒一處研去渣溫服須更大瀉毒亦隨出雖十分渴亦不可飲水飲水難收

右三方熱多裏多者宜之

雄黃丸治療不相染

雄黃

研一兩

赤小草

炒丹參

鬼箭羽

各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每日空心以溫水下五丸可與病同床共衣亦不相染矣

活務成子螢火丸主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠍諸毒五兵自刃盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭羽

皮法

蒺藜各

一兩

雄黃

雌黃

各二兩

礬石

一兩

燒

一兩

羚羊角

鍛龜灰

鐵錘柄

入銚處燒焦用一分半

右九味搗爲散以雞子黃并雄雞冠一具和之如杏仁

大作三角縫囊盛五丸帶左臂上仍可掛於戶上

脊涼

春應煖而清氣折之則實邪在肝升麻解肌湯主之

方見溫病

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射干湯半夏

桂枝甘草湯選用之

夏寒

調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯

熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱嘔悶脈數

宜下之

大黃

去皮三分

黃芩

芍藥

葛根

桔梗

去皮三分

茯苓

去皮三分

藁本

擇真者無則川芎代之

白术

各半兩

甘草

炙已上各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時再服之得

快利便止小兒減與服盡令不壯熱但下利或霍亂者不宜服此

射干湯方見射干湯

半夏桂枝甘草湯方見半夏桂枝甘草湯

秋熱

秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加荅木湯茵陳汁調五苓散白虎荅木湯見五苓散見渴

冬溫

丹冬溫爲病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於中仍以竹木針塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用治瘟毒用此藥一味入補藥帶表同煎服之

活冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜萎蕤湯方見風濕

診

多眠多汗脈浮爲風溫

陽脈浮滑陰脈懦弱更遇於風變爲風溫論見大法

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫爲病脈陰陽俱浮自汗

出身重多眠睡莫息必姪語言難出若被下者小便不禁直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘧癥若火著之一逆而引日再逆促命期經云陽氣發汗已則身涼寒乃風溫也

風溫續法

麻黃桂枝發汗

風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發卽諳言獨語內煩躁不得臥若驚癇月亂無精如此死者皆姜桂湯加減法殺之耳風溫忌發汗宜姜桂湯身灼熱者知母乾葛湯

如渴甚者括萎根湯脈沉身重汗出者漢防已湯

萎蕤湯治風溫兼癆久溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛

喉咽乾舌強脣內疼痞腰背強

葛根解

萎蕤解

石膏一兩
杵碎

白芷解

麻黃

泡半兩 沸湯一兩

川芎

錢三

甘草

錢八分二兩

杏仁

去皮尖雙仁者半兩

青木香

錢一

右咬咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服
知母乾葛湯治風溫身體灼熱甚者

知母

錢三

葛根

錢八

石膏

錢六

甘草

黃芩

生二錢

木香

升麻

錢各一

萎蕤

錢三

南星

生二錢

人參

川芎

錢各一

麻黃

錢去節

防風

杏仁

羌活

錢各二

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去渣服
防已湯治風溫脈浮身重汗出一方無人參

防已

錢四

甘草

黃芪

錢各一

生姜

兩

白术

兩三

人參

兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去渣飲訖仍

坐被中汗出如重行或被臥取汗出

許學士云風溫誤汗用防已黃芪湯

之教

濟氣以白术加桂枝代姜主之
方見前太陽病發熱續法

主治風溫活人本方萎蕤湯以有麻黃不敢用宜白术湯若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣

若腰背強硬者加羌活 若舌乾發渴者加人參 若身灼熱甚者加知母 若身體重多汗者加黃芩 若內傷冷者不加

一身盡痛爲濕

濕病有
病而發黃爲中濕痛不得轉側爲風濕活人又以身痛脈沉爲中濕脈浮爲風濕亦通治法見太陽病體痛門

身反張爲痙

有汗爲柔症無汗爲剛症

治法見柔症門

婦人傷寒 熱入血室 妊娠傷寒 產後傷寒

熱入血室

血熱

血結胸
刺期門
者

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譖語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之東垣云要以安閒夜夢亡人皆因本火虛而爲邪也刺期門與此義同

刺期門

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲

不可行也無已則有一焉刺期門穴斯可矣予不能針請

善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸

也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水

適來適斷邪氣乘虛而入血室血爲邪迫上入肝經肝受

邪則譖語而見鬼復入膻中則血結於胸也何以言之婦

人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以

爲月水既妊娠則中畜之以養胎及已產則上壅之以爲乳

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於膻中結於乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

名小柴胡

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譎語如見鬼狀

治人云小柴胡和之

者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

○把閭氣謂下之犯上二焦謂發汗也

衍有一婦人溫病已十二日診之其脈六七至而濶寸稍大尺稍小發寒熱煩亦口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂乾姜一日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痙身漸涼脈漸平尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不樂

時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中
有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大枣生姜加乾姜五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

熱入血室續法

雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐

熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝一兩半 赤芍三兩半 生姜一兩半 大枣六枚

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室宜麻黃加生地黃湯

麻黃二兩半

桂枝一兩半

甘草兩半

生地黃兩

杏仁二十五箇去皮尖

右咬咀每服五錢水煎

柴胡多者
葛根

婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘡狂言見鬼宜用乾姜

姜柴胡湯

柴胡四兩

括蔥根

桂枝一兩半

牡礪一兩

乾姜

甘草一兩各

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服初服微煩再服汗出而愈

羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來適

斷晝日明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露方來忽
間斷欲死

柴胡

一兩半錢

人參

黃芩

甘草

半夏

七次湯洗

生地

錢各七

右爲粗末生姜三片枣二枚同煎

雲婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁
青寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加
牡丹皮主之大實滿者桃仁承氣主之

小柴胡加牡丹皮湯

柴胡

二兩

黃芩

七錢

人參

二兩

半夏

六錢

牡丹皮

二兩

大枣

三枚

甘草

半錢

生姜

各七錢

右剉細每服一兩生姜同煎

桃仁承氣湯

方見

血

桃仁承氣湯

方見

血

氣柴胡
加硝黃

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀

脈沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡

兩二

黃芩

七錢半

半夏

一兩五錢

甘草

五錢半

大黃

芒硝

各七錢半

大枣

三枚

生姜

七錢半

右剉每服一兩生姜同煎去渣下芒硝再沸溫服若脈不沉數卽不可下

柴胡
後附方
先此後

本

辛亥中寓居毗陵學官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎响如引銼牙關緊急瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日誕生不省人事予曰此熱入血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則

明了夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者
不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上脣喘急息高脊
冒不知人事當先化其痰後除其熱半急以一呷散投之
兩時頃涎下得無省人事次授以小柴胡加地黃湯三服
而熱除不汗而自解矣

自汗身
涼經脈
者桂附
紅花

婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標
病少陽本病經水適臨桂枝加附紅花湯

桂枝

二兩

芍藥

各五錢

生姜

各二兩半

甘草

一兩

附子

半錢

紅花

各五錢

右剉細各每服一兩水三盞煎服

表寒汗
解經多
者桂附
地黃
婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水
過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草

芍藥

生地

川芎

各一兩

右咬咀每服一兩水三盞煎至一盞半去渣入髮灰五錢調勺溫服不止者刺隱白

續增妊娠傷寒

大法以
參芪四物湯加君

汗下之藥佐之

人參

黃芪

當歸

川芎

甘草各五錢

芍藥六錢

加蒼朮生地亦可

右爲粗末每服五錢水煎溫服無時

海若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯四兩

桂枝

地骨皮

各七錢

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六合湯四物湯四兩麻黃細辛各半兩

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛者太

陽標病也宜風濕六合湯

四物湯四兩 防風

蒼朮七錢 煥各

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發班如綿紋宜升麻六合湯

四物湯四兩 升麻

連翹各七錢

若妊娠傷寒胸腹滿痛而脈弦少陽症也宜柴胡六合湯

四物湯四兩

柴胡

黃芩錢各七錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯四兩

大黃五錢

桃仁去皮尖十個炒各

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四兩

人參五錢

五味子錢五錢

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯四兩

厚朴

枳實五錢炒各

若姪娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯四兩

梔子

黃芩
錢五

若姪娠傷寒大渴蒸蒸而煩服長而大者宜石膏六合湯

四物湯四兩

石膏

知母
錢五

若姪娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯四兩

茯苓

澤瀉
錢五

若姪娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯四兩

琥珀

茯苓
錢五

若姪娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯四兩

阿膠

艾
各五錢一方加甘草同

若姪娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

病也宜附子六合湯

四物湯

附子

桂

若妊娠傷寒蓄血證宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下
之四物湯加生地大黃酒浸各

婦人妊娠或有血塊當桃仁勿妄施婆教子母俱無損大
黃四物對服之

丹施孺人傷風未解兩足下脰冷嗽多不吐痰頭眩蓋其
性急又當臨月

黃芩

錢半

陳皮

白朮

錢一

蘇梗

三分

木通

錢半

枳殼

炒各

麻黃

錢二

甘草

錢二

桔梗

錢半

蒼朮

各半

水煎服無時

婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當歸

湯

桂枝

芍藥

當歸各一

右剉細末服二兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飯不消脹沉者太陰病也
宜芍藥湯

芍藥

白朮

甘草

茯苓

右如前修服

活治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參

白茯苓

阿膠炒

桑寄生

右搗羅爲細末糯米飲調下二錢日二服

治妊娠傷寒安胎宜白朮散

白朮

黃芩

等分新

右爲末每服三錢水一盞生姜三斤去皮一枚擘破同
煎至七分去渣溫服但覺頭疼及熱汗出者加薄荷二三根同
煎至七分去渣溫服但覺頭疼及熱汗出者加薄荷二三根同

產惟四肢厥冷陰症見者未可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白
薑十
切

右剉水二盞煎至一盞連服取汁

葱白一物湯用葱白一把以水一升煮熟取汁令食盡亦主安胎若胎死須臾即出

治婦人傷寒妊娠服藥例

若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡若大渴者不離知母石

膏五味子麥門冬若大便泄者不離桂附乾姜白朮

若大便燥結者不離大黃芍藥若月經適來適斷者不

離小柴胡若胎不安者不離人參阿膠白朮黃芩若

發汗者不離煎鼓生姜麻黃旋覆若頭痛者不離石膏

山梔前胡非傷暑頭痛者不離柴胡甘草石膏若漏

雜方

悶者不離枳實陳皮 若胎氣不安者不離黃芩麥門冬
人參 若班發黑者不離黃芩梔子升麻

天治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細未調全臍下三十乾卽易瘥卽止

又方 片中泥金乾卽易之

二方出本事有故

又方 淫萍 朴硝 蛤粉 藍根 大黃

右爲末水調傅臍上安胎解熱極妙

治妊娠雜亂二方

附少陰吐利門

治妊娠發斑變爲黑伍宜梔子大青湯

黃芩 升麻 梔子仁各二 大青

杏仁各半

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三十煎至一盞
去渣溫服

產後傷寒

表

產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶
嘔汗出雖多陽旦證耳可與陽旦湯即桂枝湯方見太陽病

產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉一把

葛根兩三

防風

桔梗

桂枝

人參

甘草兩各一

附子一錢炮一錢

右㕮咀每服五錢枣一枚姜五片水一盞半煎一盞去
杏服溫覆使汗出若頭項強用大附子半錢煎藥揚去
沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒續法

產後傷寒宜補丹

丹產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈
不足補氣 惡寒發熱又腹痛當去惡血 惡寒發熱乳
汁不通及腹者無子黨酒用麥芽二兩炒研細清湯作四

忌寒

忌熱

服調下 有子當下用木通通草猪蹄汁調煎服
產後纔見身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾姜治之
大發其熱輕則用茯苓淡滲且熱

腹痛者
去活血

大凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是
血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或
四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏
之類竟不救者多矣

乳不
通
治宜
下乳

玉露散治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便
滯滯恐治之涼膈堅然下乳

人參

茯苓

甘草

苦梗炒

川芎

白芷各一兩

當歸

芍藥各三錢

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大
便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

大法

潔傷寒表裏攻發

有表證惡風惡寒者當發表

海藏云
惡風者

白术散惡寒
神木湯

如氣盛能食不大便無表證者可攻

春主溫屬木身溫當發汗

海藏云
神木湯

夏主長屬火身熱而

煩躁合大發散

海藏云
神木湯

長夏主化屬土及居四季

同當調其飲食

海藏云
四君子湯

秋主收屬金身涼內溫合微

下海

戴云通略

冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而

寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外

海藏云
熱在內
著調胃承氣湯

寒在內者
調中湯九

潔凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升

浮則順發之氣收藏則下之

有汗發熱惡風脈浮緩者

風傷衛桂枝湯

無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮

緊者寒傷榮麻黃湯

有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱

惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯 無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其厥與不厥量寒熱淺深而治之 有汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉
逆湯 無汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦宜涼藥三五服
下之 黃芩甘草湯 黃芩白朮湯 黃芩蒼朮湯 黃芩梔子湯 連翹飲子 小柴胡湯 八正散 京膈散
白虎湯 五黃散 此上中下三焦藥宜選用之 中暑脈虛皆惡寒自汗而渴者白虎湯身涼脈繁熱在內者急下之口燥咽乾不大便是也 無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏 有汗身大熱者桂枝湯惺惺散解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之 發汗者量四時暄暑燥濕風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之

未註

錢傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表証

也

朱古補遺云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮毛虛口申氣熱者當服散飲冬陽溫熱藥春夏兩涼寒藥

大青膏

天麻一錢

白附子

生一錢

一錢半
去毒生

琥珀

研一

青黛一錢

天竺黃

一字研

麝香

一字

烏梢蛇肉

酒浸

焰乾辰
末半兩

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同

甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲

雄黃

小塗大研搗碎根水并醋一大盞漿蓋

水

甘草末

川甜硝

各三分研細五分

寒水石

研細七錢七分

腦子

一字

硃砂

五分

右研匀煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

右大青膏發散貪睡口氣熱呵欠煩悶表症者蓋爲三歲已下小兒未能言者設也

活參常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之

方見瘧

海傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛瓜蒌桔梗各一分生姜薄荷煎或加防風川芎各一分內有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌加桔梗多虛汗夜啼者加麥門冬 傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防風等分細辛羌活減半同煎

活咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

雲人參羌活散治小兒寒邪及瘟氣時疫瘡疹頭痛體疼壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活

獨活

柴胡

人參

芎藭

枳殼

炒

甘草

炙各二兩

前胡

桔梗

天麻酒浸
各半

地骨皮

各半
兩

白茯苓

去皮
兩

右爲散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去渣溫服
不拘時候

七寶散治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉

香附炒各
三兩

陳皮

甘草炙
一錢

桔梗

白芷

川芎

各一
兩

右㕮咀姜末煎服

海麻黃芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

麻黃

赤芍

黃芩

半
兩

甘草

桂枝各二
錢半

右爲粗末水煎服

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻

葛根

黃芩

芍藥各五
錢半

甘草
生
錢

右㕮咀每服二錢水煎溫服

右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋爲三歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗惡寒第六方治有汗惡風

裏証

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水不止而善食者可微下餘不可下也此裏症也云大熱飲水能食不
大便用大黃丸作散子與服之如濟便自調慎不可妄下恐外熱逐於內而變結胸危証多矣

大小便
積進食
欬去為
裏証

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便祕赤飲水不止有下證者宜服之

甘草
半
兩

半
錢

川芎
半
兩

黑牽牛
半
兩

半
錢炒

大黃
一
兩

酒
熬

右爲細末稀糊和丸麻子大二歲每服十九溫蜜水下乳後服以溏利爲度未利加丸數

活頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲三黃丸主之四順飲連翹飲三黃丸並見痘門

身體潮熱頭目昏痛心

神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主

之洗心散見痘門

大便白頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主

大便不利
小便不宣利
頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主

如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝瀉藥白术茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澀大便褐色面赤熱者導赤散
錢傷風乘寒兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣
嗽兼腎則畏明各隨補毋藏虛見故也

傷風乘

兼脾則
肢冷或利或
泄或脹

散大青膏主之

此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥無汗脈沉滑者不宜此法宜大承氣湯而加麻粉

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發

大青膏主之未瘥調中丸主之有下証大黃丸下之後服

溫驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去脹塌氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉

治見吐瀉門治白朮散發散用益黃

湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

薄荷葉

半兩

羌活

全蝎

麻黃

去節

甘草

半升

天竺黃

姜棗

白附子

炮各一分

右爲細末每服一錢水一小盞煎至三分加竹瀝少許

妙

雲小兒表傷寒則皮膚閉而爲熱盛卽生風欲爲驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之宜大青膏

兼肺則
喘嗽

肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後

胸滿

兼腎則
聾明

腎虛則聾明宜補腎地黃丸

有表者間用大青膏發散之

傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生胃中津液多服白朮散 小兒結熱於內口乾而渴身黃

體重者宜白朮散

湯傷寒發渴宜白虎湯

潔大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之

右三方白朮散治虛渴爲下後而食少胃虛者設也白

嘯分虛

虎湯大黃丸治實渴爲未經下而能食不大便者設也

繫傷寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也合用阿膠散面白如枯骨者死不治 身熱咳嗽吐痰者當用福

銀丸

方見咳門

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽爲哽氣長出氣者設也
福銀丸治實嗽爲痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒
而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是
也

嘯分陰

陰厥陽厥

見大法條

繫身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓湯方見嘯門
湯傷寒嘔者枳殼半夏湯

枳殼

半夏各半兩

右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉

厚朴

半夏

甘草

陳皮

蒼朮

米泔浸拘各等分

右㕮咀每服一錢水牛蓋姜三片布二枚煎至二分去查溫服

瀉大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸

三方俱見辨門

潮熱

有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸

方見小兒積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘二方治表寒而吐也

自汗爲虛

陽傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參

地黃

黃芪

白芍

甘草

人參

熟地酒牛

右咬咀每二錢水半盞煎至三分去渣服

診小兒傷寒形症 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內喘息 兩手脈洪數 頰赤眼澁 身上寒毛起 口鼻出水 眼赤黃 口乾澀 咳嗽 山根青色 嘴噴嚏活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷臭氣熱爲班疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與傷寒表證同治者慎也當作班疹治之

溫病

溫病者春月之溫病而不熱也

溫病 春日溫病 未滿三日先用惺惺散二服後四五日不解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七日大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺

和解因時法

溫中法

灰包熨法

和改
用仲景
法因時
世

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻黃等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於韓祗和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之末也韓祗和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今編祗和之法於篇末以廣後學之見云

韓氏和解因時法

寸脈定
發表隨
氣氣立
方

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮爲

在表今畧舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有
陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥
則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分
二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶
學者易爲開悟耳

十國力齊等未可發表

病人二三月已前兩手脈浮數或緩或緊按之差軟寸關
尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥
此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如關尺即可投
解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見
證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症爲先脈爲後治傷
寒病以脈爲先證爲後

見傷寒脉不見傳寒症

病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若關前寸脈力小關後
尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脈
和

也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之

調脈湯

葛根一兩

防風

前胡去苗三分

甘草炙半兩

右爲粗末每服二錢水一盞生姜一塊如小指大劈破煎至七分去渣溫服如寸脈依前力小加麥三箇同煎

葛根柴胡湯

葛根一兩

柴胡去芦一兩

芍藥

桔梗

甘草炙各三分

右㕮咀每服二錢水一盞生姜二片煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加葱白三十同煎服

人參桔梗湯

人參

桔梗各三分

麻黃去節一兩

石膏兩

甘草炙三分

甘草炙各三分

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

見中風
本末見

病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷

葛根

人參

甘草

炙半兩

防風

去芦十兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去渣熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯

防風

去芦一兩

桔梗

三錢

甘草

半兩

旋覆花

半兩

厚朴

三分

右咬咀每服三錢水二盞姜一塊同煎熱服如三五寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香薷湯

川芎

石膏

升麻

甘草

炙半兩

厚朴

製半兩

右咬咀每服二錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸脈力尚小加細辛二分同煎

前二段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見而症猶未見尚可以藥解之故立方耳

小柴胡湯主之
人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘爲多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已

後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯

麻黃一兩

葛根半錢

人參五錢

甘草

炙五錢

蒼朮

七錢

右咬咀每服三錢水一盞東二枚煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荆芥三分三五服後不惡風猶

汗者加丁香皮半兩

荆芥七錢

七物柴胡湯

柴胡二兩

蒼朮

荆芥

麻黃

各一兩

甘草

錢七錢

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊枣三枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯

麻黃一兩

去節

蒼朮二兩

人參

當歸各半

甘草炙三分

丁香皮分

右咬咀每服三錢水一盞入姜一塊東三枚同煎至七分去渣服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止爲度

寸大於尺宜消表藥助陰

病人脈浮數大或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發冒悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘爲身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯

人參半

芍藥三分

石膏二兩

柴胡

甘草炙三分

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊煎七分熱服如三五

後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祇和方補之

傷寒便覺有前胡湯方用
石膏一兩前胡半兩甘草

黃芩如牡丹大青各三
錢姜葱煎服疑即是此

石膏湯

石膏

芍藥

升麻

黃芩

三分

柴胡

二兩

甘草

炙三分

右㕮咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三

五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

尺寸俱有力宜平之
病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前宜知母湯主之

解肌湯

石膏

麻黃

去節三分

甘草

升麻

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞入豉半合煎至八分去渣熟
服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩

芍藥湯

甘草

炙半兩

芍藥

一兩

石膏

三兩

荆芥穗

兩

知母湯

知母

一兩

石膏

三兩

麻黃

升麻

一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服三錢水一盞入生姜一塊同煎至七分去
渣溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩
前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈
症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

仲景云傷寒爲病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛于骨髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外傷風而引內邪出及乎內邪旣出而爲病一也古人云立此二端恐後人疑其緊脈與緩脈治別也若中風與傷寒脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表症亦可依脈症投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病症甚可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如症依前未解可作熱粥投之加葱白亦可如有汗出勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也

診海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脈頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思訓保命新書亦分尺

寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈俱浮而緩緊則爲傷寒無汗緩則爲傷風自汗又有傷寒有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大卽爲傷寒尾小頭大卽爲傷風人病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述爲和解因時法也又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也又寸口脈小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒

寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若飲冷舉按全無也若果寸口舉按全無即不可解表只宜溫中不可不知

韓氏溫中法

附症

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條目自後膚淺之學莫知其數言者只云病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰症云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼服沉者附子湯又厥

陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之良法于今世用之尚有未盡證者愚常校之自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及爲則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方纔見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因較量此形證今別立方以治之藥多對證不可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小

胸膈塞滿氣短不能相接者便可隨服證投溫中藥以治之 病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及力小於闊尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之 若立春已後至清明已前宜溫中湯主之清明已後芒種已前宜陳皮湯主之芒種已後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯

丁皮一

乾姜炮一

白朮

陳皮

丁香一
分二

厚朴一
兩制

右爲細末每服二錢水一盞葱白三寸荆芥五穗煎至七分去渣熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜各二錢

各二錢

陳皮湯

陳皮一

藿香錢

白朮

葛根一
兩

厚朴一
兩

甘草一
兩

右爲末每服一錢水一盞姜一塊同煎至七分去渣熟
服如三服未快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂
枝各半兩每服加葱白三十寸煎服

七物理中丸

白术

五錢

乾姜

三錢半

人參

七錢半

桔梗

一錢

乾葛

七錢半

藿香葉

五錢

甘草

二錢半

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸水一盞煎八
分和查熟服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏生姜
各半兩

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停等亦是陰氣盛也
更不須候寸脈短治之或胃脇滿悶身體拘急疼痛手足
逆冷速宜溫中藥和之若立春已後至清明已前宜厚
朴丸主之清明已後至芒種已前宜白术湯主之芒種已

後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸半兩

丁皮半兩

厚朴一兩
製

細辛二錢

人參七錢

甘草半兩

乾姜半兩
炮

右爲末煉蜜爲丸彈子大每服一丸煎至六分和杏熱
服三服後脈尚細及寸脈尚細無力者每服加葱白三
寸同煎服

白术湯

白术

半夏

當歸

厚朴

製

乾姜

炮各半兩

丁香七錢

右爲末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去渣熱
服三五服後脈未有力寸脈尚小者加細辛半兩每服
加葱白三十片同煎服

橘皮湯

橘皮半兩

半夏

葛根三錢各

半夏

厚朴半兩
製各

右爲末每服三錢水一盞生姜如枣大同煎至七分去
查熱服三五服後服尚小手足逆冷者加細辛半兩
病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是
停飲宜二苓湯

赤茯苓

木猪苓

白术各半兩

滑石一兩

通草

白芷蔻各二錢半

丁香皮七錢半

陳皮半兩

桂枝五錢

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去查熱服小便未
快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏半兩浙浙惡寒甚每
服加葱白三十

灰包熨法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過
上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二三升許入好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛爲度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而解病人三部脈沉寸脈小於關尺此爲陰盛當溫中藥以消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸

人參

厚朴

陳皮

藿香

當歸

細辛

神术湯亦同治陰躁而渴不可悞用涼藥若熱藥令服內

有伏陽則可若服已虛按之全無力或病人素無食慾者
只可溫服

醫學綱目卷之二

卷之二

三