

醫
學
綱
目

醫學綱目卷之十九

癰疽所發部分名狀不同

疔瘡

石癰

諸腫

瘰癧附馬結核

瘰瘤

偷鍼

天蛇頭代指

甲疽嵌甲

乳癰乳巖

囊癰陰頭癰

便毒

貼骨癰

內癰有

三 肺癰腸癰胃脘癰

通於癰
疽發於

部分

五臟身有五部伏兎一肺二肺者膾也背三五臟膾四項五此五部有癰疽者死寒熱病篇王海藏云陽氣異肺內處亦爲癰疽必死之處

不可患癰疽者七處

眼後虛處

頤接骨處

陰根

根上毛間脣與尻骨接處

耳門前後車骨接處

諸因

小腹風水所成癰疽

領骨下近耳後虛處

鼻骨中並

能害人但以諸法療之或有得瘥唯眼後虛處最險

正

宜忌破
風還生
腦上一處起爲腦癰及腦疽腦鑠並在大椎骨上入髮際

生腦癱皮起易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得
破穴須急發內毒使破穴方可

脣癱疽
愈

腦鑠一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如火
燒其色青黑如靴皮大硬不見膿卽損外反如犬咬去肉
之跡難愈錄式約切

瘻
髮防

左右鬢兩處癰疽癰初起如虫咬痕滲痛腫不赤紅難見
膿汁是爲鬢發此亦危篤之患旣損破多爲漏瘻

左右髮際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺此疾婦人患
多丈夫患少始因風濕上攻髮際亦宜出膿無傷

額爻太
陽發疽
慎風水

左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急宜藥貼破見膿
無害右額角一處發毒疽及惡瘻爲近太陽穴如腫滿太
陽卽成虛損爲近穴而難消不可破如破後傷外風水卽
能害人亦宜用藥潰膿後速飲合瘡口如經冬月卽成冷

瘡綠此處近太陽穴上至額角都爲險處

左右太陽穴或發疽癧及癰五七日不潰毒氣流入眼眶
攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水所入卽損其睛
症損眼臉而成大疾

發眉頭
攻眼與
太陽
發鬚

左右眉稜兩處發爲發眉不拘在頭尾宜慮未穴已前攻
擊在眉頭卽攻入眼損睛在眉後卽攻入太陽並宜戒慎
鼻下一處人中兩處爲發鬚此多因摘鬚外入風而結攻
作不常寒熱相併此亦害人

發頤

下頤一處發爲發頤肥人多有此疾恐手搔傷而發腫

生火發
忌風水

左右牙叉骨接處發癰疽處腫脹攻骨及牙關張口不得
因諸風熱上攻或多食燒炙之物所爲或因患牙癧卽從

牙縫中破出膿血切忌外風水觸犯

管頭按
卷頭掌

垂臂兩處發接骨下臂鷺上起如鷄鴨卵大皆由榮衛不

調所爲也。喜患實處而不透，內亦宜急消或發穴早療。
兩臂肘起在接骨下，引手至小骨之上，發癰癧。此處雖實，
奈連大小筋骨舉動不便，垂手多墜疼如臘，深沉徹骨，卽
傷筋脈，拳縮不舒，搘撒宜急以緩慢筋脈藥餌治之。

發手背
兩手背發癰疽，初生如水刺，無頭，腦頑然滿手，背腫滿後，
聚毒成瘡，深入至骨，而爲發手背。此屬五種皆發毒之類，
也。

發肋內
兩肋起疽，名爲發肋，初腫盛至十數日，不穴攻卽腫大如
杯碗，高如鍤，背痛徹內，腸絞刺左邊，患應右邊，痛右邊，患
應左邊，痛唯有此處多是。內毒却入攻而死者多人，有斯
患急以針刺出膿血，則免內攻傷內矣。

三里發
三里兩處起癰疽，初發如牛眼睛，青黑便五七日破穴出
黑血汁，膿腫攻膀胱，連腰裏拘急，冷疼此因傷筋氣勞力。

所成宜用湯藥注射去其外毒自平息矣

接骨
上枝筋

兩脚接骨近上膀胱下一處起丹疽如胡桃大硬如物打
搣之狀不苦疼但腫急脹慮其損筋亦須早出腹毒可保
平安也

脚心發
毒淺可
治深不
可治

兩脚心發徹骨者不治如脚心微皮破不至深發膿不多
者可治 瘰發雖重不至損人但世人不曉醫治自至危
殆耳

上焦宜
用解利
藥方服
風水

上焦發癰爲陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積熱
上攻外卽貼消毒逼腫藥如已結定卽用發穴藥候穴破
出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後飲合瘡口亦慮外傷
風水勿食發風熱醬廻毒物等忌房事

中焦宜
用散內
攻藥防內

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是滯滯候亦
乘虛而作不拘大小前起心堆尾者最要緊近兩腋是虛

處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬
難潰膿爲此等處偏難發穴後難合瘡口並須先用燒
內藥服後用熱藥貼令軟和慢慢破穴不得急破急破卽
朝夕出膿不住緩慢破穴卽一頓出膿易爲將息後心者
唯有十一椎脾俞下十四椎上爲腎俞腎俞下爲腰俞兩
處起癰者防毒氣內攻爲此處皆是至虛處凡有癰起先
須補內氣令實方可放破內氣實則不內攻且易得潰唯
腰俞兩處多成漏疾預防節慾則免矣

下焦宜
用和平

下焦發爲流注虛損候前陰股兩處起如鷄卵大長橫摺
內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先用和
平內藥服三五日後用發穴散及罨藥令軟卽穴後其
瘡口卽隨摺子內作長瘡瘡口破宜急用抽毒膏出膿膜
盡便貼合瘡口藥爲此處無肉可壞更不須長肉也

尾垂防

腿肚兩處起爲便瘡即下兩脣尖下大道前道後道

水
漏

成懸癰皆是虛極人患此癰近敍道左右亦名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥即用發穴散破後用抽腰膏敷盡用合瘡口散合之慎勿過冬卽成冷漏難治

垂珠
兩曲腋
兩外踝
防漏

垂珠左右兩處起癰爲驅馬墜初起大小不定此處微質皮肉薄紋繁口亦難合瘡初起宜以消散藥貼令內消此處亦易成漏瘡唯宜消散之硬卽恐緩慢難爲功矣又云交檔一處近棱線上亦爲驅馬墜防漏驅匹肩切俗名
跨馬癰是也

兩曲腋膀胱下內外兩踝前有廉刃兩邊爲裏外廉上結癰腫此處近骨難瘥宜用收毒散外貼四畔中心卽用活血肉藥貼無害

下至兩脚心發癰瘡沉深不治如微似皮薄易破者猶可也 凡有癰腫皆屬六腑有疾

癰發於嗌中名曰猛疽猛疽不治化爲膿膿不瀉塞咽半日死其化爲膿者瀉則合豕膏冷食三日而已發於頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內薰肝肺薰肝肺十餘日而死矣俱出痘疽篇下同

百脈疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止悄悄不能食此有大畏恐該上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五日可刺導引不刺導引見血八十日必死土龍疽發背

起胃俞及腎俞大發寒熱十數日太汗展頸引身盡熱如沸不穴二十日死九日可刺不刺其上下亦黑若膿青黑者死膿者不死

陽氣大發消腦溜項名曰腦瘻其色不樂腦項痛如刺以針煩心者死不可治

赤色疽發頭額及腦前并手掌中十日不穴者死七日

可刺出赤血七日未有膿不可治

不穴者不作穴而東攻西擊也

杼疽

發於頭及兩耳不穴十五日死可刺其膿色黑如豆豉或見血者死 黑疽發大椎骨上連兩夾脊上七日可刺導引爲癰疽出膿不可止吐碎骨身痒後痛者此故傷寒氣入臟腑發爲食疽也九日可刺導引之不刺不導引十日死

■發於肩及臑名曰疵疽其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五臟瘡發四五日逆燒之

疽疽篇
此當入瘡

■丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔疽五日腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十日死 陳乾疽疽發起兩肩及兩大臂連胛骨二七日痛不息亦不可動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死

■發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長躁

砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者爲馬刀
挾癰急治之

■內疚疽發兩腋下及臂并兩手掌中振寒熱血噏乾飲
多卽嘔煩心悄悄脈盛六七八日診如此可汗不汗死
■發於胸名曰井疽其狀如大蕡三四日起不早治下入
腹不治七日死矣發於膺名曰甘疽色青其狀如穀實
瓜瓠常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十歲死死後出
膿發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大
癰膿其中乃有生肉大如赤小黃治之剉藜蘆草根各一
升以水一斗六升煮之竭爲取三升卽強飲厚衣坐於金
上令汗至足已此疾蜜切○甲乙經於赤小黃下
作治之蜜藜蘆赤松根各一升

■使焚疽腫起發肪及兩肩肘頭二十日不穴死九日可
刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治蜂疽發脾

背起心俞及心包絡俞若肩髃二十日不穴死十日可刺
其色赤黑膿清者不治 特疽發肺俞及肝俞不穴二十
日死八日可刺其色紅赤內隱起如椒子者死 陰陽二
氣疽廣濶滿背或大或小不常腫熱脹大十日可刺導引
出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治 筋
疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有瘡在肥腸中
九十日死 衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日悄悄五日
變色可刺不刺卽導引出膿毒不治五十餘日死

癰發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死

矣治見經

虛條

疽湧泉疽腫起發太陰如伏鼠二十日不穴死十日可刺
發清膿赤黑者死白者可治太陰尻尾前是也

疽發於股脰名曰股脰疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

不急治三十日死矣

股脛劉涓子作股陽

發於股陰名曰赤施

急治六十日死在兩股之內不治十日死

癰陰疽發腿髀及陰股始發腰強數飲不能多七日發堅腫脹惡疼心煩躁死不治

癰發於膝名曰疣疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之者死須其柔乃石之者生

堅如石者用生樟
塗根篤之則効

諸癰疽

之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰

者三十日死

陽謂諸節之背陰謂諸節之臍

劉涓子云應者內發透外也

發於脰

名曰鬼嚙其狀如赤蔓延至骨急治之不急治害人也發

於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其輸而止其寒熱

不死發於足上下名曰四溢其狀大癰不急治之百日

死發於足傍名曰厲癰其狀不大初從小指發急治去

之其狀黑者不可消輒益不治百日死發於足指名曰

脫癰其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不衰急斬之否則死矣

痛敦疽發兩足指五日不穴死四日可刺其色發黑癰者不堪未過節者可治陽疽起足趺及足下二十日不穴死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上痒及赤黑者死禽疽始發者如疥數十處如拳打之狀發寒齒噤如此者十四日死十日可刺導引膿出卽愈衡疽發如腫或時復往來可要其所刺之導引膿出卽愈

丹琥珀膏

歸鬚

川芎

黃芪稍

蜂房

細辛

皂角

升麻

甘草稍

草麻子

木蠶子

芍藥

白欵

獨活

川椒

藁本

防風稍

枸杞子

菖蒲

降真香

官桂

瓜蒌

蘇木

白芷

杏仁

黃連

槐枝

琥珀

沉香

木香

丁香

藿香

零零香

雲母石

乳香

雄黃

硃砂

安息香

甘松

輕粉

麝香

髮灰

白礬

粉

一錢半

真酥

香油

丹

羊腎脂

右先以前十六味剉槌碎用水五升文武火熬至二升半去渣再用水五升又熬至二升半去渣與前汁一處慢火煎用槐枝不住手攪成膏用磁器盛頓起將後琥珀等十六味研爲極細末用帛包起於前膏內下淨羊脂四兩真酥二兩同膏入香油內攪令勻以文武火熬

膏內水盡用桑擦點油燒不燥爲度漸入黃丹以二兩五錢重爲一次仍用槐枝不住手攬滴水中不散軟硬得所如軟添黃丹如硬添油再上火熬却入前藥細末五兩微煎敷沸用磁器盛貯如用於紙上摊之量瘡口大小專治五發惡瘡疔腫癰癧遠年冷疳痔漏一切無名惡瘡蛇傷蝎噏大吹並皆治之

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃疮中或紫黑必先痒後痛先寒後熱

也

罐丙午歲予居藁城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方用之者無不效官給藥錢君當捨手治之遂諾其語董公榜示通衢命予施藥如此一年全活甚衆其用保生錠子千金

托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方

保生銕子治疗瘡背疽癰一切惡瘡

金脚信二錢

輕粉二錢

礪砂三錢

麝香一錢

巴豆四十九粒

武火炮生用尤妙另研文

加蟾酥一錢

右爲細末用黃蠟五錢溶開將藥和成銕子冷水浸少

時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一
餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺

丹世傳疔瘡心有一條紅線可針紅絲所至之處出毒血然後傅藥

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸

各半兩

藁本

各半兩

沒藥

各二錢

乳香

各二錢

白芨

各半兩

琥珀

各二錢

黃丹

各二錢

白膠香

各三兩

黃蠟

各二兩

粉霜

各一錢

清油

各十五粒去油

巴豆

各十五粒去皮

槐柳枝

各一百二十枝去皮

勝藥

右件一處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥
熬勿至焦濾出却將油澄清下黃丹兩錢成膏用緋帛
攤之立有神功

托裏散治一切發背疔瘡

黃芩

一兩半

厚朴

二兩

川芎

防風

桔梗

各二兩

白芷

一兩

連翹

二兩

芍藥

官桂

甘草節

人參

各一兩

木香

沒藥

乳香

當歸

各半兩

右爲細末每服三錢酒一太盞煎二三沸和查溫服

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃

二兩半生半熟

甘草

芒硝

各一兩

右爲細末煉蜜丸如彈子每服半丸食後溫酒化下或

童渴半盞研化之忌冷水

敷貼雜

金砂散取疔瘡

道人頭微炒存性一兩

抑蒼耳子

硇砂三錢

雄黃三錢

礬酥以多爲妙

右將瘡四圍刺破以少油調藥末置於瘡內紺帛封之

數日疔自出如瘡入腹嘔逆者將蒼耳搗汁飲之一方
鍋砂及黃等分研細用蜜搗先破瘡頭去

追入藥黃大在瘡口內搗花臘之亦妙

蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取一

色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥脂
瘡大小塗上厚二分乾卽易之不過十度卽拔根出須針
破塗之更加雄黃

世蒼耳與白梅研爛貼疔上拔去根

癰瘡酥丹治疗瘡取蟾酥以白麪黃丹搜作劑丸如麥粒

狀針破患處以一粒納之

取蟾酥法用硫紀破骨發上以手搗出醋汗酒稀或桑葉上用

竹簾刮下然後插在背陰處自乾用之

苦苣搗汁傳疔瘡殊驗

青苗陰乾以備冬月爲末水調

傳本草云取苦苣莖中白汁傳疗

脚出根又取汁滴患上立消

丹治疗用磁石爲末水調傳之

聖惠方

疔瘡用白蘚爲末水調傳之

聖惠

世治疗瘡用麻內蛭虫一條研傳瘡上却用膏藥貼上一
飯時去膏藥其疔自出

治疗瘡最有功效用蟬蛻僵蚕爲末酸醋調塗四圍留瘡
口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡海藏方單用僵蚕
爲末津調塗亦佳

圓治疗瘡奪命散

烏頭尖

附子底

鷓鴣

雌黃

雄黃各一錢

蜈蚣一隻

礪砂

粉霜

輕粉各五分

砒半錢

腦子少許

麝香少許

右爲細末先破瘡出惡血以草杖頭用帛帶藥末挿入于內以深爲度

日本三藏傳疔瘡方江子肉十粒半夏一大顆研末附子半枚羌蠅一枚各爲末四味臭麝香也相和看瘡大小以喬繩子圍瘡口以藥泥上又用絹帛貼傅時換新藥以可爲度此方活人甚多

聖治疗瘡甚者用附子末醋和塗之乾卽再塗千金方同

丹琥珀膏見瘡疽

又方用鍼刀鎚破疔頭以蟾酥傅之後用

野菊花

莎草根 甜菜葉 插細以無灰酒盡量調服之酒醒疔化水卽痛定如熱除不必去疔亦自愈也

獨脚茅

防風

細辛

甘草節

白僵蚕

青皮

黃連

羌活

獨活

蟬腿

赤芍藥

各等

羌活

右咬咀每服五錢先將一服加澤蘭葉少許鹽一兩同
擂爛熟酒和服然後酒水各半盞薑三片煎服此方神
効

無治十三種疔皆以此法治之

以緋帛一片裹藥取匝爲限先用亂髮鷄子大攤布帛
上牛黃如桐子大又以棘刺針二十一枚赤小豆七粒
爲末並布髮上捲緋綿作圍外以髮作繩十字縛之置
熨斗中急火燒灰研細以枸杞或子或根皮枝葉隨得
爲末用枸杞末二七緋帛灰一七共成三七研勻分二

服空心溫酒調下

世奪命丹治療瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥半
錢

硃砂三分
水飛各

輕粉

枯礬

寒水石一錢
水飛各

銅綠一字
字

麝香一
字

海羊二十箇研
即蟾牛也

右件爲細末將海羊另研爲泥和藥一處丸如棗莖大
如丸不就加好酒成之病輕者一丸二丸重者三丸未
效再服服時嚼薑白一大口極爛置手心放藥丸於薑
內裹合以熱酒送下暖處臥取汗出爲效忌水水

瑞返魂丹治十三種疔

硃砂

膽礬各一
兩

血竭

銅綠

蠍牛生用各
一兩

雄黃

枯白藜各一
兩

輕粉

沒藥

蟾酥各半
水

麝香少許

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥爲細末同研和丸如鷄頭大
每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹
在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出
卽瘥如不能嚼葱研爛裹下極効

治疗瘡毒氣入腹多嘔吐欲死者卽服內托香粉散滴乳
半兩另研真茱萸粉一兩爲細末煎生甘草湯調三錢時
時飲之常令灌潤胸膈一方用蟾黃茱萸粉乳
香等分爲末水調服

治疗瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

治疗瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁

蟬腿

貫仲各一兩

丁香

乳香各二

右爲細末每服二錢空心溫酒下

紫花地丁麥熟時有
之開紫花實甚良如

蒲公英狀但蒲公英
開黃花地丁開紫花

瑞治疗危篤者二服卽愈輕者一服立効

土蜂房

小窠全本草云土蜂房有毒利大小便

蛇蛻

全一條

右作一處器皿中盛用黃泥封固火煅存性研爲細末
每服一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已
化黃水矣仍服五聖散

大黃

一兩

生薑

三兩

瓜蔞

一兩

皂角針

二兩

右㕮咀用好酒二升同煎至八分去渣不拘時服

羅破棺丹

一方有齒病赤芍連翹牡蠣金銀花潔花地丁宣透用之

山梔

一兩

牽牛末

一兩

大黃

各一兩

甘草

京三棱

七錢炮各

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

世治疗瘡最驗用蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水或

順流水調服一碗瀉下黑水卽愈

有果者
熟丁之

追毒丸

海浮石

燒赤醋燗
七次半兩

乳香

沒藥各一錢

巴荳

四十五粒

川烏

一兩

右爲末醋糊丸如桐子大若患二三日服十九五六日服十四丸隨病上下服之先喫冷酒半盞或一盞又用冷酒吞下如嘔吞之不妨出藥依上服之病人大便不動再用三丸如疔看得端的爪破用頭垢留患處後服藥

治方
治

肘後犯疔腫垂死菊花葉一握搗絞汁一升入口卽活

此神驗亦用其根丹溪云根莖葉花皆可紫梗者佳

疔腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服一升日三服甚驗

生黃疮其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際急宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出血爲好否則紅線入腹攻心必致危困矣

白 治疔瘡以針刺四畔用石榴皮末着瘡上調麵圍四畔灸痛爲度調末傅上急裹經宿連根自出

禹錫患疔腫中風疼痛者燭驢馬糞熨瘡滿五十遍極効

診忌

無 一曰麻子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子及衣布并入麻田中行 二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉內陰陰微痛忌瓦礫埠石之屬 三曰雄疔其狀炮頭黑盤四畔仰炮葉起有水出色黃大如錢孔形忌房事 四曰雌疔其狀瘡

頭稍黃向裏壓亦似灸瘡四面炮漿起心凹色赤大如錢
孔忌房事 五曰久疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑盤四邊
有皯漿起如赤粟米忌火灸燎 六曰爛疔其狀色稍黑
有白癥瘡中潰潰有濃水流出瘡形大小如匙面忌沸熱
食爛帛物 七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四
畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十
六藥所不能治俗名黑胞忌嗔怒畜積愁恨 八曰蛇眼
疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌
惡眼看并嫉妒人見之及毒藥 九曰鷹肩疔其狀大如
匙面四畔背赤有黑粟粒起大忌食鹹物 十曰水洗疔
其狀大如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑蟹汁出中硬忌飲
漿水水洗渡河 十一曰刀鎌疔其狀澗狹如鎌葉大長
一寸左側肉黑如燒燼忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以

藥治不可亂攻 十二曰浮溫疔其狀瘡體圓曲少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑處刺不痛黃處刺則痛十三曰牛拘疔其狀肉胞起瘤不破

此十三種初發必先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末唯痒所最忌者不得觸犯犯即難治其浮溫疔牛拘疔兩種無忌縱不治亦不殺人欲知犯觸但看脊強瘡痛極甚不可忍者是犯禁也

起步孝切

石癰

堅硬雜方

■治石癰如石不治腫者生商陸根搗擦之燥則易之取軟爲度張文仲癰未潰以苦苣白汁滴之立潰本草云亦出

疔根

■木香散治瘡難消不能作膿痛不止酒調下三錢方用治癰

諸腫

卒腫起大痛尤苦根大者杵之和苦酒如泥煮三沸呴上包之

萬氏

風毒腫三年苦酒濃煎葱白以布包慰腫上

外臺秘要

治一切熱毒腫前陰根和鹽少許傅之日再易

孫氏

人食

治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻仁傅之立瘥

方附後

治腫瘍藜子一升炒黃杵細以香油和如泥再炒

令焦以舊布如腫之大小攤之貼腫上勿開頭搭上

治惡刺及狐狸刺毒腫取蒲公英草根白汁傅之多塗

外臺秘要

立瘥余七月十五日夜左手中指背揩着庭木痛不可忍

十日後瘡日深漸高大痛欲死用此而安

孫方

患熱腫水研山荳根濃汁塗乾再塗

臍月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝二升投湯中攪散掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調半盞掃一

切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫痛應手神効
山腫毒或疼痛處以赤小豆爲末水調傅頻換或用香白
芷水調傅尤妙 又方白芙蓉葉晒乾同皂角爲末水調
傅

治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調膏以帛裹於痛處
用火炙皮鞋底熨之妙方

瘰癧馬刀

結核連續者爲瘰癧形長如蛤者爲馬刀

曲陽縣劉禪師善治瘡瘍瘰癧其効更捷授予四方太
乙膏玉燭散丸散翠玉膏用之每毋見効

太乙膏治癰子瘡神効

沒藥

四錢

清油

一斤

黃丹

五兩

腦子

研一

麝香

三錢

輕粉

各二錢

麝香

三錢

輕粉

乳香

各二錢

表裏交攻

右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪又用葱薑七枝旋旋
加下葱薑爲度下火不住手攪至滴水不散却入沒乳
腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

丸効散

斑貓四十九箇不
去翅足炒

官桂半

粳米九粒

赤小豆四十個砂半

右五味研爲細末初服一字次服半錢次服三字又次
服四字煎樟柳根湯送下空心服以小便淋瀝併作溼
爲効惡心嘔吐黃水無妨其療癧日日自消矣

玉燭散治瘰癧自消和血通經

當歸

芍藥

大黃

甘草

熟地

芒硝

黃芩

川芎各等分

右爲篋末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

溫服日進一服七八日効

翠玉膏

方見
藥考

楊氏家藏治癩癧方

荆芥

白僵蚕

黑牽牛

各二錢

斑蝥

箇去頭去尾

大米炒
足用

右爲末臨臥時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時又一服五更初却用漏酒調藥一錢或二三錢量強弱用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以燈心湯下調琥珀末一錢重服以小便內利去惡毒爲愈如小便痛用青黛一錢以甘草湯調送下卽止

靈三聖丸治癩癧

丁香

五粒

班蝥

十箇

麝香

另研一錢

右爲末用鹽豉五十粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸
如棋豆大每服五七丸食前溫酒送下日進三服五七
日外覺小便淋瀝是藥之効或便下如青筋膜之狀是
病之根也忌濕麴毒食

保連翹湯

連翹一

瞿麥一

大黃三

甘草二

右剉每服一兩水二碗煎至一盞半早食後已時服在
項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二
七壯服藥不可住至五六十日方効 一方加大黃木
通貝母知母^{一作}各五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用
同前藥爲細末熟水調下三五錢

無必勝丸治瘰癧不以年深月近及腦後兩邊有小結塊
連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鯽魚一箇去腸子雄黃一粒

雞砂一錢

巴上二味並入

硇砂一錢

在鯽魚腹內卻安魚

魚

于炭火燒
網盡取出

蜈蚣一條

蓬术半兩

巴上燒

梔子一箇

皂角二挺巴上四味並燒布帖

草麻子五箇去皮

燈上燒

白芷半兩

巴上燒

梔子一箇

右爲末另用皂角二挺去皮搗碎以水三碗揉去滓煮精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成膏和藥末丸如棗莖大硃砂爲衣溫酒浸晨下十九一服至晚看肉疙瘩子若項有五箇則以五服藥取之視其所生多少以爲服數既可更進數服

白花蛇散治久漏瘰癧發於頂腋間增寒發熱或痛或不

痛

白花蛇酒浸軟去皮

骨髓乾二兩

犀角銘半兩

黑牽牛半兩半生

炒半兩

青皮兩半

右爲末每服二錢加膩粉半錢研勻五更糯米飲調下
已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌
發風壅熱物如已成瘡一月可効神驗

小犀角丸常服除去根本截其源流應効如神諸癬並
宜服之

犀角

青皮

陳皮各一
兩

黑牽牛一
兩

半

連翹半
兩

兩

半

右爲細末用皂角二條去皮弦子炮槌以布紋取汁一
碗許又用新薄苛二斤研取汁同熬成膏以前藥末爲
丸如桐子大每服三十九連翹煎湯食後服間以薄苛
茶湯服

子和一婦人病瘰癧延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉
求戴人療之戴人曰火滯所勝治以鹹寒命以滄鹽吐之

外敷藥
方

即一吐而着加次用涼膈散解毒湯等劑皮肉反復如初

治瘰癧未破者如神百藥不應者累効

杏樹葉

陰乾爲
末五分

萬年霜

火煅爲末二分
卽人中白

蝙蝠

火焙乾爲
末二分半

白花蛇

蛻蟄爲末二分半
存性

蜜蜂

七箇焙
爲末

右將杏樹葉末用清水調却入前四件藥末調勻傅患處却將皮希一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就希上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子數貼其熱自退

敗散瘰癧方神効

白膠香

海螵蛸

降真香

用心無
止滌者

右等分爲末摻患處外以水希掩之一夕而退

已破者

蜜蜂

二十一

蛇蛻

七分

蜈蚣

二條端午

前收者

右用香油四兩將前三藥入油內用文武火熬成入光粉二兩用紫枝七條如筋大者急攪候冷出火氣七晝夜方可用布攤作膏貼患處已上二方得之於葵門蜘蛛累驗不須服藥貼上五

七日
便消

貼瘰癧方用大烏頭五箇火炮五箇生用並去皮臍大皂莢二條半以好米醋二鍾刷炙醋乾爲度一半焙乾並去黑皮又用炒糯米一百六十粒同研末以好米醋於火上畧煖微煖傅貼患處入蜜少許尤佳不問有頭無頭大螭五枚日乾細研酥調如麪日兩度貼之一出聖惠方
一作蜘蛛大螭或破或不破項以下至胸前者皆治之用九真藤如鷄卵大洗生嚼常服之取葉搗覆瘡上數服即止出斗門方
九真藤即

何首
烏地

無 蝸牛散治瘰癧瘻未潰皆可治

蝸牛 不拘多少以竹簽穿瓦上晒乾燒存性

右爲末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之一法以帶殼蝸牛七箇生用取去肉入丁香七枚於七殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

無 項後側少陽經中疙瘩不辨肉色不問大小及月日深遠或有赤硬腫痛用

生山藥 一兩

法少者一錢

蜜子一錢

右研勻糊貼之如神 丹溪云山藥補陽氣生者能消腫

不去其病爲實其腫硬之謂乎

故其名則確自不容不行

世 粉金散

黃柏

草烏

等分

爲末蜜調傅之

清涼散餅

山慈姑生用

良薦等

右俱搗爲餅去汁器之能散去寒熱或以山慈姑磨調酒服大妙此藥大能散癰如神

東龍泉散塗癰

瓦粉

龍泉粉

炒即磨刀石上粉也

昆布去土

廣茂

京三稜

各半兩炒乾浸沙酒

右件同爲極細末煎熱水調塗之用此去疾尤速

世治癰用鯽魚莞花燒灰存性水調傅 治鼠癰小嫩鼠未出毛者焙乾蝙蝠糞小麥炒鬼箭根焙乾各爲末和勻油調傅乾再傅之

本治鼠癰刺蝟皮瓦上炒右一味研爲末加水銀粉乾傅

瘻治癰瘻經年不瘥者生玄參搗碎傅上日一易之

外治癩瘻燒狼屎夾傳上

本治諸瘻疾

硃砂

砒霜

礀砂

馬牙硝

各等分

右乳鉢內研細麪糊搜如香附子狀相瘡口大小作之
盡送入瘡口中恐腫時用薄苛研細塗之待收口却將
大柏皮白丁香並爲末盡入孔中如邊不乾却用江子
去殼不拘多少用麻油煎令赤去火氣後去江子入蠟
合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗上立効
治漏瘻用蛇菰子不拘多少瓦上晒乾爲末用紙燃薰藥
入瘡口立効

蛇菰子未詳
又方用大田螺肉燒存性爲末麝香少許濕則乾摻乾

則油調傳

虛實人年五六十其脈浮大者渾俠背行苦腸鳴馬刀俠癩

者皆爲勞得之

又治療癰

人參

白木

當歸

陳皮

芍藥

酒浸各一錢

川芎

香附

茯苓

半夏

各五分

甘草

少

右作一服臺二片以金銀藤煎湯一鍾半煎前藥食後就吞絲官丸五十粒

又方絲官丸

大黃

酒蒸二兩

山楂

連翹

川芎

當歸

酒洗二兩

麥芽

桃仁

蘆薈

甘草

酒洗二兩

芸薹子

黃連

酒浸一錢

海藻

酒洗兩半

升麻

羌活

炒一錢

防風

半兩

白术

二兩

黃芩

酒炒一錢

桔梗

右用神麴糊爲丸已破加人參一兩作膏用甘草節僵
蚕同煎

治頸上塊動者

夏枯草末

六錢

一錢

甘草末

右和勻每服一錢至二錢茶清調下食後

本言夏枯草大治瘰疬散結氣有補養厥陰血脉之功而
經不言觀其能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之
藥佐之外施艾灸亦漸取効此草三四月開花夏至邊便
枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之
內瀉病本之法並見前表裏條

連翹散堅湯治耳下至缺盆或至肩上生瘡堅硬如石
動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇
或已流膿作瘡或未破並皆治之

當歸酒洗

半兩

黃芩土半

土瓜根酒炒

一兩

芍藥錢

柴胡根

一兩

連翹半錢

三錢

蒼朮酒炒

三錢

草龍膽酒洗

黃芩酒炒

二錢

連翹半錢

三錢

黃連酒炒

三錢

廣茂酒

京三稜

七錢細剉

半兩同廣茂酒

一次微炒乾

右以一半爲細末煉蜜爲丸如棗大每服一百丸或一百五十九一半咬咀每服半兩水一盞八分先浸半日煎去渣熱服臨臥頭低脚高去枕而臥每口作十次嚥留一口送下丸子服畢如常安臥

升陽調經湯治遠項下或至頰車生瘰癧此症出足陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也是戊傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦得

升麻錢

八兩

連翹半兩

葛根五錢

草龍膽酒炒

半兩

桔梗

半兩

細黃芩

酒炒六錢

黃柏

酒炒去皮七錢

知母

酒洗炒兩錢

廣茂

酒洗炒一兩

甘草

炙半兩

京三稜

酒洗微同

蘆茂炒五錢

黃連

去頭酒洗五錢

右秤一半作丸，煉蜜爲丸，如棗大。每服一百丸，或一百五十丸。一半咬咀，每服半兩。若能食，大便硬可旋加至七八錢。止水二盞，先浸半日，煎至一盞，去渣，熱服。臥身脚在高處，去枕頭，噙一口，作十次嚥之。留一口，在後送下九子服藥，單臥如常。此治法也。

散腫潰堅湯。治馬刀瘡，結硬如石，在耳下至缺盆，或至肩上，或至脇下，皆手足少陽經中及療癰遍下頰，或至頰車，堅而不潰，在足陽明經中所出，或二瘡已破，及流膿水，並皆治之。服藥多少，臨病斟酌，量病人飲食多少，大便硬軟，以意消息之。

柴胡稍

升麻

桔梗

草龍膽

酒沙

黃芩

梢

酒洗炒入

錢一
半牛

連翹

錢三

酒洗

黃柏

去皮酒
炒半兩

當歸

錢三

酒洗炒入

錢一
半牛

白芍藥

錢二

酒洗

黃柏

去皮酒
炒半兩

知母

錢半

葛根

錢二

黃連

錢二

酒洗炒入

京三棱

三錢

廣茂

酒洗炒

昆布

去上
半兩

右咬咀每服六錢或七錢水二盞先浸半日煎至一盞去渣稍熱服於臥處伸脚在高處頭微低每噙一仁作十次噙至服畢依常安臥取藥在胸中停留故也另攢半料作細末煉蜜爲丸如棗大每服一百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒食後量虛實加減多少服皆倣此例

救苦勝蠶丹湯治馬刀挾癰者從耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其癰癰在於頸

下或至煩東者乃足陽明經之分野受心脾之邪而作也
今將二證合治之

黃芪

一錢護皮毛實腠理及活血氣又
實表補元氣乃疮家之聖藥也

三分構肺氣如

氣短及不調而喘者加之

真漏蘆半錢勿以白

一錢

葛根

半錢此三味俱足陽明本經藥

甘草

半錢能調中和諸藥爲大益胃

連翹

一錢此一味乃十二經橐中之藥不可無者能散血結氣橐此疮家之神藥也

升麻

一錢

牡丹皮

三分去腸胃中留滞宿血

當歸身

三分

生地黃

三分

熟地黃

三分此三味諸經中和生血涼血藥也

白芍藥

三分

月信之用味酸其氣寒能潤中

肉桂

二分大辛熱能

益氣治陽病如冬月寒溢勿用

散結聚如陰疽瘡少用之此寒因熱用之意又爲陰寒覆蓋其瘡固大作熱去之煩燥者勿用

柴胡

三分同連翹如瘡不

少陽病勿用

秦粘子

三分無勝不用

昆布

二分味鹹若瘀堅硬甚者用之能軟堅也

京三棱

炮二分

廣茂

三分此二味竢堅硬甚者用之不硬者勿用

羌活

獨活

防風

各一錢巴上三味必
同手足太陽
如按防風辛溫如瘡在脣上瘻無手足太陽
經益亦當用之爲能散結去上部風邪故也

益智仁

二分如嘔多者附不和也或吐沫
食胃中寒者加之無則勿用

麥芽

一錢消中炒二分食不
食健脾神曲炒消化者用之

厚朴

舊製一錢二分
如腹脹加之

黃柏

炒三分如有熱或腰
欲去表者此腎中
火大也更宜加用

黃連

炒三分治煩渴

右共爲細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗如米粒大每
服三錢白湯下如氣不順加橘紅甚者加木香少許
量病人虛實消息之毋令藥多妨其飲食此治之大法
也如止在陽明分者去柴胡黍粘子一味餘皆用之

如在少陽分爲馬刀挾瘻獨活漏蘆升麻葛根加瞿
麥三分如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促
者不可考其平素宜作氣盛而從病變治之權也加黃

芩黃連黃柏知母防已視邪氣在上中下而用之假令
在上焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半酒在下焦加
酒製黃柏知母防已之類選而用之如大便不通而
滋其邪盛者加酒製大黃以利之如血燥而大便乾
燥者加梔仁泥大黃如風結燥不行者加麻仁大黃
以潤之如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽
以利之如脈澁覺身亦氣澁而大便不通者加郁李
仁大黃以除風燥如陰寒症爲寒結秘而大便不通
者以局方半硫丸或加炮附子乾薑煎候水冷服之
大抵用藥之法不惟滄桑一家凡諸疾病氣蒸怯弱者
當去苦寒之劑多加入參黃芪甘草之類以瀉火而補
元氣餘皆倣此

土附子

食鹽

小便

升

雜方

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾爲末用
黑豆爛煮研爲膏丸附子末如桐子大每服十九酒吞
下早晚二服

鹹夷

溪治世義大官

一切丈夫婦人瘰癧經効牡礪用炭一

末每服一大錢食後膚恭同點日二服半月除根
楊虞世醫用此方
稱煅通亦取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄
參三兩并搗羅爲末以麴糊丸如桐子大早晚食後臨臥
各三十九酒下藥將盡癧亦除根出經驗方

治頸下瘰癧如梅李大宜速消之海藻一斤酒一升漬
數日倘稍飲之

取蓼子微炒研爲細末薄荷酒調二三錢服治瘰癧久

則効

醸收

四治瘰癧用夜合草遇夜則其葉閉合本草名合明俗名連錢母出禾田中貼水面生取其葉搗自然汁服之查盒患處効

甘緩

五文武醫治瘰癧用桑椹黑熟者一斗以布袋絞取汁石器中熬成膏子白湯化下一匙日三服紅者晒乾爲末湯

調服

聖治瘰癧腫硬疼痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥灸黃搗羅爲散每日空心將飲調下一錢七

針灸

國黃帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內着於肌肉而外爲膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請

從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥首一刺知三刺而已寒熱

萬熟

右經一章皆從經脈取臟腑之本以治療癰之末也其末出於耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者當於

手足少陽經取之或針或灸如後穴

扁瘻瘡天井

肩井

撮瘻瘡天井

半寸灸七壯
杜鵑之

東腋下腫馬刀挾瘻善自嚙舌頰天牖中腫寒熱臨泣

丘墟

灸各一分

太衝

一分灸三壯

腋下頸項腫

天池

順皮

三分灸七壯

如頷腫加後谿

二分灸五壯

腋下腫馬刀挾瘻喉

瘻

陽輔

五分灸二七壯

申脈

一分灸三壯立効

用

胸中滿腋下腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中腫淫熱脛

痠頭眩枕骨領頸痛目澁身痺酒淅振寒季脇支滿寒熱

腰腹脛外臙痛臨泣主之 馬刀腫瘻淵液章門支溝
主之 出於頰下或至頰車者當於手足陽明經取之或
針或灸如後穴 三里足陽明 合谷手陽明

丹 搗生商陸根作餅子置於瘰癧上艾炷灸餅子上乾即
易之灸三四餅出外臺
經驗

四當癧上貼肉灸十四壯神効

東 療癰馬刀將先出一瘡用四楞鐵環定住不令出移破
作口子以油紙撲紗之勿令合了以絕其瘡之源其効至
速如瘡不破或病人不肯破更以藥塗之三日一易之以

龍泉散主之

方見表
良藥

西 療癰多生肩項或赤或白或沉或浮物生如豆久似核
年月浸久其大如梅或如雞卵排列成列或生二三或生
六七俗云蟠蛇癰是也用性努力思慮過久則疾痛赤腫

繼之早治爲上

流注癰婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着初生在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注癰也又名子歲瘡宜服托裏救苦神應丸

川烏附

去皮臍生
一兩

烏頭

五
兩

當歸

酒浸
一宿

沒藥

水洗
半兩

白芷

陳皮

甘草

節各一
兩

蟬蛻

水洗
半兩

大皂角

七錢去
皮
弦子

薑黃

半
兩

右用皂角敲碎水四大碗煎至二大碗濾去渣用汁一同煮烏頭川烏候烏頭爛爲度搗如泥其餘諸藥却另爲末和烏頭泥爲丸如桐子大每服六十九飢飽皆用薄荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴其處必生腫肉如指大或黑或白乃風與氣搏宜驅風行經散氣之劑以化氣

調經湯主之

化氣調經湯與神應丸同服治流注癧

香附末

酒浸一宿
晒乾一兩

橘皮

二兩

羌活

一兩

白芷

一兩

甘草

半兩

牡礪

煅半兩

天花粉

皂角刺

各半兩

右爲細末每服二錢用清湯不拘時候調下日三次如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應丸

辰砂

血竭各一錢

麝香

一字共大黃半兩
爲細末

大甘草節

半兩

右爲哎咀作一貼河水一鍾煎半鍾調前末子臨臥服之

單窠癰者生一箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之日久自消或發於顱骨亦難治用毒藥療之勿令破

久 蓬子癰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬按不動者乃不可生憎寒發熱燥渴凡遇此症至難治雖神聖亦無如之何也

重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在下重疊見之是名重臺癰此症藥不可療不可針灸若是毒行其腫痛發渴生痰萬死一生害人極速勿覺有之急用小犀角丸粉金散治之 燕巢癰形似燕巢不可治

肺脈微濤爲鼠癰在頸支脈之間下不勝其上其應善瘦

全文易治虛實法
色白脈主治

黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈不下貫瞳子可治也

寒熱篇

禁忌

夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊爲可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉爲潮熱其症危矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也

結核

獨形而小核者爲結核

○結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消

○結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核

痰積

熱

結核在頸項方

僵蚕

炒

大黃

酒浸

青黛

分

膽星

各等

右爲末蜜丸噙

結核在下頰二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂角刺僵
蚕麝香行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷

治頸下結核不消經効用大壯蜘蛛不拘幾箇以好酒
浸之研爛同浸酌酒去渣溫熱臨臥服之

癰瘤

虛實

虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內着寒勝其
熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷
骨爲骨蝕有所疾前筋接前二字衍文筋屈不得伸邪氣
居其間而不及發爲筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得

反津液久留合爲腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有
所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚
居爲昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣
并日以益大則爲骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而
不去有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽凡此數氣者其發
無常處而有常名也

刺節真邪篇○此皆虛邪中人爲病

弗去而久留着故積歲累月而成疽也

子新寨一婦人年四十餘有瘤三辨戴人令以鹹吐之
三涌三汗三下瘳已消半次服化瘳之藥遂大消去夫病
在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

四 脘氣亦瘤丹燫熱勝氣也火之色也

火
雜方

海藻洗一

黃連二

右爲末以少許置掌中時時舐之津咽下如消三分之二須止後服一方用黃柏二兩海藻一兩不用黃連亦佳

治癰氣結核瘤瘡腫硬以昆布一兩洗去鹹搗爲末每用一錢綿裹於好醋中浸過含之咽津藥味盡再噙之

治頸下卒結囊欲成癰海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

無破結散

海藻洗

草龍膽

海蛤

通草

昆布

礬石枯

松蘿各三

麥麩四分

半夏

貝母各二

大黃一分

爲末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜諸雜毒物十日知二十日愈

王壺散治三種癰

海藻

洗

海帶

洗

昆布

雷丸

青鹽

廣茂

各半

好

子和人參化癰丹

海帶

洗

海藻

洗

海蛤

昆布

已上

四味皆培

海藻

洗

澤鴻

炒

連翹

已上各

豬膾

等分

猪膾

羊膾

各十枚

羊膾

猪膾

羊膾

猪膾

羊膾

猪膾

羊膾

猪膾

羊膾

猪膾

羊膾

右爲末蜜丸如鷄頭大臨臥噙化一二丸忌油膩物

寶金散偏醫寒氣無不瘥

猪羊膾

十對

浸水

洗去

脂膜

後晒乾

作爲細末

海藻

洗

海帶

各二

兩

洗

海帶

各二

兩

洗

海藻

洗

海帶

右件先將丁香木香海藻海帶杵爲細末入下項藥味
合和再研細重羅過每服一錢熟酒一盞調服夜臥服
垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一
月見効有胎不可服

海帶丸治癰氣久不消

海藻

洗

貝母

青皮

陳皮

右件各等分爲細末煉蜜爲丸如彈子大食後噙化一
丸大効

枯瘤方名一井散

硝砂

粉霜

雄黃

已上二錢

各輕粉

沒藥

乳香

已上各一錢

土黃

另末二兩

各輕粉

爾去殼巴豆半兩去油硝砂另爲末二錢右以硝黃
冰去殼巴豆半兩去油硝砂另爲末二錢右以硝黃
於地坑內四十九日取出於礮器處
擊作小塊研細少許硝黃即雌黃

右爲細末以津調塗瘤頂外邊歇一菲葉先以花紙貼之上用小黃膏貼之

小黃膏

黃柏

黃芩

大黃

各等分

右爲細末以水調爲糊比前藥大一遭三日一易至八九日不取直候可取一方單用黃柏末亦佳

■小兒丹瘤草麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚

妙

出小兒門

羅生肌青龍散

訶子皮

高茶

龍骨

右件各等分爲細末乾摻上

又枯瘍方

硯

硝砂

黃丹

雄黃

輕粉

已上各

斑蝥生川十箇

硃砂

乳香

沒藥各一錢

右研爲末糯米粥爲丸捏作棋子樣燥乾先灸破癰頂三炷以藥餅蓋上用黃柏末以水調貼之數日自然枯落

一方以銅綠爲末草刺瘤破摻上以膏藥塗之

點瘤癰方神驗

桑柴灰

棗樹灰

黃荊灰

桐殼灰

各二升半

蕎麥灰少

右以沸湯淋汁五碗許澄清入斑蝥四十箇川山甲五片乳香腦子不拘多少約五碗前作二碗用磁器盛之乳香腦子候冷入之後臨用時入新石灰調成膏神妙傳瘤上乾以清水潤之其効如神

羅枯瘤方

桑柴灰

碗

石灰

碗

朽木

碗

乾桑耳

兩

針灸

草烏

半斤

川烏

兩

右朽木等四味一處燒灰令有性同前二灰研勻用水一桶淋汁如法熬成膏用之

東諸癰惡氣

肩頸

男左灸十八壯右十七壯女右灸十八壯左十七壯

又法

天府

七十七北

衡陽

萬年北

甲癰天憲

一作天容千金作天府

及膿會主之

癰瘍氣合主之

卷和在西華衆人皆訕以爲吐瀉而已一日魏晉之與戴入食肆中見一夫病一瘤正當目上納內背色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂晉之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術其人從之乃引一小室中令俛臥一床以繩束其脣刺委中大出血先

令以手採其目瘤上亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎 部城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類鷄距一類羊角腕不能鉶向明望之如撻膜然夫家欲棄之戴人見之曰在乎背者爲膠瘤在面者爲粉瘤此膠瘤也以銛針十字刺破按出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法耳

■治果報面生瘡瘤方用艾丸灸十壯卽用醋磨硫黃金希上剪如螺蛳掩子大貼所癰處更用膏藥重貼二日一換候痒擣出膿如菉豆粉卽愈硫黃羅謙甫作雄黃

■瘡多着於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石瘡皮色不變者名曰肉瘡筋脈露結者名曰筋瘡赤脈交結者名曰血瘡晦憂愁消長

者名曰氣癰五癰皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致
夭枉瘤則有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰內
瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈

服癰瘤藥先須斷厚味

目皆瘍即俗謂之針也

運氣目皆方有二

一曰熱經云少陰司天之政三之氣大火行寒氣時至民
病目赤皆瘍治以寒劑也

二曰燥經云歲金太過民病目赤腫皆瘍又云陽明司天
燥淫所勝民病目眩皆瘍治以溫劑也

治偷針眼方

南星生川芎末三錢 生地黃不拘多少

右一處研成膏貼太陽兩邊腫自消

雜方

雜方

又方治偷針眼生蔓搗細盦之淚出卽愈

天蛇頭 代指

■蒲公英草清明時節如薺菜狀中開一朵花如菊花者取乾與蒼耳草二味等爲末以好醋濃煎浸洗卽愈

蒲公英忍冬酒治天蛇頭極効累驗方見乳
筋門

■治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查盦患處便効

治天蛇頭用

野落蘇即兼
絲子

金銀花藤 天蕎麥

右切細用好米醋濃煎先薰後洗

又方用人糞雜黃泥搗之裹在患處卽愈

■治手指急腫痛名爲代指以烏梅入醋研浸患處立瘥治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷卽易人
方

鹽治甲疽因剔甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復綠
穿窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸
引上脚趺跑漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能
療者用綠礬五兩形色似朴硝而綠色置於鐵板上聚炭
封之吹令火熾其礬即沸流出赤如滾金汁者是真也
候沸定汁盡去火待冷取出研爲細末色似黃丹收之先
以鹽湯洗瘡帛裹乾用此末傅之愈

鹽死治甲疽努肉暴甲膜血疼痛不瘥凡此疾須剔去肉
中甲不治亦愈或已成瘡不瘥用乳香末臙礬燒研等分
傅之内消愈

勝金方治甲疽努肉膜血疼痛不瘥用牡礬頭厚處生
研爲末每服二錢研綻花酒調下如瘡盛已潰者以此末

傳之更服煎藥一日三服

四 嵌甲陷甲割甲成瘡久年不癒者用烏頭尖黃柏等分
末之洗淨貼之

五 華陀治嵌甲累効方

硝砂

乳香

並研各一錢

膩粉

半錢

橄欖核

燒存性用

茴三子

黃丹

一字

右爲末以生麻油調先以鹽湯洗淨搘乾傳之二次効

六 乳癰乳巖

明霞陽
所屬

七 乳梗論○乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛操令稍軟吮今汁透自可

消散失此不治必成瘻癰治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷彼村工喜於自銜便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鰲棋子不痛不痒十數年後方爲瘡陷名曰妹巖以其瘡形狀凹似巖穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而感

又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有抑怒氣激滯而生者
煅石膏燒櫟皮瓜蒌子甘草節青皮皆神効藥也婦人此
病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無
月經時不可作輕易看也

血勞
乳癰

青皮

瓜萎

橘葉

連翹

桃仁

留尖

皂角刺

甘草節

破多加參芪

■神効瓜蒌散治乳癰亦效神効丹溪亦云妙捷恐貧賤
之家未能辦集者用後蒲公英草尤妙

瓜萎

一箇去皮搗爲末子多者有力

甘草

生

當歸酒浸燒

乳香

另研各二錢半

沒藥

另研各二錢半

右爲末用無灰酒三升於銀石器內慢火熬取一升清
汁分作三服食後良久服如有癰腫便服此藥可杜絕

病根如毒氣已成能化膿爲黃水毒未成卽於大小便中通利如疾甚再合服以退爲度 立効散與前方間服神妙但於瓜萎散方減去當歸加紫色皂角刺一兩六錢是也

公蒲公英草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及

丹蒲公英在處田間路側有之三四月開黃花似菊味甘解毒散滯意其可入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤浸煎湯勿入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣

張氏橘皮湯治乳癰未結卽散已結卽潰極痛不可忍者神効因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之用陳皮一味湯浸去白晒乾薑炒微黃爲細末麝香研酒調二錢初發覺赤腫疼痛一服見効

丹乳癰初發腫硬一服瘥真樺皮末酒服方寸七睡省已
失出

失苑

羅勝金丹治婦人吹乳極有神効用白齒霜即木梳上髮垢右一味不拘多少用無根水爲丸如桐子大每服三九倒流水送下食後令病左乳者左臥右乳者右臥於溫處汗出愈用新水傾於房上接之乃倒流水也

圖治婦人吹疼痛不可忍用川山甲灸黃木通各一兩自然銅半兩生用三味搗爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候

商始人吹乳獨勝散白丁香半兩搗羅爲末每服一錢七溫酒調服無時

國治婦人吹乳皂角散訶曰婦人吹乳意如何皂角燒灰蛤粉和熱酒一杯調一字頓間揉散笑呵呵

又方

乳香

研一錢

瓜蒌根末

兩右研令勻溫酒調服二錢

有熟者
清之

丹楊孺人乳腫痛

青皮

石膏

研一錢

連翹

皂角刺

炒

黃藥子

當歸頭

木通

各一錢

甘草

生三分

作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗腫處

義二孺人平時乳內有結核不爲痛忽乳邊又有一腫核

頗却有些痛

黃芩

川芎

木通

陳皮

各四錢

人參

芍藥

大腹皮

三錢

炙甘草

生甘草

各一錢

當歸頭

一錢

分二貼煎服

丹二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少

減脈左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓帶
熱下與點丸三十粒

產後輕者內消下之

連翹湯治產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝各一錢

玄參

芍藥

白芍

防已

射干各八錢

大黃

甘草

杏仁四十個去皮尖

右㕮咀以水六升煮二升下大黃次共硝分三服

一婦人年六十厚味鬱氣而形實多如夏無汗而性急
忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食
味絕半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一
日夜五六次至五七日消矣此乃妬岩之始不早治隱至
五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰一竅如巖穴出

乳石在鼻中

臘又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得
於夫者有之婦人以夫爲天失於所天乃能生此謂之巖
者以其如穴之嵌岈空洞而外無所見故名曰巖患此者
必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡
十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

貼方數

用蒲公英草搗爛盦患處神妙

用天南星末以溫酒調塗之

■治婦人乳痛成癰以益母草爲末水調塗乳上一宿自
癰生搗爛用之亦得

■婦人吹乳用素樹蛙屑飯搗成膏貼之

乳頭裂破丁香末傅之

筋師方

■乳癰寒熱短氣臥不安膺窓主之乳癰凍素寒熱痛

針灸

■乳癰在乳下中針入一分沿皮鉗拔一寸半俟渴

不可按乳根主之

大驚乳痛梁丘主之

乳癰有熱三

里主之

乳癰諸藥不能止痛者
三里歸入五分土

女子乳癰驚巨虛下廉

主之

千金云臂腫重
足跗不收臘痛

乳癰

太衝及復溜主之

妬乳太

淵主之

婦人乳餘疾盲門主之

囊癰陰頭癰

外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將以爲屬少陰腎經邪予親見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫畢丸懸掛可畏者皆不死但未知下虛年老者如何耳

論治丈夫陰頭癰師所不能醫用鱗甲一枚燒末以鷄子白和傅之良

便毒

論治穀道前後生癰謂之懸癰用橫紋甘草一兩四寸截

斷以長流水一碗文武火慢慢蘸水炙自早至午炙令水
盡甘草中心見水潤爲透細剉却用無灰好酒二小杯入
甘草煎至一杯溫服之二三服便可保無虞此病初發如
松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃子即破若破
難治此藥雖不能消過二十日後必盡消矣投兩服亦無
害林判院嘗患此癰已破服此藥兩服瘡即合甚妙

丹騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水一碗以碎浸水盡
爲末入皂角灰少許作四服湯調頓服立效

垣青皮湯治便毒

青皮

防風

當歸身

甘草稍生各等分

右㕮咀分作四服水一小碗煎至八分去粗大溫服空
心日進三服

丹毒腫或着陰卵或偏着一邊痛牽引小腹痛不可忍方

內
疎

卷引小腹痛
瘧病雜病

子和王燭散

卽四物湯調胃承
氣湯各半服之也

世又方

劉寄奴

王不留行 大黃

金銀花

木鱉子

右等分酒水煎露一宿五更服

丹便毒初起

射干

生薑如指大
搗細

右取順流水煎微沸服之以瀉爲度又用牛皮膠醋煮
塗患處

已結成膿者

大黃

半兩

枳實

三分

厚朴

錢

甘草節

一錢

連翹

半錢

桃仁泥

半錢

生薑

三片

右作一貼煎服之

又便毒

青皮

白芷

柴胡

赤芍藥

檳榔

朴硝

烏藥

木瓜

大黃

連翹

瓜萎

生地黃

甘草節

三棱

蓬朮

黃芩

犀角

皂角刺

右咬咀水三碗煎至一碗大飢服以瀉爲度
便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒下

又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白枯礬
赤石脂并用鐵圈散癰疽腫毒亦治用之效

乳香

沒藥各半兩

大黃

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

雜方

羌活

皂角刺

木鱉子

瓜萎

甘草節

草烏尖

阿膠另研

右爲細末醋調成膏以石器內火熬黑色驚綉傅之

貼骨癰

諸瘡大痛不辨肉色浸腫光色名附骨癰如神三生散

露蜂房

蛇退

頭髮洗淨等分

右燒灰存性研細酒下三錢

附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破後當養血

內癰有三

肝滿腎滿肺滿皆實即爲腫王註云滿謂脹氣實腫謂壅腫

肺之癰

喘而兩胠滿仲景六脉造吐瀉千篇謂兩胠滿謂寒

肝癰兩胠滿臥則驚不得

小便 腎癰脚下至小腹滿大奇論林億云脚下當作肚

○千金云腸道之爲病小

腹脹強按則痛便數似淋仲景云腸癰小腹疼堅蓋小腹
痛而癌堅者腎癰也小便數而似淋者腸癰也卽肺癰肝

癌之

胃脘癰人迎脈逆而盛

全文見後
胃脘癌條

肺癰腸癰胃脘癰

肺癰治法

癰疽發於內者肺癰肝癰腎癰腸癰裏內癰附骨癰惟
肺癰須先解表今表而出之

欬唾膿血其脈數實者爲肺癰若口中欬卽胸中隱痛
脈反滑數此肺癰也

問曰病者欬逆何以知其肺癰當有膿血吐之則死其脈
何如曰寸脈微而數微爲風數爲熱微則汙出數則惡寒
風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷
血脉風舍於衛其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫
時時振寒熱之所過血爲凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌

可救。膜成則死。問曰：振寒發熱，寸脈滑數，其人飲食起居如故，此爲癰腫。醫反不知以傷寒治之，不應。何以知有膜？膜之所在，何以別知其處？師曰：假令膜在胷中者爲肺癰，其脈數。欬吐有膜，血設膜未成，其脈自數。緊去但數，爲膜已成也。

先解表
次取寒
終補氣

要小青龍湯

方見傷寒解

要桂、薑大棗瀉肺湯治肺癰喘不得臥

薄蔞

炒黃研細丸如彈大

大棗

十二枚

水三升入棗先煮，取二升去棗入薄蔞，又煮一升，頓服之。又曰：治肺癰，胸滿，脹一身，并面目浮腫，鼻塞，清涕出。不知香臭，酸辛，咳逆上氣，喘鳴，迫塞。用前方三日一劑，可至三四劑。須先與小青龍湯一劑，乃與之。

要桔梗湯治欬而胸滿，振寒，脈數，咽乾，不渴，時出濁唾腥。

臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗

甘草炙各一兩

水三升煮取一升去渣分溫再服則吐膿血也亦治喉
癰三因甘草倍之每四錢名四聖散千金亦名桔梗湯
用桔梗三兩甘草二兩服後必吐膿血

苦杏葉湯治肺癰又云一本治欬有微熱煩滿心胸甲錯

苦杏葉三升切

薏苡仁半升

冬瓜仁半升

桃仁

五十枚

去皮

水一斗先煮苦杏葉得五升去粗入諸藥取二升分溫五

服當吐如粥千金云肺癰當吐膿血

苦杏葉卽汀洲間
薑灰之粗種也

治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入男子
髮灰研細入和之清米飲下可除根只兩服亦治吐血消風

散方荆芥川芎羌活人參茯苓白芍防風葛
香蟬壳各二錢厚朴陳皮各半兩爲末提也

常宜獨行方治心腎甲錯爲肺癰黃昏湯主之用夜合皮

掌大一枚水三升煮取二升分再服

後合樹按本草即鳥農樹

右肺癰證治要畧以小青龍湯先與一劑乃行氣取膿之藥將以解表之風寒邪氣此治腫瘍之例也後以常宿方終之者將以補裏之陰氣此治潰瘍之例也

皆丹溪

已上六方

取膿排

如聖丸治風熱毒氣上攻咽喉痛癰塞妨悶及肺癰

喘嗽唾濃血冒滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥久久

咯膿狀如米粥

獐腦粥

牛黃

桔梗

甘草生用各
蜜

右爲細末煉蜜丸每兩作二十丸每用一丸噙化

四濟生桔梗湯治肺癰心胃氣塞咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澁桔梗貝母川歸瓜萎仁枳殼薏苡仁桑白皮防風已上各一兩生甘草杏仁

蒸百合各半兩黃芪一兩半右修事㕮咀每服四錢水一碗半生薑五片煎至八分去渣服若大便秘加大黃小便秘加木通

桔梗白散治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者爲肺癰

桔梗

貝母各三分

巴荳一分去皮

炒研加脂

右三味爲散強人飲服半錢七癰者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一碗則定此要醫方丹溪不刪採用之者必有微意存焉

肺癰醫聖元戎搜風湯吐之搜風湯本考

治肺癰吐膿血作臭氣胷乳皆痛升麻湯

川升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

牡丹皮

芍藥各半兩

甘草二分

右剉龜末每一兩水一升半薑五片煎去渣日三服
丹濟生排膿湯治肺癰得吐膿後以此排膿捕肺生綿芪
二兩細末每二錢水一碗煎一半服 肺癰收斂瘡口止
有合懨樹皮白欵煎湯飲之

肺癰已破入風者不治 腸癰千金謂妄治必殺人腸癰
爲病小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒
身皮甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢云洪數
者已有膿脈若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲
或透脣生瘡或膿自脣出或大使出膿血

脈問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脈滑而數滑則爲
實數則爲熱滑則爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上升榮
衛相干血爲敗濁小腹痞堅小便或澀或自汗出或復惡
寒膿爲已成設脈遲緊則爲瘀血血下卽安

例

要慧苡附子敗醬散治身甲錯腹皮急如腹脹本無積聚

附子 分炮二
敗醬 分五

薏苡仁一錢

右爲末每服方寸匕以水二合煎頓服小便當下三因
薏苡仁附子同前敗醬用一兩一分每四錢水一盞半
煎七分去渣空心服

大黃牡丹湯治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色白堅大如掌熱小便自調時自汗出脈遲緊者未成膜可下之當有血脈數膜成不復可下

大黃四兩
牡丹皮三兩

牡丹皮

芒硝二

冬瓜仁

樊仁箇五十

右㕮咀水五升煮一升頓服當下腹血剛繁用芒硝半合瓜子五合劉涓子用硝石三合附後同名瓜子湯三

因用大黃榧仁各一分瓜子三分牡丹皮一錢硝二錢剉散作一貼水三盞煎至八分去渣入硝再煎沸頓服無時

■薏苡湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澁婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑是者便可與或有差亦無妨薏苡仁五兩牡丹皮桃仁各三兩瓜子仁四兩剉散每四大錢水蓋半煎七分服姚氏去桃仁用杏仁崔氏加芒硝二兩千金方同

醫案曰女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急孫診曰腹痛脈當沉細今脈滑數此腸癰也以雲母膏一兩作丸如桐子大以牛皮膠烊溫酒調膠水下丸子藥餉時服蓋膏下腹血一盆而安

子灸法屈兩肘正肘頭銳骨是穴灸百壯下腹血而安

例
濟瘡補

王氏餘話有婦人腸中痛不可忍大便自小便出李生診之曰芤脈見於陽部此腸癰也乃出雲母膏作百十九煎黃芪湯吞下利膿血數升而安李曰十芤積血在臍關芤爲腸生癰也李乃楊吉老之壻葉舉業習醫官取醫博士內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而向裏非干腸胃盲膜也謂之內者以其視之不見故名焉

右腸癰五方丹溪先生所集也前三方內其要畧一方元本雖云內有癰膿然先生不言之而又連千金三因二方置於篇首者蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠烊黃芪煎湯吞藥者蓋亦潰瘍補例也

扁帝曰人病胃脫癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆甲乙經沉逆作沉澁逆者人迎甚盛甚

勞

盛則熱人迎者胃服也逆而盛則熱聚於胃中而不行故
胃脘爲癰也

病能篇

■射干湯治胃脘癰人迎服逆而盛嗽脹血榮衛不流熟
聚胃口成癰

射干去毛

桔梗

赤茯苓去皮

升麻各一兩

赤芍藥

一兩半

白朮

半兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去渣入地黃汁一
合蜜半合再煎溫服不計時候

■復元通氣散治諸氣滯耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛

消腫

青皮

陳皮各四兩

甘草三寸生

熟各半兩

川山甲炮

瓜萎根各二

兩

金銀花一

兩

連翹一

兩

右爲細末熱酒調下

卷之二

診

腸癰大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯加連翹秦艽
近肛門破入風者難治用防風之類 大凡破傷風在
頭面則以白芷爲君防風頭佐之蓋去頭面皮膚之風故
也在身體及四肢則以防風爲君隨身稍用下部則以獨
活佐之 肺癰吐膿後其脈短而濶者自痊浮大者難治
其面色白而反赤者此火之尅金皆不可治

金匱方論曰熱在上焦者因欬爲肺痿肺痿之病何從得
之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又
被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中反有濶
唾涎沫者爲肺痿之病若口中辟辟燥欬卽胷中隱隱痛
脈反滑數此爲肺癰欬唾膿血脈數虛者爲肺痿數實者
爲肺癰

按此言肺痿屬熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此屬陰

虛火熱甚是也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾用灸甘草乾薑此屬寒也肺痿吐涎多心中溫液者用灸甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治之故肺痿又有寒熱之異也

諸勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內盛於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強脅脹脹滿久久不瘥已成肺痿也肺癰者由食啖辛熱炙焯或酣飲熟酒燥熱傷肺所致治之宜早

醫學綱目卷之十九