

醫

宗

必

讀

醫宗必讀卷之五

雲間李中梓士材父著

門人黃寅錫清伯父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

傷寒

黃帝曰熱病者皆傷寒之類也其死皆以六七日之間其愈皆
十日以上者何也冬寒之氣感而即病名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病
岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也巨陽也太陽為六經之長統其攝陽分故諸陽皆其所屬其
脈連於風府故為諸陽主氣也風府督脉穴太陽經脉覆於人脊背之表故主諸陽之氣分
之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死陽氣不傷邪氣不得散越鬱而為熱
寒散則熱退其兩感於寒而病者必不免於死兩感者陰陽俱
故雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死傷寒表裏同病也
太陽與少陰同病則頭痛與日乾煩滿陽明與太陰同病則身
熱譫言與腹滿不欲食少陽與厥陽同病則耳聾與黃連而厥
三陰三陽俱受病水漿不傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊
入昏不知人六日當死也

強足太陽爲三陽之表而脈連風府故傷寒者多從太陽始二

日陽明受之陽明主肉其脈使鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾

不得卧也卧不安也三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡於

耳故胸脇痛而耳聾邪傳少陽者三陽已盡將入太陰故爲半

屬少陽口苦咽乾脇下脹滿乾嘔不能食往來寒熱蓋三陽經

邪在陰則寒在陽則熱在半表半裏故寒熱俱見也三陽經

絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已三陽爲表屬府邪四

日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾邪在三陽

則傳三陰自太陰始也仲景曰脈浮而緩手足自溫失於汗邪

聚在太陰腹滿而吐食不下自利益甚腹自痛也五日少陰

受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴腎屬水而

故燥渴仲景曰少陰爲六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於

肝故煩滿而囊縮仲景曰厥陰爲病氣上衝心中痛飢不欲

食食則吐衄下之利不止按傷寒傳變先自三陽後入三陰

此常序也東垣曰太陽經病若渴者自入於本也名曰傳本太

陽傳陽明者名巡經傳太陽傳少陽者名越經傳太陰傳少陰
者名表裏傳太陽傳太陰者名誤下傳太陽傳厥陰者名巡經
得指傳陶節庵曰或自太陽始或傳二三經而止者或始終只
在經者或越經而傳者或初人太陽不發熱便入少陰而成
陰證者或其中陰經者有兩經或三經齊病不傳者爲合病有
一經先病未盡又過一經之傳者爲併病有三陽合病若三陽與三陰
合病即三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死
是兩感矣傳經已偏邪當解若過經而不解則深入於府府不解則
丙則五藏不通所謂其死皆以六七日者如此劉草惡謂傷
寒傳足不傳手其說蓋出此篇而誕妄實甚夫人之氣血運行
周身豈邪遇手經而有不入者哉寒之傷人必生皮毛者
肺之合表外則寒氣內則喘嗽極氣非傳肺乎舌胎舌亂
非傳心與胞絡乎洩瀉結非傳太陽乎瘧閉非傳小腸乎疝
滿上下不通非傳三焦乎且本文云五藏六府皆病豈手經不
亦內乎然經言傳變不及手經者何也足之六經可其不兩感
於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九
日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十

一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噤十二日厥陰病衰囊縱

少腹微下大氣皆去病日已矣

所謂其愈皆十日以上者如此又有言傷寒以不服藥爲中醫

者其說本於此不知經文爲氣

實者言也若正虛邪勝則死譬如人溺洪濟不爲援手而救其自渡全活者幾希矣帝曰

治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日

者可汗而已其滿三日者可泄而已

各通者言各明經脉隨證施治也未滿三日其邪在

表汗之而愈滿三日者其邪在裏下之而愈然此特道其常耳

正理論云脉大浮數在表可汗脉實沉數在裏可下故曰數雖多有表證者必汗日數雖少有裏證者必下第當以表裏爲辨不可以日數拘也

愚按冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒固密者毋勞

爾形毋搖爾神形神並守偕行於閉鑿封藏之本者也一有不

謹而犯寒威則殺厲之毒乘於肌體冬月卽發名正傷寒伏而

不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂虞治之或差反掌

生殺自仲景以來名賢代起立言不患不詳患其多而惑也陶

節庵曰得其要領易於拾芥脉證與理而已求之多岐則支離
繁碎如涉海問津矣脉證者表裏陰陽虛實寒熱也理者知其
常通其變也多岐者蔓衍之方書也余有感於斯言約六法以
盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散
寒勝之時陰勝之藏陽氣不充則表不解雖身有大熱必用辛
溫一曰涼解炎熱熾盛表裏枯涸陰氣不營亦不能汗宜用辛
涼一曰平解病在陰陽之間既不可溫又不可涼但宜平用期
於解表而已吐者治其上也吐中有發散之意可去胸中之實
經曰在上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿
在氣燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍
緩但見痞實者攻之更緩或行血畜或逐水停輕重緩急隨證
靈通也溫者溫其中也藏有寒邪不溫則死夫氣爲陽氣虛則

寒故溫卽是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本非下證若不清之熱何由散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳今人畏而不用使傷寒犯虛者坐而待斃大可憐已如屢散而汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而火不退陰不足也人知寒涼可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不痊補正則邪自除溫中則寒自散此必見衰微之陰脈者也傷寒論曰陰證得陽脈者生陽證得陰脈者死人皆奉其言未知釋其義夫正氣實者多見陽脈正氣虛者多見陰脈證之陽者假實也脈之陰者真虛也陳氏曰凡察陰證不論熱與不熱惟憑脈用藥至爲穩當不論浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰然則

沉小者人知爲陰脉不知浮大者亦有陰脉也是知傷寒雖具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正氣實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重氣實而病者攻之卽愈雖不服藥經盡卽安何足慮也所可慮者惟挾虛耳奈何庸淺之輩不察虛實但見發熱動手便攻虛而攻之無不死者且曰傷寒無補法謬之甚矣獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用人參桂附者八十有奇東垣丹溪節菴亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也謂傷寒無補法可乎夫實者不藥可愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者握傷寒之要矣何必求之多岐哉傷寒十六證傷寒者寒傷營血脉浮而緊頭痛發熱無汗惡寒傷風者風傷衛氣脉浮而緩頭痛發熱有汗惡風傷寒見

風者既傷於寒復感風邪惡寒不躁其脉浮緩 傷風見寒者

既傷於風復感寒邪惡風煩躁其脉浮緊

以上四證皆冬月即病者

溫病者

冬受寒邪來春乃發發熱頭疼不惡寒而渴脉浮數

溫瘧者

冬受寒邪復感春寒

風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱

自汗身重嘿嘿欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮

溫疫者

冬受寒邪復感春溫時行之氣

溫毒者冬受寒邪春令早熱

復感其邪

以上五證皆冬傷於寒而病發于春皆有溫之名也

熱病者冬傷於寒至夏乃

發頭疼身熱惡寒其脉洪盛

傷暑者暑語爲邪自汗煩渴身

熱脉虛

傷濕者感受濕邪身重而痛自汗身不甚熱兩脰逆

冷四肢沉重胸膈滿悶

風濕者既受濕氣復感風邪肢體重

痛額汗脉浮

瘧者身熱足寒頭項強急面赤目赤口噤頭搖

角弓反張若先受風邪復感於寒無汗惡寒爲剛瘧先受風邪

復感於濕惡風有汗爲柔痙

類傷寒五症一日痰中脘停痰憎寒發熱自汗胸滿但頭不痛項不强與傷寒異耳一日食積胃中停食發熱頭痛但身不痛氣口緊盛與傷寒異耳一日虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳一日腳氣足受寒濕頭痛身熱肢節痛便閉嘔逆但腳痛或腫滿或枯細與傷寒異耳一日內癰脉浮數當發熱而惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿也胸中痛而欬脉數咽乾不渴渴唾腥臭肺癰也小腹重按之痛便數如淋汗出惡寒身皮甲錯腹皮腫急脉滑而數腸癰也胃脘痛手不可近胃脉細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而誤認傷寒禁其飲食必死

表證發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻乾不眠胸脇痛

耳聾寒熱嘔脉浮而大或緊或緩

有汗脉浮緩無力表虛也無汗脉浮緊表實也

裏證不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞭滿大便不通腹痛

腹鳴自利小便如常語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿裏縮而厥

唇青舌卷脉沉細或沉實

腹鳴自利不渴唇青舌卷無熱惡寒下利清穀身痛脉沉微裏虛也腹中

難大便閉語潮熱腹滿裏實也

表裏俱見屬半表半裏表裏俱無不可

汗下小柴胡湯隨證加減

陰證身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入

二便不禁面如刀割色青黑或喜向壁卧閉目不欲見人鼻氣

自冷唇口不紅或自或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡

黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷透手也陰毒者腎

本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中

絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗

恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲呶逆六脉沉微或尺衰寸盛五日可治六七日不可治陰證似陽者煩躁面赤身熱咽痛煩渴脉浮微手足冷大便洩小便清昏沉多眠又有身熱反欲得衣口不渴指甲黑此陰盛於內眞陽失守也

陽證身動氣高而喘目睛不了了呼吸能往能來口鼻氣熱面赤唇紅口乾舌燥謔語能飲凉水身輕如常小便赤大便閉手足溫指甲紅陽毒者邪熱深重失汗失下或誤服熱藥熱毒散

漫舌卷焦黑鼻中如烟煤咽喉痛甚身面錦斑狂言直走踰垣

上屋登高而歌弃衣而走脉洪大滑促五日可治六七日不可

治吐衄血藥入即吐陽證似陰者手足冷大便閉小便赤煩

悶昏迷不眠身寒卻不欲衣口渴指甲紅脉沉滑或四肢厥冷

陰厥脉沉弱指甲青而冷此陽極於內眞陰失守也

六經證治足太陽膀胱此經從頭頂貫腰脊故頭痛惡寒發熱脊強然風與寒常相因寒則傷營惡寒頭痛脉浮緊而無汗用麻黃湯開發腠理以散寒得汗而愈風則傷衛惡風頭痛脉浮緩而有汗用桂枝湯充寒腠理以散風止汗而愈若夫風寒兼受營衛俱傷用大青龍湯此三湯者冬月天寒腠密非辛溫不能發散故宜用也若春溫夏熱之證皆用羌活冲和湯辛涼解之傳至陽明則目痛鼻乾不眠以葛根湯升麻湯治之此經有府之別如目痛鼻乾微惡寒身熱脉浮洪病在經也潮熱自汗譫語發渴大便閉搗去衣被手揚足攣發斑發黃狂亂惡熱脉沉數病在府也傳至少陽則寒熱而嘔胸脅痛口苦耳聾此爲半表半裏之經表證多者小柴胡湯裏證急者大柴胡湯過此不已則傳陽明之府表證悉罷名爲入裏惡熱譫語口燥咽乾不大便脉沉實如痞滿燥實四證皆具三焦俱傷宜大承氣湯但見

痞燥實三證邪在中焦宜調胃承氣湯不用枳櫟恐傷上焦之氣也但見痞實二證邪在上焦宜小承氣湯不用芒硝恐傷下焦之血也小腹急大便黑小便不利如狂喜忘竅血證也宜桃仁承氣湯傳至三陰四肢厥冷腸痛吐瀉口唾冷涎畏寒戰慄面如刀割引衣踰卧脉見遲軟急宜溫之輕者理中湯重者四逆湯或初病起不發熱便見寒證者名爲真中陰經亦以二湯主之以上各經治法一見表證卽與汗之一見裏證卽與下之一見虛寒卽與溫補但當以脉證爲據不可以口數爲拘也可汗頭痛項強皮節腰背俱強身疼拘急惡寒發熱無汗脉浮數或浮緊皆可汗若汗後不解仍發熱脉浮須再汗之

不可汗無表證者不可汗 脉沉不可汗 尺脉遲不可汗

脉微弱者雖惡寒不可汗 咽中閉塞者不可汗 諸動氣者

不可汗 淋家不可汗 亡血虛家不可汗 厥者不可汗

汗家不可重汗 太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒心下痞

不可汗 脉弦細頭痛而熱屬少陽不可汗

昔范雲患傷寒時武帝有九錫之命

謂徐文伯曰可速愈乎文伯曰甚易但元氣不足恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死可矣況二年乎遂以蒸法取汗而愈後二年果卒虛者其可輕汗哉

可吐病在膈上者可吐 汗下後虛煩懊憹者可吐

不可吐脉虛不可吐 厥逆者不可吐膈上寒乾嘔宜溫不宜吐

可下汗後不解邪傳胃府可下 潮熱腹痛脉實可下 陽明

多汗譫語有燥糞可下 潮熱手足腋下汗出譫語者可下

吐後腹滿可下 凡臍腹硬或痛不可按者可下 下後不解

臍腹硬痛可再下 結胸脉不浮可下 少陰病下利清水其

色青者心下必痛口乾者可下 大陽證熱結膀胱小便不利

小腹急結其人如狂者血畜也可下 陽明證其人喜忘大便
黑必有閹血可下 陽明無汗小便不利心中懊憹必發哥下
不可下表未解者不可下 腹脹可按而減者不可下 諸虛
者不可下 陽微者不可下 咽中閉塞者不可下 諸動氣
者不可下 脈弱者不可下 脈浮大者不可下 小便清白
者不可下 陽明病面赤心下雖鞭滿不可下
用火法以火燒地布桃葉拍葉亦可設席置病人於上卽汗出 或
醋炒香附熱熨胸背卽汗 或置火於牀下 或灸灸
用水法傷寒思飲水爲欲愈若不與則不愈若恣飲則水停宜
以新汲水少與之待再思再與 熱甚者以青布浸新汲水中
置病人胸前熱則易之甚者置病人於水中或浸手足或漱口
若表未解及陰證似陽者忌之

發熱翕翕而熱者表也

羌活冲和湯

蒸蒸而熱者裏也

輕者大柴胡湯重者承氣

湯半表半裏者表裏俱熱而輕於純在裏也

小柴胡湯

至於三陰發

熱則有腹痛肢冷脉沉下利爲異

四逆湯

潮熱屬陽明一日一發

日晡而作陽明內實也大便秘者

承氣湯

表未罷者

小柴胡湯煩熱兼

渴者

竹葉石膏湯

心煩不眠

酸棗仁湯

煩而心悸

小建中湯

煩而悶者

梔子豉湯熱

者

白虎湯

寒者

附子湯

惡寒

不見風亦惡寒身雖熱不欲去衣彼

發熱惡寒者陽也

羌活冲和湯

無熱惡寒者

陰也

理中湯

下證悉具微惡寒者表未解也

羌活冲和湯

下後不解發熱而渴惡寒

白虎湯

惡寒而嘔心下痞者

五苓散

汗後

惡寒虛也

芍藥附子甘草湯

背惡寒表未解也

葛根湯

背惡寒而潮熱

加桂湯

口渴心煩背微惡寒

白虎加人參湯

背惡寒潮熱腹滿

小承氣湯少陰

病口中和背惡寒

附子湯

汗後不解反背惡寒者虛也

芍藥甘草附子湯

惡風

風不惡

太陽惡風無汗而喘

麻黃湯

有汗

桂枝湯

吐下後不解

表裏俱熱時時惡風燥渴而煩

白虎加人參湯

汗多亡陽惡風者

桂枝湯

自汗惡風寒者

桂枝湯

惡寒自汗表虛也

小建中湯或黃耆建中湯

自汗不惡

風寒表證罷裏證實也

承氣湯

汗多小便利必津液竭大便雖鞭

不可攻宜蜜導

用蜜於銅器中未少許和之

微火煎稍凝攪之勿令焦皂角

大便急

自汗而渴小便難

五苓散

汗多不止曰亡陽

桂枝湯

本川芎白芷各一兩牡蠣粉

盜汗在半表半裏膈有熱也

小柴胡湯

頭汗者熱不得越陽氣上騰

承氣湯

心下滿頭汗出水結胸

也

小半夏湯

頭汗出齊頸而還發黃也

茵陳五苓散

頭汗出小便難者

死

手足汗大便燥謔語

大承氣湯

寒不能食小便不利水穀不分

手足汗者

理中湯

頭痛

太陰少陰

有身熱無頭痛厥陰有頭痛發熱無汗惡寒

痛無身熱若身熱又頭痛

傷寒

傷寒

傷寒

傷寒

傷寒

麻黃湯 大便六七日不通頭痛有熱小便清者不在裏仍在表

沖和 頭痛甚者必衄葛根蔥白湯少陽頭痛胡湯頭痛寒熱寸

脈大痰厥也散瓜蒂厥陰頭痛嘔而吐沫黃湯厥陰頭痛脈微遲

爲欲愈如不愈中湯陽明頭痛不惡寒微惡熱不大便調胃承

身痛太陽脈浮身痛無汗麻黃湯陽明下證已見但身痛者表未

解也麻黃湯發熱有汗身痛桂枝湯陽明脈浮身痛葛根湯汗後脈沉

遲身痛血虛也黃耆建中湯陰毒嘔逆下利身痛如被杖唇青面黑

逆湯甘草附子湯一身盡痛發熱惡寒尚寒桂枝湯一身盡痛發熱面黃二

便反利甘草附子湯一身盡痛發熱發黃頭汗出背強小便不利溼

也茵陳五苓散一身盡痛發熱面黃熱結瘀血也抵當湯

筋惕肉瞤汗多亡陽筋肉失調動兼肢冷者真武湯輕者茯苓桂

白朮汗吐下後見此者先服防風白朮牡蠣湯湯小建中湯

胸脇滿胸滿多表證葛根湯喘而胸滿麻黃杏仁湯脇下痞硬中

東加胸脇俱滿或鞭痛或嘔或不大便舌上白胎但小柴胡湯邪在

胸汗下之而煩熱黃芩湯胸中痞鞭氣上冲喉寒也瓜蒂散陽明少

陽合病下利身熱脇痛大柴胡湯汗後頭痛心痞脇滿十棗湯

結胸病發於陽而反下脈浮者先以小柴胡解表然後下之

按之則痛小結胸也小陷胸湯不按亦痛大結胸也大陷胸湯懊憹躁渴

實熱結胸也三黃湯血結胸者小腹滿小便不利抵當湯飲水不

散水結胸也小半夏湯用陷胸等藥不效者枳實理中丸煩亂欲死宜

水漬法凝雪湯漬布滿

痞滿而不痛病名曰痞病發輕者通用枳桔胸滿脈濡半夏瀉

手足溫按之濡關上浮者黃連瀉乾嘔有水氣生薑瀉下利腹

鳴甘草瀉胃寒欬逆理中關脈沉緊大柴胡湯

胃寒欬逆理中關脈沉緊大柴胡湯

大腹滿六七日不大便腹滿常痛者承氣湯腹滿時痛者桂枝湯

腹滿吐食枳桔理中湯汗後脹滿厚朴半夏甘草湯腹滿漉漉有聲水與

氣也半夏茯苓湯小腹滿邪氣小腹滿為有物小腹滿小便利畜血也重者桃仁

者犀角小腹鞭滿小便自利發狂者抵當湯小腹滿手足厥冷真武

湯不結胸小腹滿按之痛冷結也元氣

腹痛陽邪痛者其痛不常按而痛甚為實右關脈實腹痛便

閉承氣湯下之早因而腹痛中陽脈瀼陰脈弦腹痛洩利建中

桂枝湯少陰厥逆或利而欬四逆加五味厥陰小腹痛當歸四

咽痛少陰不可汗不可下甘桔湯陽毒咽痛口瘡赤爛升麻六物

汗亡陽屬少陰當咽痛猪膚湯陽毒咽痛口瘡赤爛升麻六物

黃連非時暴寒附於少陰之經脈弱咽痛必下利先用半夏桂

汁

湯

逆下利咽痛手足微冷無熱證者

四逆湯

脇痛往來寒熱脇痛胸痛

小柴胡湯

身涼表證罷乾嘔脇痛有

水也

十棗湯

呃逆

仲景作欬逆即此脈微細呃逆胃寒也

橘皮乾薑半夏生薑湯丁香柿蒂湯

脈洪大而呃心火上奔肺不得納

心湯

服藥無效用鯁法

乳香等分爲未酒煎服之失下呃逆大便實者

小承氣湯

嘔吐噦嘔者聲物俱出吐者無聲出物噦者有聲無物 太陽

陽明合病當自利若不利但嘔

葛根湯

少陽有嘔證

渴者

茯苓湯

先渴後嘔水停心下

飲後餘熱在胃而嘔者

竹葉湯

太陽少陽合病自利而嘔

牛夏生薑湯寒熱嘔而不渴

黃芩湯

嘔而發熱心下急微煩

有熱胃中有邪陰陽不交腹痛欲吐

黃連湯

三陽發熱

醫宗必讀

卷五 傷寒

七

而吐

俱用小柴胡湯

發熱六七日不解煩渴欲飲水入即吐

五苓散 虛熱

少氣氣逆欲吐

竹葉石膏湯

寒多而吐

理中湯

不飲而吐

理中湯去朮加生薑汗

下後胃虛冷吐

乾薑黃連黃芩人參湯

少陰吐者

真武去附子加生薑

吐逆二便秘

厥逆無脈

大承氣湯

心下有水氣乾嘔身熱微喘或自利

小承氣湯 不發

熱不惡寒肋痛乾嘔

十棗湯

自汗頭痛乾嘔

桂枝湯

乾嘔自利

黃芩半夏

生薑

裏寒外熱脈微欲絕乾嘔

通脈四逆湯

咳嗽

有聲無痰曰咳有痰有聲曰嗽

太陽證罷表未解心下有水氣乾嘔發熱

而咳

小青龙湯

太陽發熱咳嗽

方同上

太陽發熱嘔噦而咳

小柴胡湯 少陽

寒熱往來咳嗽胸脇滿或泄利

小柴胡去參薑加五味子乾薑

少陰咳嗽

真武湯

少陰腹痛小便不利四肢沉重咳嗽者水氣也

真武湯加五味子細辛乾薑

喘太陽無汗而喘

太陽陽明合病胸滿而喘

俱用麻黃湯 邪氣壅盛

而喘雖汗而喘不已宜再發之

麻黃杏子石青湯

誤下太陽利不止喘

而有汗脉促

黃芩湯

連

太陽汗後飲多水停而喘

小青龙湯去麻黃加杏仁

小腹滿

太陽下之微喘表未解也

桂枝湯

水停心下腎氣乘

心爲悸爲喘

五苓散

陰喘脉伏而逆

理中湯

喘而氣促腹滿

煩躁

太陽中風脉浮

緊發熱惡寒身痛無汗煩躁

大青龙湯

煩躁消

渴

五苓散

下利咳嘔

煩躁

猪苓湯

下利咽痛胸滿而煩

猪苓湯

自汗

煩躁小便多

芍藥湯

少陰心煩不卧

黃連雞子湯

少陰吐利手足厥

冷煩躁欲死

吳茱萸湯

後復發汗晝則煩躁夜則安靜不渴無熱

乾薑附子

六七日無

大熱陰盛隔陽身冷脉細煩躁不飲水

陰躁欲生

升中

葛根湯

懊憹

比之煩躁

有甚焉

汗吐下後虛煩不眠甚則懊憹

梔子豉湯

陽明脉浮咽燥腹滿而喘發熱汗出惡熱懊憹

後懊憹有燥屎

承氣湯

短氣煩躁懊憹

大陷胸湯

陽明無汗小便不利

醫宗必讀

卷五

傷寒

七

懊惱發黃

茵陳蒿湯

戰慄

戰者身動慄者戰慄也

慄而不戰陰盛陽虛

薑附四逆湯

悸

心中築然欲解也

代心悸

炙甘草湯

傷寒三四日心悸而煩

中湯

汗發過多

心悸喜按

桂枝甘草湯

心神不寧怔忡不卧

安神丸

少陰病

厥逆心下悸

四逆散

飲水多而悸雖有他邪亦先治水

茯苓甘草湯

寒熱心悸

小便不利心煩喜嘔

小柴胡湯

少陽發汗

譫語悸動

小柴胡湯

渴

或因熱耗津液或汗下過多

太陽脉弦而渴

小柴胡加天花粉

太陽表不解有水

氣而渴

小清能去半夏加瓜蒌湯

脇下痛手足溫而渴

小柴胡加人參

天花粉

厥陰

病消渴氣上冲心

茯苓白朮甘草桂枝四物湯

汗下後寒熱胸脇滿小便不利

頭汗心煩渴而不嘔

乾薑湯

太陽脉浮而渴

桂枝湯

脉浮發熱

渴欲飲水小便不利

猪苓湯

少陰下利咳而嘔渴煩不得眠

猪苓湯

多不汗吐下後六七日不解表裏俱熱惡風大渴

白虎加人參湯

汗後

脉大而渴

白虎加人參湯

夏至左

右虛煩而渴發熱不惡寒

竹葉石膏湯

便不利而渴

必發黃

茵陳蒿湯

少陰自利而渴小便清利下焦虛

寒

甘草乾薑湯

心煩但欲寐或自利而渴少陰也

理中湯

陽明脉長而

實有汗而渴

承氣湯

脉沉滑熱實煩躁而渴

大陷胸湯

口燥咽乾

引飲日燥不引飲日燥乾

少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脉弦

小柴胡湯

口乾脉浮緊微數人參湯陽明無大熱背惡寒口燥咽乾

上方同

少陰病二三日口燥咽乾急下之

大承氣湯

漱水不欲嚥

此證屬陽熱熱在經不在府也

陽明身熱頭痛脉微漱水不欲嚥

必發衄

犀角地黄湯

外證無寒熱漱水不欲嚥必發狂此畜血

也

桃仁承氣湯

發狂

熱毒在胃併于心神志不定而狂少卧不臥妄言笑登高而歌棄衣而走踰垣上屋

六七日未得汗

脉洪數面赤目腫大熱煩躁狂言欲走

葶藶散

陽毒發狂斑爛

諸語

升麻湯

火劫汗多亡陽煩躁驚狂金匱風引湯柴胡湯加龍骨牡蠣三陽熱

極脉大身熱渴而狂

黃連解毒湯甚者承氣湯汗吐下後虛者人參白虎湯加辰砂

陽毒發狂

眼赤脉洪口渴

三黃石膏湯

血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯

抵當湯

脉弦長而狂

調胃承氣湯

陽勝陰絕發狂譫妄而赤咽痛發

斑脉洪實或滑促宜酸苦之藥收陰抑陽大汗而解葶藶苦酒湯

譫語

胃熱乘心神識昏冒妄言不休實則譫語虛則鄭聲譫語者數數更端聲高脉實鄭聲者只將一事一語鄭重諄復

聲低脉微

極當明辨已發汗身和譫語扶湯婦人經水適來熱入血室

諸語

胡小柴湯

譫語不惡寒反惡熱

白虎湯

煩躁不眠白虎加梔子湯三陽合

病腹滿身重口中不和面垢譫語遺尿脉滑實不可下白虎腹

滿微喘口乾咽爛或不大便譫語是因火劫

白虎湯

身熱汗出胃

實譫語或下利譫語

調胃承氣湯

下利譫語必有燥屎承氣湯譫語小

便利大便實小腹滿手不可近為瘀血

抵當湯

鄭聲脉微自利厥

逆

白通湯氣虛獨言脉細弱者

理中湯

自利太陽與陽明合病自利者葛根湯太陰與少陽合病自利

黃芩湯自利而渴屬少陰白虎湯自利下血柏皮湯少陰腎虛客熱下

利咽痛胸滿心煩猪膚湯協熱自利臍下必熱白頭翁湯溫毒下利膿

血桃花湯下後脉數不解自利不止必協熱當使膿血犀角湯自

利不渴屬太陰理中湯自利清穀脉微白通湯自利腹寒痛手足

冷理中湯或自利不止裏寒下脫桃花湯赤石

脂吳茱萸湯而氣不舒鬱冒昏冒而神不清太陽誤下利不止復發汗表裏俱虛鬱冒

為汗下後復發汗又與水噦而冒理中湯熱而鬱冒不得卧有

燥屎調胃承氣湯

瘕瘕熱極生風風主動故瘕瘕瘕則筋急而汗出時蓋覆不周

腰背手足搖擗牛旁根湯脉浮數有風熱防風通聖散血不養筋亢湯

動氣

藏氣不調，肌膚問，氣跳動，隨藏所主而見于臂之左右。

下皆

不宜汗下，此證須手探之，切勿忽也。四旁有動氣，保命四。

剛痙

柔痙，太陽中風，重感寒濕，而致也。大發汗，家汗則成痙，新

之必

發痙，經日身熱，足寒，頭項強急，惡寒，頭熱，面赤，背反張，口

禁脉

沉細如發，胸狀是也。若先受風，復感寒，無汗，惡寒，為剛痙。

先受

風，復感寒，惡風，有汗，為柔痙。叩面開目，為陽合，而閉目為

陰痙

為陽口中和，為陰。肝浮緊，數為陽，沉細為陰。陽痙易

難治

通用附子，桑痙去麻黃。陰痙厥逆，筋脉拘急，汗多，白朮

散

閉目合眼，風散附子，助胸滿口噤，卧不着席，咬牙，掣急，氣喘，頭項

強小

腹滿，小便不利，五苓散。風盛血燥，防風當歸散。

手足

厥逆，四肢冷，謂之四厥。逆脉沉細，踏卧惡寒，引衣自覆，不

飲水

下利，清穀，四逆，脉不至者，通脉四逆湯。脉遲弱，理中

冷謂

之清，理中寒熱而厥，面色不澤，用綿衣包手足，溫大汗而

解急

服子湯，少陰病吐利，厥逆煩躁欲死，吳茱萸厥而自熱，人參

建中 厥而渴者白虎湯 厥而悸先治其水茯苓湯 厥而惡熱不眠

諸語白虎湯 諸陽受氣于胸邪客則陽氣不舒手足厥逆脉乍緊

心滿而煩病在胸中當吐之瓜蒂散 先發熱而後厥者手揚足擲

煩躁飲水畏熱大便秘小便赤怫鬱大抵熱深厥亦深脉沉滑

頭面有汗指甲溫皆伏熱也大小承氣湯

頭眩上虛則眩 半表半裏表中陽虛目眩葛根湯 風家多頭眩葛根湯 口

苦咽乾頭眩小柴胡湯 陽明頭眩不惡寒能食而欬葛根湯 太

陽病發汗汗不止眩冒身瞤動振振欲僻地真武湯

衄血鼻血也 太陽病衄血及服桂枝後衄者為欲解犀角湯 脉浮

大發熱下利鼻衄乾嘔黃芩湯 衄煩渴欲飲水水入即吐五苓散

散次服竹葉石膏湯自利而衄麻黃湯 少陰病但厥無汗而強發之必衄

名下厥上竭為難治當歸四逆湯 汗後熱退鼻血不止新汲井水

草紙數層貼頂上及項脊溫則易必止

吐血當汗不汗熱毒深入故吐血內有瘀積

桃仁承氣湯抵當湯

後吐血

犀角地黄湯或栝枝湯

血紫黑成塊脉遲細口不渴小便清

理中湯加丹皮

畜血太陽病不解熱結膀胱發狂血自下

桂枝湯

熱在下焦小腹

急滿小便自利其人如狂

桃仁承氣湯抵當湯

下血太陽病不解其人如狂熱結膀胱血自下者愈若不愈

桂枝湯

湯小腹急滿

抵當湯

少陰下血

桃仁承氣湯

腹滿身熱下膿血

黃連阿膠散

小便不利已汗復下小便不利心煩

小柴胡湯

太陽汗後脉浮小便

不利微熱而渴

五苓散

身黃小便不利腹微滿者

茵陳蒿湯

小便不利

大便乍難乍易微熱有燥屎也

承氣湯

潮熱大便泄小便不利

柴胡湯

風濕自汗身重小便不利

甘草附子湯

熱鬱不通

田螺搗朴消少加廬如泥貼臍

上寒鬱不通

妙醫製

小便自利太陽病小便自利以飲水多心下悸桂枝茯苓湯身黃

小便當不利今反自利其人如狂下焦蓄血抵當湯熱而小腹滿

應小便不利今反自利畜血也抵當湯二便俱利脉沉遲四逆湯

小便數頻來而短少也太陽汗吐後小便數譫語調胃承氣湯太陽自汗四

肢拘急心煩微惡寒小便數甘草乾薑湯

發黃發熱身盡痛面目俱黃太陽中溼連翹赤茯苓湯熱不去瘀血在

裏面黃小便微利麻黃連翹赤小豆湯往來寒熱身痛發黃小柴胡湯發

熱頭汗渴欲飲水小便利大便快發黃五苓散小便不利四

肢沉重似瘧不欲飲茵陳五苓散傷冷脉虛小便如常變爲陰黃理中

加茵陳湯下之太過脾虛津竭飲水自傷此陰濕變黃茵陳茯苓湯

發斑熱甚傷血裏實表虛發爲斑也斑見紫黑者十死一生或

邪入胃或下遲熱陽毒結熱舌卷焦黑鼻如烟煤狂言見鬼面

赤錦斑

陽毒升

赤斑咽痛

玄參升

表證多者

防風通聖散去硝黃以上皆消散

斑出咽痛

猪膽雞子湯紫雪細細煎之

赤斑

大青四逆湯

通川湯升麻湯犀角地黃

冬煖受邪至春發斑溫毒也

黑膏化毒丹以上皆解毒丹溫毒煩渴便實腹痛

赤斑

承風

汗下虛極發斑

白虎湯加人參白朮

狐惑

失汗所致食少胃空更喘五藏故唇口生瘡更食其藏則上唇生瘡為惑更食其肛則上唇生瘡為狐其喉齒燎聲

上白胎唇黑

四枝沉重喜眠清熱黃連犀聲啞湯俱仁殺更雄

錢散為膏

納穀道中

多眠太陽病脈細多眠外已解也

小柴切湯尺寸沉細但欲寐者少

陰證也

四逆湯

陽脈浮滑陰脈濡弱多汗或發汗後身猶灼熱喘

息多眠風溫也

萎殺

不得眠

眠安

吐下後不眠

酸棗仁湯

吐下後懊憹不眠梔子豉湯大熱嘔

錯語不眠

黃連解毒湯

少陰病二三日以上心煩不眠

黃連雞子湯

太陽

大汗胃乾不眠欲飲水者少少與之若下後渴而不眠

猪苓湯

浮小便不利不眠

五苓散

下後復發汗不眠無表證脈沉

乾薑附子湯

短氣

呼吸短促不能接續似喘而不搖肩似呻吟而無痛

汗出不徹故短氣

葛根加人參湯

短氣邪在表爲虛

桂枝湯

風濕相搏汗出短氣小便不利惡風

不欲去衣

甘草附子湯

水停心下短氣

五苓散

乾嘔短氣汗出不惡寒

此表解裏未和

十棗湯

太陽下之早心下硬結胸短氣

大陷胸湯

虢厥

藏寒故食即吐也

胃中虛冷

理中丸

吐虢而渴

加大黃

和之

百合病

以寒無寒似熱不熱飲食不食欲卧不卧欲行不行

成百通

小柴胡湯加百合知母梗米生薑

血熱

百合地黃湯

水二十碗

煮身

陰陽易

男病新瘥女與之交日陽易女病新瘥男與之交日陰易細考之即女勞復也有謂男病愈後因交而女病女

傷寒

七

病愈後用交而男病於理未然古今未嘗見此證也證狀體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上冲胸頭暈不致舉眼中生

花膝膈通用燒散取女入混熨近隱處剪燒灰新瘥後大虛

因交復作垂死獨參湯調燒散多有古用羶湯寒者未湯

勞復非但強力持重若梳沐脈虛者補中益氣湯挾外證者則

謂之復非爲勞也小柴胡湯

食復新瘥胃虛食稍多則腹滿脈實煩熱便秘大柴胡湯輕者

麥芽砂復羊肉及酒九忌腹滿脈實煩熱便秘二陳湯加山查

過經不解則再傳是爲過經潮熱者實也先與小柴胡外嘔嚳

煩大柴胡湯過經譫語脈實當下調胃承

汗後不解或表邪未盡或邪傳汗後脈大如瘡狀再汗之麻黃

汗後心下痞鞭嘔吐不和大柴胡湯大汗大渴煩而脈大白虎加汗

後惡熱脈實調胃承汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者

麻黃杏仁

太陽大汗山冒乾不眠欲飲水者少少與之若脉浮

甘草湯

五苓

汗後脉洪數煩渴

五苓

汗後服滿

生薑人

汗過多心悸發顛

桂枝湯

汗後惡寒表虛也脉細神倦

芍藥甘草

大陽汗出不解發熱心悸胸悶

真武

汗後身痛脉沉

桂枝湯

汗後熱不去內拘急四肢疼下利惡寒

藥人參湯

汗後熱不去

內拘急四肢疼下利惡寒

四逆

汗後臍

下悸欲作奔豚

桂枝湯

下後不解

下後熱不去心中結痛

陽下

後心煩腹滿卧起不

安

太陽桂枝證誤下之利不止脉促喘而汗出表未解

葛根湯

陽明下之心下懊憹

連黃芩湯

有燥屎大承太陽下後脉

促胸滿

大下後脉沉遲厥逆下利咽喉不利吐膿血難

治

麻黃升

合病

兩經三經清病

三陽合病腹滿身重口中不和譫語遺尿

皆

陽寒

不可汗下

白虎湯

太陽陽明合病脉浮長大便秘小便不利

升麻葛根湯

不惡寒反惡熱

大便秘者白虎湯大便通者白虎湯大便通者白虎湯

下麻黃湯

嘔不下利

葛根湯太陽少陽合病脉浮弦脇下鞭往來

寒熱

小柴胡湯

自下利者

黃芩湯

嘔者

黃芩加半夏湯少陽陽明合病脉弦

長因發汗因利小便利胃中燥實

調胃承氣湯

脉長自利者爲順滑而

數者爲負有宿食

大承氣湯

併病一經先病未盡又過一經之傳者爲併病或始則二陽合

併病

病後則一陽病衰一陽邪盛厥後於一經二經皆併病也

太陽陽明併病太陽病發汗不徹轉屬陽明續自微汗出不惡

寒若面色怫鬱痛無常處是陽明復併歸太陽當再汗

陽證未罷

桂枝麻黃各半湯

太陽證罷但見陽明證者下之

少陽併病頭痛

太陽

眩冒心下痞

當刺肺俞肝俞大椎

慎勿下

太陽不勝

陽明不負不相尅爲順

少陽脉勝陽明脉負鬼賊相尅爲逆

兩感

口傳二絡陰陽俱病也表裏不可

東垣以氣實而感之淺

者猶或可治

大羌活湯

舌胎

邪在表者舌上無胎半表半裏白胎而陽明病腸下鞭滿

而喘發熱汗出不大便而嘔舌上白胎者

小柴胡湯

脈陰陽俱緊舌

上滑胎

小柴胡去半夏加人參

熱聚於胃則舌黃

承氣湯

舌純黑

有二種皆死證也有火極似水者爲熱極

大承氣湯

有水來尅火者

爲寒極脈證必寒

附子理中湯

七八日不解熱結在裏表裏俱熱時

時惡風舌燥欲飲水數升

白虎湯加人參

瘥後昏沉

因發汗不盡餘毒在心胞絡也

發汗出時蓋覆不周則汗出不均腰

背手足搐搦或冷或熱

牛旁根散

瘥後腰已下有水氣者

杜蠟澤瀉散

摘陶氏十法
發狂難制以醋炭氣八鼻卽定方可察其陰陽初病起頭痛發

熱傳裏時熱極發狂當下之 初病起頭不痛身微熱面赤煩躁欲坐卧涼水中陰極似陽當溫之 須察脉來有力無力此爲良法

腹中痛甚將凉水一碗與病人飲之其痛稍減者屬熱當涼之涼之不愈渴而大便實者下之若小腹痛大便黑小便利身目黃者畜血也行血藥下之 若飲水痛增者屬寒當溫之 須察脉來有力無力此爲良法

寒證脉伏或吐瀉脫而無脉以薑汁好酒各半盞與病人服脉出者生不出者死更覆手取之而無脉則絕矣

舌上有胎不拘何色用井水浸新青布拭淨後用生薑浸水利之或以薄荷爲末入蜜少許刷牙擦之 若發黃者生薑渣周身擦之卽退

鼻衄不止山梔炒黑爲末吹鼻中外用濕草紙搭於鼻冲血止
熱邪傳裏服藥後將鹽炒麩皮一升絹包於病人腹上熨之藥
氣得熱則行大便秘通

吐血不止韭汁磨梔叩之如無韭汁雞子清亦可赤屬火黑屬
水有相制之理也

陰毒昏不知人四肢如冰唇青甲黑藥不得入將葱一握束縛
切去根葉留白三寸如餅先將麝香半分填於臍內後加葱
餅於上以火熨之爛卽易納三餅後稍醒先灌薑汁後服薑
附湯如不醒再灸關元穴三十壯不醒者必死

熱邪亢極黃連一兩煎水一碗放井中待冷浸新青布搭胸上
稍熱卽易熱勢稍減卽止夏月方用此法

服藥卽吐者將生薑汁半盞熱飲吐卽止 大抵服寒藥熱飲

熱藥寒飲中和之劑溫飲

傷寒死候陽證見陰脉者死 陰陽毒過六七日者死 脉浮

而滑身汗如油水漿不入喘息不休身體不仁者死 咳逆

上氣脉散者死 陽反獨留體如烟薰直視搖頭心絕 汗

出髮潤而喘肺絕 唇反青四肢汗出肝絕 環口薰黑

虛寒發黃脾絕 脉緊盛汗出不解者死 尺寸俱虛熱不

止者死 身熱喘急脉陽而躁者死 大發濕家汗則瘧熱

而瘧者死 發少陽汗則譫語發少陰汗則動血謂之下厥

上竭者死 發動氣汗者死 發風溫汗者死 發濕溫汗

曰重喝死 汗後不爲汗衰謂之陰陽交者死 不得汗者

死 發熱脉躁疾狂言不能食謂之三死 咳逆不止者死

藏結者死 結胸證舌 有白胎也 舌卷囊縮者死 脉代者死 少陰

吐利煩躁四逆者死 結胸證悉具煩躁者死 發厥至七八日膚冷而躁無時暫安曰藏厥死 少陽與陽明合病脈長大而弦曰負者死 陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足攣痛離經脈見者死 厥而下利當不能食反能食者除中死 少陰病厥逆無脈與白通猪膽湯脈暴出者死 脈陰陽俱虛熱不止者死 七八日以上大發熱者死 脈候浮濇而緊爲傷寒 浮而緊者表實可汗 浮而緩弱表虛宜救 沉數或疾滑或沉實裏實可下 沉細微遲軟裏虛可溫 中候而數爲胃實 中候而遲爲胃虛 寸口沉細無力爲陽中伏陰 尺部沉數有力爲陰中伏陽 寸部數大有力爲重陽 尺部遲細無力爲重陰 寸脈微細爲脫陽 尺部無力爲脫陰 寸脈弱者忌吐 尺脈弱者忌下 純弦之

脉名曰負死脉也

陰病見陽脉者生

浮數動滑大

陽病見陰脉者

死

沉微弱弦微結促滿死後緊遲孔散革代

醫案

社友韓茂遠傷寒九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷衆皆口陰證比余診之六脉皆無以手按腹兩手護之眉皺作楚按其趺陽大而有力乃知腹有燥屎也欲與大承氣湯病家惶懼不敢進余曰吾郡能辨是證者惟施笠澤耳延至診之與余言若合符節遂下之得燥屎六七枚日能言體能動矣故按手不及足者何以救此垂絕之證耶

休寧吳文哉傷寒煩躁面赤昏倒門絕時索冷水其弟曰休乞余決死期手揚足擲難以候脉五六人制之方得就診洪大無倫按之如絲余曰浮大沉小陰證似陽也與附子理中湯當有

生理口休駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則曰竹葉石膏今反用熱劑烏乎敢余曰溫劑猶生涼劑立斃矣曰休卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子二錢煎成入井冰冷與飲甫及一時狂躁定矣再劑而神爽服參至五觔而安文哉遺以書曰弟爲俗子所誤既登鬼錄矣而兄翁拯全之大奇亦大幸也方弟躁熱之時醫以三黃湯入牛黃服之轉加悶絕舉室哀號惟是治終具候目瞑而已不意兄翁毅然以爲可活參附一投陰霜見眼荆妻稚子含淚歡呼一日卽甦經年乃復嗚呼父母生之兄翁再生之昊天罔極莫可云喻敢誌顛末乞附案帙俾天下萬世知藥不可浪投命不可輕棄何莫非大仁人回春之澤哉同社王月懷傷寒至五日下午利不止懊懷目脹諸藥不效有以山藥茯苓與之慮其瀉脫余診之六脉沉數按其臍則痛此協

熱自利中有結糞小承氣倍大黃服之得結糞數枚諸症悉安
婁水張爾和傷寒第二日頭痛發熱正在太陽余曰方今正月
天令猶寒必服麻黃兩日愈矣若服沖和湯不惟不得汗即使
得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以滾水入浴桶置床下
薰之得汗如雨密覆半日易被神已爽矣至晚索粥家人不與
余曰邪已解矣必不傳裏食粥何妨至明日果愈不以麻黃汗
之傳變深重非半月不安也

光祿卿吳玄水太陽歸頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語
言謬妄有云表裏俱有邪宜以大柴胡下之余曰此三陽合病
也誤下之決不可救乃以白虎湯連進兩服諸證漸減更加天
花粉麥門冬二劑而安

縣學師楊龍友如夫人發熱頭痛六日後忽見紅疹衆皆以爲

發斑用升麻犀角等湯凡五分不效余視之曰此痧也非斑也
斑爲陽明火毒痧爲太陰風熱一表一裏如天與淵乃川防風
二錢黃芩一錢甘草五分薄荷桔梗蟬殼各一錢四劑霍然矣
儒者吳君明傷寒六日譫語狂笑頭痛有汗大便秘不通小便自
利衆議承氣湯下之余診其脈浮而大因思仲景云傷寒不大
便六七日頭疼有熱小便清知不在裏仍在表也方令仲冬宜
與桂枝湯衆皆咋舌掩口謗之甚力以譫狂爲陽盛桂枝入口
必斃矣余曰汗多神昏故發譫妄雖不大便秘無所苦和其營
衛必自愈耳遂違衆用之及夜而笑語皆止明日大便自通故
夫病變多端不可膠執向使狐疑而用下藥其可活乎

內戚顧淡之勞神之後煩躁大熱頭痛時作時止醫者禁其飲食
與之解表見四日熱不退欲與攻裏余診之曰脈不浮緊安

得表耶又不沉實安得裏耶惟心部大而滿此勞心而虛煩乃類傷寒非真傷寒禁食餓絕矣與之粥兼進歸脾湯五日而安

傷寒諸劑

麻黃湯

治太陽經脉浮緊頭痛身疼發熱惡寒無汗而喘

麻黃

二錢去根節

桂枝

一錢

甘草

五分

杏仁

八枚去皮尖炒

水盞半加生薑三片棗一枚煎八分熱服

桂枝湯

治太陽中風發熱汗出鼻鳴乾嘔

桂枝

赤芍藥

各二錢

甘草

一錢

水盞半生薑五片大棗三枚煎八分溫服

大青龍湯

治傷寒中風頭痛發熱無汗煩躁

麻黃

三錢去節

桂枝

一錢

杏仁

五枚去皮尖炒

甘草

四錢

石膏

三錢

水鍾半生薑一錢棗一枚煎八分溫服

小青龍湯 治表不解有水氣發熱嘔欬或渴或利或小便不利小腹滿而喘

麻黃

桂枝

芍藥

各一錢

甘草

五分

乾薑

細辛

各五分

五味子

十二粒

半夏

一錢

水二鍾煎八分服

桂枝麻黃各半湯 治太陽脈浮緩無汗身疼

桂枝

五錢

芍藥

甘草

麻黃

各三錢

杏仁

三十個

水四鍾生薑三錢大棗四枚煎二鍾分三服

麻黃升麻湯

治大下後脈沉遲尺脈不至咽喉不利厥逆泄利不止

麻黃

八錢

升麻

當歸

各四錢

知母

去毛

黃芩

炒

萎蕤

各二錢

石膏

白朮

炒黃

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

去皮

甘草

乾薑

各一錢

水四鍾煎二鍾分三服

麻黃連翹赤小豆湯

治瘧熱在裏身自發黃中濕身痛

麻黃

去根節

連翹

甘草

各四錢

桑白皮

蜜炙

赤豆

各二錢

杏仁

三十個

水四鍾生薑七錢大棗八枚煎二鍾分三服

桂枝甘草湯

治發汗過多又干目心心下悸欲得按

桂枝

三錢

甘草

一錢

水一鍾煎八分服

桂枝芍藥湯

治脉浮腹痛

桂枝湯加芍藥一倍

桂枝附子湯

治風濕身疼脉浮虛瀉

桂枝湯加附子一錢

葛根湯 治太陽無汗惡風太陽陽明合病

葛根

一錢五分

麻黃

一錢

桂枝

芍藥

八錢

甘草

各六分

水二鍾生薑五片大棗二枚煎一鍾服

葛根蒸白湯 治已汗未汗頭痛

葛根

芍藥

知母 去毛

川芎 各一錢 生薑 三片

葱白 五個

水二鍾煎一鍾熱服

葛根半夏湯

葛根湯加半夏 水煎服

小柴胡湯

治傷寒四五日往來寒熱胸滿心煩喜嘔少陽經發熱及風溫濕熱

柴胡 三錢

黃芩

人參 去蘆

半夏 各一錢 甘草 五分

水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾熱服

柴胡桂枝湯

治風濕汗後身熱心下煩熱妨悶動氣

柴胡 二錢

桂枝 一錢

甘草 七分

人參 一錢 半夏 熱

芍藥 各七

黃芩 一錢

生薑 五片

水二鍾棗二枚煎一杯溫服

柴胡桂枝乾薑湯

治往來寒熱胸脇痞滿
小便不利嘔而不渴

柴胡

一錢五分

黃芩

桂枝

乾薑

各入五分

甘草

五分

牡蠣

七分

括蕢根

錢一

水二鍾煎一鍾溫服

柴苓湯

治小便難微熱腹滿

小柴胡湯加茯苓

水煎服

柴胡加桂湯

治身熱欲近衣 身熱不渴

柴胡

黃芩

半夏

各一錢泡

甘草

肉桂

各五分

水二鍾生薑三片大棗一枚煎一鍾服

五苓散 治小便不利而渴中暑煩躁霍亂

猪苓

澤瀉

白朮

炒

茯苓

各一錢

肉桂

五分

右爲細末每服二錢白湯調下

辰砂五苓散

治表裏未解頭痛發熱心膈鬱悶唇口乾燥狂言見鬼小便閉

五苓散加辰砂

研細水飛

白湯調服

小建中湯

飢寒三四日心忪而煩少陰惡寒手足踈而溫

桂枝錢一

芍藥錢二

甘草六分

飴糖三匙生薑五片

大棗一抄

水鍾半煎八分納飴令化溫服

黃耆建中湯

傷寒身痛汗後身痛脈弱宜服

黃耆

一錢五分炒

芍藥二錢

肉桂一錢去皮

甘草六分生薑五片

大棗

三枚

水二鍾煎一鍾去渣入飴一大匙煎一兩服若微瀉利或嘔者不用飴

大柴胡湯

治身熱不惡寒反惡熱大便秘

柴胡

二錢二分

黃芩

芍藥各一

半夏八分大黃七分

枳

十四分

水二鍾生薑三片棗一枚煎一鍾熱服

大承氣湯

治五六日不大便腹滿煩渴少陰口燥舌乾日晡發熱脈實三焦俱有邪

大黃

五兩

芒硝四

厚朴二小

枳實一錢

水二鍾先煎朴實至鍾半投大黃煎至一鍾去渣納芒硝一

小承氣湯

六七日不大便腹脹滿潮熱狂言而喘專治上焦之病熱

大黃

四

厚朴

炒二

枳

炒一

水二鍾煎一鍾熱服

調胃承氣湯

太陽七日明不惡寒反惡熱大便秘澀語啞逆宜服

大黃

六

芒硝

四

甘草

一

水鍾半煎八分去渣入硝一沸服

桃仁承氣湯

小腹急大便黑小便不利中焦積血也

桃仁

十個

肉桂

去

甘草

各一

大黃

二

芒硝

一

五分

水二鍾煎一鍾去渣入硝煎一沸熱服

梔子豉湯

治吐下後心中懊憹大下後身熱不去心中痛

肥梔子

四

香豉

五

水二鍾煎梔子至一鍾入豉煎至七分服

梔子厚朴湯

太陽下後腹痛起臥不安

梔子

五枚

厚朴

三錢

枳實

一錢

水二鍾煎一鍾溫服

猪苓湯

治嘔而渴心煩不得眠熱在下焦小便不利

猪苓

澤瀉

滑石

茯苓

阿膠

各二錢五分

水二鍾煎一鍾入阿膠煎銕溫服

黃芩湯

太陽少陽合病協熱下利

黃芩

三錢

芍藥

甘草

各一錢

水鍾半棗二枚

煎一鍾

熱服

黃芩芍藥湯

厥後脈微

黃芩湯

去大棗

黃芩半夏生薑湯

治乾嘔而利

黃芩湯

加半夏生薑

黃連湯

治腹滿痛大便後胸中有熱腹痛欲嘔

黃連

甘草

乾薑

芍藥

各一錢

人參

半夏

各五分

大棗

一枚

桂分

水二鍾煎一鍾服

黃連阿膠湯

一名黃連雞子湯治溫病下利膿血少陰煩躁不得卧

黃連

二錢

阿膠

一分

黃芩

芍藥

各一錢

雞子黃

二枚

水二鍾煎三物至一鍾去渣入膠煎一沸入雞子黃勻服

黃連犀角湯

治狐惑

犀角

三錢

黃連

二錢

烏梅

四個

木香

三錢

水鍾半煎八分入犀角木香汁勻服

黃連解毒湯

治大熱乾嘔譫語呻吟不眠

黃連

三錢

黃芩

三錢

黃柏

三錢

梔子

各一錢

水二鍾煎一鍾熱服

黃連瀉心湯

黃連

生地

知母

各一錢

甘草

五分

水鍾半

煎八分服

升麻湯

治無汗而喘小便不利而煩渴

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃

各一錢

黃芩

大青

各七

石膏

一錢

淡竹葉

十片

水二鍾煎

一鍾

熱服

升麻葛根湯

治無汗惡寒發斑小兒瘡疹疫癘通川

升麻

葛根

芍藥

甘草

等分

水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服

升麻六物湯

治赤斑口瘡赤爛

升麻

梔子

各一錢五分

大青

杏仁

黃芩

各一錢

水鍾半煮白三莖煎八分溫服

陽毒升麻湯

治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻

一錢五分

犀角

磨

射干

黃芩

人參

甘草

各八分

水鍾半煎八分入犀角汁服

玄參升麻湯

治咽痛發斑

升麻六物湯

治傷寒

玄參

升麻各一錢五分

甘草八分

水鍾半煎八分溫服

白虎湯

治汗後脈洪大而渴虛煩中暈

知母三錢

石膏五錢

甘草一錢

粳米一握

水二鍾煎一鍾溫服

白虎人參湯

一名化斑湯治赤斑口燥煩渴中暈

白虎湯

加人參

竹葉石膏湯

治陽明汗多而渴嘔而渴欲飲水水入即吐後渴

竹葉十四片

麥門冬

人參各一錢

甘草四分

石膏三錢

半夏八分

粳米一握

水二鍾煎一鍾入生薑汁一匙服

茵陳湯

治頭汗出欲發黃

茵陳蒿三錢

大黃二錢

梔子三枚

水二鍾煎一鍾服

茵陳五苓散

頭汗出發黃秋疫癘及黃疸

茵陳三錢

五苓散三錢

每服二錢米湯調服

茵陳四逆湯 治陰黃四肢厥冷

茵陳一錢

甘草

炙一錢五分

乾薑

炮一錢五分

附子

一錢

水煎溫服

大陷胸湯

治大結胸手不可按

此藥性峻不可輕用

大黃

四錢

芒硝

三錢

甘遂末

三分

水二鍾煎一鍾入硝煎一沸入甘遂末服

小陷胸湯

治小結胸

黃連

一錢五分

半夏

三錢

栝蒌實

二錢

水二鍾煎一鍾服

抵當湯

治血結胸諸語小腹痛脈水不欲飲

水蛭

各十枚

蟅蟲

各十枚

桃仁

十枚

大黃

八錢

水二鍾煎一鍾熱服

小半夏湯

治水結胸

半夏

四錢

白茯苓

二錢五分

水二鍾煎一鍾入薑汁熱服

半夏瀉心湯

半夏一錢

黃連五分

人參

甘草

黃芩

乾薑各一錢

水鍾半薑五片棗五枚煎八分溫服

半夏生薑湯

治欬逆水穀不下而嘔吐

半夏五錢

生薑一兩

水煎服

半夏桂甘湯

治非時暴寒伏於少陰脈微弱次必下利一名腎寒

半夏

桂枝

甘草各三錢

生薑五片水煎服

厚朴半夏甘草人參湯

厚朴

半夏各一錢

甘草

人參各五分

水鍾半薑五片煎八分服

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯加甘草

生薑瀉心湯

治下痢心下痞腹中雷鳴

甘草瀉心湯

湯甘草一倍
生薑一倍

赤茯苓湯

治厥陰消渴氣上冲
吐下後身振搖肉掛

赤茯苓

陳皮

人參各一錢

白朮

川芎

半夏各六分

水鍾半煎八分溫服

茯苓甘草湯

茯苓三錢

桂枝二錢

甘草一錢

生薑五片水煎服

茯苓桂枝白朮湯

茯苓三錢

桂枝一錢五分

甘草

白朮各一錢

水二鍾煎一鍾溫服

四逆湯

治太陰自利不退
陰證脈沉身痛

附子三錢

甘草

乾薑各一錢五分

水鍾半煎八分服

當歸四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛

各一錢

通草

各七分

水鍾半大棗三枚煎七分服

通脉四逆湯

厥逆下利脉不至 四逆湯 加甘草一倍

真武湯

治陰證脉沉身痛少陰腹痛小便不利

附子

三錢

生薑

五錢

白朮一錢

茯苓

芍藥

各二錢

水三鍾煎鍾半分二服

附子湯

治陰證脉沉身痛少陰背惡寒口中和

附子

二錢

人參

白朮

茯苓

芍藥

各一錢

水二鍾煎一鍾分二服

甘草附子湯

風濕小便不利大便反快

甘草

炙

附子

各一錢

白朮

桂枝

各一錢

水二鍾煎一鍾溫服

甘草乾薑湯

少陰小便色白吐逆而渴動氣下之反刺身雖有熱反欲跪臥

甘草二錢

乾薑一錢

水煎服

理中湯

治太陰自利不渴痰多而嘔腹痛霍亂

人參

白朮

乾薑各一錢

甘草八分

水二鍾煎一鍾服腹痛甚加附子寒而吐者加生薑小便

不利加茯苓腎氣動者去朮

附子防風湯

附子

防風

柴胡

白朮

一錢桂心五分

茯苓

乾薑各五錢

五味子各八分

甘草

四分

生薑五片

水鍾半煎八分服

芍藥甘草附子湯 汗下後惡寒

芍藥

甘草

附子各二錢

水二鍾煎八分服

霹靂散

陰盛隔陽身冷脉浮煩躁欲水

附子

炮一隻

用冷灰埋之取出細研入真臘茶一錢同研分二服每服水一鍾煎六分入蜜一匙冷服

白通湯

少陰下利

葱白

三莖

附子三錢

乾薑

二錢五分

水鍾半煎七分服

正陽散

陰毒面青四肢厥冷

乾薑

五分

附子一錢

甘草

五分

麝一分

皂莢一分

爲細末水一鍾煎五分服

枳實理中丸

治寒實結胸

枳實

十六枚

乾薑

白朮

甘草

人參

茯苓

各一兩

爲末蜜丸彈子大熱湯化下連進二三服

乾薑附子湯

下後復發汗晝夜不得眠無表證脉微

乾薑 二錢

附子 三錢

水煎服

乾薑黃芩黃連人參湯

寒氣內格食人即吐

乾薑

黃芩

黃連

人參 等分

水鍾半煎八分服

脾約丸

津少大便秘

大黃

枳實

白芍藥

厚朴

各五錢

麻子仁

一兩

杏仁

三錢

爲末蜜丸桐子大每服三十丸溫水下

金匱風引湯

大黃

乾薑

龍骨

各二兩

桂枝

甘草

牡蠣

各一兩

凝水石

滑石

赤石脂

白石脂

石膏

紫石英

各三兩

爲粗末以囊盛之取三指一撮

井水二鍾煎一鍾去渣服

百合地黃湯

治百合病

百合

七枚

生地黃汁

鍾一

先以水洗百合漬一宿洗去白

沫別以水二鍾煎取一鍾入地黃汁一沸分二服

犀角地黃湯

治後脈微發狂發黃失汗成瘧血大便黑漱水不欲嚥

犀角

一錢

生地黃

四錢

牡丹皮

芍藥各一

水二鍾煎八分入犀角服

大青四物湯

一名阿膠大青湯

治赤斑

大青

阿膠

甘草

各一錢

豉三錢

水鍾半煎八分入阿膠候銕溫服

黑膏

治溫毒發斑嘔逆使毒從皮中出

生地黃

二兩好豉一兩

猪膏十兩合蠶之煎令三分減一絞去渣入雄黃麝香如豆大攪和分三服忌熱羹

紫雪 腳氣及暑中三陽所患必熱煩躁發狂

升麻 六錢

黃金 十兩

寒水石

石膏 各四兩
八錢 犀角

羚羊角 各一兩

玄參 六錢

沉香

木香

丁香 各五錢

甘草 入錢

水五鍾煮金至三鍾去金入諸藥再煎至一碗去渣投朴硝

三兩二錢微火煎柳條勿停手攪候欲凝入盆中更下硃砂

麝香各三錢急攪令勻候冷凝成雪每服一錢細細嚥之

吳茱萸湯 嘔胸滿吐利手足厥冷煩躁欲死

吳茱萸

生薑 各三錢

人參 一錢

水鍾半棗一枚煎一錢服

甘桔湯 少陰咽痛

桔梗 三錢

甘草 二錢

水鍾半煎八分服

枳桔湯 痞證胸滿不痛

醫宗必讀

卷五 傷寒

桔梗

枳殼各三錢

水煎熱服

防風白朮牡蠣散

防風

白朮

牡蠣等分

爲末每服二錢米飲調服汗出服小建中湯

五積散

治感冒脾氣食積心腹滿痛嘔吐背項拘急

川芎

蒼朮

桔梗

橘皮

枳殼各七分

白芷

官桂

人參各五分

厚朴

芍藥

茯苓

當歸

乾薑

麻黃

半夏各八分

甘草各五分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分服

十棗湯

痞硬脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒

芫花

甘遂

大戟各等分

水鍾半先煎大棗十枚取八分入藥末七分

平旦溫服若病不除再服五分

桃花湯

少陰下利膿血并溫青下利

赤石脂

五兩三錢一半煎

糯米三合

乾薑三錢

水二鍾煮米令熟去渣溫服一鍾入赤石脂末方寸七日三

服愈止服

冲和湯

離九味羌活湯治傷寒兩感春分後代桂枝麻黃湯用

羌活

防風

蒼朮各一錢

甘草

白芷

川芎

生地黃

黃芩各一錢五分

細辛七分

水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾熱服取汗有汗者去蒼朮加

白朮湯加葛根石膏

柿蒂湯

柿蒂

丁香各一錢五分

水鍾半薑五片煎八分服

烏梅丸

治蛇厥

烏梅

七十個

細辛

附子

人參

栝皮

桂枝

各一兩五錢

乾薑

二兩五錢

黃連

四兩

蜀椒

各一兩

當歸

各一兩

十味各搗末以苦酒漬烏梅一宿去核薑之五升米飯在下飯熟搗梅成泥和勻諸藥蜜九桐子大米飲下十九漸加至二十九忌生冷滑物

牛旁根湯

汗不流是汗出時蓋覆不密故腰背手足攣攣

牛旁根

麻黃

牛膝

天南星

各六錢

爲末好酒一升同研以新布濾取汁用炭火半秤燒一地坑通赤去火令淨投藥汁在坑內燒令黑色取出細研每酒調服五分日三服

地榆散

傷寒熱毒不解晚卽壯熱腹痛便膿血

地榆

犀角

黃連

茜根

黃芩

梔子仁

各八分

水二鍾韭白五莖煎一鍾服

酸棗仁湯 汗下後晝夜不得眠

酸棗仁

炒

甘草

知母

麥門冬

各一錢

茯苓

川芎

各二分

乾薑

三分

水煎服

茅花湯

鼻血不止

茅花

一握無花用根

水三鍾煎鍾半分二服

栝皮湯

熱毒入深吐血

栝皮

三錢

黃連

黃芩

各一錢五分

水二鍾煎一鍾去渣入阿膠候鎔服

麥門冬湯

麥門冬

甘草

各二錢五分

粳米湯鍾半棗二枚竹葉十五片煎八分服

小續命湯

方見中風

醫宗心讀

卷五

傷寒

三

黑錫丹

方見眩暈

大秦芩湯

方見中

補中益氣湯

方見類中風

藿香正氣散

方見類中風

萎蕤湯

治風溫冬溫春月傷寒

萎蕤

石膏

各一錢

麻黃

白薇

羌活

杏仁

甘草

川芎

各六分

青木香

五分

乾薑

一錢

水煎服

牡蠣澤瀉湯

瘥後從股以下有水氣

牡蠣

澤瀉

蜀漆

商陸

葶藶

海藻

瓜瓞根

各等分

爲末米飲調服

豬膚湯

少陰下利咽痛胸滿而煩

豬膚

五兩

水四鍾煎二鍾加白蜜十匙白粉二合熬香和令得所分二服

猪膽雞子湯 傷寒五六日出現

猪膽

三

雞子

一枚

苦酒

十匙

和勻煎三沸服

龍甲散

傷寒八九日不瘥諸藥不效名壞傷寒

龍甲

升麻

前胡

烏梅

黃芩

犀角

枳實

各七分

生地黃

錢

甘草

五分

水鍾半煎八分服

白頭翁湯

協熱而利渴而下利

白頭翁

黃栢

秦皮

黃連

各一錢五分

水鍾半煎八分服

赤石脂禹餘糧湯

痞而下利不止當治下焦

赤石脂

禹餘糧

各三錢

水煎服

葶藶苦酒湯

發狂煩躁面赤咽痛大下傷血發熱脉滿

醫心必讀

卷五

傷寒

三

葶藶

五錢

苦酒

一破半

艾汁

半碗

煎取七分作二服

治蜜桃仁湯

傷寒失汗變成狐惑
唇口生瘡聲啞不出

桃仁

槐子

艾各三

水二鍾棗十個煎一鍾分二服

雄黃銳散

狐惑唇瘡聲啞

雄黃

桃仁

苦參

青箱子

黃連

等分

爲末艾汁爲丸如小指尖大綿裹內下部中

猯鼠糞湯

男女陰陽易

韭根

一大握

猯鼠糞

十四枚兩頭尖者是

水鍾半煎七分去渣再煎一二沸溫服

安神丸

方見驚悸

瓜蒂散

寸脈大胸滿多痰有涎病頭痛

瓜蒂炒

赤小豆各等分

二味別搗篩爲末合和以水二鍾煮香豉一合作稀粥去渣取三分之一和散一錢頓服之如未吐少少又加

大羌活湯 治雨感元氣實感之輕者可活

防風

羌活

獨活

防已

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

甘草炙

細辛各二錢

知母

川芎

生地黃各一兩

每服五錢水二鍾煎一鍾熱飲之未愈連服三四劑若有

他證遵仲景法

辟邪丸

服此雖與病人同床合被亦不能傳染也

雄黃

一兩

丹參

鬼箭羽

赤小豆

各二兩

右爲末蜜丸桐子大空心溫水下五丸

醫宗必讀卷五終