

醫

燈

續

焰

醫燈續焰卷十六

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人

高鴻奎君錫

曹毓貞元起校

督施安祖孔安

小兒脈證第七十八

小兒之脈。七至爲平。更察色證。與虎口文。

三歲以下小兒純陽之體。形質小。呼吸促。脈之周行。駛而應指疾。大約以七至爲平。非若大人四至爲平也。其太過爲數爲熱。不及爲遲爲寒。則與大人無異矣。雖然。脈至七八。難全爲準。必察其色。與所見之證。更視虎口之文。而病情始無隱匿。蓋五藏之列於面。各有定部。如左腮屬肝。右腮屬肺。額上屬心。鼻屬脾。頰屬腎是已。諸邪之見於部。亦各有定色。如赤爲熱。白爲寒。黃爲積。青黑爲痛是已。

虎口者。食指內側。連大指作虎口形。故曰虎口。是處肌皮嫩薄。文色顯明。卽肺手太陰經脈之盡處。諸脈大會。此經察色者。卽所以察脈也。故色赤爲熱。在脈則數。色白爲寒。在脈則遲。色黃爲積。在脈則緩。色青黑爲痛。在脈則沉弦。此皆自然之理。非可牽會。雖無五部之分。而有三關之別。指初節曰風關。二節曰氣關。三節曰命關。文色見風關者輕。再進則上氣關爲重。再進則直透命關爲最重。甚。

則主死。由風邪而干正氣。正氣不能勝而迫及於命。漸進漸深之象也。至如外證。肝病。主諸風頭掉。實則目直。叫呼。脇痛。項急。呵欠。頓悶。二便閉塞。虛則咬牙多欠。目閉羞明。心病。主驚。實則發搐。叫喊。或笑。發熱。欲飲水。頻吐舌。虛則悸。卧不安。畏見人。舌痿不能乳。脾主困。實則困頓。身重肌熱。腹脹硬。唇腫而渴。虛則吐瀉不食。慢風。四肢不收。口流涎。肺主喘。實則胸滿喘促悶亂。虛則哽氣。呵欠寒慄。

腎主恐怖。畏明。不能立。二便清泄。足冷。但有虛證。
而無實證。已上諸證。不過言其大槩耳。至於傾移。
傳變。何可勝紀。唯國機之士。叅合色脈。識本知標。
辨流窮源。繙綜體認。縱不能臻聖神之域。諒亦不
在工巧之下矣。

小兒雜述

襁褓 千金論云。小兒宜用父故絮。女用母故絮。
爲衣。勿用新綿。及過厚。令壯熱生瘡。發癟。又令筋

骨緩弱。宜時見風日爲佳。

○乳哺。乳者。奶也。哺者。食也。乳後不得便與食。哺後不得便與乳。小兒脾胃弱。乳食相併。難以尅化。周歲已上。必成乳癬。食癪。作熱。作疼。癧病從此始。丹溪曰。小兒腸胃薄窄。一切酸鹹甜辣魚肉水果。濕麵煎炒。俱是發熱難化之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非唯無病。且不縱口。可以養德。婦人無知。唯務姑息。畏其啼哭。無所不與。積成痼疾。雖悔何

及乳母尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便通。情欲中動。
乳脈便應。兒得此乳。疾病立至。不吐則渴。不瘡則
熱。驚搐夜啼。口瘻腹痛諸疾。所由來矣。病之初來。
其瀨必少。便須詢問。隨證治母。可消患於未形也。
乳母亦不宜用狐臭。癩癩。喘嗽。疥癬。頭瘡。聾啞。鼈
鼻癟證之人。

肘後云。兒生三日。宜助穀神。碎米作飲如乳。與兒
大豆許。令嚥之。頻與三豆許。三七日可哺。

千金云。兒嘯早。不勝穀氣。令頭面體生瘡。愈而復發。延羸難養。一月後。雖嘯勿多。不嗜食。勿強與之。
寶鑑云。兒五十日。可嘯如棗核。百日彈丸。早晚二
晡。莫當風解衣。沐浴及帶哭而乳。冒冷而嘯。又不
可在神佛驢馬畔。及各房異戶。皆令兒爲病。

錢乙云。惜兒過當。三兩歲猶未飲食。致脾胃弱。一
生多病。半年後。宜煎陳米稀粥。時與之。十月後漸
與稠粥。助中氣。自然易養少病。

外臺崔氏。初哺兒用平定成日。丑寅辰巳酉日吉。
男忌戊己。女忌丙丁日。

小兒四五歲當斷乳而不肯斷者。宜盡眉膏斷後。肉食
宜少少漸進。則無癬癬之患。

田氏曰。大凡小兒過煖生熱。熱極生風。提抱生癬。
餵飼生癬。盛夏浴後勿卽乳兒。兒啼勿卽與乳。令
兒成胃毒。或秋成痢。浴後良久。身體燥。兒啼後。俟
氣息平。方可乳。盛喚卽乳。多令氣逆成呃。

千金論曰。乳兒勿過飽。飽則溢而吐。若乳來多猛。取出授後再乳。或先捏去宿汁乳之。乳母欲寐。當以臂枕兒頭。與乳平。母欲睡熟。卽奪其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合兒卧於側。或驚起。勿與乳。蓋氣亂未定。亦能害兒。

顧頡經曰。夏不去熱乳。令兒嘔吐。冬不去寒乳。令兒渴痢。侵早乳兒。皆須捏去宿乳。乳汁勿投於地。亟蟻食之。令乳無汁。宜沃東壁上。

張湊曰。乳母須每日三時摸兒項後風池。若壯熱者。卽須熨之。使微汗卽愈。風池在頭項筋肉之邊切不可妄鍼灸。亦不可輒吐下。蓋鍼灸傷兒經絡。吐下動兒藏府也。

嬰兒半歲。尻骨已成。乳母當教兒學坐。二百日外。掌骨成。教令地上匍匐。三百日。臍骨成。教令獨立。周歲膝骨成。教令行步。此皆一定之法。世人惜兒懷抱過時。柔瘻筋骨爲害非淺。

○初生兒在胎。藉胎液以生藏府。分娩時。口含血
塊。啼聲出。卽嘔下此毒。內伏命門。外感天時。多發
爲驚風瘡瘍等病。須於未啼時。用綿裹指。急它去。
用黃連豆豉殊寡。其艸解之。後出痘亦輕。又或難
產。或冒風寒。垂危者。勿卽斷臍帶。急燃綿絮。包抱
懷中。以胎衣置火中。更用火紙捻。於臍帶上下往
來燎之。使緩氣入腹。必自甦。尤戒浴。恐腠理泄而
外邪乘也。看舌下有膜如橘子連舌。致啼不出。覺

不轉。速以指爪斷之。或用葦刀割之。微有血出。卽活。
若血出多。燒髮灰。猪脂和塗之。見上下唇與齒齦
連處。皆有一筋牽引。若上唇筋緊。卽生上瘍。下唇
筋緊。卽生下瘍。上瘍生瘡滿頭。或眉間如癬狀。瘡
痒不已。復流黃汁。至處生瘡。下瘍起腰背。漸至四
肢。患亦如上。若不治。或頭面相通。累年不輕。令天
折。或成大瘍。唯每早拭口。卽活。

兒生三日。以桑槐榆桃柳嫩枝各三寸。長者二三

十節煎湯適冷熱。入猪胆汁一枚浴之。勿久浴湯。
用猪胆益母草。不生疥瘡。用金銀花。虎頭骨。麝丹
砂。辟惡氣。客忤驚癇。用桃梅李楮根葉。解體熱溫
疫。須臨浴時煮。紀用經浴法。用寅卯酉日吉。壬午
丁未癸巳凶。不能上三日。勿犯下三日。又三日五
日七日宜浴。

小兒浴。勿先斷臍帶。恐水濕侵臍。有臍風。臍瘻等
證。用清油調髮灰。傅臍焦。

千金云。臍勿以刀割。隔单衣咬斷。以煖氣呵七遍。
卽繩結。所留帶致兒足趺上。斷訖。看臍帶中多有
虫。急剔去。不爾。入臍成疾。臍當長六寸。長則傷肌。
短則傷藏。不以時斷。及接汁不盡。煖氣漸微。卽生
寒。令兒臍風。寶鑑論斷臍。若用剪刀。先於懷中令
剪煖。又水入臍。多天鈞。痛苦啼叫。面青黑。臍傷動
久不乾。傷外風。卽口噤不可救。聖惠云。兒生一宿。
抱近明無風處。看臍上有赤脉直上者。卽於脈盡

頭灸三壯。赤散卽無患矣。臍必用軟練帛。若十
許日怒啼不止。必臍燥刺腹。或衣中有刺物。或換
衣。或換裹。須細察之。

崔氏云。兒衣須清水洗。勿令污濁。新瓶盛密蓋。置
便宜處。三日後。依月吉地。向陽處埋之。入土三尺。
須牢築。令兒壽。若不謹。或爲虫畜傷食。再兒不壽。
或橫亡。宜天德月空處埋吉。正月天德在丁月空
在丙辰餘詳官本曆

日

若遇反亥。宜挂宅外福德上。向陽高燥處。待過

月。然後依法埋藏。吉甲乙日生。丙丁日藏。丙丁日生。
戊己日歲。戊己日生。庚辛日歲。庚辛日生。壬癸日歲。

吉

集驗方云。小兒初剃頭。不擇日。皆於滿月日剃之。
蓋俗所尚。前產婦未得出房。於滿月。卽與兒俱出。
謂胎髮穢惡。有觸神竈。令兒不安。故於此日剃頭。
而出。凡剃頭須避風就暖。剃後以杏仁三枚。去皮
尖研碎。入薄荷三葉。再同研。却入生麻油三四滴。

脈粉拌和頭上擦免生瘡疥熱毒。

○初生輒死 千金云。兒初生輒死。視口中懸壅。前
上齶有泡者。以指甲摘取頭。決潰去血。勿令入咽。
○不能啼 三因云。兒初生不能啼者。必難產。因寒
所致。急用綿絮抱懷中。勿斷臍帶。將胞衣置爐
炭中燒之。再燃大紙條。蘸油點火。於臍帶下燼之。
令火氣入脾。更以熱醋湯盪洗。臍帶須臾氣回啼
哭。方可浴。浴後斷帶。又或有泡在上齶。即如上救

初生輒死法 治之

○眼不開 兒初生眼不開呻吟胎熱故也。宜天竺黃散。土地黃湯及與乳母喫亦有洗拭不淨使穢汁漬於背中致赤爛長亦不瘥。宜真金散洗之

○不喫乳 此亦拭口不淨惡穢入腹令兒腹滿氣短不能喫乳或母取冷過度胎中受寒令兒腹痛也。宜外臺方之類灸承浆七壯亦好

○不小便 此多因母恣食熱物熱毒入胎所致如

臍腹腫脹。四旁青黑色。及口撮。卽不可捲。如未見色。宜外塗方豆

政脊之類

○不大便。由胎中受熱。熱結肛門。燥澁。所以如此。若三日不通。急令乳母以溫水漱口。咂兒前後心并臍下。手足心。共七處。凡四五次。仍以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時服少許。以通爲度。如仍不通。須透而通之。金簪玉簪俱可。須刺入一二寸。肉少蘇合丸。於內糞出爲快。若腹膨脹。呻吟不乳。至

一七則難救。用硬蕎鉗紙肛門亦好。

鴦口。初生口中舌上白屑如鴦之口。內在胎受穀氣盛。心脾熱氣薰發。用髮纏指蘸井花水揩拭之。睡時煅黃丹出火氣。摻舌上。如屑不脫可濃煮粟莢汁。綿纏指蘸拭。如無粟莢。粟木皮代之。

撮口。其證舌強唇青。聚口撮面。面目黃赤喘急。聲不出。飲乳有妨。若口出白沫。四肢冷。不治。其或肚脹青筋。弔腸卵病。內氣引痛。皆腸胃鬱結不通。

所致。治宜疏利。過七日乃免。

宜辰砂殼
散之類

臍風。臍濕。臍瘡。氣臍。凸臍。此皆因斷臍不慎。爲

風冷水濕所乘。入於臍。流入心脾。令腹脹。臍腫。四

肢不收。多啼不乳。甚者發搐。久不癒。爲臍瘡。入於

經脈。多變爲癰。若臍凸肚紫。微有青色。口撮不開。

肝氣盛而克脾土。不可施治。縱使得安。亦非長壽。

宜五苓散之類又法。小兒七日內。患臍風撮。已百無一愈。

但看兒齒齦上。有小泡子。如粟米狀。以熟帛裹指。

薰溫水輕輕擦破卽安。又灸然谷穴在內踝前大骨下陷中灸三壯鍼入三分不宜見血。頸頓經治臍漏用枯藜龍骨爲末。入射少許拭臍乾用避風絳帛灰傅妙。蓋破壁爛草爲末摻之亦好。氣臍大如栗虛腫而軟疼用竹瀝塗日數上消臍瘡宜龍骨散。凸臍因兒有熱在胸頻頻伸引呃呃作聲。努張其氣抑入根本之中所以凸起虛大可畏不必以藥傅之恐反爲害。宜自芍藥湯加米仁煎湯空心溫服以外消散塗貼自平。

天鈞

亦驚風之類。但發時頭面仰視。翻眼抬睛。

故名天鈞。

宜雙金散或灸兩手大杼指兩甲內相半男先灸左女先灸右及兩足大拇指

中間各三五壯。又灸前後手心各五壯。妙頭目不仰。乃驚風之類。宜辰砂抱砂龍。

九

遺尿

原病式謂遺尿不禁爲冷。內經云。不約爲

遺溺。仁齋曰。小使者乃津液之餘也。腎主水。膀胱

爲津液之府。腎與膀胱俱虛。而冷氣乘之。不能拘

制。其水出不禁。謂之遺尿。睡裏出者。謂之尿牀。此

皆腎與膀胱俱處而挾冷所致。

宜殊勝散
分臺方

亦有熱

結於腎部。干於足厥陰之經。庭孔鬱結。氣血不能宣通。則癆痺而神無用。故液滲入膀胱而溺遺失。

宜殊勝散
分臺方

舌齦齶諸病。

薛師王紹龍先生云。心爲一身君

主。神識之舍。外候於舌。無論外感內傷。皆當察之。

其色紅潤而淨者吉。有胎者病。胎薄少。色鮮明者輕。厚滿色黑闇者危。色枯燥不澤。圓縮強硬者死。

至於傷寒痘瘍更宜細察。又脾之脉絡絡舌本心

脾有熱無處疏泄而發證於舌者如弄舌重舌木

舌舌白舌黃舌瘍舌血之類弄舌者時時微吐其

舌如火之燄心脾積熱所致兼脾證者宜瀉黃散

導赤散或大黃黃連湯心湯重舌者舌下有形如舌宜刺出血

散敷擦清液散馬牙硝蒲黃末之類木舌者舌腫漸大塞滿口不治

殺人宜瀉黃散舌白者舌上有厚白胎也宜桑白皮汁敷之薄荷汁

生蠶殼亦燒舌黃者卽舌上黃胎也宜瀉黃散舌瘍者舌上

生瘡也。

宜自繫

足法舌血者舌上黑有孔出血不止心

火熾盛故也。

宜蒲黃

末敷之重齦重齶者齦上齶上腫也。

總不外一熱俱宜刺決洗拭。

宜雞內金爲末乾膠或服五福化毒丹

○鼻鼽 小兒鼻鼽者因肺胃熱盛迫血妄行出于

上竅。春冬衄者宜用生地黃汁加生蒲黃末少許。

砂糖井花水浸服之。秋夏宜用車前草一握洗淨同生薑一處研取汁入白蜜一匙先拌查塞鼻次用新汲水和蜜并車前薑汁飲之。又生蘿蔔搗汁。

仰頭滴入鼻卽止。次以新汲水和蜜蘿蔔汁飲之。

又宜服膠黃散。

○語遲 應語不語曰語遲。由母受驚怖。內動兒藏。
邪乘於心。舌乃心苗。心氣不和。舌痿無力故也。

首宣

蒲丸或灸
心俞三壯

○無辜瘡 巢氏云。古謂天上有鳥。名無辜。晝伏夜遊。小兒衣衲。夜露失收。鳥從上過。小兒親體。染其毒氣。遂致面黃髮直。壯熱。能飲食而不生肌肉。累

積月日而死。故名無辜。漢東王先生非之曰。此由八邪所乘。八邪者何。謂饑。飽。勞。役。風。驚。暑。積也。若然是皆有因而成。不得名無辜矣。又謂夜露陰沉。百邪皆出。狐狸梟鵠之類。何所不有。衣染其氣。小兒氣虛體薄者。理應成病。以其不在八邪之內。無辜而得。故名無辜。非獨因烏名也。宜肥兒丸布袋丸之類

○鶴節 小兒稟賦不足。血氣不榮。肌肉瘦瘠。骨節聳露。如鶴膝之節。乃腎虛不生骨髓耳。宜錢氏地黃丸

○ 哺露 小兒哺乳不節。不消。致脾胃衰弱。弱則愈不能消。令肌肉虛羸。骨如柴露。吸啜苦熱。以其得之乳哺。故曰哺露。宜大啓脾丸

○ 丁奚 小兒脾胃尚弱。若哺食過度。不消。水穀之

精減少。不榮肌肉。日漸瘦削。其頭項四肢。骨立零丁。而腹則獨大如奚囊也。故名丁奚。與哺露大同小異。其證吐泄不時。色慘潮熱。或黃瘦。頤開頤陷。

手足如筒。

宜參苓白朮散大啓脾丸之類

○滯頤

俗名口水流滯於頤下。故名。由脾虛冷液

多。不能收攝耳。亦有脾虛挾熱而流者。宜審證施

治。

虛冷宜益黃散。熟黃散之類。

二啼哭

有驚啼。夜啼。軀啼。驚啼者。精神不定。睡卧

不安。如驚而啼。屬藏熱。夜啼者。入夜卽啼。陰寒相

感。屬藏寒。軀啼者。腹中痛甚。張氣促眉。身軀而啼。

三屬食不消。或有癆滯。

驚啼宜安神丸。涼膈散。夜啼宜花火膏。單花散。茅先生林

辱音覆。希

當歸煎丸之類。

○龜胸。龜背。龜胸者。母食五辛。或兒食宿乳。熱薰

于肺。肺氣不寧。以致欬逆上氣。壅滿胸中。久則胸

亦高腫。如龜之胸也。龜背者。是強兒坐。或坐風中。

邪乘于脊。或乘于督脈。不能解散。漸如僵僂而背

高如龜狀也。龜胸者宜渴白散外治塗龜尿洗。龜背者宜羌活防風及龜鹿膠等藥外

亦宜塗龜尿。

○解顱。頸陷。頸填。解顱者。小兒數歲。頸不合而頭

顱開也。頸陷者。頸門深陷也。頸填者。頸門腫起也。

皆屬腎虛髓少骨氣不實多主夭折間有藏府有

熱熱上衝而成者然腎虛固本病耳

宜補中益氣湯錢氏地黃

丸小兒頭頸之類

○行遲 腎主骨主髓虛則髓少骨柔故行遲耳

宜錢

氏地黃丸勝
耳鼻之類

○齒遲 亦腎虛也夫齒爲骨之餘藉髓榮養腎髓

虛少不能充骨又安能及齒故久不生也

宜六味地黃丸

○髮遲髮黃 亦少陰腎藏虛耳腎主藏精其華在

髮少陰氣血不足。卽髮疎薄不生。亦有因頭瘡而

禿落者。

宜千金秋葵方榆末散聖惠黑豆膏逐月

錢氏曰。小兒長大不行。行則腳弱。齒久不生。生則不固。髮久不生生。則不黑。皆屬氣血虛也。宜大劑補之。

髮黃宜千金翼大豆方

○齒牙頰車

齒者骨之餘。其本在腎。而經則屬胃。

與大腸。病在本者多屬虛。在經者多實火。宜細察。

形脉兼證治之

宜清胃湯。雄黃丸。千金白鹽方。靈芝生齒方。

耳

耳者心腎之竅肝膽之經也心腎主內屬精

血不足肝膽主外屬風熱有餘或幹澀或鳴響者

稟賦虛也或腰痛或腹癢者邪氣客也

虛者食少味地黃丸

柴胡湯散若諸虛火體皆散若諸虛火

入耳宜立發散

五轉 五轉者頭項轉手轉脚轉肌肉轉口轉是

也頭轉項不舉項脈轉而難收治雖暫差他年必
再發手轉則手垂四肢無力亦顫指肩若得解題

還進飲食乃慢脾風候也。尚堪醫治。脚軟者五歲不能行。虛羸脚細小。不妨藥衛。但服參者等藥。併錢氏地黃丸長大。自然肌肉充滿。肌肉軟。則肉少皮寬。自離飲食不長肌肉。宜錢氏
瘧速丸若渴利頻者難治。口軟。則虛。舌出口。唇青氣喘。則難治。薛氏曰。頭項軟者。天柱骨弱。藏府骨脈皆虛。諸陽氣不足也。手足軟者。脾主四肢。中州不足。不能榮養四肢。故肉少皮寬而飲不爲肌膚也。口軟者。口爲脾竅。上

下頸屬手足陽明。陽明主胃脾。胃氣虛。舌不能藏而常舒出也。此五者皆因五藏氣弱。不能滋養充達。原其要則總歸於胃。以胃爲水穀之海。五藏六府之大源。故治必先以脾胃爲主。皆宜用補中益氣湯以滋化源。頸項手足三轉。兼服地黃丸。

○五轉 五轉者仰頭取氣。難以動搖。氣壅作痛。連於胸膈手足心冷而轉。此陽氣不營於四末也。經曰。脾主四肢。又曰。脾主諸陰。今手足冷而轉者。獨

陰無陽也。故難治。若壯筋青懸者。水乘土位。懸用六君子湯加炮薑肉桂。柴胡升麻。以復其真氣。若係風邪。當參驚風治之。此證從肝脾二藏受患。補脾平肝。

○癇病 癇。小鬼也。乳兒未能行。而母復有娠。其兒忽微下利。寒熱往來。毛髮聾聾。爲有惡鬼神。導腹中之胎。姪嫉而爲此。故名癇病也。以他兒食其乳。亦能相繼而病。故俗又名繼病。雖然。妊娠乳兒。不

必悉致魅亦偶有此耳。女子氣血上爲乳汁下爲
經水。小兒飲交乳且病。况氣血既榮於胎而乳汁
必自溝薄兒飲之能無病乎。鬼神之咎似無稽也。
客忤。客忤者是小兒神氣軟弱忽有非常之物
或未經識見之人觸之與兒氣相忤而發病謂之
客忤亦名中客又名中人其狀吐下青黃白色水
穀解離腹痛反側夭矯而變易五色狀似癇但眼
不上挿耳其脈弦急數者是也失時不治久則難

治若乳母飲酒過度醉及房勞喘後乳者最劇能
殺兒。凡兒衣布綿帛鞋襪中不得有頭髮。凡小兒
中客。急視其口中懸離左右當有青黑腫脈核。如
麻豆大或赤或白或青者便宜用針速刺或炙摘
決之。并以綿纏釵頭拭去血能愈。宜豆豉大丸摩
法譚氏殊聖治

客忤方張漢辟都骨龜中
黃土方三物燒髮散之類

○中惡 小兒中惡者是卒中鬼邪之氣也。其證先
無他病卒然心腹刺痛悶亂欲死是也。此必精氣

衰弱而後鬼惡得以中之。若腹大而滿脈紫大而

浮者死。緊細而微者生。治之餘邪不盡留滯藏府

更發變爲痘病矣。

宜先下蘇合香丸未醒以皂角末搐鼻取嚏次服沉降氣湯

又宜葱白鼻法。刮後灸法。管吹下部法已上救客忤中惡法。反一切卒死皆可參用。

卒死 小兒卒死者是三虛而遇賊風故無病倉

卒而死三虛者乘年之衰逢月之空失時之和也

詳靈樞歲露篇人因此三虛復遇賊風令陰氣偏竭于內

陽氣阻隔於外榮衛壅閉陰陽不通故暴絕而死

若藏府未竭，良久乃甦。亦有挾鬼神氣者，皆須治令邪退乃生。若有餘邪畱蓄，再發則成疰病矣。其

證眼合齶齒，遍身綿軟，面青黑，口鼻冷。

宜蘇合香丸一千金牛

紙方雙兩路方治卒屬方皂角指鼻法雞兔血方灸人中反心下之類

○鬼持 小兒鬼持者，乃神氣弱爲鬼所持。其狀無他疾，乃瘦黃啼喚，口氣常臭是也。宜圖經治鬼持方外臺深師五

邪丸之類

○疰病 痹者注也。亦言住也。謂風邪鬼氣住人身

內又復注易傍人無問人之大小若血氣衰弱則陰陽失守風邪鬼氣因而客之留住肌腠迫着藏府或皮膚掣動遊易不常或心腹刺痛或體熱皮膚沉滯至死死後注人小兒襁褓居室無因觸冒風邪多緣乳母解脫之時不避溫涼暑濕或抱持出入早晚其神魂軟弱爲鬼氣所傷故耳宜太乙備急散

○尸疰 尸疰者是五尸之中一尸疰也人無問大小腹內皆有尸疰尸疰爲性忌惡多接引外邪共

爲患者。小兒血氣衰弱者精神亦羸。故尸疰因而爲病。其狀沉默不的知病之所在。或寒熱淋漓。涉引歲月。遂至於死。死又疰易傷人。故曰尸疰也。

宜聖

惠木香
散之類

○蠭疰 蠭疰者人以蛇虫諸毒聚於器中令相噉食。食盡存一物最惡最毒。名曰蠭。能隨飲食變化入腹還生。食人五臟。小兒中者證與大人無異。其狀心腹多刺痛懊悶。懾者卽死。緩者延涉歲月。羸

困下血藏爛乃死。死又瘥易傍人故爲疊瘡也。

范立

注十七味紫參左殼羊角散雄黃散小兒五種疊毒方敗故皮

附方

疊眉膏

山梔

三個存性

雄黃

少許

朱砂

少許

右爲細末入麻油輕粉各少許調勻候兒睡着濃抹于兩眉上醒便不食乳未効再用加黃丹

一錢。

金朱飲

本名天黃散

治驚壯熱，傷寒伏熱。上焦虛熱。

童舌口鼻生瘡，赤眼。

川鬱金

剉皂莢水煮乾細者如膽狀佳

天竺黃

甘草

炙十四個水洗去土

馬牙硝各半

研一分

蟬殼

十四個水麝香少許

右爲末，每服半錢，至一錢，蜜湯調下。

生地黃湯 治初生兒眼不開。

乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸

去蘆

瓜蔞根

耳艸

各等分

右爲細末。少許用燈心煎湯調抹口中。

真金散

治兒初生。洗眼不淨。穢汁浸漬眼脣。赤爛至長不瘥。每食熟物熟藥名曰胎赤。

黃連

去髮

黃柏

當歸

赤芍藥

各一錢

杏仁

去皮尖

半錢

右剉散。乳汁浸一宿。晒乾爲極細末。用生地黃汁調一字。頻頻點眼。新織裹荆芥湯浸濕。時時

洗浴母服洗心湯

外臺方

乳兩合葱白一寸煎一兩沸去葱喫卽乳

豆鼓膏

黑豆一

田螺十九個

葱一大把

右搗爛芭蕉汁調貼臍下

蘇合香丸見第十八

辰砂殼蠶散治初生撮口

辰砂

水飛半錢

殼蠶

真阿去絲嘴炒一錢

蛇蛻皮

炒一錢

麝香

研半錢

右爲極細末少許用蜜調傅脣口

五苓散

見第十七

龍骨散 治臍中瘡

龍骨

煅

輕粉

各半錢

黃連

去鬚一錢半

右爲極細末少許乾摻麝

白芍藥湯 治冷疝腹痛及誤汗下卽壞症傷寒

是也。並宜先服。次投對證之劑。

白芍藥

一兩半

澤瀉

去粗皮七錢半

甘艸

炙二錢

薄桂

去粗皮一錢半

右件咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。
誤汗誤下。加人參。南木香各二錢。腑下痛。入生
薑及鹽同煎。或加鈎藤亦好。

外消散。治兒初生。臍突。或痛。或不痛。痛則啼不
已。及小兒因感濕熱。陰囊浮腫。

大黃

牡蠣

各半兩

朴硝

錢

前二味剉焙爲末。仍入朴硝鉢內同杵勻。用一二錢。先取田螺淨洗。水半碗活過宿去螺。用水調塗腫處。卽消其螺放生勿害。治陰囊腫。用草前子煎湯候冷調傅。

雙金散 治天鈞驚風。目久不下。

蜈蚣

一鉢去頭足尾。用真酥塗慢火炙黃。置磁子上。面南立用竹刀子當脊縫中。序剖作

兩半倒左邊者入一貼子內寫左字右邊者亦入一貼子內寫右字不得錯悞

麝香

一錢細研先將左邊者同于乳鉢內研作
細末却人在左字貼內後起別用乳鉢將

右邊字者入麝香同研極細却人有字貼內
後不得相犯每有病者眼晴釘上止見白睛
兼角弓反張更不能出

一聲者用此藥法治之

右用細葦筒子取左字貼內藥少許咬在左邊
鼻裏右亦如之用藥不可多若眼未全下更添
些小以意量度其眼卽下。

神砂抱龍丸 治小兒驚風。痰喘。風寒。

胆星

四兩

朱砂

水硝五錢

麝香

五分

雄黃

二錢
五分

天竺黃

一
兩

右爲極細末。甘艸膏和丸。朱砂爲衣。一方加金

箔十張。

雞腸散 治因膀胱有熱。服冷藥過多。小便不能

禁止。或遺尿病。

雞腸

一具男用雄雞女用
雄雞尾存性

牡蠣

茯苓

去皮

桑螵蛸

炒各
五錢

桂皮

龍骨

各二
錢半

右爲極細末。仍以雞肫脰一具。雞腸一具。燒存性。研極細末。每用和前藥末一錢。用溫酒調化食前服。

外臺方 療小兒睡中遺尿。不自覺。

桂末。雄雞肝等分。搗丸一豆大。溫水下。日三服。

六味地黃丸

見第十六

鴻黃散

見第四十九

導赤散

見第十七

大黃黃連湯

兒第五十五

清波散 治小兒重舌及口瘡

青黛

朴硝

各一錢

龍腦

一字

右爲細末。用蜜調鴉翎蘸少許傅之。

五福化毒丹 治發熱。驚惕。狂譫。煩渴。頰赤。咽喉乾
唇口生瘡。夜卧不寧。頭面遍身瘡癤。及小兒驚
風。瘍熱。潮搐等證。如大人口臭。及小兒瘡疹。上
攻口齒。涎血。臭氣。用生地自然汁化一丸。以雞

翎劄口內熱癬黃瘦雀目者陳粟米泔下食後
臨卧服。

玄參

桔梗

各三兩

人參

牙硝

青黛

各一兩

甘艸

七錢五分

麝香

一分

蜜丸芡實大金銀箔各四十片爲衣。每一丸作

四服。薄荷湯下。

膠黃散 治小兒大衄。口鼻耳出血不止。十五六

歲兒陽盛多此病

阿膠

一兩

蒲黃

半兩

右爲末三歲半錢生地黃汁微煎調服食前

菖蒲丸治小兒心氣不足五六歲不能言

石菖蒲

二錢

人參

切去蘆根半兩

丹參

二錢

天門冬

皮去心

麥門冬

去心皮各一兩

赤石脂

三錢

直指有當歸川芎朱砂

右爲細末煉蜜丸如菉豆大或麻子大溫水下

五七丸至一二十九。不拘時日三服。久服取效。
又有病後腎虛不語者。宜兼服錢氏地黃丸。
肥兒丸。治小兒腦後項邊有物如蟬子。按之轉
動軟而不痛。名無辜癥。久服神效。

胡黃連

神麴

麥蘖

各五錢

檳榔

三錢

木香

二錢

肉豆蔻

麵裹半錢

史君子

肉各二錢半

右爲細末。蒸餅丸如黍米大。用米飲食遠服。

醫曰。脾色黃

食肌肉納飲

食腹方其府

乃其直是

以四君補

脾運土治其

更益砂

收蛔治

其積食肉不

食藥者收藥

味子肉并肉

并味從類而

歸脾若脾虛

而黃放大飲

食之調取肉

枯草每見則

布袋丸 治諸疾。面黃腹大。飲食不調。肌肉枯

瘁。

夜明砂

擗淨。拘
蕪熟。各二兩。

白茯苓

去皮。

白术

無油者
去皮。

人參

去皮。

甘艸

蘆薈

細末。各半兩。

史君子

肥白者微炒。
去皮。二兩。

右爲末。湯浸蒸餅和丸。如彈子大。每服一丸。以生絹袋盛之。次用精猪肉二兩。同藥一處煮。候肉熟爛。提取藥於當風處懸挂。將所煮肉并汁。

者服之自効
恐誤辨則未
必也

令小兒食所懸之藥。第二日仍依前法煮食。只
待藥盡爲度。

錢氏地黃丸 治頭顛不合。體瘦骨露如鶴膝皆
腎虛也。并治腎痺天柱傾倒。腎主骨故。

熟地黃

洗焙八錢

澤瀉

洗去毛

牡丹皮

去心

白茯苓

各三錢

山茱萸肉

牛膝

鹿茸

酥炙各一錢

山藥

各四錢

右爲末。煉蜜丸如梧子大。三歲已下。三二丸。溫

水空心化下

大啓脾丸

制資生丸見
第五十一

參芩白术散

見第四十四

益黃散

又名補
脾散

治脾胃虛寒。泄瀉嘔吐。腹痛。

鼻氣冷。有熱證。不可服。

陳橘皮

兩

青橘皮

二錢

訶子肉

甘草

各半兩

丁香

二錢

白茯苓

一兩

右爲細末。每服三錢。水一盞。煎至六分。食前溫

服。

瀉黃散

見第四十九

安神丸

見第十九

涼膈散

治小兒藏府積熱。煩躁多渴。頭昏。唇焦。

咽燥。舌腫喉閉。目赤鼻衄。領頸結硬。口舌生瘡。

痰實不利。涕唾稠粘。睡卧不寧。譖語狂妄。腸胃

燥結。便溺赤澁。一切風腫。並宜服之。

方見第十九

花火膏

取燈火一顆。塗乳上。令兒嗅之。

蟬花散

治小兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下。

半截爲末。一字薄荷湯入酒少許調下。或者不

信。將上半截爲末。煎湯調下。即復啼也。古人立

方。莫知其妙。

茅先生抹唇膏

主小兒夜啼。內有驚熱。

蟬殼

一個去足

燈花

兩朵

朱砂

少許

右爲末。如小兒夜啼。遇夜用雞冠血調藥抹兒。陽正南寧方。上下兩唇卽止。夾朱砂膏與服。

定驚安神丸
火鬱發心

補日養則蟬
瘡癰則難鳴
失聲子夜冠
則發高發則
表出邪于

白术當歸煎丸 治胎寒腹痛。遇夜啼叫。身體脹張。有如癟狀。吐噃不止。大便酸臭。乳食雖多。不生肌膚。

白术

當歸

木香

右等分爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每服一丸。煎木香湯化下。

瀉白散

見第四十九

塗龜尿法 取龜置荷葉上。鏡照之。則自尿。一法

以擗捕其臭亦自由。

補中益氣湯

見第三十九

小兒銅頭藥

白芍藥粉

補中益氣湯
歸脾經散血
二脉會于頭
項二脉虛亦
能令頭解自
平乘益肝飲
而透頭雄雞
冠助陽而
益頭虛不
合者無効

麝茸丹 治數歲不能行。

麝香

別研

荳蔻

酥炙黃

生地

黃耆蜜炙

虎哩骨

酥塗灸黃

當歸

洗焙乾

黃耆

剉

右件各一兩爲細末。用羊髓四兩煮爛。和成膏。如黍米大。每服十粒。磨沉香湯下。乳食前。日三服。

千金楸葉方 治少小頭不生髮。以楸葉搗取汁。

傳頭上立生。

榆末散 治小兒白禿髮不生。搗榆皮末。苦酒調。

塗。

聖惠神効黑豆膏 治兒腦疳。髮連根作穗。脫落不生。或白禿瘡髮不生者。兼能黑髮。

黑豆

茜藤

詞梨勒皮

一兩

右件藥搗羅末。水拌令勻。內于竹筒中。以亂髮塞口。燒灰內煨。取油貯瓦器中。先以米泔皂莢湯洗頭。拭乾塗之。日再用。十日髮生。

千金翼大豆方 治髮黃。以醋煮大豆爛。去豆煎

令稠塗髮。

清胃湯 治胃火牙痛。或連頭面。方見第四十九

雄黃丸 治小兒牙齒黑蛭。氣臭疼痛。

雄黃二錢 麝香半錢

右爲細末。軟飯和爲梃子。安在牙內。

千金白鹽方 常以白鹽末封齒齦上。日三夜二。

靈苑生齒方

右用雄雌雞糞各十四顆。焙乾同研如粉。入麝

香少許。仍先以針挑破損齒脚下血出。將散子傳之。年高者不過二十日生。年少者十日。不計傷損。及少自退落並再生。

柴胡清肝散 治肝胆三焦風熱怒火。或乍寒乍熱。往來寒熱。發熱或頭發瘡毒等證。

柴胡

一錢

黃芩

炒

人參

川芎

各半錢

山梔

炒一錢半

連翹

甘草

各五分

桔梗

八分

右水煎服。

湯氏龍黃散 治小兒停耳。汁出不止。

枯白礬

龍骨末

黃丹

炒各半兩

麝香

一錢

右同研細。先以綿杖子振灑水盡。用散一字半。
分爲兩處入耳內。日二次。

立驗散 治蚰蜒及諸虫入耳

川芎

白芷

夜明砂 炒

猪牙皂角

炙

南星

炮各七錢五分

百部

白丁香

藜蘆

各四錢

草烏

半兩

砒霜

另研

草撥

各二錢

海金沙

二錢半

右爲細末研勻。臨時更用鉛丹調色勻。磁器收。如蚰蜒入耳。取少許。以醋一滴調化。以細翎蘸藥入耳竅。微吹。令藥氣行。立出。藥不得多。多則蚰蜒成水不出。如蝎螫。先點少醋在螫處。摻藥半字許。擦令熱即効。

錢氏橘連丸 治癆瘦久服消食和氣長肌肉。

橘皮

一兩

黃連

半兩
水浮浸一宿

右爲細末。另研入麝香五分。用豬胆七個分藥入胆內。漿水煮候臨熟。以針微刺破。以熱爲度。煮粟米粥和丸。如菉豆大。每服十丸。至二三十丸。米飲下。量兒加減無時。

豆豉大丸摩法 用豉數合。水拌濕。搗熟。丸如雞子大。摩兒頤上足心。各五六遍。又遍摩兒心及

臍上下。食墳破視其中。當有細毛。卽擲丸道中。
譚氏殊聖治客忤方。

驚啼哭不休。壯熱脈如鉤。莫識爲何病。傷心不
自由。犀角雄黃搗。桃符煎水稠。參芩茱萸子。三
粒化無憂。

張渙辟邪膏。兒血氣未實。神氣軟弱。除父母及
乳養人外。勿令見生人。及抱往別房異戶。及見
牛馬畜獸等。其父母家人之類。自外夜行歸家。

亦勿令見。恐經鬼神惡氣犯兒。令吐下五色。
水穀解離。狀似發癇。但眼不上戴。脈不弦急。名

曰客忤。

真降香

剉

白膠香

沉香

虎頭骨

微骨

鬼臼

去毛

草龍膽

人參

白茯苓

右各半兩。搗羅細末。次入水磨雄黃半兩。細研。
水飛次研麝香一錢拌勻。煉蜜和丸。雞頭大每

一粒煎乳香湯化下。及別丸如彈子大。用綠絹袋盛。佩兒衣上。仍卧內常燒神妙。

竈中黃土方。客忤因而驚忤者。治法用竈中黃土研二兩。雞子一枚去殼。二件相和。入少許水調。先以桃柳枝湯浴兒。後將此藥塗五心及頭門上。陳無擇法用竈中黃土研
蝴蝶等分如此法塗之

三物燒髮散。治小兒見生人驚忤啼不止。

卽用來人頭上髮十莖。斷兒衣帶少許。合燒灰

細末和乳飲兒愈

皂莢搐鼻法

見第七十三

沉香降氣湯

卽前辟邪膏

葱刺鼻法

右取葱黃心刺其鼻男左女右入七八寸小兒
量度之若使目中血出佳扁鵲法同是

葛氏肘後灸法以繩圍其死人肘腕男左女右
畢伸繩從背上大椎度以下又從此灸橫行各

半絶。此法三灸各三。卽起。又令爪其病人人。瘧。取醫不起者。捲其手灸下文頭。隨年壯。又灸鼻中三壯也。又灸頤下宛宛中。名承漿穴。十壯。大効。又灸兩足大指瓜甲聚毛中七壯。此華陀法。一云三七壯。又灸臍中百壯也。

管吹下部法。以管吹下部。須數人互吹。氣通則活。

千金牛舐方。治卒死無脈。無他形候。陰陽俱竭。

故也。

用牽牛臨兒鼻上。二百息。牛舐必差。牛不肯舐着鹽汁塗面上。卽牛肯舐。

熨

兩脇法

右炙熨斗。熨兩脇下。

備急方云
又治尸厥

治鬼

魘死方

搗韭汁灌鼻孔中。劇者灌兩耳。

張仲景

景云
灌口中

雞冠血方

治小兒不知所病。便死絕方。

右取雄雞冠。臨兒口上。割血滴入口。下卽活。

灸法

卒死而四肢不收。屎便者。灸心下一寸。脐

上三寸。脐下四寸。各一百壯。兒小者隨年。

圖經治鬼持方

用虎睛爪。并指骨毛。繫兒臂上。

辟惡鬼。

外臺深師五邪方 療鬼魅。妄言狂走。恍惚不識。

人。此爲鬼忤。

丹砂

雄黃

各別研

龍骨

馬目毒公

鬼箭

各五兩

鬼臼

二兩

赤小豆

三兩

羌青

一錢

桃仁

一百枚去皮尖熬別研

右搗末。細絹篩。合諸藥拌令勻。後內蠟。和如彈丸。絳囊盛繫臂。男左女右。小兒繫頸。合時勿令婦人雞犬見服者。蜜和圓如桐子大。一服三丸。日三服。忌五辛生血物。

太乙備急散。主卒中惡客忤。五尸入腹。鬼刺鬼癆。及中蠭瘞。吐血下血。及心腹卒痛。腹滿傷寒。陰毒病。六七日。

損曰生湯丸
死陰附子桂
大黃根甘草
升麻葛根
升麻是也大
蒜巴豆
海螵蛸小毒丸

野葛是也。又

藜蘆酒子上

巴豆泄子下

吐利汗解得

一則生所以

然者運被轉

氣內張邪氣

外散故耳

雄黃

芫花

桂心

各二兩

丹砂

蜀椒

各一兩

藜蘆

巴豆

各一分

附子

炮裂去皮五分

野葛

三分

右九味。巴豆別治如脂。餘合治下篋。以巴豆合和。更搗令勻。以銅器密貯之。勿泄。有懸疾。水服一字七。可加至半錢七。老小半之。病在頭。當鼻
劙。在脇上。咷。在脇下。利。在四肢。當汗出。神妙。

聖惠木香散 治小兒尸疰。心腹脹痛。不可忍。

木香

鬼箭羽

桔梗去頭

當歸

炒微

紫蘇莖葉

各半兩

檳榔

三分

右搗爲粗散。每一錢以水一小盞。入生薑少許。

煎五分去滓。不計時溫服。更量兒大小加減。

范汪方十七物紫參丸 療大人小兒疎痘癰瘍
積聚。瘦削。大小便不利。卒忤惡風。臚脹腹滿。淋
水轉注。殫門盡戶。延及子孫。醫不能療者。

紫參

人參

半夏

湯洗

藜蘆

代赭石

桔梗

白薇

肉蓯蓉

各二分

石膏

大黃

牡蠣

熬

丹參

各一分

蟬蟆

燒灰

烏頭

炮各四分

狼毒

七分

附子

炮五分

巴豆

七十枚心皮炒去

右藥搗篩。蜜和爲圓。以飲下如小豆一丸。日三服。老小以意減之。蜂蠻所螫。塗上神良。忌豬羊肉。冷水。一方無蟬蟆。有乾薑四分。

殼羊角散 治小兒中蟲。腹內堅如石。面目青黃。
小便淋瀝。變易無常。

殼羊角屑

屑

蕤荷

各一
兩

梔子仁

七
枚

赤芍藥

牡丹皮

黃連

去頭各
一分

犀角

屑半
兩

右搗粗末。羅爲散。每服一錢。以水一小盞。煎至五分。去滓溫服。日三四服。更量兒大小加減。與之

雄黃散 治小兒飛蟲狀如鬼氣者。宜服。

雄黃

麝香

各細研

犀角

末各半兩

右藥都研令勻。每服以溫水調下半錢七。日四
五服。量兒大小加減。

小兒五種蠱毒方

右鵝馬糞鈴根糞爲散。每服一錢。水一盞。煎五
分。去滓空腹頓服。當隨吐蟲出。未吐再服。

敗鍼皮方

右用敗鼓皮一片燒灰。細研爲粉。空心粥飲調
服一錢。病人須臾呼蘇。主姓名便愈。

醫燈續焰目錄

卷之十七

奇經八脈脈證第七十九

羌活勝濕湯

見第六十五

生鐵落飲

瀉青丸

見第四十九

丁香棟實丸

見第六十四

三因散聚湯

三因化氣湯

蘇子降氣湯

見第十七

黑錫丹

見第七十

震靈丹

金匱桂枝龍骨牡蠣湯

和劑威喜丸

東垣柴胡升陽湯

東垣退熱湯

本事枳實散

奇効拈痛丸

四七湯

見第十七

胃風湯

交加散

海藏愈風湯

加味逍遙散

見第五十

十全大補湯

見第十六

反關脉第八十

真藏脉第八十一

卷之十八

補遺

嘈囁

三聖丸

越鞠丸

見第十六

丹溪導飲丸

二陳湯

見第六十三

酒煮黃連丸

見五十五

吞酸吐酸

藿香安胃散

見第二十

加減二陳湯

三因鞠木丸

二陳加茱連神翹蒼术方

酒煮黃連丸

見第五十五

噎膈

生薑半夏湯

統旨香砂寬中湯

和劑五膈寬中散

和劑穀神嘉禾散

統旨補氣運脾湯

代抵當丸

見第二十

自汗

當歸補血丸

得効玉屏風散

保元湯

黃耆建中湯

尤三十三

桂枝湯

見第十九

盜汗

當歸六黃湯

大建中湯

悸怔忡

導痰湯

見第四十一

溫膽湯

見第二十

茯苓甘艸湯

薏米湯

補中益氣湯

見三十九

四君子湯

見第十六

六君子湯

見第十六

小建中湯

見第二十一

黃耆建中湯

見二十二

四物湯

見第二十一

朱雀丸

見第五十一

當歸補血湯

見第十六

經驗定心丹

炙甘草湯

見第三十三

健忘

歸脾湯

見第五十八

讀書丸

朱雀丸

見第五十一

二參丸

開心散

壽星丸

見第五十

導痰湯 見第四十一 代抵當丸 見第二十

不寐

八珍湯

見第十六

歸脾湯

見第五十八

仲景酸棗仁湯

溫膽湯

見第二十

六君子湯

見第十六

內經半夏湯

導痰湯

見第四十一

呃

二陳湯

見第十六

溫膽湯

見第二十一

導痰湯

見第四十一

和劑枳實半夏湯

麴蘖枳术丸

見第二十

法製陳皮

法製檳榔

六君子湯

見第十六

四君子湯

見第十六

橘皮竹茹湯

理中湯

見第十七

紫古柿錢散

金匱腎氣丸

見第十六

良方參附湯

而

升麻胃風湯

升麻順氣湯

犀角升麻湯

補胃湯

茯苓桂枝五味甘艸湯

七白散

洗面藥

面上五色瘡方

面上豆痕斑點醫方

面上粉刺方

斗門方

指爪破面方

又方

平胃散

白防子散

祛風白芷散

目

易簡補肝散

本事菊花散

瀉青丸見第四十九

局方湯泡散

湯泡散

分珠散

清涼散

二黃散

照水丸

千金磁硃丸

煮肝散

洗眼方

菊睛丸

駐景丸

枸杞子酒

地芝丸

定志丸

耳

清神散

磁石湯

益腎散

犀角飲子

鼻

通氣湯

防風散

單南星散

草撥餅

瓜
萎
散

芷
夷
散

鼻
効
不
止
方

口
脣

瀉
白
湯

黃
檗
散

五
福
化
毒
丹

見七十八水瘡丸

舌

薄
荷
煎

黑
參
丸

薏
苡
仁
湯

舌
血
舌
腫
舌
出
方

齒

清胃湯

見第四十九

香鹽散

謝傳笑去散

白蒺藜散

青白散

齒縫出血方

齒肉壅出

鬚髮

天寶單方

巨勝丸

旱蓮膏

地黃膏

筆峰雜興方

六淫方

陰淫上下厥逆中外寒慄

附子理中湯

見第十七四逆湯見第二十二

陽淫狂譖煩渴血泄浸淫

白虎湯

見第四十三

犀角地黃湯

風淫肢竅毛落兼習瘧癥

寶鑑醉仙散

通天再造散

雨淫腹滿腫脹腸鳴瀉瀉

平胃散

見第四十七

五苓散

見第十七

晦淫百合狐惑熱中藏燥

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃薰法

赤小豆當歸散

金匱甘麥大棗湯

明淫恍惚動悸錯妄失神

金匱桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯

東垣朱砂安神丸

見第十九

卷之十九

望診

藏府部分

診病新久

五官

面部圖

藏府色見面部圖

肢節色見面部圖

統論色

面

口

鼻

血脉

毛髮

形體

死證

五藏絕證

詐病

聲診

聲

息

問診

人品起居

病證

嗜欲苦樂

附辯舌

醫燈續焰卷十七

錢塘後學濬 楊碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人張苑蘭曉如

世韶夔司校

姪

世韻子咸

奇經八脉脉證第七十九

奇經八脈其診又別。直上直下。浮則爲督。牢則爲衝。

緊則任脈寸左右彈陽蹻可決。尺左右彈陰蹻可別。
關左右彈帶脈當訣。尺外斜上至寸陰維。尺內斜上至寸陽維。督脈爲病。脊強癲癇。任脈爲病。七疝瘕堅。衝脈爲病。逆氣裏急。帶主帶下。腑痛精失。陽維寒熱。目眩僵仆。陰維心痛。胸脇刺築。陽蹻爲病。陰緩陽急。陰蹻爲病。陽緩陰急。癰癧癰癧。寒熱恍惚。八脈脉證各有所屬。

奇經八脈者。在十二經脈之外。無藏府與之配偶。

至要今

肺大

於正經尚
橫慣兌奇

左關肺右闕胃左尺
腎膀胱右尺命門三焦

浮中沉有定體

難經以

平潘子此
詛按部數分

菽丸散十二散之
至骨分肺心脾肝腎弦鉤毛石有定形

春弦肝木
夏鉤心火

生人司命者
所當共寶也

故曰奇夫藏府之脈寸關尺有定位。左寸心小
右寸肺大

中一源而三派督行於背總督諸陽任行於腹總
任諸陰衝則後行於背前行於腹上行於頭下行
於足以至谿谷肌肉無處不到誠十二經內外上

下之要衝也。故靈樞順逆肥瘦篇曰：衝脈者，五藏六府之海也。五藏六府皆稟焉。二脉直行上下，發源最中，故見於脈。亦皆直上直下也。直上直下者，卽三部俱長透之義。若直上下而浮，則氣張揚，陽象也。故屬督。若直上下而牢，則體堅實，有餘之象也。故屬任。若直上下而牢，則體堅實，有餘之象也。故屬衝。陽蹻陰蹻者，皆起於足跟，人身之超越蹻捷者，亦莫過於足跟，故曰蹻。一則爲足太陽之別，循外

踝上行入風池合於太陽故名陽蹻一則爲足少陰之別循內踝上行至咽喉交貫衝脈故名陰蹻寸以候陽寸左右彈者言在寸左右皆有彈石搏乎之勢是陽蹻脈也尺以候陰尺左右彈者言在尺左右皆有彈石搏乎之勢是陰蹻脈也二經之起以踝之內外分陰陽者外踝屬太陽而內踝屬少陰也二經之脉以尺寸分陰陽者以陽蹻入風池合太陽至頭故以寸候之陰蹻合少陰而不至

維持得力全
在於會處一

頭。故以尺候之也。帶脈者圍身一周。不上不下。如束帶然。故彈搏之脉唯見於左右中關耳。陽維陰維者。維持一身。陽維維陽。起於諸陽之會。陰維維陰。起於諸陰之交。夫人身經脈繁密。二脈能於陰交陽會處。加一紮縛。舉綱齊目。而陰陽斯得維持之力矣。其見於脉。自尺至寸。皆刺斜而上。陰則自外入內。陽則自內出外。蓋其經亦皆自下而起。陽自外踝出。肩至腦。陰自內踝入。腹至喉。故也。此八

經之脈狀病則見不病則不見難經二十八難曰

人脈隆盛入於八脈而不環周故十二經亦不能

拘之不能拘之者謂十二經不能拘此八脈在環

周之內然而八脈之元元已寓於十二經中矣故

平和不病則不見也其脈曰浮曰牢曰緊曰左右

彈曰斜上雖皆各因其陰陽道路呈象而脈狀則

俱似有邪而實者本難云畜則砭射良有以哉其

病督脉脊強癲癇者蓋督脈起於少腹以下骨中

可補當用藥
每宜熟施
以緩射

央。女子入繫庭孔之端。絡陰器。繞篡。繞臂。至少陰。
與太陽少陰合。入股內。貫脊屬腎。與太陽起目內。
皆上額交顴。上入絡胸。還出別下頸。循肩脾內夾
脊。抵腰中。入循膂。絡腎。自目內背。上額。下循膂。絡腎。皆合太陽而並行者也。
其男子循莖下至篡。與女子等。其少腹直上者。貫
臍中央。上貫心。入喉。上頤。環唇。上繫兩目之下中
央。其脈之別。名曰長強。俠脊上項。散上頭。下當肩
胛。左右別走太陽。入貫臂。二十八難亦曰。督脉者。

起於下極之俞。並於脊裏上至風府。入屬於脣。由是觀之。則督脈與太陽合行者十九。故邪客則脊強。以其貫脊也。督與太陽皆主表。而督爲諸陽之總。太陽爲諸陽之長。又曰巨陽。風邪從頸傷陽。表必先受。故畱則爲癲癇疾也。癲癇時發時止。或筋脉牽引。或項背反張。雖云風傷督脈。亦太陽主筋故耳。宜差活脈溼湯生氣任脈爲病。七疝瘕堅者。蓋任脈總諸陰之會。其脈起於胞中。循腹裏。爲經。

絡之海。其浮而外者。循腹裏上行於咽喉。別而綿

唇口。難經亦云。起於中極之下。以上毛際。循腹裏。

上關元。至咽喉。七病者。在巢氏則曰厥病。癥病。寒

病。氣病。盤病。附病。狼病。張子和非之。另立七名。曰

寒病。水病。筋病。血病。氣病。狐病。癩病。而諸經所載。

如素問四時刺逆從論所云。狐病風。肺風病。脾風

病。心風病。腎風病。肝風病。骨空論所云。衝病。厥犯

篇所云。癥病。王惟真藏論所云。瘕病。少腹冤熱而

諸病之有風
名者。皆不離
厥陰耳

婦人衛任有
病之體氣
不善者多委
衷於精血

痛。山白。一名曰癰。靈樞邪氣藏府病形篇所云。小腸病者。小腹痛。脣脊挾暎而痛。時瘡之後。此亦病類也。名雖多種。總不能出於七病之外。蓋七病之發必在前陰少腹之間。任脈所經之地。雖屬他經。未有不以任爲原者。癰者。假也。氣聚則堅。氣散則平。亦似疝之時作時止。發則亦在任脈界分。多屬血凝經滯。女子之病也。宜東垣丁香棟實丸三
四散聚。身化氣湯之類。衝脈爲病。逆氣裏急者。衝之與任。皆起胞中。上循背

裏爲經絡之海。亦名血海。其浮而外者。亦循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。強半與任脈同。素問骨空論曰。衝脈者。起於氣衝。並足少陰之經。俠脅上行。至胸中而散。二十八難則曰。起於氣衝。並足陽明之經。俠脅上行。至胸中而散。痿論亦曰。衝脈者。經脉之海。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。二論所並。雖有少陰陽明之不同。要知自脅至胸。與陽明則。並於前。與少陰則。並於後也。故與陽明皆得稱。

爲五藏六府之海其氣不順血不和則胸腹之氣

循經壅逆而裏急矣

宜華子降氣湯黑丹震靈丹之類

帶脈爲病

帶下脾病精失者以帶脈起於季脇廻身如帶藏府十二經絡皆過於此若飲食不節勞慾縱傷致

令濕熱下流邪火內鬱外或風入胞宮邪凝膀胱

帶脉不任與邪俱陷或赤或白如涕如膿或青黃

雜色或濁黑異形溢漏不時淋瀝不淨其兼證則

腰腹痠疼足膝痠軟頭目暈眩經脈參差甚或寒

帶下人所易忽
然此疾不
殊亦難治乎

帶下督子非
鄉也

熱往來客顏枯瘁然而發源於衝任脾胃者多。以衝爲血海任總諸陰脾胃司水穀故耳是以骨空論曰任脈爲病女子帶下瘕聚又寒論曰衝脈與陽明合於宗筋之會而陽明爲之長皆屬於帶脈帶脈起於季脇章門前則當脾上故又或爲脾痛靈樞經別篇曰腎足少陰當十四椎出屬帶脈蓋腎主藏精帶固腰膝虛則一不能藏一不能固而精有自失者矣宜金匱桂枝龍骨牡蠣湯和劑麻子丸之類陽維爲病

湯和劑麻子丸之類

金匱桂枝龍骨牡蠣

寒熱目眩僵仆者以陽維維絡一身之陽陽主衛

主氣主表病則不能維陽是陽無護持而衛氣亦

因之不固故在表則生寒熱其脈氣所發別於金

門在足太陽經下以陽爻爲鄰足少陽經外踝上與手足太陽及

蹻脈會於睛俞手太陽經後與手足少陽會於天樞手少陽經

金陽鍼上又會於肩井足少陽經上其在頭也與足少陽會

於陽白足少陽經上上於本神及臨泣俱在足少陽經上至

正營足少陽經上及脣旁足少陽經下至風池足少陽經頸項後耳

督脈會於風府。

督脈後髮

門

督脈風府後府

觀此則知本

督脈乃足少陽之經也。人身陰陽無離亦猶是也。

脈之維於頭目手足。頭項肩背諸陽無一不到。其

脈不榮則不能維。在頭目無維則眩。在頭項肩背

宜東垣柴胡升陽湯

無維則僵。在手足無維則仆矣。

東垣退熱湯之

類陰維爲病。心痛。胸腹刺築者。以陰維維絡一身之陰。陰主榮。主裏。不能維陰。則陰無約束。而榮氣

困之不和。故在裏則心痛。又榮主血。血合心。故心

痛也。其脈氣所發。陰維之鄰。名曰築賓。

足少陽內踝上一寸與

足太陰會於腹哀

足太陰乳下

大黃是太陰

又與足太

陰會於府舍

足太陰少腹

期門足天

陰乳下

與任脈會於天

穴

任脈腋下

廉泉任脉

本下唇舌

觀此則知本脈之維於胸腹

諸全亦無一不到其脈不榮則不能維在胸腹失

所繩則動築而刺痛矣

宜本事相實散奇妙基痛丸四七湯之類陽曬

爲病陰緩陽急陰蹻爲病陽緩陰急及癲癇痰癥

寒熱恍惚者蓋二蹻之脈同發一源難經二十八難曰陽蹻脉起於跟中陰蹻脉亦起於跟中不唯

同起於跟。而又同終於目靈樞脈度篇曰。督脈者少陰之別。起於然骨之下。上內踝之上。直上循陰股。入陰。上循胸裏。入缺盆。上出入迎之前。入頸屬目內。皆合於太陽。陽蹻而上行。氣并相還。則爲濡目。謂潤目又曰。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。不當數者爲絡。觀此。則知二蹻之脉。雖以男女分陰陽。而實則迭爲經絡。是一本也。故其爲病。亦不似前六脉。逐經分屬。本文以癩癰瘍瘍。寒熱。

目錄

卷之三

足之舉止，
捷蹠脉爲之。

惟此經有

二病文送爲

經脉亦大奇

矣

先以陰陽總
揭于前而後
條于上之詳
章之妙

恍惚。總系二經之下。以二經均可病此。證雖云。四
而病機可分爲八。陰陽緩急之義。自是顯然。夫人
之身。背爲陽。腹爲陰。開爲陽。闔爲陰。外爲陽。內爲
陰。熱爲陽。寒爲陰。癲則目閉。俛首。陰懸而陽緩也。
癇則目直僵仆。陽懸而陰緩也。大惑論所謂衛氣
不得入於陰。常留於陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。
則陽蹠盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。衛氣
留於陰。不得行於陽。留於陰。則陰氣盛。陰氣盛。則

陰騎滿不得入於陽。則陽氣虛。故目閉。脈度篇亦云。騎之陰脈榮其藏。陽脈榮其府。又云。內溉五藏。外濡腠理。又陰出陽。則交於足太陽。陽入陰。則交於足少陰。雖一爲太陽之別。一爲少陰之別。而實則隨衛氣相終始者。故衛氣之行留。即可徵二騎之虛盛。疾者。摶也。筋脉摶向裏拘。陰懸而陽緩也。癥者。縱也。筋脉縱從外弛。陽急而陰緩也。寒則氣收歛。從裏從陰。陰急而陽緩也。熱則氣散漫。從表

從陽陽急而陰緩也。恍者，目前恍然，若有所見。謬

刺論曰。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛，從內背始。

且合太陽上行而并濡於目，病屬目而從外，陽蹻之病，陽急而陰緩也。惚者，胸中慄惚，若有所失。脉

度篇曰。蹻脉者，少陰之別，起於然骨之後，循陰股入陰，正循胸裏，入缺盆。二十八難曰。陰蹻脉者，亦起於跟中，循內踝上行，至咽喉，交貫衝脉，病屬胸脇而從內，陰蹻之病，陰急而陽緩也。二脉一為經，一為奇，皆屬陽，故名蹻。

一爲絡病在經。則經急絡緩。病在絡。則經緩絡急。
總之皆可言經。皆可言絡。但以男女分陰陽之所屬。緩急輕重病邪之所在。而正文以諸證爲二經。共義良深矣。宜用風湯。交加散。海藏愈風湯。加陳逍遙散。十全大補湯之類。

附方

羌活勝濕湯

見第六十五

生鐵落飲 治肝木有餘或大怒諸火上炎上盛下虛發爲癲狂神氣不寧渴煩譫妄

生鐵四十斤，入火燒赤沸，砧上鍛之。有花出如蘭如蛾，紛紛墜地者，是鐵落。用水二斗，煮取一斗，入後藥。

石膏

三兩

龍齒

研

白茯苓

防風

去蘆各一兩半

玄參

藜蘆

各一兩

右爲粗散，入鐵汁中，煮取五升，去滓。入竹瀝一升，和勻，溫服二合。無時，日五服。

瀉青丸

見第四十九

東垣丁香棟實丸

見第六十四

三因散聚湯 治九氣積聚。狀如癥瘕。隨氣上下。發作心腹絞痛。攻刺腰脇。小腹臍脹。大小便不利。

半夏

湯洗
七次

檳榔

當歸

各七錢
五分

陳皮

去白
七次

杏仁

去皮尖
炒熟

桂心

各二
兩

茯苓

炙甘草
七次

炙甘草

去皮尖
炒熟

附子

炮去
皮尖

川芎

枳殼
七次

枳殼

去穰
七次

厚朴

薑
七次

吳茱萸

湯浸各
一兩

每服四錢。水一盞。薑三片。煎七分。食前溫服。大便不利。加大黃。

三因化氣湯 治息積。

砂仁

桂心

木香

各二錢
五分

甘艸

茴香

炒

丁香皮

青皮

陳皮

乾薑

蓬木

炮各半兩

胡椒

沉香

各一錢

右爲細末。每服二錢。薑蘇鹽湯調下。婦人醋湯
下。

蘇子降氣湯

見第七十

黑錫丹

見第七十

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹

治男子真元衰

憊。五勞七傷。腑腹冷疼。肢體酸痛。上盛下虛。頭
目眩晕。心神恍惚。血氣衰微。及中風癱瘓。手足
不遂。筋骨拘攣。腰膝沉重。容枯肌瘦。目暗耳聾。

口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精滑夢遺。膀胱
疝等。小腹淋瀝。夜多盜汗。久渴久病。嘔吐不食。
八風五痹。一切沉寒痼冷。服之如神。及治婦人
血氣不足。崩漏虛損。帶下。久冷胎藏無子。

禹餘糧

火煅醋淬不計過手撲得碎爲度

紫石英

赤石脂

丁頭代赭石

如禹餘糧炮製各四兩

巴上凹味。並作小塊。入瓦鍋內。鹽泥固濟候乾。
用炭十斤。煅通紅。火盡爲度。入地埋。出火毒二

宿。

滴乳香

另研

五靈脂

去砂石篩

沒藥

去砂石研

朱砂

水飛過一兩

右八味並爲細末。以糯米粉煮糊爲丸。如雞豆大。晒乾出光。每一丸。空心溫酒。或冷水任下。常服鎮心神。駐顏色。溫脾胃。理腰膝。除尸疰蟲癧。辟鬼魅邪厲。久服輕身。漸入仙道。忌猪羊血。恐減藥力。婦人醋湯下。孕婦不可服。

金匱桂枝龍骨牡蠣湯 金匱要畧云。夫失精家

少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脈極虛。芤遲。清穀

亡血。失精。脈得諸芤動微緊。男子失精。女子夢

交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白薇附子各三分名

二加龍骨湯

桂枝

芍藥

生薑各三兩

甘艸

二兩

大棗十二枚

龍骨

牡蠣

各兩

右七味以水七升煮取三升分温三服

和劑威喜丸 治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝

常流小便渴夢寐頻泄及婦人血海久冷白帶

白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟

四兩

白茯苓

去皮四兩作塊用猪苓

二錢半同於磁器內煮

二十餘沸出之
竟不用猪苓

右以茯苓爲末熔黃蠟搜爲丸如彈子大空心
細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清爲度忌米

晴尤忌使性氣只吃糟醃

東垣柴胡升陽湯 治陽虛下陷發熱

柴胡

升麻

葛根

獨活

羌活

防風

甘草

生二錢
炙二錢

人參

白芍藥

各半兩

右㕮咀每服半兩水三大盞煎一盞去滓稍熱
服忌冷物冰水月餘

東垣退熱湯 治表中虛熱或遇夜則甚

黃者

一錢

生甘草

黃連

酒製

黃芩

地骨皮

生地黃

荅木各五分

當歸身

升麻各三分

右咬咀作一服水二盞煎一盞去滓食遠溫服
本事枳實散治男子兩脇疼痛

枳實

一兩

白芍藥炒

雀腦芎

人參

兩各半

右細末。薑棗湯調二錢。酒亦得食前日三服。

奇効拈痛丸 治九種心病

五靈脂 蓬莪术 煙

木香

當歸各等分

右爲末。煉蜜和丸如桐子大。每服二十丸。食前用橘皮煎湯下。

四七湯 見第十七

胃風湯

白芷

一錢
二分

升麻

二錢

葛根

蒼术

蔓荆子

當歸身

各一錢

珪艸

柴胡

藁本

羌活

黃檗

草豆蔻

麻黃

不去節
各五分

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。溫服。

交加散。治癲癇。或顛振。或產後不省人事。口吐

痰涎。

當歸

荆芥

右爲細末。每服二錢。水一盞。酒少許。煎七分。連

下神効。

海藏愈風丹

一名舉卿
古拜散

治一切失血。筋脈翳弱。

產後及汗後搐搦。

荆芥

爲細末

先以炒大豆黃卷。以酒沃之。去黃卷。取清汁。調前末三五錢。和滓服之。輕者一服。重者二服。三

服卽止氣虛者忌服童便調亦得。

加味逍遙散

見第五十一

十全大補湯

見第十六

反關脉第八十

平人無脈移於外絡。兄位弟乘。陽谿列缺。

此種脉須詳
察勿認爲脉
脫而無跡也

平人無脈者非無脉也謂寸口脉不應指而反從尺傍過肺之列缺。大腸之陽谿刺斜出於外絡其三部定位九候淺深俱與平常應見於寸口者無

異。若兄固有之位，弟竊而乘之，此反常異衆之脉。
千百中僅一見也。

真藏脈第八十一

病脈既明，吉凶當別。經脈之外，又有真脈。肝絕之脈，循刀責責；心絕之脈，轉豆躁疾；脾則雀啄，如屋之漏；如水之流；如盃之覆；肺絕如毛，無根肅索；麻子動搖，浮波之合；腎脈將絕，至如省客來如彈石；去如解索，命脈將絕，蟻遊魚翔；至如湧泉，絕在膀胱。真脈既形，

胃氣已無。參察色證。斷之以臆。此非正文論終。

已上正文之論脈。首先源派。次及流行。次則左右。男女定位。次則五藏陰陽合時。寒熱。則屬之遲數。內外。則別之浮沉。以至虛實異形。正邪各狀。因脉知病。因病識脉。病則該於瘡癆。女幼。脉則窮於奇經。反關。可謂明且詳矣。然而諸脈之外。更有所謂真脈者。大關生死。故又審別於卷末焉。夫人稟五行而生。則五行原吾身之固有。外與天地通。內與

穀神合。是得以默運潛行而不顯然彰露。設五藏

之元真敗絕。穀神不將。則五行之死形。各墮藏而

見矣。在肝如循刀責責。強勁弦急按之切手所謂軟弱輕虛

而滑。端直以長者無有也。在心如轉豆躁疾。前曲後居

柔滑全無所謂累累如連珠。如循琅玕者無有也。在脾

如雀啄粒。堅銳如屋之漏。許久一滴二脉乍疎乍數。如水之流。

去而不返。如杯之覆。止而所謂和柔相離。如雞踐地者。

無有也。在肺如毛。無根蕭索。上則微蒸下則斷絕麻子動搖。

以平脉形而
脉使人反接
自明非善於
詮解者不能

徵散

浮波之合。

浮促無根

所謂厭厭疎疎。如落榆莢者。

無有也。在腎至如省客。

省問之客一至卽去

來如彈石。

彈博而來

所藏去如解索

解散而去

所謂喘喘累累如鈎。按

之而堅者。無有也。在命門右腎。與左腎同。但內涵

相火。故其絕也。如蟻之游。如魚之翔。忽爾靜中一

躍。火欲絕而忽烟之象也。在膀胱。至如湧泉。

泛濫不收

以其藏津液而爲州都之官。故絕形如此。蓋脈之和柔得體者。胃氣與之俱耳。胃氣者。卽生生水穀

之氣也。胃氣微少亦成病。何況於無。無則生生之根本先絕。而五藏欲自持久。不可得矣。若能再察色證而以臆斷之。理當不爽。

醫燈續焰卷十七 終