

醫

碥

醫碥卷之五

南海何夢瑞報之輯

四診

一望色



庭卽天以候首面 腺卽眉以

候肺 腺上以候咽喉 下極

恨卽山以候心 年壽卽鼻以

肝其左右以候胆 面王卽華以

以候脾 方上卽鼻以候胃

人中以候膀胱子宮 面中央

顙骨之下以候大腸 大腸之旁頰之上也以候腎 而王以上兩頰  
迎香之外以候小腸右本內經後人又以天庭候心左頰候肝右頰  
候肺鼻候脾頰候腎參而察之可也

面有青黃赤白黑以應五藏岐伯曰生于心如以縞裏朱  
生干肺如以縞裏紅紅謂淡紅生于肝如以縞裏紺青舍赤色生于肝如  
以縞裏括黃實黃舍赤色生于腎如以縞裏紫黑舍赤色按五色但  
色爲精神所發見欲藏不欲露故如縞裏若  
露則爲藏氣失守精氣外浮中藏告竭矣 此爲無病之色若  
病而色見則以相生者吉相尅者凶如肺病泄濁而見赤色爲  
見黃色爲相生兒滋潤而明亮者吉枯槁而晦滯者凶如肝病泄濁而見赤色爲  
赤色爲相尅也所謂亦欲如白裏朱不欲如赭之意 面不潤青之水無光青之火  
面不潤青之水無光青之火

少鍼向也知爲上行向而知爲下行不交內走外走等微此

行如雲散者病滅也

色見右爲逆左爲從男子反此

色散未聚病亦未聚

月色明顯者爲

新病濁晦者爲久病

色從面內走面外病亦自內走外左右上下以此

推之

青色屬肝主風主驚主寒主痛

面最青者寒極也

青而脫

色

脫色謂無血色神采形也

驚恐也

青而黑者多寒痛

青而白者多

虛風

已上皆舉證蓋肝陽不足陰寒內侵脾失其運行之權故多腹市冷痛吐泄之疾

青而赤者爲

肝火

青赤而晦滯者爲鬱火已上熱証

赤色屬心主熱

心熱者齒庭先赤

脾熱者鼻先赤

右頰先赤

腎熱者頤頰先赤

肝熱者左頰先赤

面色綠

緣正赤者陽氣怫鬱在表汗不徹故也

此傷寒太陽經表熱証

面赤而

潮熱證語者胃實也

此傷寒陽明府實熱証

面赤如微酣或兩颧淺紅

嬌嫩游移不定

不盡面通紅

乃陰証戴陽必下利清穀或小便清白

或淡脈沉細或浮數無力按之欲散雖或煩躁發熱欲坐臥泥黃

水中外熱甚也渴欲飲水或咽喉痛証似實熱而索水置前却不能

飲肌表雖大熱而重按之則不熱或反覺冷且兩足必冷須審

此傷寒直中寒証

又右面赤煩躁偏舌生瘡生刺舌欬縮如荔枝狀或

痰涎湧盛喘急小便頻數口乾引飲兩唇焦裂喉間如烟火上

攻兩足心如焰脈洪數無倫按之有力捫其身烙手此腎虛火不歸元所致証最難辨但病由內傷其來以漸是乃乾柴烈火

不戢自焚與上所列三証固有不同也 又有久病虛火兩熱  
至五後帶赤者此則陰虛火動之常証雖未至如上証之烈赤  
內傷也已上二証

必死

又熱病無汗頭赤死益顫以骨爲主骨屬腎水惡反寇也

赤色出于兩顫狀若大如拇指者病雖愈

裝朱

黃色屬脾主濕熱食積

黃而明如橘子者濕小熱多也 黃

如烟薰暗濁不明濕多熱少也

濕土瘀濁

黃而黯淡者則爲寒濕

黃而枯瘦者胃中有火 黃而色淡胃氣虛

黃而青黑者

爲木冠土

肝陽不升脾爲寒水無制則水停

白色屬肺主氣血虛寒縱有虛火斷無實熱

白而無神者爲

汗泄脫血 白而青者氣寒血凝

白而淖澤肺胃之充也

白而肥有痰 白而瘦爪用鮮赤氣虛有火也

黑色屬腎主寒主痛 青黑爲陰寒 焦黑齒槁爲腎熱 黑而枯夭見于耳目口鼻不論何處俱不吉若見于天庭大如拇指必不病而卒死

陰晦之色加于高位故死

面慄不光者陰寒也 面光不慄者陽熱也 面如錦紋者陽毒也 面垢如油喘促者暑病也

凡黑感客邪之色不妨脅濁壅滯病久氣虛祇宜瘦削清瞿若病邪方銳而青白少神氣羸久困而嫋嫋鮮澤減非正色五色之中青黑黯淡無輪囷者新久總屬陽氣不振惟黃色見于面目而明潤者尚愈之候也 此經所以謂面黃目青或赤或白

或黑皆不死以無黃色也 面青目赤或黑面赤目白或青面黑目白皆本華逆則此所謂不死者俱不死耳非順也

以無黃色也 按而目色同爲順色異爲逆說

### ○察目

凡目明能識見者可治昏不識人或反目上視或瞪目直視或目睛正顧或蛾眼反折或眼胞陷下者皆不治也 凡閉目而欲向明欲見人多言好動者陽証也陽盛欲以動而散其熱也 惡其助又自病熱而惡日與火者 熟也 目閉惡明不欲見人懶言惡動者陰証也陰盛則陽衰故惡動散又 有陽虛而喜望日地者寒其助止也 目痛爲陽明表証目赤爲經絡熱盛

目黃頭汗欲發黃

白睛黃微發黃

目晴不了了

不不了了猶不眠瞭火

黃而膜 腫也

爲胃府實

睛不和黑白不分明也似即俗所謂半瞞眼

爲內熱甚

目

眩爲痰火 眼胞微腫爲有水 目下灰色爲寒飲 眼胞上下如烟煤者寒痰 眼黑頰赤爲熱痰 眼黑而行走艱難呻吟者痰飲入骨也 眼黑而赤土色四肢瘦瘓屈伸不便者風痰也

目眴黃者爲病欲愈

目痛赤脈從上而下者太陽病

足太陽經爲目之上綱

從下而上者陽明

病

足陽明經爲目之下綱

從外背走內者爲少陽病

足少陽經行

目眴黃之後

見一脈

癆瘻發寒熱赤脈上下至瞳子見一脈一歲死

邪氣而尊也

見一脈

半一歲半死見二脈二歲死二脈半二歲半死三脈三歲死

邪散也

察耳

耳輪紅潤者生乾枯鹿垢而青黑者爲腎敗死

耳中策策痛而耳輪黃者病名黃耳類傷寒也

風入于腎卒然發熱惡寒脊強

背直如  
瘡狀

○察鼻

鼻頭色青腹痛若冷者死

中寒  
暴証

微黑而澤者水氣 黑而枯

燥者房勞

黑黃而亮者瘀血

黃色者小便難

濕熱不泄  
故瘀而黃

鮮明者有留飲

津液不行濕生熱  
故色黃而明潤

赤爲肺熱

故肺而黃

暝晦水不嚥者欲衄也

鼻孔黑如烟煤而燥者陽毒也

黃

黑枯槁爲脾火津涸大便燥結 鼻塞涕濁者風熱也 白爲

氣虛爲亡血。鼻孔冷滑而黑者陰毒也。鼻孔煽張者肺絕不治。鼻上汗出如珠爲心脾痛極。男子色見于準頭爲小腹痛爲胆痛其圓直其色直垂而繞于面正之丁爲牽痛狐疝廣陰之屬也。女子爲膀胱子處之病散爲痛色散但爲氣痛無積聚搏結滯爲聚血凝方圓左右以積之形爲言各如其色形。

察唇齒

唇焦乾燥裂爲脾熱經謂脾胃之華在唇四白者唇之四白者唇之四白肉也唇赤腫爲胃溫熱。鮮紅爲火盛。淡白爲氣虛。淡而四邊起白暈爲亡血。青黑爲寒。唇黑舌卷或環口紫黑唇口動顫不止者皆死証也。唇下有瘡名狐上有瘡名惑。

齒槁者腎熱 前板齒燥者中暑

○察舌

舌青或青紫而冷滑者爲寒証 青紫而焦燥或脹大或卷縮者爲熱証 寒甚亦卷縮筋脈得寒而收引也然必不焦燥

凡舌强硬短縮而神氣昏亂語言不清者死亦有換証而舌本  
硬及縮者不在此論

論 熱病舌本爛熱不上者死 陰陽易病舌出數寸者死

傷寒熱止在表者舌無胎熱邪傳裏則胎漸生由白而黃而黑由潤而燥而折裂由滑而澀而芒刺皆以熱之淺深微甚爲層次胎因內熱致脾氣閉塞不行飲食津液停積于內故胎見于外若脾氣不帶則飲食運化津液流通雖熱甚不必有胎也此理宜知

暑具如左純白舌 傷寒白滑胎舌爲熱初入而猶帶表

証表劑中加清涼之品 又有胃中虛冷寒飲結聚膈上成白滑胎者又脾閉甚則白如積雪 又有臟結証詳傷寒而胎白滑者雖辨 温熱病一發便壯熱煩渴舌正赤而有白胎者雖滑卽當用白虎治其內熱而表自解切不可用表藥 時癰初起胎白如積粉

白雜色舌 傷寒熱入胃則白脂中黃白多黃少而滑尙帶表証仍宜於解表藥中加清涼之品黃多白少乾澀無表証者或清或下有夾食瘀血而滑須下者參下黃雜色舌條若燥裂生芒刺則必下無疑溫熱時疫則雖潤滑亦宜涼膈白虎承氣之屬以清熱攻裏萬不可發表也

純黃舌 潤滑者須審若熱尚未結聚不可便攻若在夏月便宜攻下不必待胎燥乃攻也

黃雜色苦 根黃硬尖白中不甚乾亦不滑短縮不能伸出譙妄煩亂者此挾痰食大承氣加生薑半夏治之 舌色青紫而船却黃厚甚則絞裂但覺口燥舌仍不乾者此陰証夾食也脈或沉細而伏或虛大而濶按其心下或脇旁硬痛而時失氣者急宜大承氣另前生附子佐大黃下之脈虛大者黃龍湯下之熱極煩躁者更加生地麥冬夏月尤宜此証若胎黃不燥在冬月宜附子理中湯合小承氣下之大抵舌有積胎雖見陰象亦是虛中有實急當攻下但與常法不同耳又中宮有痰飲水血

者舌多不燥不可因其不燥而延緩至誤也

中暑証夾血多有  
心黑濁者勿誤

作陰証

純黑舌 遍舌黑胎夏月或可救以灸合邪火內外燔灼黑胎易生也猶可攻治冬月得此舌必死

黑雜色舌 中黑邊黃氣下之邊白大柴胡下之 若生苔刺裂瓣不論邊係何色但看瓣底色紅活者急下之如俱黑者不治 若腐爛卷縮亦不治發疮生蟲雖爲濕亦屬肝傷俱爲危候 外抵尖黑尚輕根黑則重 夏月由暑多黑舌邊紅中黑乾者宜用燒湯 已上皆邪熱實熱然亦有虛熱者舌心雖黑或灰黑而無積胎舌形枯瘦而不甚赤其証煩渴耳聾聾熱

不正大便五六日或十餘日不行腹不硬滿按之不痛神不昏  
不得睡稍睡或呃嗰一二句或帶笑或歎息此爲津枯血燥之  
虛熱宜大料六味丸合生脈散炙甘草湯誤與承氣必死若  
直中寒証始病不發熱舌心便黑色非油白<sub>苗變化</sub>雖黑而滑舌亦瘦  
小當急溫之

赤色舌 溫熱時疫熱毒內盛潤滑者未可便下黃連解毒白  
虎等湯乾而有黃白黑等胎及芒刺紋裂坑爛起疮者皆下証  
也一種柔嫩如新生望之似潤而燥涸殆甚者爲亥行汗下津  
液竭所致多不治宜生脈散等 又紅痿舌疹軟不<sub>能動</sub>不及紅細枯  
長舌並難治

紫色舌者乘酒毒所致其色必深紫而赤且乾涸若淡紫而帶青滑則又爲直中寒証矣須辨

灰色

有熱傷色  
焦黃爲暗色  
夾食熱証也

藍色

本剋土  
敗之色

及妊娠各舌

面赤舌

青子死

母活俱青則俱死  
宜潤澤忌枯敗

並當詳審

總之舌胎不論何色但乾燥者必屬熱惟潤滑者須審

○察身

身輕自能轉側者可治沉重不能轉側者難治足冷惡寒  
踰臥向壁爲陰証小陽病者不能俯陰病者不能仰身目齒  
爪俱黃者疽病也脾病者色黃而肉蠕動肺病者色白而  
毛敗頭重視身此天柱骨倒也死搖頭以手捫腮者齒痛

也 坐而伏者短氣也 身汗如油形體不仁乍靜乍亂喘而不

休者死 肉形脫者脈雖調亦死 皮膚潤澤者生枯燥者死

皮膚著者死

皮膚枯榮  
着骨也

○察手足

手足冷名厥在傷寒則有寒有熱初病卽手足冷者直中寒証也爪甲青冷或過肘膝且常冷若先發熱以漸入內而手足乃冷者傳經熱証也爪甲紅乍冷乍溫不過肘膝此仲景之說也在雜証則手足冷者名寒厥手足熱者名熱厥此內經之說也詳厥逆順 但足冷手不冷身發熱者爲外感夾陰宜五積散不可汗下及小柴胡以有黃芩苦寒也 又夏暑病濕溫人必

足冷手溫多汗妄語宜葛木白虎合五苓不可用五積助熱  
有兩手逆冷而兩足熱如火烙者此陰氣衰于下則陽下乘陽  
氣衰于上則陰上于陰陽否隔之兆也若初起而脚膝更弱或  
足脛赤熱腫痛當從腳氣治之手足冷至節而心痛甚者名  
真心痛且發夕死即宿衣摸床撮空理線揚手擲足此神去而  
魂亂也死即坐而下十脚者腰痛也坐久腰痛故下  
十脚以伸之行邇者  
表強也風邪東其筋絡  
故步履不隨肝熱者色蒼而灰枯 搀搦者肝邪  
也搐抽搐手足頻頻伸縮也搦十指類類閉合拳緊握也經日  
爲推撓牽絆者虛而有風也肝筋弛緩筋收引 脈急者尺之皮膚亦  
急急緊脉緩者尺之皮膚亦緩緩緩脉小者尺之皮膚亦

減而小氣 脈大者尺之皮膚亦薄血脈急大而薄起也而起 脈滑者

尺之皮膚亦滑 脈濤者尺之皮膚亦濤 尺膚滑而澤脂者

風也

熱風其氣見故滑澤

尺膚濤者風渾也

血少則內熱

尺膚

粗如枯魚之鱗者水洗而軟也

肺土衰而腹內消水反乘之也

尺膚熱甚脈

痺者虛病也 尺膚寒甚脈小者泄少氣

掌中熱者胸中

乾燥者胸中寒

掌中為三陰脈所聚其氣皆在胸中

臂多青脈曰脫血

張景岳云血脫

則氣亦寒凝故色見青黑言臂則他可知卽診尺之義愚接此  
我乃自誤矣方見青脈也然有先見青脈而後脫血者則氣虛  
寒凝不能

機亂耳

一問聲

肝聲呼怒則呼或驚而呼也

心聲言

洪範言屬火

笑

狂笑爲實熱

脾胃

聲歌輕頭如歌又爲歌乾唱

肺聲哭又爲歎 腎聲呻又爲欠

爲噫

陽未前而陰引之故也  
陽欲達而陰發之故也

聲清明如平日者吉 聲濁鼻

塞者傷風也

聲如壅中出者

混濁不必然也

攢眉呻吟

者痛也

躁嘔者風痰伏火或怒喊哀號所致也

聲嘔如破

而欬者客寒裏熱也

傷寒壞病聲啞而唇口有瘡者狐惑也

聲啞形羸者勞瘵肺有瘡也

驟然聲啞咽痛如刺而不腫不

赤不發熱二便清利陰寒也

驟然音瘡而喉頸赤腫脹閉或

發熱便秘龍火也

與息鼾睡者風溫也 診時吐氣者鬱結

也 噌氣以手撫心者中脘痛也 少氣

不足以息者氣虛也

平人無寒熱而短氣不足以息者痰火

也 言而微終日乃復言者正氣尊也 語言塞澁者風痰也  
言蹶及多言者火也 言語善惡不避親疎衣被不欵者神  
明亂也 講語者邪氣實也 鄭聲者正氣虛也

一問証

一問寒熱 凡平素無病而突然惡寒發熱多屬外感必有頭  
痛體痛拘急無汗或有汗等表証浮緊浮大等表脈可據若無  
表証表脈病由漸致者屬內傷 外感則寒熱齊作而無間內  
傷則寒熱間作而不齊 外感惡寒雖近烈火不除必表解

內傷惡寒得就溫煖卽解 外感惡風乃不禁當也——切風寒

內傷惡風惟惡夫些小賊風又外感証顯在鼻故鼻也氣促而  
鳴壅盛有力不若內傷之息短而

氣之內傷証顯在口故口巾不和飲食無味不若外感初則知  
寒傳裏則不能食也又外感熱傳裏渴其飲甚多不若內傷液  
虧之渴畧飲即止又外感則邪氣有餘故發言壯厲先輕而後  
重內傷元氣不足故出言顫怯先重而後輕又外感頭痛常常  
而痛內傷頭痛常  
時作時止也

外感手背熱手心不熱亦腹熱內傷手心熱

手背不熱亦腹熱

千背

背微惡寒者陽微不能勝陰也

陽明中

渴亦有此宜白虎加人參湯

勞役內傷亦有此必乍寒乍止爲陽虛

內熱升陽散火湯

濕痰証亦有此必身重體痛導痰湯

凡脾胃素

虛之人暑月飲食生冷冰水寒氣畜聚陰上乘陽多見皆寒冷

如掌大宜溫惡寒踰臥不發熱者陰証也

壯熱而渴不惡寒反惡熱者溫熱証也

來往寒熱有定期者瘧也無定期者傷

寒少陽經証及內傷虛証也潮熱在日晡所者傷寒陽明証

也。在子午者內傷証也。

一問頭身。傷寒大陽經頭痛自腦後上至顱頂項強腰脊。

陽明頭痛在額前迎目珠鼻孔乾不眠。少陽明痛在兩角

及耳聾脇痛。厥陰頭痛在顱頭吸引頭角脈沉弦手足厥冷。

此爲在經。

當歸四

者在裏則乾嘔吐涎沫。

吳茱萸湯

太陰少陰脈

不上頭無頭痛証然太陰中濕亦頭痛鼻塞吐痰腹滿自利。

是溫潤之氣上于清陽之分使然耳

少陰中寒亦有頭痛連腦齒爪甲青此真頭

痛不治。

亦寒邪上攻使然

溫熱病時疫病凡一切內火上炎之証皆

頭痛。內傷火升新產血虛皆有頭痛但時痛時止而無腦後

痛者蓋火炎則痛在兩角血虛則痛連魚尾以其自內達外也。

山少陽是以痛見兩角者別有少陽風熱與虛火之別若痛在額前者亦有陽明與食積之殊其見腦後者必太陽無疑也頭痛如破者風火相煽也眩運者痰火上升也頭傾視深陷精神奪矣耳聾耳痛胸脇痛寒熱口苦者少陽經証耳聾舌卷唇青爲直中厥陰耳鳴及痛火上沖也耳聾又手冒心者汗多而陽虛也耳聾者耳內無聲竅常閉而不聞也耳鳴者耳內有聲竅不閉時間時不聞也火動而上冲則鳴而不聞外聲火靜氣下則不鳴而聞面熱者足陽明病邪在肺則皮膚痛喘軟動肩背邪在肝則脰痛惡血在內抽掣舌卷則縮爲肝絕邪在脾胃則肉痛善飢熟而聞者腎之府也轉

傷寒太陽身痛但拘急耳若陰毒身痛則體勢沉重如被杖  
中濕身痛不可轉側骨節掣拗屈伸不利身重或腫汗出惡風不欲去衣

中暑亦身痛

汗後身仍疼邪未盡也然血虛者身亦疼

頭痛身熱自汗

與傷寒同而默默但欲眼鼻鼾語言難出四肢不收者風溫也

不可發汗 霍亂亦頭痛身痛惡寒發熱如傷寒而有吐利爲

異 身熱惡寒頭項強急如傷寒而頭熱目脈赤面赤獨頭搖

口禁齒齶背反張者瘇也無汗爲剛瘇有汗爲柔瘇

頭疼發

熱與傷寒同而身不痛者傷食也必中脘痞悶噫氣作酸或惡

聞食臭或欲吐不吐 煩熱似傷寒而脈不浮緊頭身不疼不  
惡寒或煩時頭亦痛煩止而痛止者虛煩也 身熱惡風自汗

似傷寒但頭不痛項不強或亦頭痛而乍止無常者痰也或胸  
滿氣上衝或目下如灰烟黑者是其候也發熱惡寒頭痛肢  
節痛嘔惡似傷寒而病自脚脚膝痛或腫滿或枯絀者脚氣也  
身熱惡寒若有痛處者癰疽也發熱如傷寒小便自利日  
不渴按其心下或脇下或脐腹間有痛處或至手不可近者畜  
血也凡勞逸七情房勞皆能瘀血不止一途弊損病劇忍身  
痛甚者此陰虛之極不能滋養筋骨也難治胸腹間脹悶而  
痛邪在中上二焦不可補若氣虛不運但痞滿者不可攻勿因  
其口不開妄行導引虛症須補而脹滿不受補者難治卒然仆倒昏不知人痰涎壅盛口眼喎斜手足癱瘓或半身不

遂者中風也若見口閉耳撒眼合遺尿瘀聲如鉗不治  
而身體強直口噤不語或四肢戰掉發熱無汗者中寒也  
卒然悶倒昏不知人汗出面垢手足微冷或吐或瀉者中暑也

中氣大類中風卒倒痰塞牙關緊急然中風口有痰涎身溫中  
氣口無痰味身冷也 中食亦似中風難辨須審其曾著怒氣  
否曾飲食否若在醉飽後着憊或感風寒食墳胸中胃氣不行  
便致厥倒昏迷不醒其脈氣口急盛或沉伏宜鹽湯探吐之吐  
不出者死 中痰者卒然麻眩舌本強直痰涎有聲四肢不舉  
重者不醒爲痰中輕者自醒爲痰厥 心火暴甚熱氣怫鬱而  
卒倒無知輕者發過自醒重者陰氣暴絕陽氣後竭而死 中

惡者忽然手足逆冷肌膚栗起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤卒然暈倒昏不知人此是卒厥客忤飛尸鬼擊死死間痰入廟盜多有此証腹痛氣自下衝上者火也從上轉下趨少腹者寒也氣從少腹上衝者陰火也從兩脇上衝者肝火也少腹痛引腰背累九者疝病也內觸筋惕者血虛也身如蟲行者表虛也不能仰臥仰臥則刻者水氣也水氣上乘于身重難行胃主肉其脈下行于足水肺則氣喘促犯胃故肉重而足不能行口苦爲胆熱口甘爲脾熱口淡爲胃中虛熱胃爲一身之主淡爲五味之本口酸爲肝熱口鹹爲腎熱口中常覺血腥爲肺傷口燥咽乾赤爛爲內熱口辣爲肺熱所謂內傷則口中不和飲食無

味也

一問飲食 外感邪未入裏則知味而食如常入裏則不思矣 喜冷者內熱也 喜熱者裏寒也 得食稍安者虛也 得食更甚者實也虛人過食亦不安 痘由飲食而致者須問所傷何物 熟者必渴喜冷飲飲必多若喜熱飲或冷飲而不多乃虛熱非實熱也大虛者必不能飲冷水虛者雖大燥津乾然少得清潤即止以本虛不能勝水之冷氣故不能多飲也

一問二便

大小便不禁爲腎敗

腎開竅于二陰腎敗則失其閉藏之職

小便

清白而長者必非熱証

亦有火在上焦者導之便下則反黃矣

黃赤而短者熱

也然勞倦生火或思慮動火或瀉利忘陰或陰虛內熱等証小

便多黃雖亦爲熱然是虛熱非實熱也。津液由于氣化氣病則小便不利。氣上耽者必無小便。氣閉者亦無小便。小腹硬痛小便不利爲溺濁利而大便黑爲畜血。濁而腹滿者死。大便閉結腹堅滿痛不可按者熱結也。大便濁利爲寒。然亦有熱者經所謂暴注屬熱也。火性急速不及傳化卽出也。其勢急迫辟辟有聲加蟹沫然若熱隨瀉考痛隨利減可不治彈九擋住擋拍止于其旁漏下清水也必極臭皆熱証也。又有純瀉清者謂之熱結旁流內有燥如微醬粘膩不見擡拍斷散也極臭者又爲熱。

一問汗液及血。外感身熱有汗爲傷風無汗爲傷寒。益汗爲邪初傳陽明又爲陽入擾陰。自汗爲陽明邪實手足心腋下皆汗。

又爲表虛不固。自汗身重。則睡爲風溫。服藥後得汗。表解不解。是汗未徹也。必汗出至足乃爲徹。頭有汗。身無汗。若小便不利。熱渴則終黃。小便利而大便黑。則爲瘀血。若胸滿。數喘。則爲水氣大抵。陽明濕熱不得發越者多。頭汗多可下之証。關格。証小便不通。頭汗出者死。額上及手足冷汗者陰毒也。汗多則津脫而亡陽。凡熱汗必濁。肌肉熱而溝道冷。冷汗必滑。肌肉冷而滑也。汗味淡而不鹹。緩而不流者爲絕汗。卽死。心爲汗。肝爲淚。肺爲涕。脾爲涎。腎爲唾。婦人病須問經候。若經水適來。或適斷而病熱者。熱人之名曰熱入血室。其証。胸脇下滿。晝日明了。夜則譖語如見鬼狀。嘔吐血。皆由胃出。若傾盆成塊。

而來或紫黑爲瘀或鮮紅爲新此太衝腎二經肝經之血由胃  
併出者也雷火勢暴故大出若止數口或一二鍾或紅或紫或黑此胃  
經血自出者也胃雖多血然其熱不苦雷火之暴故所出比之畧少欬血者因欬嗽而  
出痰中見血絲血點此乃肺傷肺絡肺少血雖少亦出恐致肺  
枯難治又肺病久及腎腎與衝脈並經出入血從腎衝欬出者  
其血必多腎難血少合衝則多須知其來喉必痒或有聲響或有硬氣自下  
冲上咯唾血者或隨氣逆火炎而唾不用力或隨痰而咯用力痰中  
浸者是此肺腎之血也上焦血浮中焦血不沉不浮下焦血  
沉以水試之可見一衄血詳血門太陽經血有從鼻噴出者  
其經從背上腦注鼻不衄則喷出也腸風血鮮膿毒血黯

洩血痛爲血淋不痛爲尿血皆與尿同出若不與尿同出者乃從精竅出也。噦水不嚥小便利大便黑多是畜血。畜于上善忘時鼻血畜于中下心腹腫痛如狂譫語發黃。好酒者陽明多畜血。

一問晝夜輕重。陽虛則畏寒而惡陰故旦安而暮亂。至夜則寒也陰虛則畏熱而惡陽故夜寧而朝爭。晝則熱也此正虛之候也。陽

邪實者遇陽而愈旺故朝熱而暮輕。陰邪實者逢陰而更强故夜寒而晝減此邪實之候也。陽虛而陰邪乘于陽分則氣行陽二十五度而病發故日寒而夜息陰虛而陽邪陷于陰分此頤多則氣行陰二十五度而病發故夜熱而晝涼。難癥疾或日發或夜發可見矣

此正虛挾邪之候也。其有晝夜俱熱者爲重陽無陰，晝夜俱寒甚者爲重陰無陽。晝寒夜熱者乃陰陽交錯也。其有久病虛弱無分晝夜，作止不時者，以正氣不能主持而陰陽相乘勝，復無常也。若壯實人初病見此，又爲邪正相攻不時擾動之故，觀傷寒少陽証往來寒熱初無定期可見矣。

一問証見先後，先瀉後痢爲脾傳腎，先痢後瀉爲腎傳脾之類。

一問七情：肝氣虛則恐，實則怒。怒傷肝以悲勝之。肝火乘心，則動而驚。心氣虛則悲，實則喜。笑不休，喜傷心以恐勝之。脾爲思，思傷脾以怒勝之。肺爲憂，憂傷肺以喜勝之。腎

爲恐懼傷腎以思勝之

怒則氣上

又云氣逆

喜則氣緩悲

氣

消恐則氣下驚則氣亂

思則氣結

### 一切脈

#### 脈之部位

脈者血氣經隧合而成名者也非血則不充非氣則不行非經隧則散漫而不就軌以經隧乃脈之道路猶水之有渠人身無處非血無處非氣如地無處非水而必注於江河乃有其流動可見故診脈必於經隧也人身血脉流行之路大者爲經小者爲絡經如正河絡如支河但有其外見之處卽皆可診

內經診分三部九候

出素問三部九候論

上部天兩額之動脈

當額厭之分足少陽脈經脈氣所行

以候頭角之氣

上部人耳前之動脈

卽和竅之分手少陽三焦經脈所行

以候耳目之氣

上部地兩頰之動脈

卽地倉大迎之分足少陽明胃經脈氣所行

以候口齒之氣

中部天手太陰也

卽寸口肺經脈氣所行

以候肺

中部人手少陰也

卽神門心經脈氣所行

以候心

中部地手陽明也

卽合谷大腸經脈氣所行

以候胸中之氣

下部天足厥陰也

氣衝下三寸五里之動脈肝經脈氣所行臥而取之女子取大衝在足大指本節後二寸

陷中以候肝

下部火足太陰也

魚腹正越筋間鍼間之動脈沉取乃得之

脾經脈氣所行也若候胃氣者當取足跗上之

衝陽以候脾胃之氣

下部地足少陰也

卽太谿腎經脈氣所行

以候腎

按上部以候頭則下部以候足可知以本藏之經脈候本部則亦以本府之經脈候本府可知古人多以互文見意當善會之再按藏府經脈共十二以止九候故遺手太陽小腸手厥陰心包足太陽膀胱三經不知當診何處又畱經之人迎與寸口並診而不列九候之中皆不可曉此後人之所以棄而不講也

內經診寸口

寸口卽氣口內分寸  
關尺三部解見下文

素問脈要精微論曰尺內

卽尺部

兩旁則季脇也

季脇小肋也尺部所主藏府其

于身之兩旁則當季脇蓋肝候于關而生脇則腎候于尺當季脇也

尺外以候腎浮也裏以候

腹裏謂沉也

中附上

言附尺之上而居中節關部也

左開外以候肝內以候

膈胸之下腹右之上爲腸右

右外以候胃內以候脾上附上

言附中部之上而居上卽寸部

也右外以候肺內以候胸中左

外以候心內以候膻中

卽寸部

包在兩乳間謂之氣海

按心肺肝腎藏也反候于外胸中膻

中高腹包裹此藏者也反候于內恐傳寫之誤當以胃外脾內

倒之易其右寸以候前前身背此分候身

位得是

前也以候前而後也以候後

後身背此分候身

之上下者就脈休言與上竟上者竟盡胸喉中事也

頭項可推下竟

下者少腹腰股脛足中事也

言寸不獨候腹也

尺不獨候腹也

按心經調脈皆伏行於分肉之間深不可見所常是者皆絡脈唯手太陰肺經脈外見於寸口此其獨診寸口之故也後人宗此背爲寸口是乘而古之診分三部九候者不復講矣

所謂寸口者合寸關尺而爲名者也。何謂寸關尺曰自手肘中橫紋至魚際橫紋得一尺一寸所取診者止長一寸九分前不及魚際橫紋一分後不及肘中橫紋九寸古人於此一寸九分分爲三部下部在一尺之內故名爲尺上部在一寸之內故名爲寸中部爲上下交界之處陰陽出八之所故名之曰關也寸口又名氣口何也以此爲肺經脈肺爲氣主故曰氣口又曰脈口問人身有藏有府此獨候五藏而六府止候胃何也曰內經原以人迎候陽以氣口候陰府陽藏陰此五藏所以候乏氣口也而兼候胃者則以五藏皆稟氣于胃五藏之氣不能自致于手太陰必因胃氣乃至故胃氣當併察也

問胆膀胱大小腸當門三焦諸府當候何處因內經無明文故後人之論不一有謂小腸與心爲表裏從心候于左寸大腸與肺爲表裏從肺候于右寸者

此難經之說非出高陽生也

有謂小腸候于左

尺大腸候于右尺者又有謂小腸爲丙火當從命門之火候於

右尺大腸屬庚金母隱子胎當從左腎之水候于左尺三說不

同今人多從後二說以夫小腸在腹中位居至下經言尺丙以

候腹應候之于尺不應與位處至离之心肺同候于寸也愚謂

藏府相移如心移熱于小腸則小便赤大便不通則肺氣壅之類

上下相關診之於寸亦

無不可況二腸位雖居下而其經脈皆上行則候脈於寸候府

於尺前說未可廢也如膀胱病居腹下而寒傷太陽其脈皆浮

豈徒左尺屬府居中而邪在陽明六脈俱大豈獨右關可治乎  
哉後二說當以左小腸右大腸爲是蓋藏府相配本因經絡相  
聯相聯乃相配相配乃有庚金丙火之稱名實相衡當從其中  
從其所聯所配爲左右可也胆同肝候于左關膀胱同左腎候  
于左尺從無歧議惟右尺所候其說不一有謂三焦命門右腎  
三者各自均於右尺候之有謂右腎卽命門與三焦同候說者  
紛紛難經謂腎有二長左名腎屬水右名命門屬火后人非之謂  
左腎爲形水右腎爲氣水總皆屬水兩腎之中乃爲命門  
按二說雖異然皆謂腎有水又有火所用補火之藥無殊則亦無庸分別矣愚謂右尺所候只一命  
門盡之不用更舉三焦右腎名色何則三焦若以位言則卽經  
之所謂胸中膈中腹中也若以三焦之元氣言則卽命門之真

然耳、蓋此火宅于命門布乎三焦隨藏發而異名豈有二火哉、  
測言胸膈腹卽言三焦之部位、言命門卽言三焦之元陽、而三  
焦之名可不立矣、兩腎旣皆屬水則當統於左腎、而右腎之名  
固可不立矣、命門爲火氣居中而親右陽能生陰氣能化水、診  
命門之火氣卽是診右腎之水源、右腎之名益可不立矣、蓋左  
尺以候先天之真陰、右尺以候先天之真陽、百川總歸于海、干  
炬無非一燈何必設立名色以滋惑亂哉、問藏府之部位何  
如田府陽藏陰、陽浮陰沉不易之理也、難經謂三菽之重爲脈  
脈則候胸中當輕於三菽可知、六菽之重爲心脈則候膻中當  
輕於三菽可知、九菽之重爲脾脈則候胃當輕於九菽可知矣、

又胸中膻中均卽上焦候於兩寸腹中卽下焦候于兩尺則腹中卽中焦亦當兩關並候可知矣然此但言其理耳實則何可泥哉何則部位雖分氣脈實量寸口三部僅長寸許除浮沉大小不能無異外其餘遲數等脈大槩無殊從未見有寸遲而關數寸滑而尺濡者假令診得六脈俱數而斷爲五藏六府皆熱可乎哉則必從心肺俱浮肝腎俱沉脾胃在中之說以案之始可以知爲何藏何府之熱詳脈配四時五藏條而手法之重輕一差則以府爲藏以藏爲府固有之矣卽不謬而浮主表病亦主裏虛沉主內邪亦主陽陷其爲虛熱實熱內因外因非參合四診安能細辨而但從區區之部位爲斷何異膠柱以鼓瑟也如胃停冷食而六脈

皆退肺被火刑而六脈皆數不獨見之。右閉右寸必分疆畫界以求之則固矣。數進則俱進則經言七診謂獨小獨大獨疾卽數獨遲獨熱獨寒。問子言六脈數則俱謂手門之而覺有獨陷下者謂沉伏不起。皆病其說非歟。自此以三處獨熱獨寒也。獨陷下者謂沉伏不起。皆病其說非歟。自此以三部九候言非言寸口也。按卽以寸口言亦得如診得數脈兼浮。脉在寸部卽謂之寸脈可也。觀下心肺但浮何以別。之條自明。

○脈之形體

脈之形體長而圓。如以水置葉葉中有長有短有大有小有虛有實有緩有長。長短以縱言大小以廣言虛實以蘊積言緩緊以張弛言。

長 滋出三指之外爲長。  
短 數于三指之中爲短。

按寸口之脈由胸中行至大指端非有斷截本無長短可言然脈體有現有不現不現者按之止見其動於三指之內現者見其長出于三指之外則長短宜分矣

往來之長謂來有餘韻也按高說甚善長短雖本言形體而凡脈之以神氣悠長爲體者固可因此說而想見其狀矣

大 大而盛于浮分名洪大而散漫滲開脈與肉無界限名散小 與大相反一名細細甚無力名微

虛 虛不實也虛甚則中空名芤

實 實結實之謂實如按猪筋虛如按燈心芤如按葱薑謂浮中沉皆有力爲實皆無力爲虛浮沉皆有力惟中無力爲芤雖未嘗不是然尙非正解實如葱中水充實虛則不克充則尤其不充者也

緩柔軟之意甚則尖之軟弱而名軟名弱舊以緩屬遲蓋緩兼兩義也

緊卽搏急與緩相反如張弦如引繩兩頭牽緊必挺勁抗指緊不甚名弦弦緊而大者名革牢

長短有得於稟賦者筋現者脈恒長筋不現者脈恒短也有隨時令變異者則春脈長而秋脈短也有因病而變異者則邪氣長而脈長而脈長正氣短而脈短也

大小有得於稟賦者世所謂六陽六陰也生成脈大者名六陽脈小者名六陰脈有隨時令變異者時當生長則脈大當收斂則脈小也有因病而變異者邪有餘則脈大邪氣正不足則脈小也血氣

虛實亦有得於生成者肉堅實者脈多實虛軟者脈多虛亦有變於時令者春夏發泄雖大而有虛象秋冬收藏雖小而有實形也若因病而異則大而實不特壅滿而且積實小而虛者不特衰小而且空虛可驗正邪之主病俱盛邪盛但衰正衰大而虛氣有餘血不足如葱中少水但吹之使脹也而實者血能充而氣衰不鼓可驗陰陽之偏枯

緊緩有得於生成者皮膚綑急者脈多緊寬鬆者脈多緩也其變於時令則天氣嚴凝而筋脈收引天氣暄熱而筋脈弛縱也其因病而變者則或外感風寒或內傷生冷寒勝故脈收引而緊急有力或熱或濕筋脈縱弛而軟弱無力也

附洪散微芤弦革牢舊作濡弱各脈

洪 洪卽大耳舊以洪爲來盛去衰是大之盛于浮分者也  
散 脈形本圓歟今散漫不收似大而實非大蓋虛甚而四散  
者也

微 古以微屬浮細屬沉分微爲陽衰細爲血少本集各脈皆  
直指本義故以細甚無力爲微

芤 脉虛而且中空者芤慈憇名如臥葱管於指下輕取重取  
皆有而中取則無此爲失血之脈

弦 似緊而畧遜但稍見抗指卽是不若緊之掉手凡弦緊之  
脈由外邪而致者猶易爲治由正虛而致者則難爲功蓋脾胃  
虛敗中和之氣化爲勁急土敗木賊不可救矣 古人有時以

長爲弦如謂春脈弦而言其軟弱直長是弦卽長也今分爲二則弦自有急勁之意不僅長而已

革牢 弦大遲而浮虛者爲革如按鼓皮內虛空而外絅急也弦大遲而沉實者爲牢寒氣深痼如牢獄也

軟弱 脈柔緩之甚而無力者舊以軟屬浮弱屬沉

○脈之行動

脈之行動如以氣鼓葱葉中之水使之流動也有浮有沉有遲有數有濤有滑

浮 古人於一身中分三部九候後人亦于寸口中分三部九候寸關尺三部也部各有浮中沉三候三而三之九候也是故

候之於皮毛間而卽得之者謂之浮候之於筋骨間乃得之者謂之沉候之於皮毛之下筋骨之上適當肌肉之中而得之者謂之中

沉 沉之極名伏

數 疾也躁也一息六至數而跳突名動  
遲 與數相反一息三至

內經謂人一呼出氣也脈再動動卽至也一吸人氣脈再動呼吸定息一呼一吸爲一息定息者前一呼一吸後息未起之時也脈五動閏以太息數息必有一息已盡一息閏長數息必有一息已盡皆名太息如月之有閏也一呼一吸本止四動有五動者則以其爲太息也診時當別令一無病人調定呼吸默數得十息診者亦默數得十五至爲平脈命曰平人一呼脈一動一吸脈一動曰少

氣

卽一息二至六呼脈三動一吸脈三動卽一息六至此爲數而躁動

疾

尺熱 皮卽手攀曰病溫 溫病 熟証一呼脈四動 卽一息八至以上曰死脈

絕不至

不待遲耳不至

曰死乍疎 疎卽有數曰死

滑 滑卽滑溜之謂言其行動往來之流利也在平脈則爲血充在病脈則爲血乾鼓動痰氣流注

濇 濇濇也與與滑相反往來粘滯者是

浮沉有得于稟賦者趾高氣揚之輩脈多浮鎮靜沉潛之土脈多沉也 又肥人多沉瘦人多浮有變于時令者春夏氣升而脈浮秋冬氣降而脈沉也其因病而致者則病在上 人身之上部也在表在府者其脈浮 上表府皆屬陽浮脈亦屬陽陽病見陽脈也在下在裏在藏者其脈沉也

問浮則外有脈而內無脈謂之裏虛沉則內有脈而外無脈謂之表虛可乎曰不由稟賦時令與外感內傷無故而浮沉謂之虛可也以浮爲陰失守沉爲陽內陷也有故則不可如以爲可則四季之月無病之人脈本和平當居中候亦可斷爲表裏兼虛乎然則古人謂浮爲裏虛又謂脈浮舉之有餘按之不足其說非歟曰謂浮爲虛者必浮而兼虛者乃名之非浮則必虛其裏也至脈體之爲虛爲實本不固浮沉而變實則浮沉皆有餘虛則浮沉皆不足而輕取之與重按勢有不同則夫脈之實者愈按愈實虛者愈按愈虛蓋重按則脈被遏抑實者鼓繫有力故愈形其實虛者無力鼓繫故愈形

其虛則舉之有餘按之不足止可言浮而虛者不可言浮而實者也或曰如子言浮而實者愈按愈實是三候皆有又何以名之爲浮乎曰浮脈本浮按抑之而後沉不按之則仍浮故曰浮也又問亦有脈浮而言表虛何也曰外感發汗太過或內傷自汗太多皆令表陽虛氣外越故浮也

遲數得于稟賦則性急躁者脈多數性寬緩者脈多遲緩于時令則晴燠而脈躁陰寒而脈靜也至其應病則亦如之矣仲景以遲爲藏寒數爲府熱可不泥以府亦有寒藏亦有熱也滑濶亦有得之稟賦者乎曰富貴之子神氣通暢則脈亦流暢貧賤之子神氣沮抑則脈亦塞滯此節太素以脈之滑濶論窮

通之意也。若夫時令則肝脈屬春而微滑肺脈屬秋而微澆矣。至其應病則本乎氣血之通塞耳。

### 附伏動脈

伏沈極爲伏按至骨乃見或竟有不見者。

動動跳動之意大驚多見此脈蓋驚則心胸跳突故脈亦應之而跳突也必帶數故上文繫之數脈條下。

張仲景曰若數脈見於關觀若字則閑是偶舉可  
知非動脈止見于關也上下無頭尾狀其圓而尖耳非真上  
不至寸下不至尺也如豆大歷歷动摇者名曰動。

### 脈之歇止

脈之歇止者有三

結脈來遲時一止而復來者曰結如人之徐行而  
促脈來數時一止而復來者曰促如人之疾行而  
亦名促此之促指歇至言須分別觀之

代結促之止無常數代之止有常數常數卽下文四十動三十動之數代又爲更代之稱別見陽氣條義與此異須分別觀之

內經曰脈一日一夜五十營營運也經謂人周身上下左右前後凡二十八脈其長一十六丈二尺五十還計長八百一十丈呼吸定息脈行六寸一日夜行八百一十丈計一萬三千五百息接此爲說也人一日夜遺止一萬三千五百息步五十動而不一代者代歇至五藏皆受氣四十

動一代者一藏無氣督氣先盡也其吸不能至腎止至肝而還景岳曰觀此則下文所謂二藏三藏云云者當自遠而近以次而相由腎而肝而脾而心而肺故凡病將死者必氣促僅呼吸于胸中數寸之間而已

十動一代者二藏無氣二十動一代者三藏無氣三十動一代者四藏無氣不滿十動一代者五藏無氣子之短期此皆死而王氏脈經謂一藏無氣后四歲死二藏無氣后三歲死云云恐非

○脈配四時五藏

內經曰春脈如弦

如弦則非過弱可知通指大脈言非單指左關下倣此

春脈者肝也東

方木也萬物之所以始生也故其氣來更

同向柔弱之意輕虛向外

而滑端正直以長曰弦其氣來實而強

堅勁

此謂太過病在外

外感也邪不實而微此謂不及病在中

內傷也正虛故脈弱接長弦緊三脈相似而不同蓋弦而微者爲長强者爲緊也此所言如弦者實卽長所言太過乃弦而且緊觀虛軟實彈字可見勿以此弦字與他處

弦緊弦  
字同論

夏脈如鉤

鉤曲也脈炎洪盛如湧起

夏辰者心也南方火也萬

物之所以盛長也故其氣來盛

來盛浮大也凡脈自滑而之分出於皮膚之間日來去衰

曰鉤

凡脈自皮膚之際還于骨肉之分日去衰減也

去盛

大且實也此謂太過病在外其氣來不盛去反盛

浮取不足沉

意少多此謂不及病在中

不言來不盛而言來不盛去反盛去有餘是流

子浮而不知此乃反浮爲沉

反盛皆以來不盛去反盛似爲有餘

失其職卽爲不足也

秋脈如溪

如浮則非

秋脈者肺也西方金也萬物之所以收成

也故其氣輕虛以浮來急

收升之意去散漫之意浮取則收飲重

散故脈體如此故曰浮其氣來毛

義取毛之輕浮

體如此故也惟兩旁散而中央不散與上所謂去散者異矣

而中央曰堅則亦非但收歛而已亦與來急異也

此謂太過

病在外其氣來毛而微此謂不及病在中

冬脈如營

如營壘之固也內守意

冬脈者腎也北方水也萬物之所以合

藏也故其氣來沉以搏

擊指堅質以百堅實之甚也

此謂太過病在外其去如數者

彈擊手如擊石者沉取似數也數本局

脉亦多數愈虛則愈數原非實熱之數故云如數

此謂不及病在中

脾脈者土也善者不可得見

蔡西山所謂不長不短不疎不數不大不小應乎中和意恩欣歡樂者也

惡者可見其來如水之流

滑而動也

此謂太過病在外如鳥

乞喙銳而急也此謂不及病在中

按四時之升降動靜發歛伸縮相爲對待者也極于二至平於二分故脈于月極沉于月極浮至卯酉而平觀經又謂秋

脈中衡如衡又謂夏脈在膚皮也秋脈下膚冬脈在骨則秋之不當以浮言可知也特以肺位至高其脈浮秋金配肺故亦言浮耳夫秋初之脈仍帶夏象言浮猶可若干酉戌之月仍求浮脈不亦惑乎夫子春言長滑则于秋言短澑可知于冬言沉實則于夏言浮虛可知書不盡言不盡意是在讀者之領會耳

難經曰初持脈如三菽大豆之重與皮毛相得者肺部也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也

又曰心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也

心主血脉位在肺下按至血脉

而得者爲深稍加力脈道粗大爲大又稍加力脈道散開爲散浮而短濶者肺也

肺主皮毛位居最上按至

皮毛得者爲深稍加力脈道不稱爲濶不見長出指外爲無

腎肝俱沉何以別之然牢

即沉弦

而長者肝也

肝主筋位在脾下按至筋

按之濡舉指來實者腎

也腎主骨在肝下按至骨上得之爲沉又重按之

脾者由州故

其脈在中

脾主肌肉位在心下按至肌肉脈道和柔而緩又稍

加力脈道敦實而大

王家正謂診法當從心肺俱

浮肝腎俱沉脾胃在中之說王叔和但守寸關尺分藏府位部

者非其說甚是然二說亦不相悖蓋寸關骨高肉薄尺骨低肉厚故寸關恒浮尺恒沉假如診得三部俱浮之脈亦必兩寸較尺更浮故可從其大槩通言亦可從其甚者獨舉不相悖也若

弦緩遲數名脈則三部

僉同有不可分指者矣

問脈氣當隨時令變更則夏月脈浮不特心肺浮卽肝腎亦

**浮** 最浮爲肺次心次脾次肝次腎 **浮** 冬月脈沉不特腎沉卽心肺亦沉矣 **沉**  
爲腎次肝次脾次心次肺 **何必泥定肺脈常在皮毛腎脈常在骨上乎** **曰**  
**夏浮冬沉特微浮耳其變更固不遠也**

按肺較心更浮肝較脾畧沉是右寸關比左寸關差浮也以  
例兩尺亦應有浮于左益右腎爲水中之火左腎爲水中之  
水自應少異耳合而言之右三部皆浮于左古人謂右屬氣  
左屬血氣浮血沉不亦宜乎

○脈無胃氣則死

經曰人無胃氣者死

此言脈以有胃氣爲主也胃屬土其德中

不大不小不浮不沉有雍容和平之號無過不及之傷者也

春胃微弦曰平

雍容平緩也

譽帶之意也弦

多胃少曰肝病

肝邪勝胃得秋金克木也

但弦無胃曰死

胃氣已絕故也

而有毛

猶

脈曰秋病

金旺木也春木旺尚無傷至秋則必病矣

毛甚曰今病

日下卽

病病也

夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病

但鈎無胃曰死胃而有石曰

冬病石甚曰今病

石者流實之意冬脈也

長夏胃微弱弱曰平

長夏未月也土濕則軟故微軟弱卽緩脈也

弱多胃少曰脾病

猶言脾胃自病也

但代無胃曰死

化更化也春弦夏鈎秋毛冬石脈體隨時而更但見其所更者而不見胃氣則死矣不言但弱無胃曰死以弱卽正氣不足非有邪氣相

乘且弱止可言胃氣衰不可言胃氣絕也何則胃脈雖曰中和而長夏土濕則累近柔軟一邊可云柔

而軟之甚爲弱不可云但弱無柔軟也

弱有石曰冬病

土氣衰而

水反乘之故弱當作至冬必病矣弱石

當作春夏以克我者言此皆以我

言軟弱毛石亦互文以見例也又春言

變胃言軟弱毛石此及下方

胃有毛夏言胃有石亦互文也

臥臂微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鉤曰夏病鉤甚曰今病

真肝脈至

此下皆言直藏脈直猶言純真肝脈者言此爲純乎  
肝脈毫無胃氣者也蓋肝弦肺濤心浮腎沉各得一  
偏淮胃氣之脈不弦不濁不沉中和合德有以化四者之

偏故將雖乘在令以呈其弦象而中和柔緩之胃氣即與之偕行而胃之相緩急多肝之弦急少是爲平脈若弦多胃少卽爲病脈矣况毫無胃氣而純乎弦勁耶此蓋胃絕使然故凡病真藏脈現者必死也如循刀刃如按琴瑟絃皆挺勁真心脈至堅而搏知循薏苡子堅實之狀纏繫然見于指下也直肺脈至大而虛如以毛羽中人膚力之竟虛浮無真脈至搏而純絕疎絕無如指彈石堅實脾

脈至弱而有數者

○各脈主病

病非表則裏非熱則寒非虛則實耳故序浮沉遲數虛實六脈于先餘脈于後長大實滑等有餘之脈主証多同短細虛濶等不足之脈爲病相類當會通觀之升八卦此者卽不入于彼也如頭痛身熱脉之浮數者他脈便無此三証哉覽者但取其意勿泥其文便觸類旁通引伸不盡矣

浮陽脈也陽外陰內故浮主表沉主裏又陽上陰下故浮主上部沉主下部以外感言之凡六淫之邪中于表清邪中于上脈必浮也以內傷言之裏氣失守而虛邪外越腎陰失守

而浮陽上沖脈亦必浮也

浮遲

爲表冷

浮主表遲  
主寒也

傷濕

表中濕邪  
滯其經絡

中風

虛風內  
侵故浮

內虛寒故遲  
若兼風邪中  
表帶其經絡則亦浮遲也

浮數

爲頭痛

運眩

吐衄

皆風熱上  
攻所致

表熱

瘡

陽結

能食不  
大便

胸滿

肩背痛

浮虛

爲表陽虛

傷暑

大熱傷氣汗  
出過多故虛

勞倦

喘

軟血

浮實

爲表邪實

六淫之邪或痰凝血  
塊之在表者皆是也

脹滿

因熱

氣逆痛

肺熱

肩痛

瘡

浮大

爲風熱癰瘍

風熱破血拂  
膿于外也

身痒

名泄風熱  
蒸汗出  
爲風所  
引故痒也

表邪盛

癰癧

即拂風  
風熱久不散滯而  
生蟲

肌肉

相蒸生蟲  
而遺爛也

高氣

實血虛失血燥結陽厥

闔格

浮爲正虛大爲邪實邪實正虛不能

運化故關而不得小便格而不納食也

爲癲疾

浮小爲表陽衰

浮緩

爲傷風

傷風有汗內熱得泄故脈不緊

傷濕

濕傷肌表肌肉血脉緩弱如土濕則軟也

浮緊

爲傷寒

身痛

浮弦

爲頭痛

吐食 風飲

浮滑

爲風痰

衄血 吐逆

浮濶

爲麻木

身熱無汗 肺燥 汗多津傷

浮長

爲頭痛

血虛氣浮

浮長

爲頭痛

風癟

浮短爲喘乏

沉 主裏王下部 七情鬱結痰血停滯凡屬內邪脈必見沉若不因內邪而見沉則爲陽氣內陷爲裏虛不能外達分別觀之

沉遲 爲裏寒 滯鴻 氣血滯 畜水

沉數 爲內熱外寒內熱反覺外寒熱聚于內不達于外也 便難 消穀食多  
而便少也蓋九臟厥手足冷也熱聚于內不達于四肢爲熱所消化率厥故冷又有手足熱者詳醫碥厥門

沉虛 爲裏虛 嘾血 下利

沉實 爲積聚 血瘀 煩心熱乘心 咳唾熱熱乘肺

沉緩 爲裏濕 畜水

沉緊 爲冷痛 奔豚

腎中陰寒之氣從小腹上冲心若豚奔突

瘕疝

瘕積塊也病爲

小腹有形之病皆寒邪之凝聚而成者

腰脊痛

腎附背腎寒則筋筋而脊痛

沉弦 爲脇下有積

弦爲肝脈肝主脇腹

少腹痛

內飲

疝

沉滑 爲食痰 便膿血

沉濡 爲血滯 精傷 不月不孕 內疽

沉大 爲內邪盛

沉細 爲血少 洞泄亡陰

遲 主寒以寒則氣少而行慢也屬水

遲大 爲寒邪 頑痺

遲細

爲寒濕

遲虛 爲虛寒

遲實 爲寒積

遲緩 爲寒濕

遲緊 爲寒痛寒滯氣不通故痛

爲筋急筋寒則收引故急

遲濶 血寒而滯

數 主熱以熱則氣盛而行速也屬火

數大 爲煩躁 潶 瘰疹 脹滿

數虛 爲虛熱 怔忡 虛損

按虛熱者脈必虛數無力固矣然有過脈寒劑寒熱搏擊或肝邪犯土脈反弦大有力者投以溫補之藥則數者靜

弦者緩大者歛矣此最當知又有虛寒而逼火浮越者真陽欲脫者脈皆數甚者亦弦大有之當以証泰之勿誤也

數實 爲實熱 雜瘡 煩躁 謳妄

數滑 爲熱痰 血熱 渴

數濶 爲熱灼血乾

虛 爲正氣不足

虛滑 爲正虛挾痰

虛濶 爲血液不足 氣滯

虛弦 爲虛損 小食 虛痛

虛緩 爲虛弱 泄瀉

虛細 爲氣血不足

虛大 爲血虛

實 爲邪氣有餘不作正氣充實論以正氣止有不足無太過  
太過卽爲邪氣也。參長脈條 坎中滿離中虛水脈多實火脈  
多虛

實滑 爲痰結 爲宿食

實大 爲邪盛而實

實大浮數 爲腫 胸脇壅滿 不小便氣有升無降

緊 爲寒邪爲木邪微者不過抑遏正氣甚則戕敗中州爲真

藏見

緊遲 爲肝氣寒滯

緊數 爲寒鬱熱 咳嗽

外寒束  
熱攻肺

痛

寒熱相  
搏故痛

緊大 爲寒邪盛 下利

土敗木  
脾難治

緊實 爲有形之邪

瘀血之類

緩 主濕邪土濕則泥滯而軟也問緩本和柔之名乃脾胃之

正氣何以謂之病脈曰脾胃脈本中和不緊不緩原無緊緩可  
名今曰緩卽非不緊不緩之中和矣蓋凡有可名者卽非中和  
卽爲病脈也舊謂四至爲緩三至爲遲濕滯故脈遲緩亦通蓋  
緩有兩義一對數言一對緊言以主濕則亦有兩義一爲濕滯

之而退一爲虛淡之而軟也

緩大 爲濕盛

緩細 爲正虛挾濕

緩數

爲濕熱

肉痿不能行動曰痿肌肉四肢並見軟弱

謂多濕也對脈多寒言寒則筋脈吸引故緊熱  
則筋脉弛緩故緩也然必甚見熱証乃爲熱不可不知

緩浮數

爲多汗

緩數大

爲狂笑心熱

則矣

濕熱壅脹

緩長數

爲溼暉

溫熱挾別  
大上逆

水瘕水積也土受木克不

主麻本不細痛作也土受木克不能行痰聚  
于胞胞故伸伸而不行膀胱成熟故數

緩滑

爲濕痰

緩濶

爲解体

因倦怠而血衰弱使然

長爲邪氣長問經曰長爲氣治是長本佳脈何以云病曰長大實滑皆有餘之脈短小虛濶皆不足之脈不及太過皆爲失中故長大不作正氣有餘實滑不作血氣充足也然衰弱之病脈由短而漸長則爲佳兆諸脈之變易皆當以此推之吉凶自見也

長數爲熱感

寸長

爲足腫痛

陽盛陰傷也

格

寸脈長九分過此爲太過逢于上胃中血枯上魚名釐格不納食也陽盛故食不得入

道氣喘息

尺長

爲關

尺脈長一寸過此爲大過名覆關不得小便也熱在下故不得小便

尺寸俱長大爲陽明病氣熱在陽明則脈大而長

短 短爲正氣短

短濶 爲肺燥

寸短 爲頭痛陽不足則陰氣得而上干之

大 無邪氣盛 經謂大爲病進乃指大而有力者其病爲實

邪邪加盛則脈如大也仲景謂太爲虛又謂大爲勞乃指大而無力者其病爲虛邪虛則氣散勞則氣張故脈亦應之而虛大也當分別觀之陰靜而歛陽動而張故火旺者脈必大而浮數虛諸水足者脈不必大卽大亦流靜而有力也

小 爲正衰血氣皆少形體消瘦陽不張則小水不生亦小兼遲則火尤衰兼數則水更損

細數 爲血虛發熱虛勞得此難治

醫林

卷之五十一

美

七

八

九

十

十一

十二

十三

芤

爲失血

芤數爲亡血發熱

身體瘦肌肉甲錯

甲錯枯躁也

芤遲爲氣虛脫血

芤動微緊爲男子失精女子夢交

弦

爲肝邪傷脾爲痛爲欲告肺氣破傷

而停滯之故甚則與緊同論

弦遲爲寒瘲慢驚風

弦數爲熱痛急驚風正氣大虛

弦實

爲肝實善怒不樂

肝搏不暢

眩冒

肝火上冲故冒眩乘忘故冒

颤病

肝脈會于顫火上冲故痛

弦大爲肝邪盛

弦小

爲虛損

弦滑

爲痰飲

滑

流動屬陽

主風熱

熱氣如風  
吹血流動

上痕飲

凡物乾涸則  
澀則滑故滑

爲血盛  
痰多

主胎孕

滑大

爲多痰

多而

滑緩

爲寒濕

滑緊

爲寒痰

冷食

滑

血少而滑屬陰

濡大

火盛血枯

此經所謂  
陽有餘也

濡小

爲血氣俱少

少食

心痛

血少不  
養心

痛氣滯

癥攣血不  
通

噎膈反胃腸結

微濡弱

皆曰氣衰微之脈

微浮

爲陽氣微

微緊

爲虛損多汗

陰寒逼  
陽于外

短氣

陰寒逼  
陽浮上

微濇

爲體痺

氣滯  
血濇

寒慄

欬逆

睡腥

濡弱

爲亡血發熱

煩心

厥逆

陽氣不能四  
達故手足冷

弱濇

爲精冷無子

散

爲脫

爲昫仆

牢

爲痼塞

陰病累及連  
少腹急痛

瘕聚

革

爲寒盛

男亡血失精

女平產漏下

並寒不  
通血

動爲陰陽相搏虛者則動陽動見而才陰動見于口

陰動爲發熱出血崩

陽動爲汗出

驚

痛

陰陽相搏氣不順致痛

伏過一時偶伏乃暴病久之氣調即通

爲霍亂 痛劇 隱隱否隔 氣閉 血滯

忿怒氣逆

戰汗

傷寒服藥后

胃脅脹忽伏不見寒戰此正邪相爭欲作汗宜靜待勿倉皇誤治

伏濇爲吐逆

血枯不能納食

水穀不化

氣滯不運

結爲寒滯 七情鬱結 氣血滯 瘀 瘡

促爲熱壅 瘰毒 使膿血

毒不成

則下泄也

若非熱壅則爲氣脫

化爲臟絕 霍亂 跌打悶絕 暴絕 瘡痛

胎氣咀

按以上所列脈病醫舉大槩難以執泥如浮主表沉主裏而內傷發熱大類外感脈亦浮數此邪初感過轉表氣脈不能外達反見沉緊不細辨則以表爲裏以裏爲表而誤治矣脈數爲熱然陰虛發熱陽虛發熱者脈皆數愈虛愈數一當滋陰一當補陽而槩以實熱治之可乎嘗見實熱之脈多緩軟不數故經以緩爲熱宜知脈遲爲寒然熱滯于內者脈亦雍滯似遲以爲寒誤矣有邪盛而正未衰者有邪盛而正已衰者脈見實則不見虛既無虛脈可參則正之已衰者又何由而見乎按此當以兼緊緩緩辨之又以形氣之盛凡此皆當參伍求之而不可刻舟求劍者况一脈

而數病亦一病而數脈卽發膠熱言之又烏可得哉

人迎氣口

按內經謂寸口主中

寸口爲太陰肺經脈肺爲藏故以此通候六腑之氣

人迎主外

陽明

脾也胃爲府故以此通候六腑之氣

人迎本在頸下夾

結喉旁一寸五分後世既廢古人三分診之法遂改候人迎

於左手關脈而名右手關脈爲氣口與之相衡謂氣口大於人

迎爲內傷飲食

以左關屬胃也此有理

人迎大干氣口爲外感風寒

以左

肝肝主風也然內風與外風無涉于理未的

分主表裏雖與經意無異而部位不同

矣猶之足少陰腎氣本于太谿診之在足內踝后五分在筋骨上動脈中右季則診於兩尺足陽明胃氣本于趺陽即衝陽在足蹠上不去者二寸高骨間動脈診之今

則診手右關也

張仲景海以趺坐跌陽歸少陰並言喻喜言謂卽寸開尺

再按結喉旁人迎脈恒大至兩寸口脈數倍從無寸口反

大至人迎者

經謂平入春夏天迎微大秋冬氣口微大急非

此後人所以改候人迎

於左關以與右關較大小也

○男客脈同異

古謂男脈左太至右女脈右太至左驗之不然蓋人之右手比左手大脈亦應之而右太至不論男女皆然也惟男兩尺  
寸虛玄兩尺相對差不<sup>半寸</sup>同耳

○胎孕脈

經曰婦人手少陰動甚都任子也

少陰脈指神門言今則診子左右脉亦動甚流利滑動如舊

說謂心生血血脉

脉接手少陰全陰

陰轉陽別

脈謂陰戶

起元作足少陰謂之

脈準繩從之

陰轉陽別

脈謂陰戶

手與寸外別

謂之有子子男

女利之意

按叔和王氏曰左疾爲男右

疾者滑

通稱

按叔和王氏曰左疾爲男右

疾

爲男右浮大爲女益左屬陽右屬陰陽道實故脈實而沉陰道

虛故脈浮而虛也

觀坎離二大字含有虛意而滑伯仁則云左

尺洪大爲男右尺沉實爲女與叔和相反滑說恐非一再按胎

孕之脈六部皆滑疾而兩尺尤盛不求于尺而求于寸亦誤信

經語矣經言心生血謂血色之赤自心火來耳豈真血生于心

哉一準繩曰妊娠初時寸微小呼吸五至三月而數尺滑疾重

按之散者胎已三月也不散但病不滑者五月也

胎至五月則乳頭根必

哉

黑乳房亦升

黑

脈更爲實據。脈經云尺脈按之不絕妊娠也。婦弱者婦不必  
脈皆滑實但按尺寸中應指源源不絕便是滑伯仁謂三部浮沉正等無他病而不月爲胎妊亦此意其脈雖經經常出與首是一說離經謂歇至及脉異常日脉異次小不令如雀啄者是而腹痛引腰背爲欲生也。腹不痛者常日不引腰脊俱未產當靜待之

張路玉云胎形如抱甕接之冰冷而脈食太有小

者有在無浮沉動止互移不同爲兒胎又有如風雨亂點急去忽來或指下見兩限者爲夜叉胎又云孕脈浮細弦急憎寒壯熱唇口青黑是胎氣損也胎若不動反覺上搶心悶絕按之冰冷者是胎已死

之脈有應道

脈得四時之順曰病無他脈反四時曰病難已。春夏而脈瘦

小也秋冬而脈浮大曰逆四時 春得秋脈夏得冬脈長夏得春

脈秋得夏脈冬得長夏脈命死不治

春不沉

春脈宜弦然春初猶濡冬沉分但弦不沉也餘倣此

夏不弦秋不數冬不濇是謂

四塞脈

爲病沉甚弦甚數甚濇甚曰病參見曰病復見曰病未去

而去曰病而不去曰病反者死

按脈與時違須問有病無病無病而得此誠爲可虞

無病何因脈變

非無病也不見其病耳如受蟲之木如磨刀之石不見其損日有所虧不無枝葉末壞本實先陰之憂日若因病

而致不過難治非必死也如秋月病熱脈得浮洪爲脈

証相合寧可斷爲必死乎

形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胸中多氣者死

經又云形

氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足往當參看形氣相得者生參伍不調者病三部

九候皆相失者

失常死上下左右相應如參春者如彼去此來彼起此落也

不可數者死

中部獨調中部在手部在頭下

各藏若失常者死

上部在足所候中雖調亦死

中部獨滅者死

上部在手部獨衰滅亦死

脈從陰陽

謂陽病見陽脈陰病見陰脈

病易已逆陰陽病難已

脈從而病

反者何如曰脈至而從按之不鼓

諸陽皆然陽證見陽脈爲脈之無力不能鼓指便非真陽証不可作

王而從矣然使按

熱治凡諸脈之似陽非陽者皆然也

諸陰之反何如曰脈至

而從按之鼓甚而盛也

陰証雖見陰脈然鼓指有力則非陰

熱病汗出而脈

尚燥盛者死

濕病時疫皆以數盛有力爲順細小無力爲逆汗後脉靜身涼爲順脈仍燥身仍熱爲逆

熱而脈靜泄脫血而脈實病在中

形內結也脈虛病在外也脉濡

堅皆難治

已上皆舊名申屈張景岳易名非風

諸卒仆暴厥証

舊名申屈張景岳易名非風皆元氣素

虧故而卒倒不省人專脈宜大弱不可較強則由毒宜淨大勦

實浮則毒尚活動可行散不宜微細瘡澑正破濤

傷矣小勞倦傷脈以虛大弱

緩爲順緊數大汗出熱不止者死

飲食傷以滑大爲順若胃停生冷則兼緊

霍亂吐利後搏大者逆太微遲者逆未吐利前脈伏

或歇至不妨以氣熱不行也吐利後眼歇亦不妨以氣累虛不能接續也

噎膈脈浮滑而大便潤

者順不過痰氣阻逆數弦澑大便燥結者死

氣血枯結也腫脹宜浮大有

力忌短澑虛細肺痿虛數爲順肺癰過於治數者逆已潰

宜緩滑失血証脈宜虛弱弦實數者逆加以身熱不得臥必

死畜血脉實大可攻爲順止渴疾爲裏証宜沉惡浮與發熱

久病虛陽外越也若初病兼表邪者不在此論宜緩細有神惡強弦頭目痛脈浮滑

爲風痰上攻可治、短橫爲血虛火逆難治、卒神無所見者死。

清陽

失守邪火借逆于上也。瘕積聚之類沉實有力可治、虛弱者死。癲

狂宜滑大忌濇小。膿癰瘡未潰浮滑數大爲順沉細遲濇者逆

。瘧病浮弦爲陽沉緊爲陰，然過于堅强者不治。胎脈宜和

滑流利忌虛濡。頭部座及崩漏宜緩弱忌弦數。脾太抵新病陽

病凡屬邪氣有餘之証法當攻伐者須見盛滿有餘之脈乃可

受攻。若見細微不足之脈則邪盛正衰攻邪恐傷乎。正仲景謂

陽病見陰脈者死雖未盡然亦難爲力矣。久病陰病凡屬正

氣不足之証法當培補者須見虛弱不足之脈乃可受補。補之

而脈之弱者漸大虛者漸充是陰脈轉爲陽脈此仲景所謂陰

病見陽脈者生也若見強實有餘之脈則土敗木賊任補不勝或反以助邪不可救矣

凡敗証脈脫治後脈氣以漸生復得日若吐然而出如復元者必復脫不可起矣此燃將滅而復明之義也

再按陽病而得盛大之脈須察其胃氣之虛

實必盛大而和緩方任攻伐若弦多胃少或形氣不足俱不可攻若癥瘕積聚脈本帶弦亦須看弦中胃氣仍在且形氣未損又處不得不攻之熱方可議攻病去六七卽已所謂大積大聚衰其大半而止也

○脈証從舍

凡脈証不相合必有一真一假須細辨之如外雖煩熱而脈見微弱者必虛火也腹雖脹滿而脈見微弱者必胃寒也虛火虛

脈若堪攻乎此宜從脈之真虛不從証之假據也其有本無煩  
熱而脈見洪數者非火邪也本無脈滯而脈見弦強者非內實  
也無熱無脈其堪瀉乎此宜從証之真虛不從脈之假實也如  
寒邪內傷或食停氣滯而心腹急痛以致脈道沉伏或促或結  
此以邪閉經絡而然既有痛脈等實証可據則脈之虛乃假虛  
當從証不從脈又若傷寒四肢厥逆寒戰而脈見數滑此由內  
熱格陰何以知之以病由傳經漸致並非直中陰經從無熱証  
轉寒之理既有數滑之脈可據則外証之虛爲假虛亦從脈不  
從証也

○南北政辨

少經謂少陰所在其脈不應謂沉細不應指地歷驗不然此僞說也必爲其所惑

### 附奇經八脈診法

岐伯曰前部外者足太陽也膀胱內者沉足厥陰也謂之外者外謂之外謂之外者外謂之外也  
中部謂之中者中謂之中也外者足陽明也胃經內者足太陰也脾經後部謂之後者後謂之後也外者足少陽也膽經內者足少陰也腎經前部中央不浮不沉謂之中候直者直謂之直者手少陰心經太陽也小腸經中部中央直者手厥陰也心包絡經後部中央直者手太陰肺經陽明也太陽經

按此與素問脈要精微論不同殊無理蓋內經乃後人所撰非出一手故互異但此爲平文奇經八脈章本存

前部橫子寸口九九者

橫如連棋之攢注脉游一體無異也說謂下文九九猶動脈所謂如豆也詳動

脈橫开寸口九九者謂才口脈團結滑動如布浮中流皆然也任脈此語

岐伯異泰長至陽爲任脈此語

岐伯異泰察可也三部俱浮陽故浮直上直尺者

下文自明謂不斜潤督脈也

三部俱平沉實也衝爲血

海陰盛故沉實

直上直下者衝脈也前部陽蹻屬陽

左右兩手彈者弦緊陽蹻也後部陰蹻屬陰在右彈者陰蹻也

彈指陽蹻也後部陰蹻屬陰在左故候于左

中部帶脈居中左右彈者帶脈也從足少陰

他言尺沉分即上支所謂後部內爲

足少陰至足太陽者足太陽上文脈前部外乃寸浮分也從尺

陰也斜至足太陽者沉分上至寸浮分與督脈三部俱浮衝脈

三部俱沉實者直上直陽維也

屬陽故始沉終浮從足少陽上文言後部外者足

少陽乃尺斜至足厥陰者

上文言前部內者足陰故浮分也

厥陰乃寸沉分也始浮終

爲圖明之

寸開尺



甲子浮候  
乙丑沉候  
丙寅浮候  
丁卯中候  
戊辰中候  
己巳中候  
庚午沉候  
辛未沉候  
壬申浮候

橫于寸部九丸者任脈也

橫于寸部申子庚也借算書勾股法  
號之甲乙丙直線爲股申子庚橫線

爲名庚丙酉卦歸爲坎卦

見寸口三部加勾之橫寸關尺俱浮者督脈也

甲乙丙也寸加股之直寸

關尺俱沉者衝脈也

庚辛壬也寸加肺之直寸

從足少陰斜至足太陽者陽


維也

卽從尺沉斜至寸浮乃王戌甲也如弦之斜

從足少陽斜至足厥陰者陰維也

卽從尺浮斜至寸沉乃丙戌庚也亦如弦之斜

按李瀕湖則以脈常行之道爲中而有時偏于外而近臂中筋間爲圖明之  
有時偏于內而近臂中筋間爲圖明之



所謂從足少陰斜至足太陽者乃從尺內斜至寸外也所謂從足少陽至足厥陰者乃從尺外至寸內也所謂左右彈者

卽內外彈也與愚說不同不知孰是請質愚明

再按奇經之病當以証診勿專恃脈其病証詳針灸奇經病

篇

卷之五終