

金匱要略編注

高李少男注目南甫編註

血痺

辨血痺之由，示鍼法也。靈樞曰：病在陰者，命曰痺。此風邪痺着於管，故爲血痺。蓋大尊榮人膏梁之體，素習安閒，不勞筋骨，膂力不出，爲骨弱肌

重，因疲勞過，出臥不時，動搖加被，微風遂得之。但以新自微溝，守口關上，微尺中小緊，宜鍼引陽氣，令肺和緊，去則愈。

膚盛而氣弱陰強重因疲勞傷力或房勞汗出衛氣疎怯或臥露體軀衛虛行陰失護風邪乘入謂臥不時動搖加被微風得之如漏肩風之類乃邪入於血也但氣虛則脉微血痺則脉濇氣虛血痺故微濇之脉見於寸口關上微者乃陽氣微而不入於陰陰邪居下所以脉見尺中小緊乃邪痺營而不痺於衛也故宜鍼引陽氣入陰陰得陽和俾痺着通而脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃芪桂枝五物湯主之

此血癰脉證而兼出方也。血癰乃陰陽營衛俱微邪入血分而成血癰。中上二焦陽微所以寸口關上脉亦見微微邪下連營血主病故尺中小緊是因氣虛受邪而成血癰然因血癰則氣不獨行於周身故外證則身體不仁如風癰狀經謂臥出而風吹之血凝於膚者爲癰是也用桂芍薑棗調和營衛而宣陽氣雖然邪癰於血實因表陽失護而受邪致癰故以黃芪補其衛外之陽陰陽平補俾微邪去而癰自開矣。

黃芪桂枝五物湯

黃芪

三兩

芍藥

三兩

桂枝

三兩

生薑

六兩

大棗

十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服  
虛勞

夫男子平人脈大爲勞極虛亦爲勞

此概言男子虛勞之脉也謂男子無外感六淫之病而爲平人勞者由勞傷氣血內損所致之病然勞有氣血之辨若偏勞於氣則元氣不攝氣亂化火而脈大或勞營血故脈大虛而極虛矣然脈大與之曰言陰陽氣血虛之兩大法門後出孔遲

動微緊脈是互五臟氣血虛實寒熱之謂也。男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也。此觀氣色而互脉證也。色乃神之旗營衛之標。若面色薄者是白而嬌嫩無神乃氣虛不統營血於面也。然陰血虛而陽氣則盛虛火上僭津液不充則渴氣傷而不攝血則亡血虛陽上逆衝肺卒喘心營虛而真氣不歛則悸血虛則脉浮矣由臟腑精血不足所致故爲裏虛。

男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼渴少腹滿此爲勞使之然

此虛勞偏於陰也。虛勞之脉，毋論浮沈遲數，必現虛而無力。故冠虛字爲首，下出芤，遲動微緊，乃以心肺肝脾腎陰陽寒熱之分耳。然血虛則脈虛，氣變化火熱收於內，則脉沈弦，是屬陰虛，而兼以陰血虛而言之。謂脉虛沈弦也。陰火內鬱，外無寒熱，但逆上衝而刑肺金，則短氣。衝脉受傷，則裏急，然衝脉逆，則膀胱氣化亦逆，故小便不利，營氣不充，面色白而無神矣。肝腎虛，火陷於內，故目瞑，目瞑者，乃內火熾旺而羞外明，上蒸清道，血熱妄行，則動肝腎虛，而元陽亦損，腎樞不得開闊，故小腹滿。

此皆勞精氣所致爲勞使之然  
勞之爲病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精  
自出瘦削不能行

第一條脉大爲勞，槩言虛也。此加浮字，加陰虛。  
陽燔之脉也。蓋手心勞宮穴屬心包絡經相火所  
司。足心湧泉穴屬足少陰腎經而腎爲精血之主。  
若勞之爲病，精血必虛，陰精虛而心相燔盛，故脉  
浮大。火熱臨脾，浮越四肢，則手足煩在於春夏木。  
火熾旺金水衰而不能制火，值天盛陽助吾身陽  
陽氣愈盛，故病劇。秋冬金木相生，陰長陽消，值天

卷之二  
盛陰助吾身陰陰盛制陽病故瘥也。陰虛者龍雷之火浮越於上而無攝陰之能反爲擾陰之害。上熱下虛陰精不交自洩所謂陰寒精自出實非真寒爲病骨髓虛憊則瘦削不能行矣。

男子脈浮弱而濶爲無子精氣清冷

此以脉斷無子也。男精女血盛而成胎然精盛脉亦當盛若浮弱而濶者浮乃陰虛弱爲真陽不足濶爲精衰陰陽精氣皆爲不足故爲精氣清冷則知不能成胎謂無子也。蓋有生而不育者亦是精氣清冷所致乏嗣者可不知之而守養精氣者乎。

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲爲清穀臥血失精脉得諸芤動微累男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

此營衛陰陽不足虛勞脉證以從中氣而治也勞傷心氣火浮不歛則爲心腎不交上熱下寒火不攝水精孤於下不交自洩故病失精或精虛心相內浮擾精而出亦成夢交然陽泛於上陰氣下凝少腹弦急而陰頭寒相火內動於肝則目眩木虛火盛則頭髮落營虛不充於脉故脉極虛而芤此勞於精血所致也若勞陽虛脉則遲矣然臥血失

精是有心相三火之別。若傷心陽不振而失精者，其脉必遲。或真陽不充，脾胃氣弱，則脈遲而便清穀矣。丸動微緊者，乃以陰陽氣血虛實之偏而總言也。但丸動偏損於陰虛，陰虛則陽盛，微緊偏損於陽虛。陽虛則陰盛，故陰虛者心相火盛，神明不安而失精；夢交陽虛者，心相氣衰，神不收持，亦爲失精；夢交此槩言男子失精，女子夢交者而有傷心傷腎之分也。設非調營衛而生精，血何以填補虛勞之體？故用桂枝湯調營衛而生精，血加龍骨、鎮心安神，而攝腎水以牡蠣養腎濟精，而制心火。

俾心腎相交則陰虛者得補陽虛者得欵失精夢交庶可得瘳若中焦陽虛不攝而失精者或以天雄散主之可也

桂枝加龍骨牡蠣湯

小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白微附子各三分故曰二加湯

桂枝

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

龍骨

三兩

牡蠣

三兩

右七味以水七升煮取三升分溫三服

天雄散

天雄

三兩

白术

八兩

桂枝

六兩

龍骨

三兩

右四味杵爲散酒服半錢七日三服不知稍增之  
男子平人脉虛弱細微者喜盜汗也

此明陰陽虛而皆致盜汗也。男子平人脉見虛弱  
細微者外雖無病內之營衛氣血必虛而脉虛者  
營虛也。營虛夜臥則衛入於陰擾亂陰血反越於  
外故盜汗出也。弱主陽衰虛陽陷入陰中陰陽相  
搏皮毛失護陰不內守則盜汗也。細爲氣血皆虛  
血虛陽陷氣虛不歛陰竄不守故盜汗也。微爲陽  
弱陽虛不攝虛陽擾動於陰陰不內守故盜汗也。  
此槩言四脉推及陰虛而陽亦虛故盜汗出非止。

陰虛之一端耳

人年五六十其病脈大者，痺挾背行，若腸鳴、馬刀、挾  
瘻者皆爲勞得之。

此因陰虛而陽氣痺也。經云：年五十體重，耳目不  
聰明。年六十陰痺，氣大衰。此謂人年五六十，脈大  
者，乃營衛皆衰，更益過節。勞頓則精血不足，而  
衛不獨行。虛陽上浮，則脉大，營衛不充於經，發相  
循，背裏屬少陰，精血所流，而陽氣不升於背陰，精  
亦不注於脊，以致氣血兩痺，必成背寒，背痛，背瘻。

之類也。若勞足太陰陽明，腸胃真氣不充，則爲腸鳴。或勞少陽厥陰，氣變化火，陰血滯滯，則爲馬刀，俠癰，卽癰瘡之類。此皆勞傷營衛所致，爲勞得之。脈沈小遲，名脫氣。其人疾行，則喘喝。當作急字手足逆寒，腹滿甚，則溏泄，食不消化也。

此勞脾腎之陽爲病也。眞陽衰憊，所以脉沈小遲，陽虛則氣亦虛，故名脫氣。蓋陽根於腎，而陰盛陽虛，不能歸納腎間，所以並入行則擾動虛陽，上浮而喘急。陽虛則脾胃四肢不溫，故手足逆寒，脾失健運，腹滿溏泄，而食不消化也。

脈弦而大弦則爲減，大則爲芤。減則爲寒，芤則爲虛。虛寒相搏，此名爲革。婦人則半產漏下，男子則臥血失精。

此以革脉發明木盛胃虛失血也。寸口主肺，肺主金，氣虛則木盛。木盛則脉弦而虛，則火旺。火旺則脈大，但弦屬陰，木氣盛，木勝則胃陽氣減。謂弦則爲減，大屬陽火盛而陰血虛，謂大則爲芤。然胃氣虛而爲減氣減，所以爲寒。斯非真寒，卽狂陽不治之謂也。失血脉芤，謂芤則爲虛，然以芤虛弦減合而言之，爲虛寒相搏，名之曰革。革者，如按鼓皮乃取

全圖經卷第十一  
改革不常之義。是主木火盛而胃氣虛。然木盛胃虛。不能統血於諸經。故在婦人得之爲中虛。不能攝血。廢胎則主半產漏下。男子得之爲土虛。不能攝血。攝精則主少血失精也。

虛勞裏急。悸。腹中痛。夢失精。四肢瘦疼。手足煩熱。  
呻乾口燥。小建中湯主之。

此營衛兩濟之方也。虛勞病非傷先天陰陽。卽傷後天營衛。若傷後天中氣。則營衛不充。於五臟。臟腑無賴。精血漸衰。則臟腑各自爲病。顯證百出也。因營血不灌於衝脉。則逆氣裏急。腎陰不能既濟。

心包火氣內動則悸。肝脾不和則腹中痛。相火妄動擾於陰中則夢失精。營氣不充於四肢則四肢痠疼。手足煩熱。胃津不輸於上則咽乾口燥。此因中氣不充故顯。以上諸證所以建中湯之桂枝。行陽芍藥收陰。一陰一陽和調營衛以甘草膠飴。一陰一陽補和營衛。薑棗一陰一陽宣通營衛。俾營衛冲和灑灌臟腑而臟腑受濟則諸虛恢復也。蓋營衛陰陽兩建之方欲補其血則加歸芍之類。欲補其氣則加參芪甘术之類。欲補其陰則加地黃知柏之類。欲補其陽則加桂附之類。以此類推。

變化無窮矣

小建中湯

桂枝

三兩  
去皮

甘草

三兩  
炙

大棗

十二枚

芍藥

六兩

生薑

三兩

膠飴

一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

附錄千金用小建中湯方註證以見此方之妙

于金瘡男女積冷氣滯或大病後不復常苦四肢沈重骨肉痠疼吸吸少氣行動喘乏胸滿氣急腹背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無滋味脇肋腹脹頭重不舉多臥少起甚者積年輕者百日漸致瘦弱五臟氣竭則難可復常六脈俱不足虛寒之氣少腹拘急羸瘠百病名曰黃芪建中

湯又有人  
參二兩

虛勞裏急諸不足黃芪建中湯主之

此胃中營衛不濟於五臟現證也雖云諸不足觀其立方之意誠偏肺腎氣虛損所致脾胃氣弱不生於肺氣反上逆而爲裏急故以建中湯加黃芪甘味之藥調之俾脾元健運營衛溉灌於肺裏氣不急諸虛自富也若痰氣阻遏短氣胸滿加生薑宣潤胸中之氣腹滿者加茯苓導濕下行肺虛痰氣壅逆者加半夏滌痰鎮逆而五臟見證以此加減出入則神妙在我或火氣內鬱暫除桂枝可

也。

黃芪建中湯

於小建中湯內加黃芪一兩半。○氣短胸滿者加生薑。腹滿者去棗。加茯苓一兩半。及療肺虛損不足補氣。加半夏三兩。

虛勞腰痛少腹拘急。小便不利者。八味腎氣丸主之。

方見婦人  
雜病中

此勞腎中真陽之方也。腎氣受傷。精氣痺着。不宣。腰痛而少腹拘急。陰陽鬱鬱。開闔之機不轉。則小便不利。故用六味丸滋起真陰。桂附壯火通陽。陰

陽相和開闔有權。腎經諸病悉愈。  
虛勞諸不足風氣百疾。薯蕷丸主之。

此治肝虛致病之方也。諸不足者。因肝臟血虛。木盛。生風乘吸。胃中津液。以致營衛不生。五臟皆虛。故爲諸不足風氣百疾。所以四君四物。平補肝脾。氣血。麥冬。阿膠。以養肺腎之陰。兼驅伏風。薑棗宣行。管衛。桔梗。杏仁。開提肺鬱。使治節有權。則風木得平。桂枝防風。行陽化鬱。使肝氣上升而不凌土。以神麴去濕。健脾開鬱。白芍引肺藥補肺而生腎。水豆黃卷引脾藥補脾而生營。柴胡升發少陽。

之氣而爲轉運之樞。薯蕷獨多者，肝虛用甘味之藥培土濟肝之義也。

薯蕷丸

薯蕷	三十	人參	七分	白术	六分	茯苓	五分
甘草	二分	當歸	十分	乾地黃	十分	芍藥	六分
芎藭	六分	麥冬	六分	阿膠	七分	乾薑	三分
大棗	百枚 <small>爲膏</small>	桔梗	五分	杏仁	六分	桂枝	十分
防風	六分	神麪	十分	豆黃卷	十分	柴胡	五分
白欵	二分						

右二十一味末之煉蜜和丸，如彈子大，空腹酒服。

一丸百丸爲劑

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之。  
此勞心受病之方也。勞傷心血虛氣不欽。木火氣壅。所以虛煩然心虛則胃土無賴。陽明之氣上逆。故不得眠。所以芎藭疏肝而通心氣。茯苓宣導心胃虛氣下行。以棗仁和肝安神。甘草以瀉心家虛火。知母保肺生水而制火煩也。

酸棗湯

酸棗仁二升

甘草一兩

知母二兩

茯苓二兩

芎藭一兩

右五味以水八升煮棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡營衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑綏中補虛大黃䗪蟲丸主之

此諸傷積血爲病也諸傷臟腑則真氣不能統血於周身營血廻着而不行於經絡瘀積不散內有乾血以致形體虛極羸瘦腹滿不能飲食外顯肌膚甲錯兩目黯黑故用四蟲大黃桃仁乾漆破血行瘀峻攻其血芩杏甘草涼順肺氣以使通調而

活癥着芍藥地黃收養陰血俾正氣實而瘀血得去飲食自進則氣血自復故爲緩中補虛此因乾血而設非虛勞常用之方也

大黃䗪蟲丸

大黃十分

蒸

黃芩二兩

甘草三兩

桃仁一升

杏仁一升

芍藥四兩

乾地黃十兩

乾漆一兩

䗪蟲一升

水蛭百枚

蟻一升

䗪蟲半升

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三服

論曰世知房慾所傷爲虛勞補腎爲耑門殊不知

靈素金匱有七情勞傷五臟六腑而無外邪乃爲虛勞也經曰心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破脣脫肉脾憂愁不解則傷意意傷則恍亂四肢不舉肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂皮革焦腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰膝不可以俛仰屈伸恐懼而不解則傷精精傷則骨瘦痿厥精時自下是情志內傷神思氣血爲病也又謂是以夜行喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎於骨然五臟所傷之氣則一故

喘病屬氣此先傷其氣而後致陰血漸虧也又謂飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾其因雖異致傷津液則一而汗屬陰精先傷精津血液而後傷於氣二者當分陰陽而治也難經謂一損損於毛皮聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於床從上下者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚毛落者死

謂損其肺者益其氣、損其心者調其營衛、損其脾者調其飲食適其寒溫、損其肝者緩其中、損其腎者益其精此立五臟致傷現證並治法之大綱仲景補其脈而述其證謂男子平人脉大極虛者沈弦浮弱而大者芤遲動微緊者沈小遲者弦而大者皆爲虛勞之脉但有營衛陰陽寒熱之分證有面色薄主渴亾血喘悸者無寒熱短氣裏急小便不利面白目瞑兼衄少腹滿者手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出瘦削不能行者精氣清冷而無子者失精少腹弦急陰頭寒目眩髮落清穀亾血

盜汗者。痺。俠。背。行。腸。鳴。馬。刀。俠。癰。者。脫。氣。疾。行。喘。  
急。手。足。厥。寒。腹。滿。泄。食。不。消。化。者。此。皆。勞。傷。臟。  
腑。營。衛。氣。血。陰。陽。偏。勝。之。證。也。然。虛。勞。病。乃。無。邪。  
可。除。無。病。可。療。惟。有。調。和。營。衛。陰。陽。爲。主。仲。景。每。  
於。後。天。中。氣。而。爲。營。衛。氣。血。之。源。調。養。營。衛。以。生。  
精。氣。血。液。充。溢。臟。腑。爲。復。虛。勞。諸。證。之。良。法。故。裏。  
急。悸。彌。腹。痛。失。精。四。肢。瘦。疼。手。足。煩。熱。咽。乾。目。燥。  
以。小。建。中。湯。爲。治。虛。勞。之。總。持。治。失。精。夢。交。羽。桂。  
枝。湯。入。龍。骨。牡。蠣。是。開。後。學。之。加。減。法。也。有。不。因。  
中。氣。而。自。傷。本。臟。致。病。者。則。以。心。肝。脾。肺。腎。各。立。

一方見肺虛不生腎水而逆氣裏急卽以土金相  
生之製名曰黃芪建中是偏補於氣也肝氣盛而  
化爲風氣百疾用甘藥相和木土之製故立薯蕷  
丸若腎中陽虛腰痛少腹拘急小便不利以陰陽  
升降開闢機關而製八味丸若心勞虛煩不得眠  
則以酸棗湯疏滯而育神以上爲治虛勞曲盡之  
法也有五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食內有乾血  
瘀積不行而極虛之中反見大實之證庸流於此  
目眩心迷喜補畏攻使病愈篤不至於死則不休  
也仲景開大法門故立大黃䗪蟲丸峻藥緩圖死

裏求生之方而治死裏求生之病、每日三服、陸續漸除、俾痰積去而虛勞庶幾可復、但後人惟知補虛、未窺其至聖至妙之理也、蓋論中失血麻證雖多、不言失血而致咳嗽、此乃陰虛極證、當治其本、不必言標、故不論及、設以前之方論、泰治虛勞一證、思過半矣。

### 附方

千金翼灸甘草湯、治虛勞不足、汗出而闌脈結悸、行動如常不出百日、危急者十一日死、此心勞以心腎爲關鍵、故心陰之虛則心火盛、

熱。收。於。內。火。熱。內。蒸。心。液。外。越。則。汗。出。心。液。少。而。  
氣。不。舒。則。汗。出。而。悶。心。血。不。足。則。脈。道。滯。滯。結。而。  
悸。也。蓋。心。爲。君。主。而。屬。陽。狂。陽。未。息。以。故。行。動。如。  
常。欲。知。死。期。必。至。火。氣。休。囚。木。旺。之。鄉。故。斷。百。日。  
而。危。急。者。卽。不。應。期。當。在。水。旺。火。絕。之。日。日。十。  
日。死。方。用。灸。甘。草。湯。救。其。始。萌。之。初。希。圖。萬。一。是。  
以。桂。甘。通。理。中。氣。而。行。營。衛。薑。棗。宣。通。上。焦。之。陽。  
人。參。補。心。之。正。麥。冬。地。黃。清。心。生。血。以。阿。膠。善。保。  
肺。腎。之。陰。麻。仁。入。脾。養。血。而。潤。燥。以。灸。甘。草。爲。君。  
者。乃。甘。平。補。脾。中。和。之。品。萬。物。以。土。爲。稼。穡。乃。生。

長之司故耳

甘草

四兩  
炙

桂枝

三兩

生薑

三兩

麥冬

半升

麻仁

半升

人參

二兩

阿膠

二兩

大棗

三十枚

生地黃

一觔

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫服一升日三服

肘後獺肝散治冷勞又主鬼疰一門相染  
蓋勞無不熱此冷者卽無陽之謂也要知非傷營衛精血乃傷肝中陽氣而肝爲火之母肝膽相爲表裏爲一陽生發之源夫一陽生則諸臟之陽皆

生若肝胆之陽滅則諸臟之陽亦滅此傷肝臟溫和生發之氣則心肺腎諸臟不溫經云逆春氣則少陽不生肝氣內變之義也病必心神恍惚夜臥多驚不思飲食食不消化謂之冷勞但治病必求其本而獺爲陰獸其肝應月而增減乃得天地陰陽進退之正獺肉皆寒惟肝性溫故以獸所之溫而補人肝溫氣之本是非桂附大熱而補心相之標是欲肝得其溫則火源漸長諸陽齊起冷勞可愈矣治鬼疰一門相染者蓋鬼卽人之魂而離體則爲鬼是屬陰邪而肝主藏魄鬼邪侵襲於肝

使人魂不得歸室故爲鬼疰冤業情思不散尸氣相傳同氣受邪連綿不絕謂一門相染所以獫肝性溫陰中陽物獨補人肝之陽陽能勝陰而肝得其補舍氣充盈陽長陰消故亦治也

獫肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

王仲景金匱要略卷六

禁

虛勞

張仲景金匱要略卷七

構李沈明宗目南甫編註

肺痿

問曰、熱在上焦者因欬爲肺痿、肺痿之病從何得之、  
師曰、或從汗出、或從嘔吐、或從消渴、小便利數、或從  
便難、又被快藥下利重、人津液故得之、曰寸口脉數、  
其人欬口中反有濁唾涎沫者何、師曰爲肺痿之病、  
若口中辟辟燥欬卽胸中隱隱痛、脉反滑數者此爲  
肺癰、欬唾膿血、脉數虛者爲肺痿、數實者爲肺癰、  
此肺痿肺癰之辨也、心肺居上、腎水不足、心火刑

金爲熱在上焦肺陰日消氣逆則咳故致肺痿然本經明其始病之因或從病後陰虛過汗傷液虛吐傷津消渴血虛津竭或利小便數而傷陰或便難反被快藥下利而重亡津液以致肺津枯燥虛熱薰蒸故寸口脉數其人欬嗽氣弱不振津液不佈化爲濁唾涎沫而成肺痿若口中辟辟燥欬卽胸中隱隱痛者乃風寒侵入肺中凝滯營血爲癰故脉滑數而咳唾膿血然無形虛熱致痿故脉數虛有形氣血凝滯成癰而脉數實此明肺癰屬實肺痿屬虛也

肺癆吐涎沫而不渴者，其人不渴必遺尿，小便數所以然者，以上虛不能制下故也。此爲肺中冷必眩，多涎唾，甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者，屬消渴。

此肺寒致癆也。前傷津液虛熱成癆，乃肺癆之常。此肺氣虛寒癆之變也。經云上焦開發宣五穀味，充身澤毛。若霧露之漑，是胃中營衛之氣相蒸於上焦而成宗氣，溫養於肺，散佈津液而爲常度。此胃虛則營衛衰弱，宗氣虛微，上焦不溫，津液不佈，聚化爲沫，則吐涎沫，內無火氣動肺，不爍津液，故不渴而不渴也。遺尿小便數者，因肺之上源虛而

不能制下肺冷痰弱之故也。肺冷則腎陰上逆，必眩而多涎唾。方用甘草乾薑溫補肺胃之氣，肺氣得溫則津液佈而涎沫不聚，痰自愈矣。若服甘草乾薑湯已渴者屬熱痰，又非肺寒之比。因涎多，聚溢胸中而制燥熱，故不渴實熱內伏而服乾薑湯，助起肺胃之熱，遂作渴，故屬消渴也。

甘草乾薑湯

甘草

四兩  
炙

乾薑

二兩  
炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服。論曰：經謂有所失，亾所求不得，則發肺鳴。鳴則肺

熟藥焦皮毛。虛急者，則生痿躯者是也。  
患慮傷肺火盛水虧，所以局方發汗有瀉南方補  
北方之治。本經寸口脉數，其人欬口中反有濁唾。  
涎沫者，乃從汗出，嘔吐消渴小便利數，大便難而  
重。从津液過傷肺與大腸氣血所致，與內經不同。  
又吐涎沫而不渴，其人不欬必遺尿，小便數上虛  
不能制下，爲肺中冷必眩，多涎唾以甘草乾薑湯、  
溫肺起痿經所不載，仲景創補之矣。但治熟痿之  
方遺失無傳，余以內經治痿獨取陽明調和營衛、  
滋陰清熱潤燥或溫中益虛顯然有據諒不罪予。

僭妄宋人遷入外臺于金等方亦調陽明之意謬證參酌用之

附方

外臺灸甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液波者

方身  
虛勞

肺熱別痿弱不振通調失職聚液成涎故涎唾多而溫溫液波卽泛泛惡心之意也然肺之痿熱必從胃虛或濕熱傷肺而致故經謂治痿獨取陽明但或瀉或補隨其所宜所以灸甘草湯補調脾胃生津益肺俾土金相生涎沫止而痿自愈矣

于金生薑甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽喉不渴

生薑甘草湯卽炙甘草湯之變方也。甘草人參大棗扶脾胃而生津液，以生薑辛潤宣行滯氣，俾胃中津液溉灌於肺，則澤潤回枯，不致肺熱耗葉，焦爲治肺痿之良法也。

生薑

五兩

人參

三兩

甘草

四兩

大棗

十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

于金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫用桂枝湯嫌芍藥酸收，故去之加皂莢利涎通竅

不令涎沫壅遏肺氣而致喘痽。桂枝和調營衛，俾營衛宣行，則肺氣振而涎沫止矣。

桂枝

三兩

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十枚

皂莢

子一枚去皮焦

右五味以水七升微微火煮取三升分溫三服

肺癰

問曰：病欬逆豚之，何以知此爲肺癰？當有膿血吐之，則死。其脉何類？師曰：寸口脉微而數，微則爲風，數則爲熱。微則寸出，數則惡寒。風中於衛，呼氣不入，熱過於營，吸氣不出。風寒客於肺，則發為癰。

則。歎。口。乾。喘。滿。咽。燥。不。渴。多。唾。濁。沫。時。時。振。寒。熱。之。  
所。遇。血。爲。之。凝。滯。畜。結。癰。膿。吐。如。米。粥。始。萌。可。救。膿。  
成。則。死。

此風入肺之營分成癰。辨已成未成之脉也。前言。  
滑數爲癰成之脉。此寸口脉微而數。是風邪傷肺。  
未成癰膿之脉也。脉微乃肺虛受風。曰微。則爲風。  
邪化爲火。曰數。則爲熱。蓋風性輕揚能開腠理表。  
虛受風而自汗爲微。則汗出風熱在肺外應皮毛。  
而惡寒。卽惡風之互辭也。但呼出心肺衛氣。之。  
肺受外邪阻遏衛氣則呼氣不入吸入腎肝營血。

所司邪傳血分爲熱過於營營氣壅塞吸而不出風傷皮毛浸淫營血爲熱傷血脉卽傷肺之血脉也風舍於肺邪正搏擊氣亂於胸其人卽欬熱鬱胸中所以口乾喘滿涎沫制燥以故咽燥不渴肺津化而爲涎則多唾濁沫肺氣應於皮毛時時振寒熱之所過於營凝滯爲癰成膿吐如米粥若始萌急瀉其肺則可圖救遷延至於肺葉腐敗膿成則死

肺雖喘不得臥葶苈大棗瀉肺湯主之此治標之方也風中於衛血氣壅逆呼氣不入則

喘。不得。臥。因循。日久。必致肺葉腐敗。吐膿而死。故用。葶藶。急瀉肺實之壅。俾氣血得利。不致腐潰。吐膿。且以大棗先固脾胃之元。其方雖峻。不妨用之耳。

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶熬令黃色搗九如彈子大

大棗十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服

欬而胸滿振寒。脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者爲肺癰。桔梗湯主之。

此癰成而出方也。風舍於肺，欬而胸滿，振寒內氣，挾風化熱，而脉數然。肺氣壅逆，津液化爲濁唾，而制胸鬲之燥咽乾，不渴時出濁唾，腥臭者明是肺爲腥臭，是熱過於營吸，而不岀氣血凝結已成癰。膿之兆若緩時日，肺葉腐敗，吐膿則死，故用桔梗開提壅逆，而破血結。甘草清熱解毒，以和中氣，使胸肺之邪從吐而出，肺葉不致腐敗，故方後云再服，則吐膿血也。

桔梗湯

亦主血癰

桔梗

一兩

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

論曰汗出惡寒呼氣不入吸氣不出口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒吐如米粥若此者癰膿已成治之遲矣仲景欲人見微知著始見日中辟辟燥欬胸中隱隱而痛之時卽以肺癰治之則免吐膿而死故示葶藶大棗之峻桔梗湯之緩一峻一緩爲訓意在開提肺氣不使成癰而爲切務若以泛常欬嗽而施順氣消痰迂緩日深必致吐膿而死

附方

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶苈大棗湯主之三日一劑可至三四劑此先服小青龍湯一劑乃進

前條肺癰喘不得臥仲景用此湯瀉實補虛此肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞邪居衛分而營分少壅逆不宣故先服小青龍湯以散表裏氣分之邪繼以葶苈專瀉肺中氣血之結俾衛邪已散而營邪亦從衛出則癰膿消散諸證自平矣

千金葦莖湯治欬有微熱煩滿胸中甲錯是爲肺癰  
欬有微熱煩滿邪在氣分而帶表證胸中甲錯則  
熱過於營矣故用葦莖體質輕浮其味甘寒能解  
在表之熱桃仁以破血壅薏苡補肺而滲利痰濕  
瓜瓣其形象肺入肺而清肺熱能吐敗濁之瘀故  
方後云再服當吐如膿卽去舊生新之意也

葦莖二升 薏苡仁半升 桃仁五十粒 瓜瓣半升  
右四味以水一斗先煮葦莖得五升去滓內諸藥  
煮取二升服一升再服當吐如膿  
煮取二升服一升再服當吐如膿

青臺桔梗白散治欬而胸滿、振寒、脈數、咽乾不渴、時出濁唾腥臭、久久吐膿如米粥者爲肺癰。欬而胸滿、振寒時出濁唾腥臭、內膿已成若以緩圖勢必吐膿故以桔梗開提肺氣貝母清熱而化痰涎巴霜峻猛熱劑急破其癰驅膿下出病在膈上則一吐盡除而胸中肺氣曠若太虛膿雖已成尚或圖救乃逆流挽舟之治也蓋觀方後云病在膈下瀉出者豈有肺癰在於膈下之理是對腸癰膿毒亦可用此方而言也

桔梗

三分

貝母

三分

巴豆

一分去皮  
熬研如脂

右三昧爲散強人飲服半錢七羸者減之病在膈  
上者吐膿在膈下者瀉出若下多不止飲冷水一  
盃則定

欬嗽上氣爲肺脹

上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

此見肺癱當有肺脹之辨也邪傷於衛後入於營  
而爲肺癱此風傷於衛內挾痰涎壅逆肺氣上逆  
奔迫故喘而躁是爲肺脹然有肺氣壅逆不得通  
調水道水卽泛濫皮膚故曰欲作風水治宜發汗  
驅風從表而出水卽下滲卽下條小青龍之證也

肺脹欬而上氣煩躁而喘肺浮者心下有水小青龍  
加石膏湯主之

此互土條肺脹治法也風寒之邪入於營衛挾痰  
上逆則欬而上氣煩躁而喘肺氣壅逆謂之肺脹  
卽肺癰未成之初也此氣分邪多故脉見浮然氣  
逆則津液化爲痰飲而痰飲乃屬陰邪內積胸膈  
爲心下有水當用小青龍滌飲散表此風多寒少  
表裏相半故加石膏以清風化之熱

小青龍加石膏湯

子金證治同外更  
加膈下痛引缺盆

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

乾薑

甘草

各三兩

五味

半升

半夏

半升

石膏

二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取  
三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四合  
欬而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越  
婢加半夏湯主之

此風寒多而痰飲少之方也邪氣壅逆於肺欬而  
上氣其人喘也胸中鬱之極故目如脫狀脈浮  
大者風多痰少表盛所致故用越婢湯驅散表邪  
加半夏一味消痰下逆足矣

越婢加半夏湯

大棗十五枚

石膏半兩

生薑三兩

大棗十五枚

甘草二兩

半夏半升

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取  
三升分溫三服

欬而上氣喫中水雞聲射干麻黃湯主之

此寒風束肺之方也寒風壅閉肺氣而不下達則  
欬而上氣津液不佈化爲痰涎帶礙呼吸之氣不  
利痰隨外邪上吸往來有聲喫如水雞聲也然肺  
氣既壅恐其熱過於營將成肺癰故用射干而通  
咽閉麻黃開發肺實之邪細辛紫菀欬冬溫散爲

助半夏化痰而下逆氣、五味以收肺氣之正、葛根宣通營衛、俾邪散則肺不成癰矣。

射干麻黃湯

射干十三枚一  
法三兩

生薑四兩

細辛

三兩

紫苑三兩

款冬花二兩

五味

半升

大棗七枚

半夏半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內

諸藥煮取三升分溫三服

欬逆上氣時時睡濶但坐不得眠皂莢丸主之

此風邪致痰之病也風邪壅逆肺氣上而不下則

欬逆上氣津液不佈化爲痰涎而時時唾濁痰壅  
氣滯但坐不得眠矣設遷延時日熟過於管膿成  
則死此風邪驟至之病而無積飲相挾故以皂莢  
一味能開諸竅而驅風痰最疾服三丸者是取峻  
藥緩散之意也

皂莢丸

皂莢

八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日  
三夜一服

欬而脈浮者厚朴麻黃湯王之欬而脈沈者澤漆湯

主之

麻沈之條當入肺癰因原文不便分割共列於此也

此以脉之浮沈而分肺之營衛受病也。欬而脈浮風邪在衛卽肺脹之類其病尚淺當使邪從表出故以厚朴杏仁下泄胸中氣實麻黃開腠驅邪石膏以清風化之熱辛半乾薑兼驅客寒而滌痰飲五味收肺之逆小麥以調脾胃也。脈沈者邪入血分而深卽熱過於營勢必成癰吐膿故用桂枝薑草宣通營衛人參以養正氣黃芩能降風熱之標半夏滌痰以降逆氣澤漆破血結開壅而下水紫苑同白前辛潤開結而下氣止欬也。

厚朴麻黃湯

厚朴

五兩

麻黃

四兩

石膏

如鴉子大

杏仁

半升

半夏

半升

乾薑

二兩

細辛

二兩

小麥

一升

五味子

半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥、  
煮取三升溫服一升日三服

澤漆湯

半夏

半升

紫參

五兩一

澤漆

三觔以東流木

五斗者取

一斗五升

甘草

生薑

五兩

白前

五兩

黃芩

人參

桂枝

各三

右九味㕮咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至

夜盡

上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又卯初尤甚此言肺死脉證也上氣面浮腫肩息乃風寒壅逆於肺邪實正虛氣上不下肺氣絕而正欲亡脫故脉浮大氣已散而離根故不治夫然則肺陰從下脫所以尤甚

火逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之此陰火上逆也真陰之虛陰火上逆刑金爲火逆上氣咽喉不利惟當壯水之主以鎮陽光曰此逆下氣故用麥冬人參甘米大棗滋培後天胃氣以

生肺金卽生陰水而降火邪惟以半夏滌痰下逆  
余竊擬爲肺痿之主方也

麥門冬湯

麥門冬七升 半夏一升

人參二兩

甘草二兩 檀米三合

大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升分三  
夜一服

論曰詳金匱欬嗽病本於肺則一大綱有三一者  
虛熱刑金氣弱不振欬而唾沫爲肺痿二者風  
衛分則病欬上氣喘爲肺脹三者邪傳營而經

不行爲肺癰。然肺脹之中，又分風寒表裏痰多風少。風多痰少之治，故氣喘而躁，脉浮者爲心下有水，欲作風水，當以小青龍兩解表裏，加石膏以清風熱之多，目如脫狀乃風寒多而痰少，以越婢粟風加半夏而下痰逆風寒外束火熱內鬱，喉中水雞聲者，射干麻黃湯宣通表裏之邪，風熱壅逆津液不佈化而爲涎，時時唾濁，但坐不得眠者，皂莢丸以驅風鬱之涎，若欬而脉沉，邪入於營，將成肺癰，麻黃湯俾從表解散而脉浮邪居肺氣以厚朴，以澤漆而破壅結，火逆上氣咽喉不利是外邪。

治當麥門冬湯清潤滋降若見浮腫肩息脉浮大而下利真氣上浮下脫則爲不治以上皆外感之內飲合病微細之辨臨證又當合內經五臟六腑互相傳乘之欵則能盡善

張仲景金匱要略卷八

檇李沈明宗目南甫編註

奔猝

師曰病有奔猝有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之

此驚氣入心病有四變也但心虛受驚驚則氣亂神浮腎家舊積內動欲上陵心故爲奔猝然驚則氣散散則血不歸經滯雷肺胃凝結成癰蒸腐爲膿則病吐膿蓋驚邪入心神明失守狂妄不精而爲驚怖若燒針以治風熱傷衛之病火氣入心逼

迫心神狂亂煩躁故爲火邪然此四病皆從心虛驚觸氣亂所致謂驚發得之

師曰奔㹠病從少腹起上衝咽疾發乍欲死復還止皆從驚恐得之

此出奔㹠之證也狀如泣豚故爲奔㹠心氣虛而驚入神明不治上中二焦氣虛不復攔阻腎積之邪直闖陽位故從少腹起上衝咽疾氣逆神昏所謂發作欲死然陰邪上而不能久居陽分卽返於陰爲復還止此從驚氣傷心氣亂恐氣傷腎致積謂驚恐得之

奔。弛。氣。上。衝。胸。腹。痛。往。來。寒。熱。奔。弛。湯。主。之。

此風邪引動腎積也前乃腎中積寒直衝陽道而至咽喉此因肝膽風邪相引腎中積風乘脾故氣上衝胸而腹痛厥陰受風相應少陽則往來寒熱是以芎歸薑芍疏養厥陰少陽氣血之正而驅邪外出以生葛李根耑解表裏風熱而清奔弛逆之上之邪黃芩能清風化之熱半夏以和脾胃而化客痰俾兩經邪散木不臨脾而腎失其勢卽奔弛自退按奔弛雖屬腎病此仗風邪引動積風而發仲景引明非僅寒邪一端致病誠補素問之不足也

奔竚湯

甘草

二兩

芎藭

二兩

當歸

二兩

半夏

四兩

黃芩

二兩

生葛

五兩

芍藥

二兩

生薑

四兩

甘李根

白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一發汗後燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔竚氣從少腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之

此因風傷衛症燒鍼取汗而致奔竚也風寒在表燒鍼令汗散邪而汗則傷洩陽氣針處重受於寒則發核起而赤內氣虛而應接表邪入裏引動腎

積故氣從少腹上衝至心治當灸其核上以除新邪仍以桂枝湯解表加桂專伐腎積之邪耳

桂枝加桂湯

桂枝五兩

芍藥三兩

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓溫服一升發汗後臍下悸者欲作奔㹢茯苓桂枝甘草大棗湯主之

此汗虛陽氣而致奔㹢出方也發汗而傷心氣腎邪遂欲上陵則臍下悸欲作奔㹢方用甘棗坐鎮

中州以制賊邪。不得上陵心位。桂苓專伐腎陰。以水揚之。千遍爲甘瀉者。取其力軟和平。不爲腎邪之助。蓋後人治奔㹠。皆忌甘草。是不識仲景補脾制腎之妙義耳。

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓半觔

甘草二兩

大棗十五枚

桂枝四兩

右四味。以甘瀉水一斗。先煮茯苓減二升。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。甘瀉水取水二斗置大盆。以杓

揚之。水上珠子五六千顆。相逐。遂取用之。

論曰。難經謂腎積發於少腹。上至心下。如豚狀。名

爲責豚上下無時久不已令人歎逆骨痿少氣以  
夏丙丁脾病傳腎腎當傳心心旺不受腎欲還脾  
脾不肯受所以畱積腎間衰者受邪而爲之本蓋  
脾病傳腎乃寒濕爲病若從肝病傳脾而來卽風  
濕爲病明矣金匱標本互舉謂驚恐得之誠補靈  
素之不足也然少腹起上衝咽喉發作欲死復還  
止乃明寒濕之邪爲本腹痛往來寒熱者謂風木  
受邪引動舊積之風而發也燒鍼令汗鍼處受寒  
引動舊寒所致臍下悸欲作責豚者過汗傷陽腎  
邪欲上陵心邪之淺也然標本風寒邪之新舊不

同故復論之

張仲景金匱要略卷八

終

張仲景金匱要略卷九

構李沈明宗目甫甫編託

胸痺

師曰夫脈當取太過不及陽微陰弦卽胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也

此胸痺陽虛陰盛而挾外邪也正氣微則陽脈微爲不及陰邪盛則陰脉弦爲太過陽氣微而客寒內侵以挾肝腎之陰上逆於胸痺着氣血不利而痛曰陽微陰弦卽胸痺而痛痺者閉也是經脉氣

直鬱閉而不通也。求其所以然者，責其上焦陽氣極虛下陰上逆謂胸痺心痛者，以其陰弦故也。

胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉澆而遲。當若字有一關上小繫數括萎薤白酒湯主之。

此寒邪痺胸而偏於肺以肺遲緊分虛實也。蓋胸中陽氣猶如杲日當空萬里無雲陽和通利候忽地氣上爲雲則太虛昏昧日月晦明而胸痺猶是者矣。但陰盛挾邪上逆胸中痺偏於肺則喘息欬唾胸背痛而短氣然陽虛則肺氣亦虛痺鬱胸中故寸口脉沈而遲乃言正氣虛寒之痺脉也。若中

上二焦陽氣未至虛極寒邪挾陰上逆邪正引搏而爲有餘則關上脉現小緊而數卽是寒實之證法當行陽散邪則胸痺得開非似沈遲虛寒而用附子回陽故用括蔞苦寒潤肺消痰而下逆氣雍白辛溫行陽散邪以白酒宣通營衛使肺通調則痺自開矣蓋此論當以寸口脉沈而遲爲虛寒之證關上小緊數括蔞薤白白酒湯爲寒實之證另作一節解否則豈有遲數二脉同見之理哉

括蔞薤白白酒湯

括蔞實一枚 薤白半觔 白酒七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺不得臥心痛徹背者括蕷薤白半夏湯主之此痺偏於心包與俞穴也痺邪偏侵心包氣逆不利則不得臥然心俞在背心包與俞相應故心痛徹背而上焦陽虛火不生土脾虛則津液化痰以前湯開痺加半夏而消痰飲也

括蕷薤白半夏湯

括蕷實

一枚搗

薤白

三兩

半夏

半升

白酒

一升

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心積實薤

白桂枝湯主之人參湯亦主之

蓋肺氣虛土扶濕邪於胸也經云風寒濕三氣令  
而爲溼原非一邪所致此上焦陽虛而中氣亦虛  
風乘於胃反挾濁濕上逆胸中以致心中痞滿爲  
濁氣結在胸肝氣挾風逆上故胸滿而脇下逆捨  
心所以桂枝薤白通陽而行營衛兼驅風邪外出  
活婁化痰而利氣枳實厚朴以下濁濕而開心下  
之痞但中州氣弱木必乘脾故用參木薑蕷溫補  
中土二焦之氣輔正驅邪胃陽升而厥陰退癥着  
自開所以人參湯亦主之

禹貢燮白桂枝湯

枳實

四枚

薤白

半觔

桂枝

一兩

厚朴

四兩

桔梗

一枚

右五味以水五升先煮枳朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

人參湯

人參

甘草

乾薑

白朮

各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

胸痺緩急者薏苡附子散主之

此寒濕痺於經絡卽寸口脉沈而遲虛寒之方也

胸中陽虛風寒濕陰之邪混合上逆癲着胸背經絡筋脉不和或緩或急而痛曰胸痺緩急所以附子補陽驅寒同意苡仁舒筋燥濕俾邪去則不緩急矣

薏苡附子散

薏苡

十五兩

大附子

十枚炮

右二味杵爲散服方寸匕日三服

心痛

心中病諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之。此屬陰上痺又互內經厥心痛之旨因風而出方。

也。上焦陽氣不治，風寒濕邪上逆，搏結於胸膈。得  
喘乳，則心中痞，當以行陽驅邪，開痞之治也。蓋諸  
通心懸病，乃發內經諸臟之邪，上逆於心內無痰。  
飲相挾，故不滿而竟空。痛爲諸逆心懸痛與痰飲  
搏結，聚滿之痛，迥殊。然厥心痛必因風寒挾引，臟  
腑之氣上逆而發此。但以風邪立方，所以桂枝生  
薑，青朴皆衛而驅邪外出，枳實下逆化痰而開痞。  
柔軟更宜心中痞，五臟厥逆諸痛共出一方，令人倣  
之，其效同治，莫爲聖法。

桂枝

三兩

生薑

三兩

枳實

五兩

右三味以水六升煮取三升分溫三服

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

此上焦陽虛受寒也邪感心包絡經氣應外俞則心痛徹背邪襲背俞氣從內走則背痛徹心俞臟相通內外之氣相引則心痛徹背背痛徹心故用烏頭薑椒味辛氣熱通陽散寒赤石脂入心養血鎮壓轉浮之氣而安中驅邪俾正氣復而邪散痛止然有風客背俞痛亦如是非盡屬寒臨證以脉辨之則的

烏頭赤石脂丸

烏頭一分

炮

蜀椒一兩

法二分

附子半兩

法一分

乾薑一兩

法一分

赤石脂一兩

法二分

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服

不知稍加增

附方

九痛丸治九種心痛

內經有五臟胃腑心痛並痰蟲食積卽爲九痛也、  
心痛之因非風卽寒故以乾薑附子驅寒壯陽吳  
茱萸龍降肝臟濁陰下行生狠牙善驅浮風以巴

豆驅逐痰蟲陳滯之積人參養正驅邪葢治中惡腹脹痛口不能言連年積冷流注心胸痛並冷氣上衝落馬墜車血疾等證者因其藥品氣血皆入補瀉攻伐皆備故也

附子

炮三兩

生狼牙

一兩

巴豆

一兩去皮心  
熬研如膏

乾薑

一兩

吳茱萸

一兩

人參

一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸○兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛並冷衝上氣落馬墜車血疾等證皆主之忌口如常法

短氣

胸痺、胸中氣塞短氣、茯苓杏仁甘草湯主之、橘枳生薑湯亦主之、

此痺、胸中之氣也、邪氣阻塞、胸膈肺氣不得往來、流利則胸中氣塞短氣、方用杏仁通調肺氣、以茯苓滲導飲濕下行、甘草和中、俾邪去、則痺開而氣不短矣、然胸痺乃胸中氣虛土濕寒濁陰氣以挾外邪上逆所致、故橘枳生薑善於散邪下濁、所以亦主之、

茯苓杏仁甘草湯

茯苓

三兩

杏仁

個五十

甘草

一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差更服

橘枳生薑湯

附後于金治胸痺胸中煩惱如滿  
噎塞習習如痒喉中燥澀唾沫

橘皮

一肋

枳實

三兩

生薑

半肋

右三味以水五升煮取二升分溫再服

平人無寒熱短氣不足以息者實也

此短氣當分虛實也但見胸痺心痛腹疼諸疾而無外熱表證謂之平人卽小邪中裏相挾痰食氣壅故短氣不足以息而爲實證若非胸痺外邪痰

食壅滯之因，卽是七情內損，短氣氣不歸源之虛勞難治證也。

論曰：脉取陰弦爲太過，陽微爲不及，乃陽微陰盛之邪爲本，所以寸口脉沈而遲，是陽虛受寒而爲虛證。或陽氣不至虛甚邪？正相搏則關上脉見小緊而數，乃爲寒實之脉矣。若寒癥於肺，則喘息欬唾，胸背痛而短氣，用括蔞薤白酒潤肺行陽，而治其實。若偏客於心，則不得臥而心痛徹背，或心氣滯而不行，脾濕生痰，以前湯加半夏消痰下逆，或風客脾胃相挾，濁濕上逆而癲，則心下痞，畱氣。

結在胸，以枳實薤白桂枝湯下逆開痞而驅風。挾肝氣上逆於胸，則胸滿脇下逆，捨心以人參理中湯溫胃養正。若挾腎寒，痺於心之脈絡，緩急而痛，用附子薏苡驅寒燥濕，而舒筋脉；或心下痞，諸逆心懸痛，而挾五臟厥心痛者，以桂枝生薑枳實，下逆而和營衛，驅風爲總法。若痺胸間，肺氣不得下，達用茯苓杏仁甘草橘枳生薑湯，宣順肺氣不行，或寒客直犯心包，而心痛徹背，背痛徹心，卽以烏頭赤石脂丸大熱補陽而散寒，然邪痺於胸，則一但有虛實風寒，五臟厥逆不同，當隨證而治，故分

胸、癰、心、痛、短、氣、諸、門、爲、要、領、也、

張仲景金匱要略卷九

終

張仲景金匱要略卷十

構李沈明宗目南南編訂

腹滿

趺陽脉微弦，法當腹滿，不滿者必便難，兩胠疼痛，此虛寒從下上也，當以溫藥服之。

此診趺陽而明腹滿之寒熱也。腹滿之病，其邪木季脾胃者多。若挾心相風火則成濕熱而爲實滿，挾腎寒反侮則爲虛滿矣。然脾與胃爲表裏，診趺陽胃脉，則能定其脾之虛實寒熱。但脉微者，是脾胃之陽微弦，乃肝邪乘於脾胃，腎寒相隨，肝氣

上逆卽厥寒生滿病之義故當溫藥服之或不滿者脉必弦數乃挾心相未乘脾胃與腎寒上逆不同本經氣滯故作便難兩胠疼痛又當涼利之治矣

寸口脉弦者卽脇下拘急而痛其人嗰嗰惡寒也此邪入厥陰陽證似陰也寸口脉弦肝家邪盛鬱於本經故脇下拘急而痛然厥陰氣不外達衛氣亦鬱於內皮毛自失護衛之氣所以嗰嗰惡寒卽內真熱而外假寒此厥陰經本病也

夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏

此肺經受寒現證也。經謂陰氣積於下，陽氣未盡，陽引而上，陰引而下。陰陽相引，故數欠也。此肺胃虛而受寒，陰盛相引，喜欠而清涕出，邪氣在表，以故發熱，因不涉肝風。主病而無色可徵，故色和善。嘔。

中寒，其人下利，以裏虛也。欲嘔不能，此人肚中寒，一云

此脾經受寒現證也。寒中太陰，陰寒濕盛，陽虛不固，其人下利，但通多不足，故爲裏虛。蓋陽和則嘔，而欲嘔不能，乃陰寒凝滯於裏，所以肚中痛也。

腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥

此虛寒腹滿之辨也陽氣或運如常滿則時減而陽虛終無恒期勝陰陰復勝陽則滿復如故不似實熱常滿減不足言之比是屬虛寒當以溫藥補陽散寒迺爲定法

病者痿黃燥而不渴胸中寒實而利不止者死

此脾陽氣虛猶如陰黃是也脾胃陽氣不足腎寒反侮於脾壅滯脾氣臟真散越於外故病痿黃即黯淡而黃也寒濕留中燥而不渴爲胸中寒實若中下二焦陽氣下脫則利不止故主死也

病者腹滿按之不痛屬虛者當可下之。若腹  
下者下之黃自去。

此以手按辨腹滿虛實也。按之不痛內無痰食燥  
屎壅滯卽知虛寒而滿當以溫藥。若按之痛乃以  
外手而就內結食痰燥屎則知內實是可下之。而  
又以舌黃驗定虛實。若舌有黃胎卽是濕熱內蒸。  
爲實未經下過必須下之。則黃自去而脹滿自除。  
舌無黃胎是近虛寒又非下法矣。

腹滿不減減不足言當須下之。宜大承氣湯方見差  
病中此實滿之方也。腹滿晝夜不減爲實時或難減亦

不足爲減。日減不足言。非似虛滿時減復如故也。  
然邪正氣實猶如兩國相持。終有一敗。惟恐正氣  
垂絕。故宜大承氣湯。峻滌其邪耳。

病腹滿發熱十日。脉浮而數。飲食如故。厚朴七物湯  
主之。

此有表證腹滿也。發熱十日之久。脉尚浮數。當責  
風邪在表。然風氣內通於肝。肝盛乘胃。故表見發  
熱。而內作腹滿。風能消穀。卽能食。而爲中風。所以  
飲食如故。用小承氣湯。滌腸胃之熱。桂甘薑棗調  
和營衛。而解在表之風耳。

厚朴七物湯

厚朴半觔

甘草三兩

大黃三兩

大棗十枚

枳實五枚

桂枝二兩

生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服○  
嘔者加半夏五合○下利去大黃○寒多者加生  
薑至半觔

論曰腹滿之病乃脾胃爲總司風木爲轉運之樞  
而木挾腎中陰寒臨土則寒濕而爲寒滿若挾心  
相而乘脾則濕熱所司是爲熱滿矣或木不乘土  
而脾濕自病病輕易治故本經以趺陽脉微弦爲

寒滿發熱十日脉浮數飲食如故而爲熱滿又以按之不痛爲虛痛者爲實時減復如故爲虛減不足以言爲實誠爲察病之兩大法門也

### 腹痛

痛而閉者厚朴三物湯主之

此以暴病閉者爲實而出方非久病之疾若痛屬虛寒陽虛不固則當下利然通多不足閉多有餘此痛而閉者不必審其邪之寒熱但責邪壅氣滯爲實故用厚朴大黃枳實三物專攻壅實之邪壅取通利不痛之藥

厚朴三物湯

厚朴八兩

大黃四兩

枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利爲度

按之心下滿痛者此爲實也當下之宜大柴胡湯此驗上實治法也心下卽胃之上脘若按之心下滿痛乃胃中邪熱食壅則當下之但邪居上脘稍連於表表裏兩持攻發難施故用大柴胡湯使上邪還從表出內邪從下而出輕圓活潑之妙耳

大柴胡湯

柴胡半觔

黃芩三兩

芍藥三兩

半夏半升  
洗

枳實四枚

大黃二兩

大棗十二枚

生薑五兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服  
一升日三服

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之

此心胃受寒引動下焦陰氣上逆而痛也中上二焦氣虛受寒故心胸中大寒痛寒邪引動下焦陰氣而挾衝脉上逆則痛嘔不能飲食故上衝皮起出見似有頭足之狀卽內經按之喘動應手之類

也。邪氣充斥三焦而爲寒實，故上下痛而不可觸。  
近方用人參膠餚乾薑建其中氣而溫散胸膈之  
寒。蜀椒能達濁陰下行，俾胃陽充而寒散痛止。此  
非腎經虛寒直中，故不用桂附回陽耳。

### 大建中湯

蜀椒二合炒去汗

乾薑四兩

人參一兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠餚一升微  
火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升  
後更服當一日食糜粥溫覆之。

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主

之

此外寒挾木乘於脾胃而痛也。外邪以挾內寒，侵於腸胃。邪正相搏，氣鬱不通，痰飲阻塞，則雷鳴切痛。胸脇逆滿嘔吐，然陰邪上僭，中上陽氣必虛。惟恐胃陽隨其嘔吐而脫，故用甘棗粳米補胃，崇土擋阻陰邪，不復上干。專藉附子，補陽散寒，逐陰下行半夏，消痰下逆，而止嘔吐。

附子粳米湯

附子一枚

半夏

半升

甘草一兩

粳米半升

大棗

十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

論曰內經痛有寒氣客於腸胃之間膜原之下者客於衝脈者客於厥陰之脈者客於陰股者客於小腸膜原之間者客於五臟者厥逆上出痛而嘔者痛而後泄者皆由寒邪所致惟熱氣留於小腸腸中痛痺熱焦渴堅乾不得出痛閉而不通者是屬風熱矣然腹痛雖一所感不同金匱以補寒熱二方之妙謂痛而閉者按之下滿痛者爲實熱用厚朴三物大柴胡等湯逐邪下出謂心胸中大

寒痛嘔不能飲食、腹中寒上衝皮起、出見有頭足  
上下痛而不可觸、近腹中寒氣雷鳴切痛、胸脇逆  
滿嘔吐爲寒、用大建中附子粳米湯溫補散邪、觀  
此二義真爲後學入室之階梯、但本經凡病僅言  
風寒不言暑濕燥火何也、蓋以寒濕燥屬陰同類、  
以濕燥統於寒下風暑火屬陽同類、以火暑統於  
風下所以僅舉風寒二大法門、不言溫燥火暑之  
繁也

### 寒病

夫瘦人達脾痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣

必衝不衝者心下則痞

此互風寒爲痛卽寒疝之類也瘦人是無濕痰壅滯乃肝腎之氣偏勝相招外邪乘於脾胃大腸之間相依腸中正氣盤旋故達腑痛爲有風冷然邪逆脾胃不和則穀氣不行要知胃氣已自先餒而反下之誅伐無過胃中元氣又傷風邪擾挾肝腎之氣上逆所以其氣必衝設不衝者是非風邪乃寒濕相挾搏聚心下則爲心下痞卽內經環腑而痛風根之變證也

脇下偏痛發熱其脉繫弦此寒也以溫藥下之宜大

黃附子湯

此邪入肝經爲偏勝痛也。勝下乃肝膽經絡所過之地。寒客厥陰經之。一邊營血不利。則勝下偏痛。然肝氣逆而胆氣亦逆。則痛而發熱。脈緊爲寒弦。屬厥陰寒實。故用附子細辛正陽而散風寒。蓋肝膽乃無出入。此用大黃。乃使厥陰之邪借從胃腑而出。則偏痛立止。雖十寒熱並行。是不相悖也。

大黃附子湯

大黃

三兩

附子

炮一枚

細辛

二兩

右三味以水五升煮取二升分温三服。若强人煮

取二升半分溫三服。服後如人行四五里，進一服寒氣厥逆，赤丸主之。

此治心胃寒鬱之方也。寒氣內客，鬱遏胃陽不行。於四肢故致厥逆。用烏頭細辛善驅在裏寒風。茯苓滲濕助半夏消痰而和脾胃。以真朱爲色者，卽硃砂爲衣。取其護心而鎮逆也。

赤丸

茯苓

四兩

半夏

四兩

烏頭

二兩

細辛

一兩

右四味末之，內真朱爲色，煉蜜丸如麻子大。先食酒下三丸，日再夜一服。不知稍增之，以知爲度。

腹滿滿當作痛脉弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒緊則不欲食邪正相搏卽爲寒疝寒疝遠臍痛若發則自汗一云出手足厥冷其脉沈緊者大烏頭煎主之

此寒疝脉證也肝腎素虛而受風寒木盛傳脾故腹痛而脉弦緊然弦緊屬陰陰凝陽鬱衛氣不行則惡寒緊乃寒入血分爲實乘胃則不欲食反侮大腸邪正相搏則繞臍痛內無形狀邪屬肝經故爲寒疝衛陽氣虛發則自汗出而手足逆冷然寒風內鬱脉必沈緊故以烏頭能行臟腑十三經絡燥濕行陽而驅寒風外出入審以謁脾胃而制烏

頭之毒也

烏頭煎

烏頭大者五枚去皮不必咀

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取二升強人服七合弱人服五合不差明日更服不可一日再服

寒疝腹中痛及腸痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之此連衝脈爲病治當溫補也肝木受邪乘脾則腹中痛本經之氣不疏故腸亦痛連及衝脈則裏急矣所以當歸補養衝任而散風寒羊肉溫補營衛

之氣、俾邪散而痛自止、方後云、痛多而嘔、乃肝氣上逆臨胃、故加橘木補之、

當歸生薑羊肉湯

當歸三兩

生薑五兩

羊肉一斤

右三味、以水八升、煮取三升、溫服七合、日三服、若寒多者、加生薑成一觔、痛多而嘔者、加橘皮二兩、白朮一兩、加生薑者、亦加水五升、煮取三升、二合服之、

寒疝腹中痛、逆冷手足不仁、若身疼痛、灸刺諸藥不能治、抵當烏頭桂枝湯主之、

此寒病而兼表也。肝受寒風乘尅脾胃故腹中痛。鬱遏營衛不行於四肢則逆冷而手足不仁。但身疼痛是兼三陽表邪所以灸刺諸藥不能治惟用烏頭溫散臟腑之寒風桂枝湯和營衛而散表邪方後云如醉狀得吐者風欲上出寒從汗出郎中病矣。

烏頭桂枝湯

烏頭

右一味以水二升煎減半去滓以桂枝湯五合解  
恐是  
煎之之令得一升後初服二合不知卽服三合又

不知復加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病桂枝湯

桂枝

三兩去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右五味剉以水七升微火煮取三升去滓

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脉數弦者當下其寒脉緊大而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之

此補上條痴病脉證不一當辨風寒虛實而施治法也脉數而緊乃弦者是緊脉而帶弦乃寒邪而

兼風也。狀如弓弦。按之不移。卽弦脈而帶緊。乃風邪而兼寒也。首由肝風腎寒。乙癸同源。風寒兩傷。互相致病。邪正兩實之證矣。脈數而弦。乃陰陽邪正有餘。當下其寒。寒卽外邪也。若緊大而遲。乃陽氣虛而陰寒邪實。上逆挾痰凝結於中。故心下堅。卽當溫補之法治之。但大爲陽。緊爲陰。是陰陽俱盛。爲陽中有陰。所以緊弦數弦。皆可下之矣。論曰。經謂任脉爲病。少腹上衝心痛。不得前後。爲衝疝者也。督脉爲病。少腹上衝心痛。不得前後。爲衝疝者也。風之爲病也。邪客足厥陰之絡。令人卒疝暴痛者。

燥淫所勝也。肝所生病爲狐疝，丈夫癩疝者，風濕流於筋也。三陽爲病，發寒熱，傳爲癲疝，乃子母相乘之病也。足陽明筋病，癩疝，腹筋急者，濕熱流筋之合病也。心脉急而病名心疝，少腹當有形，乃心移寒於小腸也。心脉微滑爲心疝，引臍小腹鳴者，心移風於小腸也。肝脉滑甚爲癩疝，風之爲病也。脾脉微大爲疝氣，風熱爲病也。滑甚爲癩疝者，風入於血也。濇甚爲腸瀆者，脾移濕於腸也。微濇爲內癩者，濕邪盛也。多下膿血者，腸澼之類也。腎脉滑甚爲癃瀆者，風濕傳於腎也。陽明司天，丈夫癲

痴婦人少腹痛者。燥淫所勝於肝也。而婦人無精丸可徵。故少腹腫痛。則爲痴矣。太陰在泉者。濕流於下也。太陽在泉。皆爲痴。少腹控睾引腰脊上衝心者。寒淫所勝也。少腹控睾引腰脊上衝心邪。在小腸連繫。屬於脊者。寒勝移於腑也。以上諸條。總不出風寒六邪侵入。少腹氣血有形而爲總司。靈素盡之本經。故不再陳。而獨補其脉與風寒入於肝腎。無形而痛者爲寒痴。但有表裏傳乘之變。如瘦人繞臍痛。乃風乘大腸之病也。腹痛脉弦而緊者。寒風乘脾也。腹中痛及腸痛者。肝脾俱病也。

腹中痛逆冷手足不仁者表裏皆病也用烏頭煎當歸生薑羊內烏頭桂枝諸湯總屬溫經散邪而爲大法又分脈數弦者爲風寒肝腎內實而當不脉緊大而遲者爲陽虛陰盛而當溫脉大而繁者爲陰陽邪正俱盛陽中有陰而寒實疝證繁多是非一言可盡欲求其備當與內經金匱合參則備

附方

外臺烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆方見上風寒內入肝腎乘侮於脾腹中絞痛而賊風傷於

五臟皆可致病故謂入攻五臟邪入於經則拘急不得轉側由肝脉循陰器使人陰縮乘鬱胃氣不伸手足厥冷故用烏頭驅散臟腑風寒恐其過燥急烈以蜜和中而潤之

外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通  
中惡之證俗謂絞腸烏痧卽臭穢惡毒之氣直從口鼻入於心胸腸胃臟腑壅塞正氣不行故心痛腹脹大便不通是爲實證非似六淫侵入而有表裏虛實清濁之分故用巴豆極熱大毒峻猛之劑急攻其邪佐杏仁以利肺與大腸之氣使邪從後

陰掃盡除則病得愈。若緩須臾正氣不通營衛。陰陽機息則死。是取通則不痛之義也。

巴豆

二枚去皮心熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏槌令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。當下老小量之。通治飛尸鬼擊病。

外臺柴胡桂枝湯治心腹卒中痛者。

心腹卒中痛者。由風邪乘侮脾胃者多。而風氣通於肝。故用柴胡桂枝提肝木之氣驅邪。外出白芍以疎土中之木。甘草人參調養脾胃之氣。以平夏消痰黃芩能清風化之熱。葛根宣通營衛。微汗。

鬱不行以致未病先食之物停擋而不傳化曰脈  
緊頭痛風寒腹中有宿食不化不必消食但行解  
表散邪食自化矣嘗見時流一遇感冒不別證之  
表裏胃之虛實發表劑中雜投消導先虛胃氣邪  
陷致劇病死不收曷勝悲夫

論曰飲食於胃全賴胃氣充和脾胃管純粹則無停  
擋之患若傷脾胃氣血津液而食不傳化則病宿  
食矣所以金匱以寸口脉浮而大按之反濤尺微  
而濤乃辨氣盛血虛之診脉數而滑血貴氣壅之  
微一實一虛而示氣血虛實致病之因也脉緊轉

索無常乃寒食傷於胃下利不欲食者因食而致利宿食在上脘者邪實於上也然宿食在胃則一當分氣血虛實寒熱表裏上下而爲治病之常但脉繫頭痛是因風寒鬱遏表氣以致內食不行不可與宿食同論本經雖有承氣瓜蒂吐下諸法若稍涉虛者必以補衛養營而兼化滯則圓機在我慎勿膠柱鼓瑟而治病也