

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷二十二

雜病源流犀燭

面部門

面部病源流

沈金鰲撰

人身之有面猶室之有大門。人未入室先見大門。人相對先見其面。惟先見大門故卽其門之景象可以知其家之貴賤貧富。惟先見面故卽其面之形色可以知其病之虛實淺深其理一也。何言之面部地分分隸五臟額爲天庭屬心頰爲地閣屬腎左頰屬肝右頰屬肺鼻居面中屬脾故察其色可以辨其病之所以在此分隸而不可易者也。然而五色又可獨決于明堂明堂者鼻也明堂之色青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又兩目內眞又精明穴就其穴而察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之盛衰可以叅互決死生之變。又天中天庭司空印堂額角方廣皆命門部位可以占病之

吉凶。此于分隸不易之外，又可相參而得者也。總之面爲諸陽之會，非他處可比。靈樞曰：手之三陽從手走至頭，足之三陽從頭走至足，竊考銅人圖，手太陽之脈從缺盆上頸至目銳，皆手少陽之脈，從缺盆上耳上角以屈下頰至顙。手陽明之脈從缺盆上頸貫頰交人中，上挾鼻孔，皆從下而上走于面，足太陽之脈起于目內眞上額，交顙上足少陽之脈，起于目內眞上抵頭角，足陽明之脈起于鼻交額中，入齒挾口環唇，倚頰車上耳前過客主人，皆從面而下走至足，此手足六陽之俱會于面也。若諸陰脈則皆至頸項無一上于面者，故人面獨耐寒熱。素問曰：人之十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上于面而走空竅，其精氣上走于目而爲睛，其別氣走于耳而爲聽，其宗氣上出于鼻而爲臭，其濁氣出于胃走唇口而爲味，其氣之津液皆上熏于面而皮又厚，其肉堅，故

大熱大寒不能勝之此面所以爲諸陽之會而非他部之可比也。然六陽之經雖皆至面而手三陽則皆自下而上面止爲其經歷之處卽足太陽少陽亦皆起于目眴而非居中以爲主獨足陽明胃起于鼻則旣有居中馭外之勢而額而齒而口而唇而頰而耳凡面部所有之處其脈俱有以維絡之故面病專屬於胃如或風熱乘之則令人面腫或面鼻色紫或風刺癰疹或面熱或面寒一皆胃之爲病也蓋面熱因于胃家鬱熱或飲食不節以致胃病漸至氣短精神少而生大熱有時溫火上行獨燎其面宜升麻黃連湯面寒固胃中有寒濕或胃氣虛故皆不能耐寒升麻子湯面腫爲胃風症必飲食不下形瘦腹大惡風頭冷汗或麻木牙關緊急口不得開目內蠕動額與頰車當猢猻牢觸則痛脉右關弦而緩帶浮宜升麻湯角皆由陽明經絡受風熱毒氣故若此也而亦有腎風症升麻湯

者面龐浮腫疼痛其色始黑多汗惡風或兼手熱口乾苦渴小便黃目下腫如卧蚕腹中鳴身重難行少氣時熱熱時從胸背上至頭此病雖由于腎虛然亦腫于面與胃風症同治宜升麻葛根湯加腎家引經藥

又有面戴陽症一因浮火所冲一因陽氣怫鬱于表一因下虛其

因下虛者面雖赤而不紅活忌用涼藥恐氣消而成大病其因陽

氣怫鬱者當發表不可攻裡火鬱則發之是也瘡瘍亦然仲景言

傷寒少陰症面戴陽由下虛之故宜通脈四逆湯加葱白九莖用

葱白者通陽氣也腮腫亦名痄腮因風熱乘胃或膏梁久積而作

甚有出膿血者宜外用醋調石灰敷之內服加味消毒飲小兒胎毒攻腮發腫尤可畏

宜大連膏飲面上紫塊如錢大或滿面俱有乃火熱所帶也宜擦面丹婦

人頰瘡甚或每年頻發亦屬惡症宜甘家秘方至于風刺粉刺對齷齪

癟酒皯肺風瘡熱毒瘡癧鼻臉赤紫黑鱗斑子皮膚瘙痒等症或

由風客皮毛或由痰漬臟腑或由上焦火毒或由脾肺風濕搏熱皆面上雜病也治之俱當以陽明爲主俱宜柏連散清上防風湯王容散連喬散紅王散

然則面之爲部雖不盈尺而所生病不且煩多也哉

面見五色

靈樞曰足厥陰之脈病面塵脫色足少陽之脈病

面微塵手厥陰之脈病面赤足少陰之脈病面黑如炭色足陽

明之脈病面黑又曰太陽病終者面色白絕汗出少陰病終者

面黑齒長而垢太陰病終者面黑皮毛焦難經曰肝外症面

青善怒心外症面赤善笑脾外症面黃善噫肺外症面白善嚏

腎外症面黑善恐善睡仲景曰寸口脉微而澁微者衛氣衰

澁者榮血不足衛氣衰則面色黃榮血不足則面色青又曰陰

陽俱虛則面色青白

面部凶症扁鵲曰病人面無光齒齦黑者死面腫色蒼黑者

死。病人榮衛竭絕。面浮腫者死。華佗曰。面黑唇青者死。面青唇黑者亦死。又曰。病人黑色出于天中天庭者死。丹溪曰。人有病面上忽見紅點者死。

導引法

養性書曰。熟摩手心。頻拭額上。謂之修天庭。連髮際二三七遍。面上自然光澤。所謂手宜在面是也。

治面部病方十三

升麻黃連湯

面熱
芍

甘草各五分

酒黃連四分

犀角

川

食

白芷

蜜黃芪

炙甘草各五分

白芷黃芪

升麻附子湯

面寒
芍各七分

升麻

附子

葛根

白芷

蜜黃芪

炙甘草各五分

白芷黃芪

白芷黃芪

白芷黃芪

升麻葛根湯乃陽明經主藥也。加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草蔻益智以治面寒良以面熱爲胃熱上

人參草蔻益智仁三分加葱白

升麻葛根湯乃陽明經主藥也。加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草蔻益智以治面寒良以面熱爲胃熱上

人參草蔻益智仁三分加葱白

升麻葛根湯乃陽明經主藥也。加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草蔻益智以治面寒良以面熱爲胃熱上

人參草蔻益智仁三分加葱白

升麻葛根湯乃陽明經主藥也。加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草蔻益智以治面寒良以面熱爲胃熱上

人參草蔻益智仁三分加葱白

升麻葛根湯乃陽明經主藥也。加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草蔻益智以治面寒良以面熱爲胃熱上

人參草蔻益智仁三分加葱白

升麻葛根湯乃陽明經主藥也。加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草蔻益智以治面寒良以面熱爲胃熱上

升麻胃風湯

胃風 升麻二錢 甘草錢半 白芷錢二分

當歸 葛根 蒼朮各一錢 麻黃五分

柴胡 茶本 羌活 草豆蔻 黃柏各三分

犀角升麻湯

犀角錢半 白附子 升麻 升麻 杏仁

白芷 川芎 姜升麻 升麻 杏仁

黃芩 黃芩 甘草各五分

加味消毒飲

防風 防風 各一錢

荆芥 惡瘻 甘草 連翹

炒胡粉 等分爲末

擦面神丹

紫塊 水銀兩半 猪脂搽擦令消盡入

野大黃四兩 取汁 穿山甲十片燒存

川椒末五錢 生姜三兩 取汁和研生絹

甘家方

石末二兩 胡粉一兩 再加猪脂令和如泥

包擦如乾入醋潤濕數次如初 此方屢效

洗瘡淨塗之 別以胡粉塗膏上

通脈四逆湯

少陰

柏連散

總治 猪脂調塗

多黃柏 此治面上熱毒惡瘡

炒胡粉 等分爲末

清上防風湯

又酒黃芩 防風一錢

川芎各七分 連翹白芷 桔梗各八分

炒胡粉 等分爲末

山梔

枳壳

薄荷各五分

甘草三分

此方耑清上焦火治頭面生瘡癩風熱毒

玉容散

皂角一斤 升麻二兩六錢半 楮實二
兩六錢半 白芷 白芨 天花粉 菓豆粉
各三錢三分半 甘松 砂仁 白丁香各一
錢六分半 糯米三合半 共爲細末令勻常
用洗面 一方加樟腦二錢
此方耑治面上瘡瘍或生小瘡或生瘡疖粉刺
之類日日洗之自然光澤

連翹散

連翹 川芎 白芷 片芩 桑白皮
黃連 沙參 荆芥 山梔 貝母 甘草各
七分 水煎食後服 一名清肺散
此方耑治面生穀蕎瘡俗名粉刺及面上肺火
肺風瘡

紅玉散

白芷 蕃香葉 牙皂各二錢 甘松
三柰子 木澤 白丁香 細辛 密陀僧
杏仁各一錢 天花粉 白茯苓各一錢半
樟腦五分 白芨三分 右共爲細末臨卧時
用津唾調或乳汁調敷面上 明早用溫水洗去
其面如玉 木澤末詳

此方耑治一切酒刺風刺黑癰癰子

明堂部位



額爲天庭屬心
額爲地閣屬腎
鼻居面中屬脾
左頤屬肝右頤
屬肺此五臟部位也察其色自
可以辨其病

自鼻直上髮際曰天中。天中之下曰天庭。卽額也。天庭之下曰司空。司空之下曰印堂。在兩眉間。印堂之下曰山根。卽兩眼之

間山根之下曰鼻準。卽明堂也。鼻準之下曰人中。人中之下曰

承漿。

承漿穴名。承漿之下曰地閣。卽頬也。兩額角曰方廣。亦曰太陽穴。靈樞曰。五色獨決于明堂。明堂者。鼻也。明堂之色。青黑爲痛。

黃赤爲熱。白爲寒。又曰明堂者。鼻也。闕者。眉間也。庭者。顏也。卽蕃者。頰側也。蔽者。耳門也。其間欲方大去之十步。皆見于外。如

是者壽必百歲。又曰庭者。額中也。闕中者。兩眉之間也。下極者。兩目之間也。直下者。兩鼻而下也。方者。鼻隧也。面王者。鼻柱之端也。又曰明堂之色。沉濁爲內。浮澤爲外。黃赤爲風。青黑爲痛。白爲寒。黃而膏潤爲膿。赤甚爲血。痛甚爲擊。寒甚爲皮不仁。五色各見其部。察其浮沉以知淺深。察其澤夭以觀成敗。又曰目赤色者。病在心。白在肺。青在肝。黃在脾。黑色在腎。黃色不可名者。病在胸中。又曰視其顏色。黃赤者多熱氣。青白者少熱氣。黑色

者多血少氣。內經曰：五臟六腑，固盡有部。視其五色，黃赤爲熱，白爲寒，青黑爲痛。此所謂視而可見者也。又曰：五臟已敗，其色必夭。天必死矣。註曰：天謂死生異常之候也。色者，神之旗。臟者，神之舍。故神去則臟敗。臟敗則色見異常之候也。又曰：切脈動靜而視精明。察五色，觀五臟。有餘不足，六腑強弱，形之盛衰，以此參互，決死生之分。註云：精明穴名，在明堂左右兩目內眞也。綱目曰：自額而下，關上屬首。咽喉之部分也。自關中循鼻而下，鼻端屬肺。心肝脾腎五臟之部分也。自目內眞挾鼻而下，至承漿屬胆。胃大小腸膀胱六腑之部分也。自顧而下頰，則屬肩臂手之部分也。自牙車而斜下頷，屬股膝脛足之部分也。內經曰：精明五色者，氣之華也。赤欲如帛裹朱，不欲如赭。白欲如翎羽，不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤，不欲如藍。黃欲如羅累椎黃。

不欲如黃土。黑欲如重漆色。不欲如炭。註云。精明穴名。五氣之精華者。上見爲五色。變化于精明之間也。又曰。五臟之氣。青如草滋者死。黃如枳實者死。黑如怡者死。赤如鰐血者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。青如翠羽者生。赤如鷄冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。又曰。生于心。如以縞裹朱。生于肺。如以縞裹紅。生于肝。如以縞裹紺。生于脾。如以縞裹瓜蔓寢。生于腎。如以縞裹紫。此五臟所生之外榮也。又曰。夫心者。五臟之專精也。目者。其竅也。華色者。其榮也。又曰。面黃目青。面黃目白。面黃目黑。皆不死也。面青目赤。面赤目白。面青目黑。目白。面赤目青。皆死也。華佗曰。病人面青目白者死。面青目黃者五日死。面赤目白者十日死。面赤目青者六日死。面黑目白者八日死。面白目黑者死。

面黑目直視惡風者死。赤色出兩顴大如拇指者病雖少愈必卒死。又曰：病人耳目及頰頬赤者死。黑色出于天庭天中者死耳目鼻黑色起入口者死。面黑唇青者面青唇黑者亦死。扁鵲曰：病人面㿠白直視肩息者一日死。仲景曰：鼻頭色青腹中痛舌冷者死。鼻頭色微黑者有水氣。色黃者胸上有寒。色白者亡血也。設微赤非時者死。色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者便難也。色鮮明者有留飲也。丹溪曰：人有病面上忽見紅點者多死。膍下忽大痛人中如墨色者多死。

面部諸瘍俱熱毒病也。雖各由于經絡大約陽明之症居多。如發眉生左右眉稜或頭或尾生瘍在眉頭則易攻入眼目在眉後則易攻入太陽最宜謹慎。或眉心生疽名面風。毒由膀胱風熱壅結陰陽相滯所致。宜消毒散或燒酥丸汗之而眉疔又名發眉。毒寒熱先作或痒

或麻木然後色黑痛甚宜追疔奪命湯二活散然凡疔之發皆如此不獨在眉也宜知之又如左右額赤疽夫額與太陽相近皆屬要害處若額疽腫滿太陽卽成虛損故始發時不拘大小急宜以藥貼破見膿卽無害破後尤宜速斂初起宜黃連消毒散仙方活命飲軟口宜外貼長肌膏倘外傷風水卽能殺人若七日刺不得膿十日不亢者死又如左右太陽亢瘡疽亦宜于五七日內破之宜追毒萬針頭丸否則毒氣攻眼眼合不開破更傷風水必傷目又如鼻柱上生疽乃肺經風熱及上焦鬱火所成也宜漏蘆湯仙方活命飲加山梔木通薄荷又如鼻下人中兩傍及承漿生疽名發鬚此由摘鬚風入孔竅而成也宜仙方活命飲又如地角上生疽名癰毒由陽明風熱也宜仙方活命飲加升麻桔梗又如額骨疽亦名面風毒多由上焦陽明鬱火所致葛根酒煎仍服奪命丹汗之而亦有由于心病者靈樞曰心病者顧赤察其色赤且診其脉病果屬心則

急降心火。宜黃連安神丸清之有由于腎者靈樞曰腎病顴骨而黑察其色黑且診其脉病果屬腎則急滋腎水。宜六味地黃丸固不得概泥爲陽明鬱火也。又如腮臉生毒發于肌肉浮而不着骨此名痄腮乃陽明風熱相乘或因積熱所致也。宜白芷胃風湯犀角升麻湯其間更自有辨近于下爲發願由陽明畜熱近于耳後又屬少陽熱毒上攻。宜急用仙方活命飲加元參若老弱人不可全用攻渴。宜黃芪內托散至于腮頰上生瘡亦屬陽明熱症。宜仙方活命飲加桔梗升麻或犀角升麻湯又如遊風毒生于面上亦陽明胃病由平日多食辛辣厚味金石藥也。宜黃連消毒飲去人參加山梔薄荷葉又如面上風瘡。宜正散及耳臭面上與下部諸竅生瘡隨月盛衰名月蝕瘡。宜明鹽瘡散眼胞上生瘡名偷針眼。宜偷針眼方并小兒環口生瘡名羊鬚瘡。宜羊鬚散小兒面上耳後生瘡多出水名黃水瘡。宜藥油玉脂膏以上皆面瘡之屬也雖然而生瘡疽其疤痕一時不易卽退宜用鮮

橄欖切斷。譙麝香少許擦之。二日即可無痕。此良法也。不然面留瘡疤。其何以使人見之哉。

面瘡症治 話立齋曰。痄腮屬足陽明胃經內熱。瘡痛宜升麻黃連湯。白芷胃風湯。外腫作痛。內熱口乾。犀角升麻湯。內傷寒涼。不能消潰者。補中益氣湯。發熱作渴。大便秘者。加味清涼飲。表裡俱解。而作腫痛者。欲成膿也。托裡消毒散。膿成托裡散。其氣虛血虛。倦怠惡食等症。照常用補中湯。六君子湯。十全大補湯。八珍湯選用。不可泥于風熱用冠伐之劑。又曰。連耳上太陽部分屬風熱。加羌活防風。連耳下少陽部分屬怒火。加柴胡。山梔丹皮。連耳後少陰部分屬相火。加知母。黃柏。齒牙俱腫出血者。清胃散加石膏。陳文治曰。凡腫初起。宜黃連消毒散。若腫硬作痛。繼以仙方活命飲一二劑。脉數而濡。乃濕熱壅盛。故用

黃連消毒散。腫硬作痛。故用仙方活命飲。並以甘溫補益陽氣。托腮而潰腐之。不宜純用苦寒傷胃氣。反致不得腐化。凡瘡易消散。易腐潰。易收斂。皆氣血壯盛故也。可以類推。

治面部諸瘍方

消毒散 白芷 菟豆 五倍子 研末醋調搽

蟾酥丸

乳香 没藥各二錢 輕粉 蟾酥各一
麝香五分 川烏 蓼鴉 珠砂各錢半

追疔奪命湯

重慶各七分 防風 細辛各八分 青皮 金線
首烏 芫活 姜黃 種節各一錢 黃連
水煎臨卧入酒一杯服 衣覆取汗 加大便秘

加大黃一錢

二活散

北方能治一切疔瘡
喬 蒼活 獨活 當歸 烏藥 赤芍 連
酒洗金銀花 花粉 白芷 甘草節各

五錢 紅花 蘇木 荆芥 蟬退 葛根各
三錢 檀香二錢 共爲末。每三錢用蒼耳子
煎湯調下

黃連消毒散

知母

黃連

羌活

黃芩

黃柏

生地

歸尾

澤鴻

獨活

防風

連翹

紫草

紫本

防已

桔梗

人參

甘草

三分

黃芪

蘇木

陳皮

仙方活命飲

草

歸尾

花粉

白芷

防風

赤芍

甘

沒藥

一錢

金銀花

陳皮

三錢

另將

乳香

沒藥

二朱

爲末

將水酒

各半煎藥送下不

飲酒

水煎亦可

此方專治一切瘡瘍未成膿者自消已成膿者即潰止痛消毒誠瘡家初起通用之神方故以仙方活命呼之

銅

白燭油

四錢

黃蠟

香油

各八錢

大楓子

去壳研

五錢

番木鳖

二錢

黃連

黃柏

枯礬

輕粉

各三錢

密陀僧

另研五

分候凝看瘡口大小做薄餅

補穿小孔十數貼

日易之蓋茶湯洗淨再貼

此方兼治年久諸般爛瘡

追毒針頭丸

砂各

麝香二錢

血竭

蟾酥

輕粉

片脑

碘

一錢 煉蜜丸 桑米大瘡頭用針挑破微有血
出以藥一粒放進眼上用綿紙蓋之周圍以津

垂枯定不一日愈

兼治一切癰背惡瘡欲死一粒可愈

漏蘆湯

島草 朴硝 大黃各一錢 黃芩 漏蘆

升麻各五分

水煎

此方專治一切疔瘡瘍毒初覺一二日如傷寒

頭痛煩渴拘急惡寒壯熱肢體疼痛恍惚間亂

老卧不寧大便祕滯小便黃赤者宜服此

奪命丹

石斛 錢 蝎牛 銅線 乳香 没藥 麝香各一

錢 加好酒三十一个另研和藥末爲丸

如乾加生葱白三四根嘴爛吐

手心包藥熱酒連葱送下約行六七里汗出爲

效重者再服一二丸

此方專主諸般大瘡毒此與前蟾酥丸皆少

陰經藥皆爲刲割用者當審陰陽輕重之分而
擇取之若些小症候勿用也

黃連安神丸

清心

六味地黃丸

酒浸

地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

白芷胃風湯

序注

白芷 升麻各二錢半 葛根七分
當歸錢半 紫草一錢 柴胡

草豆蔻 黃柏 藜本 蔓荆子
姜絲炒去絲各三分 麻黃去節六分

此方治氣虛風熱面目麻木或牙關緊急眼
目瞤動

犀角升麻湯

序注

犀角錢半 升麻 防風 蔓活 白附
水煎服

此方治胃經風毒血氣凝滯內熱口乾鼻額
口唇顫動變際連牙腫痛

黃芪內托散

序注

黃芪當歸 川芎 厚朴 桔梗
甘草 人參 白芍各五分 肉桂三

祛風白芷散

序注

白芷三錢 黃連 黃柏 黃丹各二
錢半 輕粉一錢 炸末香油調擦

一方加兒茶二錢麝香二分

月蝕瘡散

序注

炒胡粉 枯礬 黃連 黃丹 藥

粉各二錢 脂燒存性一錢 麝香一

錢 黃丹 藥

共爲末以鹽湯洗淨乾捲或油調敷

偷針眼方

鉗頭 南星 地黃各三錢研成膏貼太陽兩
邊其腫自消

羊鬚散

羊鬚頭右燒炒存性入鳳粉五分全研先洗淨香油
調塗

藥油

黃水瘡 松香 枯礬 槐樹皮 共爲末紙
捲爲筒藏藥在內蘸油燃火有油滴下收之入
輕粉少許搽

玉紅膏

又兩用香椒卽川椒一兩另研末篩細 松香八
兩用好醋加葱頭打碎或取汁同煮 黃丹三

升麻黃連湯

先以枯礬二兩半 輕粉七錢五分 共爲末
各一錢 川芎 輕粉七錢五分 共爲末
痛連太陽加羌活 當歸各錢半 水煎服 如
此方專治胃經熱毒腮腫作痛 加山梔柴胡

補中益氣湯

又黃芪 升麻 柴胡 陳皮 甘草 人參
當歸 白朮

加味清涼飲

又山梔 炒大黃 赤芍 當歸 甘草 黃芩

托裡消毒散

又人參

黃芪 盡水炒 酒當歸 川芎

炒白芍 炒白朮 茵芩各一錢 金銀花

白芷各七分

薑草各一錢

連翹各五分

薛立齋本方加減法開列于後

高腫微痛熱毒也

加黃連

漫腫微痛氣虛也去銀花連翹加參朮

頭痛發熱邪在表也

加川芎羌活或去參朮芍

外邪在表而元氣寢者暫用

人參敗毒散卽服

頭痛惡寒表虛也去銀花連翹加參朮

本方發熱飲冷便秘內熱也去參朮歸朮加大黃

發熱飲熱便秘內虛也去銀花連翹加參朮歸

本方發熱飲冷小便澁滯汗熱也去參朮加柴胡山梔

不作膿膿不遺氣虛也去銀花連翹白芷加參

本肉桂如不應暫用十全大補湯再服此

腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥如不應暫用

仙方活命飲再服本方

膿出反痛氣虛也去銀花連翹白芷加參朮

歸地丹

肉赤而不飲血虛有熱也去銀連芷加熟地丹

皮參朮

內熱而不飢陽氣虛寒也去參芪加白芍官桂

或兩桂

漫睡不痛或肉死不遺脾氣虛也去銀花連翹
加人參白朮如不應加姜桂更不應宜急加

附子

內白而不飲陽氣虛也去銀花連翹白芷加參

芪歸朮

腹多而不飲氣血虛去銀花連翹白芷加參芪
歸朮熟地如不應暫用十全大補湯再服本

方自效

飲食少思而不飲胃氣虛也去銀連芷加參芪

如不應暫用補中益氣湯

飲食難化而不飲脾氣虛也去銀連芷加參朮
如不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸

仍兼服本方

腹少而帶赤血虛也去銀連芷加參歸朮如不

應暫用八珍湯加丹皮

忿怒煖熱而出血肝火血虛也去銀連芷加丹

皮熟地

黑山梔如不應暫用八珍湯送六味

地黃丸

面青血脹而出血肝氣虛不能藏血也去銀連

芷加山黃五味子如不應兼用六味丸

食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去銀

連芷加參芪歸地兼鬱少寐加茯神枣仁遠

志驚眼內如不應暫用歸脾湯仍服此

欲吐作嘔或外擦內服寒涼或痛甚或感寒邪

穢氣

而

嘔胃氣虛也去銀連芷加人參白朮

藿香

飲食少思腸鳴腹痛腹冷泄鴻脾氣虛寒也去

附子煎送四神丸

有

渴飲冷熱毒也加赤小豆知母如不應暫用

竹葉黃芩湯

手足逆冷脾血虛寒也去銀連芷加炮姜木香義食作渴胃火也加山梔石膏如不應暫用竹

葉石膏湯

膾多作渴氣血虛也去銀連芷加熟地五味子

如

不應暫用十全大補湯加麥冬五味

口乾舌燥腎氣虛也去銀連芷加熟地山藥山

萸如不應兼用六味丸又不應佐以補中益

氣湯

自汗內熱口乾胃氣虛也去銀連芷加參芪歸

术

如

不應暫用六君子湯

盜汗內熱口乾陰血虛也去銀連芷加熟地參

冬五味

如

不應暫用當歸六黃湯

莖中痛而小便不利精內敗也去銀連芷加山

萸

如

不應佐以六味丸

愈便則愈痛愈痛則愈便後歸也去銀連芷

煎送六味丸

食少體倦口乾飲熱小便黃短肺虛熱也去
銀連芷加五味山萸如不應醫用六味丸

柴胡

勞役而小便黃元氣下陷也去銀連芷加升麻

午後小便黃短胃虛熱也去銀連芷加升麻柴
胡不應煎送六味丸

地山萸

燥作渴小便頻數腎水虧也去銀連芷加熟

四肢逆冷腎氣虛寒也去銀連芷加附桂不應
佐以八味丸

食少體倦作渴胃氣虛也去銀連芷加參芪白
术不應暫用補中益氣湯

體倦

頭痛或眩暉中氣虛也去銀連芷加升麻

柴胡不應暫用補中益氣湯加蔓荆子

日晡頭或眩暉

血虛也去銀連芷加熟地不

應佐以六味丸

泄遺精頭眩頭痛或眩暉氣促腎虛不能納
氣也去銀連芷佐以六味丸如不應是虛

寒也用八味丸而日赤色煩熱作渴脉大而

虛血脫煩躁也去銀連芷加黃芪當歸不應

身熱

惡寒欲投于水脉沉微細氣脫發躁也去

銀連芷加附桂不應暫用附子理中湯

画癰方

背用當歸補血湯

三

卷二十一

三

面部

多思不寐體痛盜汗脾血虛也去銀連芷加茯

神遠志棗仁圓眼不應暫用歸脾湯
寢汗出腎氣虛也去銀連芷加五味子煎送六

味丸

飲食時出汗胃氣虛也去三味加參芪歸术五
味子不應暫用六君子湯

睡後覺飽出盜汗宿食也去三味加參术半夏

不應暫用六君子湯

胸滿多痰脾氣虛也去三味加桔梗牛夏不應

肺熱多痰

辨血虛也去三味加歸地參术不應

暫用六君子湯加芍歸熟地

咳嗽

垂涎腎虧津液泛上也去三味加熟地山

藥山萸不應在以六味丸

忿怒胸痞

肝氣滯也加桔梗山梔不應暫用補

中益氣湯加桔梗枳壳

倦怠

胸病中氣虛也去三味加參术茯苓不應

暫用八珍湯加柴胡

口苦

寒熱往來肝火血虛也去三味加柴胡熟

因怒寒熱

往來肝火血虛也加柴芩不應暫用

八珍湯加山梔炒枣仁酒龍胆草

體倦寒熱

往來肝脾氣滯也去三味加參芪歸

术不應暫用補巾益氣湯

內

內熱睛熱或寒熱往來陰血虛也去三味加芎

歸柴胡丹皮

不應暫用入珍湯加丹皮

畏

寒或寒熱往來胃氣虛也去三味加參苓白

脇

痛滿或寒熱往來肝氣滯也去三味加青

皮木香

不應氣血虛也更加芎歸參木

婦

人勞役恚怒或適逕行發熱詰語或夜熱甚

謂

此邪在血分也去三味加生地柴胡丹皮不

應暫用加味四物湯

調服冠伐藥或膿血太泄或因吐瀉或悞入房

或勞損元氣或夢洩遺精或外邪觸觸以致

發熱頭痛小便淋澁或滑數便血日赤煩喘

氣短頭暉體倦熱渴意欲投水身熱惡衣揚

手癱足廢背反張鄭聲自汗此陽氣厥陷之

假熱症也

畏寒頭痛咳嗽逆嘔吐耳曠目睭小便自遺烏利

腸鳴哩急腹痛玉莖短縮牙齒浮痛肢體麻痺或厥冷身痛或咬牙齒唇此陽氣沉陷之

真寒症也

以上假熱真寒勿論其脉勿論

其症但有一二急去三味加桂附補之應有

復生之理又按加減六十二法皆托裡消

毒之發揮也卽此意而消息則得湯家之要矣

他如護心散十方皆有益無損之藥茲能

托裡消毒故附錄于後在臨宜取舍而已

叢心散

菉豆末一兩

乳香五錢

每末一

羹食後用生甘草湯調新呷下使常在膈間
爲妙李氏云凡患瘡疽蚤進護心散數服
使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌
生瘡或黑爛如菌苔瘡發四五日後宜間別
藥而服但此方耑解金石發瘡之品若發熱
腹脹飲冷而渴必宜用也若不喜飲冷而喜
熱湯及非因丹毒而發症者則又不宜用

阿膠飲子

橘紅五錢

阿膠蛤粉炒

粉草

分三劑水煎服

此方耑治一切

國

老膏

粉草不拘多少河水浸二日採汁砂

器內煎膏每一二匙酒或白湯下

此方耑治一切瘡疽消癰逐毒更解丹毒功難盡述

萬

金散

但元氣虛弱者忌

甘草節二錢

瓜蔓一个研細

先將二味消煎入沒藥末調

服此方耑治瘡疽已潰未潰有消毒破血

保

安湯

括

新者

一個去皮焙

沒藥二錢

忍冬之功

忍冬藤

生取五兩

甘草一兩

水

煎至半入好酒一碗再煎數沸去渣分三服

一日夜服完

重者連服二劑至大便通利

此方治一切瘡疽初起甚效

研末 破砂器 金銀花 生姜各五錢 好酒五大
卽效 內煎三茶杯分三次服毒微者一服

此方治瘡疽托裡已成者速潰
紫 菇金錠 五倍子三兩打碎洗淨培乾
子淨霜 大戟去芦焰爲末各一兩
濃飲丸爲四十錠此藥能應諸病各有神效
若瘡疽用東流水磨塗并服須端午日合一千金
方有全蝎殊砂雌黃各一兩名神仙追毒丸
凡一切瘡疽惡瘍湯火瓦蛇犬獸傷俱宜

服此

單煮大黃湯 大黃酒浸去皮水煎服 此研
眞人傳此瘡疽熱毒大便秘結者服此能宣
熱拔毒但元氣虛者切不可用須慎之
棟子灰 川棟子燒灰存性酒服次用十四枚
次用二十一枚如此三服雖成亦小 此方
耑治諸毒初起

拔毒仙丹 冬瓜一个切去一頭合瘡上瓜爛
切去仍合之瓜未完而瘡愈 此方能治背
發欲死

鷙 按托裡消毒散及護心散以下十方俱治一
切瘡疽惡症不獨面部痄腮用之也特首
見于此故詳錄之凡臨一切症者酌取可也

托裡散

大黃
皂角刺各三錢
當歸各錢半
此方兼治一切惡瘡瘍
而數種甚者
牡蠣
赤芍
黃芩各二錢
每末五錢水酒煎服
便毒始發麻洪疎寢

補中湯

又

六君子湯

又

十全大補湯

又

八珍湯

人參
芎
歸身
白芍

茯苓
白术

甘草

地黃

川

清胃散

又
歸身
生地

黃連
丹皮各錢半

川

細辛三分

黃芩一錢

清胃散

又
歸身
生地

黃連
丹皮各錢半

川

細辛三分

黃芩一錢

目病源流 眉發骨

沈金鑑撰

肝發竅于目。故目病多由于肝。目又爲五臟精華。故其地位亦分隸臟腑。何言之。目有五輪。白珠屬肺。肺主氣。氣之精曰氣輪。烏珠屬肝。肝主筋。筋之精曰風輪。肝爲風也。內外皆屬心。心主血。血之精曰血輪。上下胞屬脾。脾主肌肉。肉之精曰內輪。瞳人屬腎。腎主骨。骨之精曰水輪。腎爲水也。得效曰氣輪之病。因凌寒冒暑。愛飲寒漿。肌體虛疎。寒邪入內。其候或痛或昏。傳在白睛。筋多腫赤。視日如隔霧。看物似生烟。日久不治。變成白膜。黑暗難開。風輪之病。因喜怒不常。作勞用心。晝視遠物。夜讀細書。其候眉頭尤澁。睛內偏疼。視物不明。胞弦緊急。宜去風藥。肉輪之病。因多食熱物。五辛。遠道奔馳。食飽耽眠。風積痰壅。胞多赤腫。昏蒙多淚。倒睫溢痛。瘀血侵睛。宜醒脾藥。血輪之病。因七情煩勞。內動于心。外攻于目。其

候赤筋纏眥。白膜侵睛。胞腫難開。昏澁久不治。失明宜洗心涼血藥。水輪之病。因勞役過度。嗜慾無厭。又傷七情。多食酒麯。辛熱。因動腎經。逆于黑水。其候冷淚流于臉上。飛蠅趨于睛前。或澁或痒。結成翳障。常帶昏暗。宜補腎藥。目又有八廊。乾天廊屬肺。位睛中間。坎水廊屬腎。位瞳人艮山廊屬胆。位神光震雷廊屬小腸。位白睛上截。向小眥巽風廊屬肝。位烏珠離火廊屬心。位大小眥坤地廊屬脾胃。位上下胞。兌澤廊屬膀胱。位白睛下截。向大眥得效。曰天廊之病。因雲中射雁。月下看書。侵冐寒暑。其候視物生烟。眥疼難開。地廊之病。因濕積頭上。冷灌睛輪。其候眼弦緊急。瘀血生瘡。火廊之病。因心恐神怖。赤脉侵眥。血灌瞳人。其候瞼頭紅赤而腫。睛內偏疼。熱淚如注。水廊之病。因努力爭鬪。擊棒開弓。驟騎努力。其候常多昏暗。睛弦淚多。風廊之病。因枕邊窓穴有風。不避腦中。

風邪其候黑睛多痒。兩瞼常爛。或昏多淚。雷廓之病因失枕睡卧。酒後行房。血脉滿溢。風邪內聚。其候皆頭赤腫。瞼內生瘡。倒睫。拳毛攀睛。努肉。山廊之病。因撞刺。磕損。致令肉生兩瞼。瞼閉雙睛。若不早治。必致昏暗。瘀血侵睛。澤廓之病因春不宜解。冬聚湯毒。多食辛熱。致令腦脂凝聚。血淚漸流。有如霧障。目又有內外。背俗云。眼大頭爲內。皆太陽經脈所起也。血多氣少。俗云。眼梢頭爲銳。皆卽外背少陽經也。血少氣多。目上綱亦屬太陽。目下綱陽明也。氣俱多。此足三陽經俱會于目。惟厥陰肝經連於目系而已。故張子和云。血太過者。太陽陽明之寔也。血不及者。厥陰之虛也。故出血者。宜太陽陽明。以此二經血多故也。少陽一經不宜出血。血少故也。刺太陽陽明出血。則目愈。刺少陽出血。則目愈。皆矣。此五輸八廓。內外皆之。分配臟腑而目之爲病。所以不止由于肝也。然

其部位雖各分屬而病之發于臟腑又統全局言之不必細分其部也試觀肺經壅熱則病白睛腫赤皮湯心火上炎則病目赤而

寸脉數

宜導赤散清水止痛湯

脾胃不足則病內障耳鳴及多年目昏不能

視物

宜益氣聰明湯

腎水不足則病視不分明漸成內障宜熟地肝血不足則病目昏生花久視無力多眵

宜養肝丸

與夫肝火盛則病目赤澁痛

宜龍膽湯

肝經熱邪上壅則病目暴赤澁而腫痛

宜湯泡散

肝經

積熱肺受風邪則病眼障昏花

宜還睛丸

如此等症雖亦有現于本經之部位者然總不能盡拘矣至病之所發定有見于各經之部位

者又當隨各經治之如白睛變赤爲火乘肺也上下胞赤腫爲火

乘脾也五色花晉遮瞞子爲腎虛也瞞被晉遮爲肝虛火旺也目

中血貫澁火自甚也蓋以目之爲病皆屬於火斷無由于寒者故

既見于各經宜用各經藥以治之也雖然目病大綱約有三端一

爲內障。總係足厥陰肝疾亦有由腎虛者。蓋通黑睛之脈者曰目系。而目系則屬足厥陰足太陽手少陽三經。三經虛邪從目系入黑睛內爲翳。故內障爲肝疾兼腎心則肝腎之主也。其症每先患一眼漸及兩眼。皆黑睛內有隱隱青白翳遮瞳人不痛不痒無淚無眵。如薄霧如輕烟或如金色或如菉豆色。或見五花日漸日增比外障更難療治。其屬肝者必由血少神勞。宜養肝丸生熟地黃丸其屬腎者必由內傷色慄。宜益陰腎氣丸滋腎明目丸其肝腎俱病者必由二經皆虛。宜駐景丸加減駐景丸此則通治內障之法也。而其症狀寔各有名目。共二十三種。今詳考眼科家書。撮其要畧。如一曰圓翳。在黑珠上一點圓。日中見之。差小陰處見之。卽大視物不明。轉見黑花。此由肝腎兩虛而得也。宜補腎元散二曰水翳。如水束堅寔。傍觀目透于瞳人。內陰處及日中見之。其形一般。疼而淚出。此肝膽病也。宜通肝散三曰

滑聾有如水銀珠子。但微含黃色。不疼不痛。無淚。遮蔽瞳人。宜藥花散四曰濇聾。微如赤色。或聚或開。兩傍微光。瞳人上如凝脂。色無派。時濇痛。宜決明子散五曰散聾。形如鱗點。或瞼下生粟。日夜痛楚。瞳人最疼。常下熱淚。此濇散二症。皆肝肺相傳也。宜八味還晴散六曰橫開聾。上橫如劍脊。下微薄不赤不痛。此病稀少。七曰浮聾。上如水光白色。環遮瞳人生。自小皆頭至黑珠上。不痛不痒。無血色相潮。八曰沉聾。白點藏在黑珠下。向日細視方見。其白睛疼痛。日輕夜重。間或出淚。宜空青丸九曰偃月。瞼膜如凝脂。一邊厚一邊薄。如缺月。其色光白無瑕疵。此橫開浮沉。偃月四症。皆難治。十曰棗花聾。周回如鋸齒。四五枚相合。赤色。刺痛如針。視物如烟畫。則痛楚多淚昏暗。十一曰黃心聾。四邊白中一點黃。在黑珠上。時下澁淚。此棗花黃心兩症。皆由肝肺風熱。宜還晴散十二曰黑花聾。其狀青色。大小

皆頭澁痛常淚口苦此膽受風寒也

膽元

十三日胎患初生觀物

轉睛不快至四五歲瞳人潔白昏蒙不見及年高不治此由胎中受熱致損也十四日五風五色變爲內障頭痛甚却無淚日中如坐暗室常自憂嘆此由毒風腦熱所致十五日雷頭風此毒熱之氣冲入眼睛中牽引瞳人或微或大或小黑暗全不見物十六日驚振因病中再被撞打變成內障日夜疼痛不能視三光此胎患五風雷頭驚振四症俱不可治俱宜八味還晴散十七日綠風初患頭旋額角相牽瞳人連鼻皆痛或時紅白花起肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發宜先服羚羊角散羚羊角丸後服還晴丸十八日烏風眼雖痒痛而頭不旋但漸昏如物遮全無障翳或時生花此肝有寃熱也宜渴十九日黑風與綠風相似但時時黑花起此腎受風邪熱攻于眼也須涼腎二十日青風不痛不痒瞳人依然如無恙者但

微頭旋及生花轉加昏蒙。此黑風青風相似。俱宜還二十一曰肝

虛雀目。雀目者日落卽不見物也。此由肝虛血少時時花起或時

頭痛久則雙目盲。此則有初時好眼患成雀目者而亦有生成如

此并由父母遺體。日落卽不見物不必治。治亦無效。

宜雀目散鱗地黃炒豬肝

食亦小兒每因疳病得之。

宜蛤粉丸

二十二曰高風雀目與前症

相同。晝明晦暗。但經年瞳子如金色。名曰黃風不治。

宜還二十三

日肝虛目暗。遠視不明。眼花頻起。皆目赤痛。有時看一成二。此宜

與眼暗參看。肝散一爲外障。總係足三陽病。按綱目本靈樞經曰。

凡赤脉腎初從上而下屬太陽主表。必眉棱骨痛或腦項痛或半

邊頭腫痛。治法必當溫之。

宜蠟茶飲

散之。

宜夏枯草散

赤脉腎初從下而上。

或從內皆出外。皆屬陽明主裡。其症多熱或便寒。治法當下之。

宜

目流氣飲寒之味宜羊角元一赤脉腎初從外皆入內屬小陽主半表半

宜黃連飲

裡治法宜和解之。

宜神仙退醫丸

綱目條析三陽是已而又皆統于肺以

外障皆連遮白睛而白睛則屬肺此則通治外障之法也而其症

狀亦各有名目共二十七款今復詳攷眼科書撮其要畧如一

曰混睛白睛先赤後痒痛閉澁淚下久則睛變碧色滿目如凝脂

赤脉橫貫

宜地黃散

二曰弩肉攀睛必眼先赤爛多年時庠時痛兩皆

頭弩出筋膜心氣不寧憂慮不已遂成攀睛或由用力作勞而得

或由風熱冲肝而成

俱宜二黃散定心元

或由心經寢熱必大背赤紅肉堆

起或由心經虛熱必小背赤紅絲血脹

俱宜速效散

三曰兩瞼粘睛卽

爛弦風也由風沿眼系上膈有積熱或飲食時挾怒氣而成久則

眼沿因膿漬而腫

宜還睛紫金丹點之

甚則中生細虫年久不愈而多痒者

是也當去虫以絕根

宜聖草散

亦有小兒初生卽兩目赤而眶爛至三

四歲不愈者

宜桑皮湯送消風散

四曰鷄冠蜆肉由風熱乘于脾經後有所

傳致。醫。生。瞼。肉。如。鷄。冠。如。蜋。肉。或。青。或。黑。阻。碍。痛。楚。怕。日。羞。明。須。

翻。出。看。之。用。燈。草。輕。輕。刮。去。毫。厘。血。出。用。銀。匙。挑。洗。風。毒。藥。水。按。
止。之。并。不。時。將。藥。水。點。入。則。不。復。腫。然。後。服。藥。宜石决明散

五日

瞼。生。

風。粟。由。肝。壅。瘀。血。致。兩。瞼。上。下。初。生。如。粟。米。漸。大。如。米。粒。或。赤。或。

白。不。甚。痛。痒。常。淚。出。滲。痛。當。翻。出。以。針。撥。之。兼。服。藥。以。宣。其。風。熱。

宜消毒飲亦。有。由。脾。經。積。熱。者。須。分。別。治。之。荆黃湯加味

六。日。胞。肉。膠。凝。由。風。毒。所。注。或。熱。積。脾。經。或。過。于。傷。胞。故。上。下。胞。腫。如。桃。時。出。熱。淚。

宜消風散七。日。漏。睛。膿。出。由。心。氣。不。寧。風。熱。客。于。眞。臟。間。致。眞。頭。

結。聚。津。液。膿。出。不。止。宜白薇散八。日。風。牽。瞼。出。由。脾。受。風。毒。侵。

不。早。治。必。生。黑。點。侵。損。于。目。宜黃芪散九。日。瞼。硬。睛。疼。瞼。中。紅。而。堅。硬。疼。痛。涎。出。怕。日。羞。明。

宜通肝散十。日。故。上。下。瞼。俱。赤。或。翻。出。一。瞼。在。外。若。久。而。瞼。內。俱。赤。則。不。

宜五退散十一。日。瞼。硬。睛。疼。瞼。中。紅。而。堅。硬。疼。痛。涎。出。怕。日。羞。明。

宜通肝散

亦有起腎障宜春雪膏點之十日蟹睛疼痛由肝家積熱上冲于目令目

痛甚黑睛上生黑子如蟹目或大如豆名曰損腎極難治宜石决明散羚羊角

教十一日晴高突起由風熱痰飲漬于臟腑蘊積生熱熱冲于

目致眼珠突出是名睛脹須用涼藥瀉肝宜瀉肝散一說云黑睛脹當

瀉肝宜龍膽散白睛脹當治肺宜清肺散存柅十二日血灌瞳人由肝氣閉

塞血無所歸致灌于瞳人痛如針刺視物不明却無瞼膜宜通血丸車前散

又恐生花須預防之服前藥後再服還睛散倘生腎障不可輕忽急早治

之宜鮮地黃汁和大黃末攤帛上二寸許罨眼上久則易之十三日痛如針刺由熱毒在心忽

然睛急疼痛如針刺坐卧不寧宜先服洗心散再服還睛散十四日瞳人乾缺

眼睛乾澀全無淚流始而痛後稍定或白或黑不能見物不可治

十五日輒輒轉閉睛藏上下瞼不能歸中也亦不易療姑服藥以

治之然不能決其必效也宜瀉肝散門冬飲子若風寒直灌瞳人攻于眼帶

則瞳人牽曳向下名墜睛眼亦輾轉轉閑之類若日久卽拽破瞳人兩眼俱陷卽不見物宜犀角散十六曰風起喝偏由偏風牽引雙目喝斜頻淚無腎不痒不痛宜蝉花無比散至如眼有偏視者由風邪攻肝牽引瞳人故令偏視也宜槐子丸十七曰鶻眼凝睛輪硬而不能轉動者是也此不可治十八曰神祟疼痛本無根因忽然疼痛如針刺如火炙兩太陽牽痛日輕夜重先當求禱再服藥宜石决明散十九曰風赤瘡疾由脾藏風熱蘊結兩瞼似朱塗而生瘡黑睛端然無染不治便生翳膜宜五退散外以湯泡散洗之二十曰小眥赤脈由三焦積熱令小眥中生赤脈漸漸冲睛急當早治并忌食熱物及房事宜犀角飲二十一曰拳毛倒睫由內多伏熱致陰氣外行故始則兩目緊急皮縮漸生瞼膜淚出涔涔睺倒難開瞳人如刺須先去其內熱及火邪宜先服蕷肝散再服五退散使眼皮緩則毛自出瞼自退或摘去拳毛用風

子血點眼內數次卽愈。一法用木鼈子一個去壳打爛綿裹塞鼻中。左目塞右右目塞左二二夜其曉卽正二十二日衝風淚出肺虛遇風風衝于內火發于外風熱相搏遂至淚流不止冬月尤甚。宜白姜亦有汗熱甚而淚流并兩瞼赤者宜食後吞當垂散亦有肝虛客熱而迎風冷淚者宜木鼈散二十三日痒極難當由膽受風熱致瞳子及背頭皆痒不能收瞼宜驅風一字散二十四日天行赤目由天行時疾目忽腫赤痛澁長効相似宜鴻肝散石决明散并以五行湯洗之二十五日被物撞打目因撞打疼痛瞳人被驚昏暗眼眶停留瘀血宜石决明散外貼地黃膏若撞打睛出而目系未斷卽推入瞼內勿驚觸四畔宜生地黃散敷厚如目系斷睛損不可治其有瘀血者以針刺出且用眼藥二十六日塵絲眯目或爲飛絲所侵或爲塵沙所苦皆疼痛閉澁眯眼不脫宜瞿麥散二十七日偷針眼或太陽結熱或脾家積熱兼宿食

不消令目皆生小泡如瘡以針刺破卽差甚有發腫而痛者用生
南星生地黃同研膏貼兩太陽穴腫自消一爲腎膜總係肝受風
熱成病輕則朦朧重則厚起直指云腎雖自熱生然治之必先退
腎而後退熱以先去熱則血冷而腎不能去也旨哉斯言其可知
治腎之法平至如勞役過度亦生腎當以補元爲主宜益本服原
藥過多亦生腎蓋緣陽氣衰九竅不宣故青白腎見大告也當益
火之源以消陰腎宜補陽湯痘瘡後亦生腎宜決明元風熱眼病後亦生腎
菊花散
宜神仙角散
宜補陽湯痘瘡後亦生腎宜決明元風熱眼病後亦生腎
表故始治之法只宜表散宜差活退腎湯如反疏利邪必內陷而腎益深
矣故凡邪氣未定謂之熱腎而浮邪氣已定謂之冰腎而沉羊角散
邪氣牢而深謂之陷腎當先熾發之宜羚羊使邪氣再動腎再
浮乃用退腎之劑宜神仙角散大約腎係久病治之亦不能速效故須

積歲月除之。若眼睛上但有物如蠅翅之薄，則謂之膚瞖。此瞖之

輕者也。用點藥卽愈。

宜烏賊骨散

此皆通治瞖膜之法也。而其症狀亦

各有名目。共一十四條。今更詳考眼科書撮其要略。如一曰肝

瞖積熱先患赤腫疼痛。怕日羞明。淚溢難開。忽生瞖膜初患一日。

瞖積熱

宜洗肝散

亦有由風熱相侵者。大約風眼腫則軟。熱眼

腫則硬。

宜局方蜜蒙花散

二曰膜入水輪。因黑珠上生瘡稍安其痕不沒。

故侵入水輪此難治。三曰釘瞖根深由心肝留熱致目疼生瞖久

則如銀釘頭入黑睛不可治。

宜石決明散點之

四曰黑瞖如珠由腎虛受

風熱而得如小黑豆生黑睛上疼痛淚出不可用點藥

宜先服羚羊角散次

如鱗砌。宜先點磨瞖膏

再服羚羊角散

六曰水瑕深瞖由五臟俱受熱致黑水內

腎丸五曰花瞖白陷由肝肺二臟積熱致睛上忽生白瞖如花白

如鱗砌。宜先點磨瞖膏

再服羚羊角散

七曰玉瞖浮滿黑珠上浮玉

橫深瑕盤青色深入痛楚無時

宜清涼散

八曰黑珠上浮玉

色不疼痛。瞖根下紅粒。宜龍胆散八曰順逆生瞖。凡瞖自下而上者爲順。自上而下者爲逆。順則易愈。逆則難治。宜車前散
點磨瞖膏九曰旋螺尖起。目痛瞖生。尖起而赤。一似旋螺。宜先服通肝散十曰撞刺生瞖。因撞刺傷目生瞖也。或兼風熱。更加疼痛昏暗。宜先服輕效散次石决明散
十一曰赤眼後生瞖。由暴赤後熱流于肺。輕則朦朧。重則白睛紅花乃生雲膜。極不易治。宜服鴻肝散十二曰暴風客熱。由暴風熱所攻。白睛起脹。漸覆黑珠。瞖腫痒痛。宜鴻肝散十三曰黃膜上衝。由脾受風熱毒致黃膜從下生而上衝。黑暗疼痛。閉澁。此猶可治。宜犀角飲十四曰赤膜下垂。由客邪所攻。致赤膜從上生而下遮黑睛。名垂簾膜。迎風出淚。怕日羞明。此爲難治。宜通肝散觀音蔓授丸以百點膏點之以上論內障外障瞖膜皆目病。所當縷析者。此外又有眼昏眼花眼疼三端。各有由來。不可不察。蓋眼昏者。視物不明也。內經曰。肝

虛則目眊眊無所見。靈樞曰：足少陰之脈病，目眊眊無所見。又曰：氣脫者，目不明。難經曰：脫陰者，目盲。據諸經之言，是目昏皆由于虛。以五臟精皆聚于目，每一臟虛，則一臟精明之用失，故皆能令目昏。此則其原也。然亦有由于目之元府受熱者。河間云：熱氣怫鬱，元府閉塞而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入，各隨所鬱，微甚而爲病之重輕。故熱鬱于目，則目無所見也。或目昏而見繁花，由熱氣甚也。據此可知目昏不但爲虛，而亦由熱矣。試觀傷寒症，熱極則目盲不識人。且有病後餘熱未清，并有目昏漸生瞤膜者。宜石決明散益可信也。若微昏者，至近則視難辨物，以近則光反隔也。目暴不見物者，氣脫也。久病昏暗者，腎臟真陰虛也。點春雪膏總治宜駐景丸加減。婦人目昏者，多由于鬱怒傷肝也。宜抑青目湯老人眼昏者，血氣衰而肝葉薄，膽汁減也。前人云：童子水在上，故視明瞭。

老人火在上故視昏暗旨哉言也

宜夜光育神丸明服地黃丸

眼花者眼光昏

散也皆由腎虛之故蓋腎主骨骨之精爲瞳子腎水虛骨枯火得

乘之故瞳子散而視物杳冥也如見黑花或如飛蠅散亂或如懸

嬉空虛皆腎虛也見青花膽虛也見紅花火甚也見五色花腎虛

客熱也東垣云陽主散陽虛則眼楞急而爲倒睫拳毛陰主歛陰

虛不歛則瞳子散大而爲目暗眼花然則昏花二症舍陰虛其安

屬哉

宜滋陰地黃丸益本滋腎丸

眼疼者一爲目眚白眼疼卽經言白眼赤脉

法于陽是也惟其屬陽故日中更疼點苦寒藥則效一爲目珠黑

眼疼卽經言瞳子黑眼法于陰是也惟其屬陰故夜則更疼點苦

寒藥反劇何相反若是歟蓋以白眼疼由肝寢熱

宜瀉青丸葛根湯加苦陽丸

黑眼

疼由肝虛熱故也

宜夏枯草散

至若男子讀書過度女子針綉太甚以

至眼疼發澁此爲肝勞過度不必服藥時常閉目調養自愈以上

三端。又于內外障瞼膜之外所當詳審而析治者也。總之目爲肝臟發竅而肝寔藏血。肝又主風故目病多半由于虛寔寒熱及內動外感之風邪。前既歷詳各種名目症治茲更寔指其由以明病所從發。如由血虛必目昏也。宜明日地黃丸由亡血過多及久痛傷血或

年老血少必羞明酸痛不能視物也。宜芎歸或雖養血安神必兩目昏花不能久視也。

宜久患目疾方失血後復受燥熱

左目赤痛也。宜葉氏羚羊角湯

葉湯高年血絡空虛目昏日久復又氣血乘其空隙攻觸脈絡液盡而痛當夜而甚乃熱氣由陰而上也。

宜葉氏羚羊角湯

也。宜葉氏樽勃氣火。醫遮目睛也。宜葉氏山或陰血虛而陽氣盛。

茯苓湯

梔皮湯

或陰血虛而陽氣盛。

能遠視不能近視也。宜地丸陽氣虛而陰血盛。能近視不能遠視也。

宜定志丸

陽升不交于陰。竟夕無寐。而目珠赤痛也。

宜葉氏

桑葉湯

陰傷

火鬱左眼眶疼痛。或微寒汗大出。不可作時邪治也。

宜六味丸去更肉加蔓荆

白芍皮。或肺有寔熱。而眵多結硬。肺有虛熱。而眵稀不結也。

宜經效散

宜驅風一字散

肝腎虛而視一爲

邪中腦項之精。精散視岐見一爲兩也。

宜驅風一字散

肝腎虛而視一爲

兩也。宜腎丸肝胆氣熱而目痛偏左。瞼膜紅絲脉左弦澁也。

宜葉氏草決明

湯陽明空虛。肝陽上擾。而右目多淚。皆脹心嘈雜。當調補肝胃也。

宜葉氏

肝腎

肝胃湯。肝陰內虧。厥陽上越。左目痛。瞼膜澀熱。而脈細澁也。

宜葉氏

補

肝胃湯。肝陰內虧。陽升化風。劫傷血液。而左偏頭痛。先損左目。致瞳人散大也。

宜葉氏

肝

腎兼補丸。時行火邪。兩目腫痛也。宜白蒺藜種種目疾。安可不詳求治法哉。總之暴病皆是風火爲災。

宜葉氏

藜

湯

外以久病則洗眼湯洗之。

皆爲虛候。必須壯水滋陰。宜加味地黃丸或有過服寒涼。以致陽虛。其火轉甚者。則當用溫補。其火自降。目自明矣。宜八味丸凡患目疾。切忌以冰片。辛香金石等藥。搽點。俗語云。眼不醫。不瞎。蓋謂此也。加目疾藥此篇參取危達齋得效方。

脉法 醫鑑曰。左寸脉洪數。心火炎也。關弦而洪。肝火盛也。右寸關俱弦而洪。肝木挾相火之勢。侮肺金而乘脾土也。回春曰。眼本火病。心肝數。洪右寸。開見相火上冲。類聚曰。眼見黑花者。從腎虛而起。左手尺脉沉而數者。是也。

眼病皆火無寒 直指曰。凡眼爲患。多生于熱。治法以清心涼肝。調血順氣爲先耳。入門曰。歷攷眼科之病。無寒而有虛。與熱。豈寒澁血而不上攻歟。

目得血而能視 內經曰。人卧則血歸于肝。肝受血而能視。又

曰。肝虛則目瞶。瞶無所見。難經曰。肝氣通于目。肝和則能變五色。直指曰。肝者。目之外候。肝取木。腎取水。水能生木。子母相合。故肝腎之氣充。則精彩光明。肝腎之氣乏。則昏蒙暈眩。心者。神之舍。又所以爲肝腎之綱焉。蓋心主血。肝藏血。血能熱。凡熱冲發于眼。皆當清心涼肝。入門曰。肝藏血。熱則目赤而腫。虛則眼前生花。

目病原由症治 東垣曰。因心事煩冗。飲食失節。勞役過度。故脾胃虛弱。心火太甚。則百脈沸騰。血脈逆行。邪害孔竅。故日月不明。脾者。諸陰之首。目者。血脉之宗。故脾虛則五臟精氣皆失所司。不能歸明于目矣。心者。君火也。主人之神。宜靜而安。相火代行其令。相火者。包絡也。主百脈。皆榮于目。既勞役運動。損其血脈。故百病生焉。不理脾胃。及養血安神。是治其標。不治其本。

不明此理也。入門日五臟六腑精華皆稟于脾注于目故理
脾胃則氣上升而神清也。肝之系雖連于目而照徹光彩寔腎
精心神所主故補精安神治眼之本也。又曰內障昏蒙因腦脂
下凝烏珠轉白如腦脂凝結瞳人反背者不治。丹溪曰凡昏
弱不能視物內障見黑花瞳子散大皆裡病也。又曰目疾所因
不過虛寔虛者昏花由腎經真水之微也。寔者瞳痛由肝經風
熱之甚也。若虛實相因則兼用滋陰散熱此內治法也。至日久
熱壅血凝而爲攀睛弩肉瞼膜赤爛等則必須點洗外治之法。
正傳曰雀目病暮暗者所虛無血也。至曉復明者木生于亥
旺于卯絕于申酉戌木氣衰故暗至卯木氣盛故復明至雀目
終變爲黃脈宜平胃散以平土氣四物湯以補肝虛保命日
始變爲黃脈宜平胃散以平土氣四物湯以補肝虛保命日

目病在肺爲表。當除風散熱在臟爲裡。當養血安神。

目病易治難治不治及凶症。內經曰。瞳子高者太陽不足。戴眼者太陽已絕。此決死生之要不可以不察也。又曰。目內陷者。

太陽絕也死。

保命曰。外障易治。內障難治。暴發爲表。易治。

久病爲裡難治。直指曰。真珠翳狀如碎米者易散。梅花翳狀如

梅花者難消。

入門曰。瞳人乾缺痛澁無淚者或白翳藏在黑水下。向日細看方見者或兩眼相傳疼痛晝輕夜重者或內障

五色相間頭痛無淚。日中如坐暗室者或雷頭風熱毒氣冲入

睛中或微或大昏暗不見者皆不治。綱目曰。戴眼者目直視

而目睛不轉動也。若目睛動者非直視也。傷寒直視者邪氣壅

盛。臟腑之氣不上榮于目則直視多難治。翊家不可發汗發汗

則目直視不能瞬不能眠。未甚也。迨狂言反目直視與直視

搖頭皆臟腑氣奪絕也卽死。

目病導引法 保生秘要曰對香靜坐灰心歇念目含光意覺
香頭有灰以意吹之又靜覽灰又吹香盡爲期治一切雲翳眵
肉扳睛腎水枯心火盛皆效。

運功 保生秘要曰法行艮背右旋上行逾崑崙經明堂漸旋
至眼細圈入瞳人撤散數十度降胸臆曲行大腸出穀道退火
復歸元位左目運左右目運右左右齊患則止從明堂位上分
行雙運。

又導引法 保生秘要曰先以手抱崑崙仰頭吐氣或噓或呵
鴻而復納次以二目轉動左右上下轉時先開後閉閉而復開
隨時行之不間或動或運二者兼之。

運功 保生秘要曰雙瞳藏于兩腎想腎水浸洗能退熱運微

四散能去風。雙目視二腎。存兩道白水。運至眼中。着意闔。洗膚。
剝單去臂。想二乳下肺肋。推下脚股。吹吸之法。能退白上紅。以
雙手向肩。厯兩脚心。懸空噓吸。能退黑睛熱。能泄肝經之火。常
注念膚。終取腎水升洗覆膚效。

眉稜骨痛。風痰濕火俱有病也。目系所過。上抵于腦。諸陽經挾外
邪。鬱成風熱。毒上攻腦。下注目精。遂從目系過眉骨。相並不痛。若
心肝壅熱。上攻目精而痛。亦目系與眉骨牽連而痛。故其爲症有
由風痰眉骨痛。連于目不可開。晝靜夜劇者。宜芎辛導痰湯。有由風熱眉
心并眉梁骨痛者。宜二陳湯送。有由風熱挾痰而痛者。宜正中苓散。有中
風寒侵犯而痛者。宜芎辛導痰湯加川。大約選奇湯上清散二方。俱爲總治眉稜骨痛之劑。戴復菴
分爲二症。皆屬于肝。一爲肝經傷頭痛。眼不可開。必書靜夜劇。宜

淡湯加川

一爲肝虛而痛方見光明卽發

宜生地黃丸

眉稜骨原由醫說曰眉屬肝故橫生稜木氣眉所生處之骨爲眉稜骨故其爲病亦屬肝

治目病方一百十七

導赤散

心火

生地 木通

甘草各一錢 竹葉七

桑皮湯

肺熱

桑皮 元參 枳壳 杏仁 升麻

花防風

赤芍 甘菊 黃芩 炙甘草 旋覆

清火止痛湯

總治木通

川連 元參 甘菊 連翹 黃芩

當歸

丹皮 白芍藥 木賊草 羌

羊角 生地 藥清草

益氣聰明湯

脾胃

黃芪 甘草 人參 升麻 葛根

熟地黃丸

腎虛

黃柏 莫荊子 柴胡 生地 西黃

養肝丸

肝虛

柏子 桂枝 川芎 牛膝 五味子

當歸 車前子 防風

白芍

桔梗 熟地

白芍

車前子 防風

目病方

龍膽丸

胆火
木香

龍膽草

黃芩

蘆薈

當歸

黑山梔

廣

四物龍胆湯

又
肝熱

龍胆草

川芎

當歸

白芍

熟地

湯泡散

洗
又
肝熱

赤芍

當歸

黃連各一錢

滾水泡

還騎丸

又
車前子

人參

茺蔚子

知母

桔梗

熟地

明目地黃丸

血虛
杏仁

生地

熟地

牛膝

枳壳

防風

芎歸明目丸

甘草
甘草

川芎

當歸

白芍

地黃

牛膝

內障加珍珠

久患目疾方

久患
杞子

甘菊

地黃

白蒺藜

瀉熱黃連湯

寃熱
龍胆草

黃連

黃芩

升麻

柴胡

生地

蓋明立勝散

又
熟

黃連

黃芩

防風

秦皮

黃連湯

又
黃連

細辛

甘菊

川芎

薄荷

蔓荆子

元參

陳皮

決明子散

赤朮
羌活

黃芩

甘菊

次明子

石决明

甘草

蔓荆子

撥雲丹

鵝兩
二錢
薄荷
六分
爲末
水下

蔓荆子

木賊草

密蒙花

川芎各
二錢牛
甘菊二
錢

當歸各二
錢半
黃連八
分

蟬退

楮窠

甘菊花
粉各

無比丸

赤願
石决明
甘草
近視
地芝丸
烏金丹
羌柴湯
白蒺藜湯
服此忌暴怒
酒色辛辣之物

茯苓
當歸
當歸
白蒺藜
飛絲

甘菊
當歸
當歸
白蒺藜
京墨一味

防風各四
兩
羌活
天冬
枳壳
磨濃汁點之

川芎
赤芍
荳本
蔓荆子
細辛各七
分
青箱子
木賊草
白芍
黃連
黃芩

甘菊湯
地芝丸
烏金丹
羌柴湯
白蒺藜湯
服此忌暴怒

又
甘草
近視
生地
飛絲
甚痛
差活
柴胡
白蒺藜
時氣
草決明
川芎各五
分
甘草三分

防風
防風
天冬
枳壳
京墨一味
防風
細辛各七
分
青箱子
木賊草
白芍
黃連
黃芩

洗眼湯

外洗 甘菊 玉竹各一錢 大黃 山梔

細辛 竹葉 蘇葉各五分 甘草 青鹽

各三分

乘熱洗 有障加蟬退

加味地黃丸

久病當歸杞子八兩

熟地黃連澤瀉

山萸人參

山藥丹皮

茯苓

明目四神丸

又炒去茴一用川椒三錢

拌分四股一用小茴三錢

炒出汗去椒一用青鹽

三錢炒一用黑芝麻三錢炒

熟地各三兩白蒺藜四兩

桑葉歸頭酒炒

熟地各三兩石決明

甘菊

熟地各二兩蜜丸每三錢

開水送

八味丸

溫補澤瀉附子

地黃肉桂

山藥山萸

丹皮

茯苓

生熟地黃丸

血虛山藥蜜丸

空心茶下生地

熟地

元參

石膏各一兩

益陰腎氣丸

腎虛山藥茯神

熟地丹皮

酒柴胡

生地歸尾

萸肉各一兩

滋腎明目丸

又錢川芎當歸

白芍人參

桔梗

山梔白芷

黃連生地各一

菊甘草

蔓荆子

各五分

加茶葉

甘草心

駐景丸

肝腎

兔絲子五兩

車前子熟地黃各三

熟地黃各三

加減駐景丸

兩

蜜丸一方加杞子一兩半尤佳

杞子一兩半尤佳

杞子車前子

補肝散

兩

川椒各一兩

熟地一兩

當歸各五錢

補腎丸

兩

前子各三錢

七分半

每末二錢米飲下

通肝散

兩

冰糖山藥各七錢

巴戟天二錢

破故紙

又

山藥荳蔻各一兩

青鹽二錢半

巴戟天二錢半

八味還睛散

散劑

草决明一兩

白蒺藜防風

木穀

草决明

甘草各五錢

青葙子退各

蟬退各

空青丸

沉鬱

防風生地

細辛

石決明

車前子五味子各一兩

牛蒡子各二錢半

白蒺藜

墜智丸

黃心醫

青羊胆青魚膽

鯉魚胆各七個

能胆二錢半

牛膽五錢麝香三分

水

面部

目病方

卷二十一

飛石決明一兩 麵糊丸茶下

涼膽元

穗各二錢半 龍胆草黃芩各五錢 地膚子黃柏

羚羊角散

細辛各二錢半 車前子各五錢 羚羊角每末二錢生姜薄荷湯下三十丸

羚羊角丸

大黃甘草各五錢 郁李仁甘菊 独活川芎 川烏
穗各二錢半 車前子各七錢半 犀角獨活防風甘菊
雀目 雄豬肝竹刀批開納夜明砂扎好米泔水煎服

鴻肝散

烏風大黃甘草各五錢 郁李仁荆芥
穗各二錢半 分二帖空心水煎服
雀目 雄豬肝竹刀批開納夜明砂扎好米泔水煎服
煮七分熟取肝細嚼將汁送下 或雄豬肝煮熟和夜明砂爲丸亦可

蛤粉丸

小兒蛤粉黃蠟等分鎔蠟和蛤粉丸如
塞大用猪肝一片二兩許批開入藥一丸扎好
水一碗煮熟取肝乘熱熏眼溫食以愈止

風疳丸

又夜明砂

青黛

黃連

天麻

五靈脂

川芎

蟬

退各錢半
汁浸糕和丸
用羊肝汁丸尤妙

全蝎二個
乾蟾頭三錢

大猪肝

每十九丸薄荷湯下

若

還睛丸

高風石決明水飛

覆盆子

茺蔚子各二

兩

槐花

人參

細辛

一錢

龍胆草防風

扶苓

甘菊

細辛

甘草各七分

白芍一錢

熟地

柏子仁

蜜丸

黑睛連目系屬厥陰之經此

補肝散

圓醫

柴胡錢半

白芍一錢

熟地

柏子仁

荳芩

附子各一錢

黑睛治里睛疼

風各五分

蠟茶飲

赤朮

芽茶

白芷

附子各一錢

細辛

荆芥各五分

鹽少許

黑睛連目系屬厥陰之經此

夏枯草散

川芎

防風

羌活

荆芥各五分

鹽少許

黑睛連目系屬厥陰之經此

明目流氣飲

又

荆芥穗

夏枯草

二兩

香附

一兩

甘草

五錢

川芎

每末三錢食後茶清調下

至夜其者最效

益黑睛連目系屬厥陰之經此

物有補養厥陰血脉之功故其效如此

善本一兩

惡寒

甘菊

防風

白蒺藜

荳芩

細辛

元參

蔓荆子

木賊草

山梔

共爲末

羊肝元

白羊子肝一具去膜
黃連一兩先另研
未和同研衆手作丸空心水下三十丸連服五劑差
青羊肝尤妙

神仙退雲丸

酒當歸兩半
木賊草去節童便浸焙
川芎 荆芥穗 密蒙花 地骨皮
白蒺藜 羌活各一兩 川椒七錢半 甘菊
子 花粉 桑椹 薄荷 草決明 炙甘草
各五錢 蟭壳 蟬壳 黃連各三錢 蜜丸

地黃散

酒當歸兩半
木賊草去節童便浸焙
潤燥 生地一兩 赤芍 當歸
每末五錢水煎服

二黃散

酒當歸兩半
木賊草去節童便浸焙
分半 蜜少許全煎
大黃 黃芩 防風 薄荷各一錢
黃連二錢半

定心元

酒當歸兩半
木賊草去節童便浸焙
蠶黃連二錢半 蜜丸
蜜少許全煎

速效散

酒當歸兩半
木賊草去節童便浸焙
荷葉 蒜黃 胡蘿蔔 菊花
粉 蔓荆子 荆芥

桑螵蛸 石决明 甘菊
葛根 甘草 草决明各五分
食後服

還晴紫金丹

爛弦風 白蜜二兩
中十次水浸半日 火石甘石一兩
水飛黃丹六錢 煎淬水
烏頭膏

去壳一錢
湯煮令自乾各五分
一分先于砂石器內慢火熬塞去沫下甘石
末次下黃丹柳枝攢再下餘藥不粘手爲度
芩子大每一丸溫水化開時點

聖草散

又
圓兩眸子紗上然後以汁滴之當有虫出
芎又荆芥甘草各一錢人參茯苓川
分陳皮厚朴各三分每末二錢水下

石决明散

又
木賦草羌活山梔赤芍各五錢青箱子
荆芥各二錢半每末二錢麥冬湯下大黃

消毒飲

又
風粟草各一錢大黃一名加味荆芥穗各二錢
漏睛白微五錢防風羌活白蒺藜
石榴皮各二錢半粉糊丸
又地骨黃芪黃芩
分水煎酒遠志人參赤芩防風各一錢
水煎食後服

黃芪散

又
地骨黃芪黃芩
分水煎酒遠志人參赤芩防風各一錢
水煎食後服

五退散

風輪川山甲 川烏炮 灸草各五錢
退醋煮 奚退紙 蟬退 猪蹄壳 荆芥梗
各二錢半 每末二錢食後益湯下 蛇

春雪膏

瞬硬
此方兼治一切目赤腫痛淚出皆屬此又專治翳眼風多年連眶赤爛者最效
芥仁去壳皮研押去油二兩 水片二錢半 生蜜六錢研勻以銅箸蘸點
穗 藥草各一錢半 龍膽草 山梔各二錢 防風
草各一錢 元參 茵陳 甘菊 桃棗 荆芥
每末二錢食後茶清下 甘

龍胆散

清肺散

芥參 茅根 血竭 桑皮 片芩 升麻 甘菊 枳壳 防風
生地 蕤 芒花 胡 草 升麻 赤芍 归尾 元參 荆芥
明 車前子 茄子 芦 草 白蒺藜 木誠草 旋覆花
爲末 每二錢米飲下 蘿蔴草 甘菊 茶葉 茶葉
大黃

洗心散

鉢刺癰 麻黃去節 荆芥穗 當歸
赤芍 甘草各一錢 白朮五分 藥大黃
甘草各一錢 荆芥穗 當歸
白朮五分 藥大黃
搏荷七

藥水煎服

天門冬飲子

鱉髓

天冬

知母

茺蔚子各一錢

赤茯苓

人參

羌活各七分

防風各

五分

水煎

食後服

犀角散

又

車前子

杞子各一兩

槐子

五味子

錢半

牛蒡子

青葙子

茺蔚子

胡黃連各七

蟬花無比散

喉偏

每錢半

羊角

犀角各五錢

兔肝一具微

浸焙

荅木童

便浸一夜切晒

白芍藥各一

槐子丸

又

槐子二兩

覆盆子

東仁

柏子仁

蔓荆子

車前子

茺蔚子

鼠粘子

白蒺藜

細辛各一錢

每末二錢茶清

犀角飲

黃膜

犀角二錢

羌活

黃芩

車前子各

白僵蚕散

黃膜

白附子

麥冬各五分

水煎

食後服

芥穗

黃桑葉

一兩

木賊草

水煎

覆花

荆

甘草

姜桑各三錢

細辛五分

水煎服亦可

每

荆

當歸龍鬚丸

又黃芩各一兩

當歸

山梔

黃連

黃柏

木香二錢半

蘆薈五分

蜜丸

姜湯下二三

驅風一字散

防風各二錢半

大黃每末二錢

食後薄荷湯

下

青黛各五錢

地黃膏

寒水石各五錢

生地一合

取汁

黃連一兩

黃柏

生地黃散

桔梗各一錢半

荊芥各五錢

當歸

川芎

赤芍

瞿麥散

瞿麥炒黃爲末

鵝頭調和逐時塗

皆頭

益本滋腎丸

桔梗各一錢半

酒黃柏

當歸

車前各二兩

防風

決明元

桔梗各一錢半

酒知母

當歸

車前各二兩

防風

補陽湯

知陳草藥多

甘涼熟地

肉桂一分

白芍一分

清晨服此湯臨卧

知母各三分

防風

桔梗各一錢半

酒黃柏各五分

澤瀉當歸

服連柏益陰丸

連柏益陰丸

又
當歸茶
蜜丸茶
病後膏
子
晒
芥
蒺藜各
錢茶清下

草决明
防風
甘草各五錢
宜多服
甘菊
退

西黃蓮
甘草
蜜
石決明二錢
少服此丸

蟬花散

決明
防風
蒼木
橘草
甘菊四兩
芥
蒺藜各三兩
荆芥
甘草

山梔
密蒙花
木賊草
等分爲末
每二錢茶
白蒺藜草
退

菊花散

又
甘菊四兩
芥
蒺藜各三兩
荆芥
甘草

羌活
密蒙花
木賊草
等分爲末
每二錢茶
白蒺藜草
退

羌活退翳湯

太陽經
芥
藁本各七分

羌活錢半
防風一錢
薄荷

酒知母五分
酒黃柏四
升麻各二兩
甘草一兩半

羚羊角散

二分
川芎

當歸各三分

川芎
細辛各一分

麻黃
酒生地各
升麻各二兩
甘草一兩半

瀉青丸

肝熱
大黃

陷腎
半牛蜜丸
當歸
龍胆草

升麻各二兩
甘草一兩半

取未一錢
泔水煎送
川芎
黑山梔
大
每

羌活全砂糖化
下

一名涼肝丸
大
每

烏賊骨散

清腎

烏賊骨

水片各一錢

爲末日點三

洗肝散

肝積熱

羌活

當歸

薄荷

防風

炙甘草

草大黃

川芎

山梔

各一錢

加龍胆草

一錢尤佳

局方蜜蒙花散

羌活

蜜蒙花

白蒺藜

木賊草

石決明

點藥石決明散

膜入水輪

石決明

等分每末一錢茶清下

珍珠

西珀各七錢五

共爲末以銅

補腎元

黑腎

此方兼治一切丁醫根脚極厚久不差者

疔瘻

根脚極厚久不差者

磨腎膏

花腎

白口含去皮壳一兩

水片三錢

清涼散

空青

二錢研極細取少許點

經效散

鐵牛

研極細取少許點

觀音夢授丸

犀角各一

錢

柴胡二錢

苦竹葉

甘草各

分量

赤膜

夜明砂

甘草五分

食後服

當歸

當歸打膏爲丸空心熟水下五

十九百日如舊

百點膏

又

黃連三錢剉水一碗煎至半碗入防風八

分歸身甘草各六分蕤仁泥三分全

熬至滴水不散絞去渣入煉蜜少許再熬片時
令靜心熱之日五七次臨卧點尤效此方兼可點一切瞼膜

春雪膏

眼昏研極細每用少許口中津液和點閉目片時開
眼淚出效

抑青明日湯

白芍半夏陳皮甘草柴胡黃連生地川連遠志白朮赤芩
當歸枳壳龍胆草各七分山梔姜三莖二

夜光育神丸

杞子熟地甘菊等分蜜丸空心酒下五十九

滋陽地黃丸

眼花當歸蜜錢地各一兩柴胡八錢生地七錢半川連熟
地骨皮五味子各三錢黃芩六錢天冬炙草各二

錢蜜丸茶清下百丸亦名熟地黃丸此失血之驗也宜此丸與定

面部志丸間服

救苦湯

附
各一錢

蒼术

龍胆草各錢半

當歸

甘草

川芎六分

川柏

知母

黃芩各五分

羌活

防風

升麻

柴胡

黃芩各二分

紅花各三分

桔梗

連翹

細辛

水煎食後服

葉氏荷葉湯

失血
葵豆皮

鮮荷葉

冬桑葉

赤苓皮

甘草

葉氏羚羊角湯

高年
青菊葉

羚羊角

連翹心

夏枯草

丹皮

葉氏夏枯草湯

明
風溫
通草

夏枯草

桑葉

連翹

赤芍

草決

葉氏連翹湯

秋燥
苦丁茶

連翹

薄荷

黃芩

山梔

桑皮

葉氏茯苓湯

熱蒸
通草

冬桑葉

穀精草

望月砂

荳仁

葉氏山梔反湯

鬱勃
草決明

山梔皮

夏枯草

穀精草

望月砂

連翹

葉氏桑葉湯

陽升
草決明

桑葉

丹皮

苡仁

生香附

川貝母

夏枯草

小胡

葉氏草决明湯

肝膽
麻穀精

草決明

冬桑葉

夏枯草

白芍各錢半

茯

葉氏肝胃湯

肝胃
神三錢

黃芪三錢

當歸

南杏一枚

草决明

白芍各錢半

茯

葉氏補肝湯

炒杞子

望月砂

製首烏

福豆皮各三錢

生地

小胡麻各錢半

冬桑葉

黃菊花

各一錢

石決明一具

葉氏

兼補丸

焦煩

熟地

杞子

山萸

茯神

甘菊

治眉稜骨痛方九

二陳湯

痰火

茯苓

甘草

半夏

陳皮

青州白元子

川烏

五錢

共爲細末

南星

三兩

白附子

二兩

羌鳥散

川烏

童便浸二宿

細辛

羌活

各五分

爲末

分二服

食後

芎辛導痰湯

國溫痰

赤苓

半夏七兩

南星三兩

白附子二兩

川芎

細辛

生地黃丸

川虛

陳皮

各一錢

枳壳

甘草各五分

南星

川芎

細辛

白芍

防風

枳壳

決明

熟地黃丸

川虛

陳皮

各一錢

生地

川烏

童便浸二宿

細辛

羌活

各五分

爲末

分二服

食後

面部

目病

方

黃芪

覆盆子

菟絲子

防風

肉蓯蓉

茺蔚

地

芷芩散

膚子
九空心
茶清下

磁石煅各一兩
菟肝一具炙乾
鹽湯下

選奇湯

半治

風熱痰
羌活
防風
半夏各二錢
黃芩錢

上清散

又半

川芎
一錢
葛金
赤芍
荆芥
薄荷
等分爲末每二錢

分半

研末搐鼻
二錢半
乳香
沒藥各五分
冰片二