

雜
病
源
流
犀
燭

沈氏尊生書卷二十五

雜病源流犀燭

身形門

身形病源流

沈金鰲撰

人之生也。得天地之氣化以成形。是故頭圓象天。足方象地。四肢象四時。五臟六腑象五行六極。八節九竅象八風九星。十二經二十四俞。象十二時二十四氣。三百六十五骨節。象三百六十五度。推之。眼目象日月。寤寐象晝夜。喜怒哀象雷電。涕泣象雨露。寒熱象陰陽。血脈象水泉。毛髮象草木。齒骨象金石。凡人所以備具于一身者。莫不與天地假合以成形。故前人屢申其旨。而人自不之察。故渺視其身。而不能與天地爲昭也。惟其然。故天有陰陽寒暑之愆。人因有百疾之作。亦于是而相應。而百疾之作。由于氣血之失常。其明者。能法陰陽。和術數。節飲食。慎起居。謹作勞。保精存液。以

充其形。故能形與神俱。而百疾不作。否則一失其常。而或傷乎氣。或傷乎血。氣傷則餒。血傷則稿。種種病根。悉因乎此。又况風寒暑濕之感于外者。在可禦不可禦之間。饑飽勞役之傷于內者。在或知或不知之際。其來無端。其始無迹。又豈可以智計定哉。然而疾之未作。思有以預防之。疾之既作。必有以調治之。是故醫者。可以通神明而扶造化。欲通神明而扶造化。則必先于身形大槩。以知其故而審其原。靈樞曰。人生十歲。五臟始定。血氣始通。真氣在下。故好走。二十歲。血氣始盛。肌肉方長。故好趨。三十歲。五臟大盛。肌肉堅固。血脈充滿。故好步。四十歲。五臟六腑十二經脈皆大盛。以平定。腠理始疎。榮華頹落。鬢髮斑白。氣血平盛而不搖。故好坐。五十歲。肝氣始衰。肝葉始薄。胆汁始減。故目視不明。六十歲。心氣始衰。善憂悲。血氣解墜。故好卧。七十歲。脾氣虛。故皮膚枯。八十歲。肺

氣衰。神離。故言善候九十歲。腎氣焦。四臟經脉空虛。百歲五臟皆虛。神氣乃去。形骸徒具而已。素問又曰。人生四十。陰氣自半。起居衰矣。年五十。體重。耳目不聰明矣。年六十。陰痿。氣大衰。九竅不和。下虛上寔。涕泣俱出矣。此人身氣血盛衰之原也。臞仙曰。精者身之本。氣者神之主。形者神之宅。故神太用則歇。精太用則竭。氣太勞則絕。是以人之生者。神也。形之托者。氣也。若氣衰則形耗。欲長生者。未之聞也。類纂曰。穀氣勝元氣。其人肥而不壽。元氣勝穀氣。其人瘦而壽。悟真篇註曰。一身之中。以精氣神爲主。神生于氣。氣生于精。修真之士。不過煉治精氣神三物而已。此人身形存滅之故也。夫苟洞徹乎盛衰之原。以無戾乎生滅之故。則卽身形之內。亦何至有疾病之乘。偶或乘之。亦何不可以治之哉。

養生療病要法

太乙真人七禁文曰。一者少言語。養內氣。二

者戒色慾。養精神。三者薄滋味。養血氣。四者嚥津液。養臟氣。五者莫嗔怒。養肝氣。六者美飲食。養胃氣。七者少思慮。養心氣。人由氣生。氣由神旺。養氣全神。可得真道。凡在萬形之中。所保者莫先于元氣。又曰。欲治其疾。先治其心。必正其心。乃資其道。使病者盡去。心中疑慮。思想一切妄念。一切不平。一切人我。悔悟平生所爲過惡。便當放下身心。以我之天。而合于所事之天。久之遂凝于神。則自然心君泰寧。性地平。知世間萬事皆是空虛。終日營爲皆是妄想。知我身皆是虛幻。禍福皆是無有生。死皆是一夢。慨然領悟。頓然解釋。則心地自然清淨。疾病自然安痊。能如是。則藥未到口。病已忘矣。此真人以道治心療病之大法也。

三精丸

蒼朮天之精 地骨皮地之精 各淨末一升
黑桑椹人之精 二十升 搗爛袋盛取汁將二藥
末入汁中調勻入礬內密封口置棚上晝受日
精夜受月精待自然煎乾爲末蜜丸每十九酒
湯任下

延年不老丹


此方久服輕身延年面如童子
何首烏赤白各四兩米泔浸竹刀刮去皮切片
黑豆煎汁浸透陰乾却用甘草汁拌晒乾搗末
不許蒸煮 地骨皮酒洗晒乾 白茯苓酒洗
晒乾各五兩 生皮酒浸一宿晒乾 熟地酒
洗晒乾 天冬酒浸三時晒乾 麥冬酒浸三
時晒乾 人參各三兩 蜜丸酒下三五丸
此方千益百補服之十日或一月自已知爲別
等入久服功難盡言寔作祖之初梯也

附周身諸穴分屬十二經及督任二脉圖

遵照三才圖會并參對歌訣校正無訛

肺經諸穴

雲門 臂下夾乳旁
二寸陷中去中行任脉
六寸 氣戶 臂下俞
府陰 旁二寸陷中去
中行任脉四寸去府陰
四寸八分 俞府 臂下
下腋橫旁二寸陷中
璇璣 天突下一寸 天
突 氣喉下四寸宛宛中
右按穴之法由天突
起下璇璣由璇璣至
雲門其法甚簡後俱
倣此




太陰肺分出中府雲門之下一寸許雲門璇璣旁六寸巨骨之下二骨數天府脇下三寸

夾肘上五寸至尺澤肘中約紋論孔最腕上七寸取列缺腕側一寸半經渠寸口陷

六淵掌後橫紋頭魚際節後散脉舉少商大指端內側此穴若針病即愈


取肺大指本節後

大腸經穴



商陽食指內側近二間來平本節前三間節後陷中取谷虎口岐骨間陽谷上側腕中是
 偏歷腕後三寸安溫溜腕後去五寸池前五寸下廉池前三寸上廉池前二寸三里逢
 曲池曲骨紋頭盡肘髎大骨外廉近大筋中央尋五肘上三寸行向臑臂臑肘上七寸量
 肩髃肩端來臂取巨骨肩央端上行天鼎喉旁四寸上臑天鼎旁三寸水臑水溝旁五寸
 迎香禾髎上一寸大腸經穴自分明

胃經諸穴



胃之經兮足陽明。承泣目下七分。四白目下方一寸。巨髕鼻孔旁八分。地倉夾吻四分。大迎頰下寸三分。頰車耳下八分。穴下關耳前動脈前。頰維神庭旁四寸五分。迎喉旁寸五中。水突筋前迎下在氣舍。突下穴里。缺盆腋下橫骨內。各去中行寸半。明氣戶璇璣旁四寸。至乳六寸又四分。庫房屋脊膺窓。乳中正在乳頭心。次有乳根。乳下各一寸六不相侵。却去中行須四寸。以前穴道項脊陳。不容巨闕旁三寸。却近幽門寸五新。其下承滿與梁門。闕門太乙滑育門。上下一寸無多少。共去中行三寸中。天樞臍旁二寸間。臍下一寸外陵安。臍下二寸大巨穴。臍下四寸水道全。臍下六寸歸來是。共去中行二寸。臍氣衝臍上二寸。又去中行四寸。專解開膝上有八二伏兔膝上六寸。是陰市。膝上方三寸。梁邱膝上三寸。記膝腹陷中犢鼻存。膝下三寸三里至。臍下六寸上廉穴。膝下七寸條口味。膝下八寸下廉。膝下九寸豐隆。係却是踝上八寸量。比那下廉外邊綴。解谿去庭六寸半。搏陽庭後五寸換。陷谷庭後二寸間。內庭次指五間陷。厲兌大指次指端。去爪如韭。胃并判。

心經諸穴




少陰心起極泉中。腋下筋間脉入胸。青靈肘上三寸取。少海肘後端五分。靈道掌後一寸半。通里腕後一寸全。陰郄腕後方寸半。神門掌後兌骨隆。少府節後勞宮直。小指內側取少衝。


考心包絡穴在右手節後與左手少府相對

腎經諸穴

足掌心中是湧泉然谷踝下一寸前足絡踵後跟骨上大鐘跟後踵中過水泉絡下一寸至照海踝下四分安復留踝上前二寸安信踝上二寸然二穴止隔筋前後太陽之後少陰前繫竅肉踝上端分陰谷膝下曲膝間橫骨大赫并氣穴四滿中注并相逆各開中行止半寸上下相上一寸使上竅俞俞亦一寸育俞膝旁一寸逆俞前商曲石關束溪郛通谷幽門開谷開中行五分撓六穴上一寸募步廊神封靈墟在神藏或中俞府募各開中行計二寸上下六寸六穴俞府璇璣旁二寸取之得法有成功




膀胱經諸穴



足太陽兮膀胱經。目內眥角始睛明。眉頭陷中摺竹取曲差髮際上五分五處髮上一寸是承光髮上二寸半通天絡却五枕穴相去寸五調勻看。玉枕夾腦一寸三入髮二寸枕骨塊。天柱項後髮際中大筋外廉陷中缺。自此夾脊開寸五第一大孖二風門。三椎肺俞厥陰四心俞五椎之下論膈七肝八胆俞。十一脾俞十二胃十三三焦十四腎大腸十六之下椎。小腸十八膀十九中膈內俞二十椎。白環二十一椎下。以上諸穴可排之更有上次中下髻一二三四腰空姪會陽陰尻骨旁背部二行諸穴。又從脊上開三寸第二椎下爲附分三椎魄戶四脊背第五椎下神堂。第六噫噓膈闕七第九魂門陽綱。十一意舍之穴存十二胃倉穴已分十三盲門端正在十四志室不須論十九胞背廿跌邊背部三行諸穴。又從腰下陰紋取承扶居于陷中至浮郛扶下方六分。委陽扶下寸六數殷門扶下六寸長腦中外廉兩筋鄉委中膝膈約紋裡此下三寸尋合陽承筋根脚上七寸穴在膈腸之中央承山膈下分內間外踝七寸上飛揚輔陽外踝上三寸崑崙後跟陷中央僕參亦在踝骨下。申脉踝下五分張金門中脉下一寸京骨外側骨際基束脉本節後陷中。通谷節前陷中強至陰却在小指側太陽之穴始周詳。

按魄戶對肺俞神堂對心俞魂門對肝俞意舍對脾俞志室對腎俞蓋以肺藏魄心藏神肝藏魂脾藏意腎藏志是謂五神藏也。白環俞卽腰俞。

心包絡經諸穴




心包起自天池間。乳後一寸腋下一寸。天泉曲腋下一寸。曲澤屈肘陷中央。
却門去腕方五寸間。使腕後三寸。量內關去腕止二寸。大陵掌後兩筋間。
勞宮屈中名指取中指之末中節長。

折二第

折二第

折一第

膽經諸穴




足少陽今四十三頭上廿六分三折起自瞳子至風池積教陳之依次第瞳子
 膠近背五及耳前陷中尋應食客主人名上閉全耳前起骨開口空領廉懸頭

之一穴腦空上廉曲角下懸釐之穴異于茲腦空下廉曲角上曲髻耳上髮際
隅率谷耳上寸半安天衝耳後入髮二浮白入髮一寸間敷陰即是枕骨穴完
骨之上有空連完骨耳後入髮際量得四分須用記本神神庭旁三寸入髮一
寸耳上係陽白眉上方一寸髮上五分臨泣用髮上一寸當陽穴髮上牛寸目
窓黃正營髮上二寸半承靈髮上四寸攢腦空髮上五寸半風池耳後髮際中
肩井肩上陷中求大骨之前一寸半淵液腋下方三寸輶筋期下五分判期門
却是肝之穴相去巨關四寸半日月期門下五分京門監骨下腰結帶脉章門
下寸八五樞章下寸八貫維道章下五寸三居髻章下八寸三章門亦是肝經
穴下腕之旁九寸含環跳髀樞宛宛中屈上伸下取穴同風市垂手中指盡膝
上五寸中渚論陽關陽陵上三寸陽陵膝下一寸從陽交外踝上七寸踝上六
寸外邱用踝上五寸光明穴踝上四寸陽輔分踝上三寸懸鐘在邱墟踝前之
陷中此去俠谿四寸五却是胆經原穴功臨泣俠谿後寸半五會去敷陰穴同
頭上二十穴次第共分三折

一膽子髻二懸釐三主人兮領厭四五懸釐今六懸釐第七數分曲髻隨穴率
谷兮九天衝十浮白兮之穴從十一竅陰亦相繼十二完骨一折終又自十三
本神始十四陽白二折隨十五臨泣日下穴十六目窓之穴宜十七正營十八
靈十九腦戶廿風池依次細心量取之胆經頭上穴堪知


肝經諸穴

足大指內側爲白
外側爲大敦




足大指端名大敦行間大指經中存太衝本節後二七踝前一寸號中封後滿
踝上五寸是中都踝上七寸中臈關臈關下二寸曲泉曲臈盡橫紋陰包臈上
方四寸氣衝三寸下五里陰廉衝下有二寸羊矢衝下一寸許氣衝却是胃經
穴鼠蹊之上一寸主鼠蹊橫骨端盡處相去中行四寸主章門下腋旁九寸肘
尖盡處側臥取期門又在巨關旁四寸五分無差矣

任脉諸穴




任脉會陰兩陰間曲骨毛際陷中安中極臍下四寸取關元臍下三寸連臍下二寸各石門臍下寸半氣海全臍下一寸陰交穴臍之中央即神闕臍上一寸為水分臍上二寸下腕列臍上三寸名建里臍上四寸中脘許臍上五寸上腕在巨關臍上六寸五寸尾蔽骨下五分中庭臍下寸六取臍中却在兩乳間臍上寸六玉堂王臍上紫宮二寸臍上華蓋四寸象臍上璫瑛五寸六璇上一寸天突起天突臍下約四寸廉泉臍下骨去已示漿臍前肩後下任脉中央行




七衝門圖


唇爲飛門 齒爲戶門 會厭爲吸門 胃爲賁門
 大倉下口爲幽門 大小腸爲關門 下極爲魄門



臟腑配面圖



肢節配面圖




陷疔身陰疽癰疽圖

一切瘡症不盡


發背形如蓮子頭多矣
出者是也 高腫膿潰
者生平增陰陷者死

發背形如蜂窠頭含
蠟子片片腐爛孔孔
流膿者是也 紅活
者生黑陷者死

蓮子發



蜂窠發



井疽心火妄動而成
赤高腫者生屋硬紫黑者死



玉枕疽膀胱熱凝結
而成紅腫者生黑而
者死

對心發心火沸騰濕熱
者生取陷紫黑者死




天疽乃陽火熾甚而發
紅赤高腫者生紫黑
平陷者死


對口疽太陽經濕熱結
聚而成高腫易腐者生
平塌堅硬者死



附骨疽初起大腿筋骨作痛
久則漫腫 腫出黃稠者生
氣敗者死

失榮生于耳之前後及項間
初如瘰核久則堅硬漸大如
石破後無膿惟流血水堅硬
仍作腫痛異當乃百死一生
之症





脾壯瘡乃飲食炙博厚
味酸成紅赤高腫潰
爛者生平陷紫黑者死

人面瘡乃前生冤業所致
先以省修方可醫治



脾壯瘡





人面瘡



凡外症高腫為癰沉潰
為疽有膿者生無膿
者死





胃口疽發在心胸之
旁有頭為陽無頭為
陰乃飲食不轉所致





唇疽生唇上有頭
腫起寒熱交作乃
胃經積熱所致
流注所發不論穴
道隨處而生漫腫
無頭皮色不變一
二個起至十一個
止








小腸危腹疾膈突是也



楊梅瘡



鈕扣風頂上如癰作痒
不止
腋瘻亦名稀風瘻

鈕扣風

腋瘻



乳岩中空似岩穴邊
腫若泛蓮重死候也


乳岩



乳疔紅腫發熱疼痛
是也



乳疽堅硬腐爛是也



筋骨皮肉毛髮病源流

沈金鰲撰

筋也者。所以束節絡骨。絆肉。彌皮。爲一身之關紐。利全體之運動者也。其主則屬于肝。故曰筋者肝之合。按人身之筋。到處皆有。縱橫無算。而又有爲諸筋之主者。曰宗筋。內經註謂陰毛橫骨上下之堅筋。上絡胸腹。下貫臍尻。又經于背腹上頸項者是也。筋之總聚處。則在于膝。靈樞云。諸筋者皆屬于節。節卽膝也。所以屈伸行動。皆筋爲之。然則筋之有關於人身。豈淺鮮哉。試詳言筋病。曰筋急。曰筋緩。曰筋攣。曰筋痿。曰筋惕。曰筋傷。曰筋結。曰轉筋。曰筋絕。其名目如此。靈樞皆以寒熱分急緩之由。謂寒則反折而急。熱則弛縱而緩。得效又以筋急爲寒。急者堅強。筋縮爲熱。縮者短促。弛緩爲濕。緩者寬長。又言但熱不會受寒。亦使人筋緩。是其意。是以縮卽爲拘攣之義。而但熱之緩。不過舒長。受濕之緩。乃竟舒長無

力分析尤爲細密。若仲景言血虛則筋急。此又筋急之原。由血脈不榮于筋之故也。丹溪以四物湯治筋急。本事方以養血地黃湯治筋急。蓋本乎此。然觀于筋急之原。血虛即可知。筋緩之原。血熱無足疑者。筋急宜酒煮木瓜。筋緩宜五加皮散。若夫熱勝風搏。併干經絡。風火相乘。是以瞀瘖。此卽筋攣之由也。故筋攣亦曰筋瘈。瘈者瘈瘲。卽俗云搐是也。其症亦往往作痛。宜祛風經曰。肝氣熱則胆泄口苦。筋膜乾。筋膜乾則筋急而攣。發爲筋瘈。思想無窮。所願不得。意淫于外。人房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。則是筋瘈寔生于肝熱也。胆附肝。性肝熱。故胆洩。筋膜乾而成痿者。血液槁也。宜紫葳湯。傷寒發汗過多。則傷其血。血虛無以榮筋。因拘急而惕惕然跳。且四體百骸亦矻矻然動。是筋惕肉矻。由于筋肉失養。陶節菴謂宜用四物湯去地黃。加人參。茯苓。半夏。甘草作劑。佐以五靈脂。入生姜烏梅煎服。

自有神效。以藥熯王生血。生血乃所以收汗。宜真武湯此仲景法久行傷筋

者。筋王運動久行則太勞而致傷也。宜養肝丸肝之經脈不調氣血失

節。往往有筋結之患。不論骸體間。纍纍然若胡桃塊狀是也。宜以木杓

打之三丹溪以轉筋屬血熱。恐但血熱猶不至患轉筋。必先血熱

于內而又感風寒之故。其症并有始轉于足大指轉上至大腿且

近腰者。宜四物湯加酒芩紅花南星蒼朮霍亂後轉筋緣胃大腸皆以榮宗筋暴

吐暴瀉則胃大腸之津液驟亡宗筋失養故輕則兩腳轉筋重則

至于遍體且入腹手足逆冷危在頃刻也。宜木瓜湯理中湯加石膏靈樞曰筋

絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休手足爪甲色青者肝

色也則知筋絕肝亦絕矣。審是而筋之爲病其可忽哉。

舒筋法 得效曰此法治破傷後筋攣縮不能伸他病筋縮亦

可大竹管長尺餘兩頭鑽一竅係以繩掛于腰間每坐舉足搓

衮之勿計工程。久當有效。一人墜馬折脛。脚筋攣縮。不能行步。遇道人傳以此法。數日便愈如常。

骨也者。所以爲一身之撐架。猶屋之有樑柱然也。屋非樑柱不能堅。人非有骨不能立也。經言腎主骨。又言骨者髓之府。是惟腎氣足。故髓充滿。髓充滿。故骨堅強也。骨有本。顙骨也。凡人一身骨格。有大有小。骨大者顙必大。骨小者顙必小。驗之人人。而靈樞之言益足信也。凡人一身之骨最大者脊骨也。經言脊骨以下至尾骶二十一節。長三尺。脊節謂之節。脊窮謂之骶。是不但爲骨之最大。且居中。麗正。一身之骨皆于是附。猶屋之正樑。且爲一身之骨之主也。而其爲病約有四端。一曰寒。內經言人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不凍慄者。以是人素腎氣勝。以水爲事。太陽氣衰。腎脂枯。不長。一水不能勝兩火。腎者水也。而生于骨。腎不生。則髓

不能滿。故寒甚至骨也。所以不能凍慄者。肝一陽也。心二陽也。腎

孤臟也。一水不能勝二火。故不能凍慄。病名骨痺。是人當舉節也。

據經之言。骨寒之病甚深。非但浮淺惡寒之謂也。宜溫腎散加附子肉桂虎骨。

一曰熱。其熱從骨間蒸發。按之雖不甚烙手。然覺有鬱蒸。不可耐

狀。有非飲湯引水所能解。其板齒必乾燥。以齒者骨之餘。板齒尤

諸齒之門戶。骨熱故板齒乾燥。即經言髓涸齒乾。乃爲骨熱病者

是也。宜微陰降火湯加龜甲地骨皮。其或因骨熱至四肢緩弱不舉。駸駸成骨痿

之症矣。一曰痿。內經言腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨

痿。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍于腎。

腎者水臟也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發爲骨痿

也。據經之言。骨痿之病由于骨熱。非但尋常疲弱之謂也。宜虎一

日痛人身之痛。或由風淫濕滯。或由血刺痰攻。淺不過肌肉皮毛。

深亦止經絡臟腑。若入裏徹骨作痠作疼。雖因寒因熱有不同。要其損傷勞極爲至甚而無加矣。宜虎骨散二妙散他如久立傷骨。骨傷之病。或亦有痛者。或癢至成瘡者。當受傷之初。不可不急救也。宜補牛骨髓鹿茸骨碎補迨至骨絕齒必黃落。雖有藥餌不可救矣。經故斷之爲十日死也。

骨病症治 難經曰。少陰者冬脉也。伏行而濡骨髓者也。直指曰。骨爲髓之藏。髓者飲食五味之寔秀也。髓虛則骨虛。勢所必至也。又曰。骨熱病當與骨蒸門參看。資生曰。扁鵲云。病在腠理。湯熨之所及也。在血脉。針石之所及也。在腸胃。酒醴之所及也。其在骨髓。雖司命無柰之何矣。夫病在骨髓。扁鵲以爲難。則骨髓有病。病亦憊矣。

皮也者。所以包涵肌肉。防衛筋骨者也。皮之外。又有薄皮曰膚。俗

謂之枯皮。經言皮膚亦曰腠理。津液滲洩之所曰腠。文理縫會之

中曰理。腠理亦曰元府。元府者汗孔也。汗液色元從空而出以汗

聚於裏故謂之元府。府聚也。皮之所主爲肺故凡風寒之邪襲人

肺先受之以其先入皮毛也。邪着皮毛腠理開洩然後入于絡脉

侵及于經發而爲病其理然也。皮之爲病若癰疹。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條若癰瘡。另詳本條

外各異如此。然爲痒爲痛。又有因于火之微甚者。河間云。人近火微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而爲瘡。皆火之用。或云。痛爲寔痒。爲虛。非謂虛爲寒。正謂熱之微甚。此河間之論。又于痒痛所因之外。就火之一端。以析痒痛者也。若乃丹毒者。亦皮之病。人身忽然變赤如丹塗。名赤瘤。或因瘡而得。瘡赤者。名瘡瘤。皆遊走無定狀。如雲氣。總緣惡毒熱血蘊結。命門遇君相二火合起。致發此症。其輕者。亦緣風熱所致。總治宜四順清涼飲。外塗拔毒散。又有皮膚忽起赤暈。或發熱作痒。或搔破出水。名赤遊風。亦謂之丹毒。然其症狀。畢竟與丹毒稍異。宜臨症分辨。而遊風之因。起于脾肺氣虛。腠理不密。風熱相搏。宜刺陽。或端由風熱。宜小柴胡湯。或端由血熱所致。宜四物湯。或端由血熱所致。宜四物湯。胡山梔治之。但宜涼血消風。清肝養血。則火自息。痒自止。切不可用祛風之藥。反燥肝血。使元氣虛而別生他症。若素有病面上

忽見紅點多死。並試舉毒遊風之屬。條列言之。有赤瘤丹毒者。宜

名異末蒸汁有赤黑丹疥。或痒或燥。不急治。遍身卽死者。宜白蘆

調塗立消胎調。有五色丹毒。俗名遊腫。犯之多死者。宜白皮末有火丹赤

腫遍身者。宜磨大黃有火焰丹毒從頭起者。宜生蔥有火丹發足

脛以上者。宜鏡面草打有火霞丹毒從兩脚起如火燒者。宜五加

燒灰煨鐵槽有不拘何處火丹發而疼腫難忍者。宜鱧頭有烟火

中水和塗。丹發從背起。或兩脇及兩足其赤如火者。宜景天草珍珠各一有

螢火丹從頭起。亦名熱毒丹瘡者。宜慎火草搗有幼小火丹者。宜

芥末水有一切熱毒丹腫腮痛者。宜赤小豆末有丹從臍起者。宜

梅末醋有身面卒得赤斑。或癩子腫起不治卽死者。宜羊角燒灰

調塗有身面丹腫如蛇纏狀者。宜馬蘭草有赤遊丹發腫痛者。宜瓜

敷雖然丹毒之發。又有辨焉。其痛者爲丹毒。其痒者爲風丹。有一

敷

切風丹發痒不止者

宜炙穿山甲末一兩生甘草末三錢米飲調塗

有冷風丹者

宜白姜

有遍身風痒如癰疹者

宜菱香花末酒下一錢立效

有皮膚風熱遍身生如粟

木者

宜牛蒡子浮萍等分薄荷汁調酒下二錢日二次

有遍身本發癰疹後變成瘡又痒

又痛者

宜姜蚕焙末酒服二錢立愈

有血風丹腫起疙瘩者

宜浮萍汁和豆淋酒下

有因

酒而得風丹遍身痒者

宜浮萍散

且夫丹毒之發更有辨焉其色赤者

爲丹其色白者爲瘰如前言冷風丹其色亦白卽瘰之類也治瘰

之法前人以酒調土朱服之得愈蓋瘰爲脾病土能入脾朱能除

白也白瘰宜消風散

至若小兒血熱肌虛風邪相湊易發丹毒得之百日

內者尤爲危急

宜消風散照神散二方兼服外以金花散塗

總之丹毒遊風之發不問

大人小兒或發手足或發腹上總以自腹生出四肢者爲順而易

治自四肢生入腹者爲逆而難治不可不知也夫丹毒之發甚暴

治丹毒之方甚多古人有十二種單方治一切丹毒但得于十二

味中。

小苦生地生松毛葫蘆葉慎火草浮萍硝石豆葉以上皆爲末水和敷

二味。卽能取效。良爲簡便。又不可不知也。然而皮之爲病。且不特

此也。如人身體皮肉變色。赤者爲紫癰。風白者爲白癰。風紫由風

與血搏。血不調和所生。

宜紫癰風方

白由風與氣搏。氣不調和所生。

風丸三黃散總治紫白癰宜加減何首烏丸

又如面及頸項身體皮肉色變。與肉色不

同。不痛不痒。由肺風流注皮膚之間。久之不去。遂致浸淫遍體。爲

白駮。

宜白駮方

又如頸項胸前腋下。自生斑點相連。色微白而圓。或紫。

不痛不痒。由風邪積熱。居于肺腑。久之不散。流溢皮膚。爲癰瘍風。

宜烏蛇散

又如心常驚恐。言語無定。眼前見物如垂絲。皮肉中或如桃

李癰。疹色赤黑。手足頑麻刺之不痛。身體生瘡。痛痒如虫行。由惡

風相觸。及犯忌害。初卽覺皮毛變黑。爲烏癰。又名黑癰。

宜大黑神膏

又

如語聲嘶啞。目視不明。四肢頑痛。身體發熱。手足緩縱。背脊拘急。

皮肉之內。似生癰疹。其色正白。亦由風邪毒氣。積久爲白癰。宜白
散苦 又如肺氣不榮。津液枯涸。皮聚毛落。爪枯甲錯。肌膚乾澀。而
參酒 不滑潤。爲索澤。宜入 凡若此者。皆皮之病。凡屬司命所當一一詳
審者也。

脉法 仲景曰。脉浮而大。浮爲風虛。大爲氣強。風氣相搏。以成
癰疹。身體爲痒。痒者名泄風。久久爲癰癩。正傳曰。脉浮而緩。
屬濕。爲麻痺。脉緊而浮。屬寒。爲痛痺。脉澀而芤。屬死血。爲木不
知痛痒。滑伯仁曰。脉者。血之波瀾。發斑者。血散于皮膚。故脉
伏也。

皮病症治 河間曰。痒得爬而解者。爬爲火化。微則亦能痒。甚
則痒去者。謂令皮膚辛辣。而屬金化。辛能散火。故金化見。則火
化解矣。入門曰。丹毒入裏。腹脹則死。毒氣所走之處。急以細

針刺出惡血。卽消。又曰溝渠中小蝦搗敷妙。或伏龍肝雞子白調塗。或鯉魚血。鱖魚血。芭蕉根汁。藍葉汁。水中苔塗之。皆可。

肉也者。所以主一身之肥瘦。而驗氣血之盛衰者也。內經曰。肥而澤者。氣血有餘。肥而不澤者。氣有餘。血不足。瘦而無澤者。氣血俱不足。此經但言其榮也。其寔人之肥者。血則定而氣必虛。故行動多喘促。氣虛也。能耐寒而不能耐熱。熱傷氣。損其不足之氣。則陽愈弱。而偏于陰。故不能耐熱也。人之瘦者。氣則定而血必虛。故皮膚多燥澀。血虛也。能耐熱而不能耐寒。寒傷血。損其不足之血。則陰愈虧。而偏于陽。故不能耐寒也。此肥瘦之所以分也。肉之爲病。最重者曰食飢。飲食多而易饑。不生肌肉。如死人也。由胃中結熱消穀之故。宜參芩元其次曰肉苛。苛者。癢重也。由榮氣虛。衛氣寔之故。宜前其次曰肉痿。胃乾而渴。肌肉不仁。無力以運。由脾經傷熱之

故。宜清。其次曰肉脫。形肉瘦削而脫盡。不能行動。蓋脫者空也。謂

肉消而皮與骨着。中空無有也。此亦死症。由真元內竭。穀氣外衰

之故。宜谷。至如瘡瘍雖愈。有肉凸出。小如豆。大如李。長至數寸。名

曰贅肉。亦曰努肉。宜烏梅肉搗作餅貼肉上即消去。又如手足忽生如豆。甚至三

箇五箇相連而生。由風邪搏于肌肉所致。名曰疣目。宜烏雞膽汁日三塗之。或

杏仁燒研塗之。又如肌肉間忽生紅粒。撫之則痛如錐刺。血虛襲風所致。

名曰肉刺。可不必治。以上皆肉病所及也。若夫耳聾舌短。背腫尿

血。大便赤泄。則爲肉絕之候矣。經故斷之爲六日死也。

肉病症治。內經曰。髓爲內標。膝後肉如塊者。資生曰。羸

瘦固瘵疾。若素來清羸者。非有疾也。惟病後瘦甚。久不復常。謂

之形脫。與夫平昔充肥。忽爾羸瘦。飲食減少。此爲五勞六極之

疾。宜服滋補藥。

毛髮也者。所以爲一身之儀表。而可驗盛衰于衝任二脉者也。夫毛髮爲血之餘。似已然。衝爲血海。任爲陰脉之海。二脉皆起胞中。上循腹裏。其浮而外者。循腹右上行。會于咽喉。列而絡唇口。血氣盛。則充膚熱肉。血獨盛。則滲皮膚。生毫毛。然則毛髮之生。皆由二脉之盛也。明矣。內經獨以屬腎者。腎主精。精卽血也。毛者統詞。一身之毛。及眉鬚髭鬣。前後二陰之毛。皆是。髮者專指。但卽生于頭者言也。鬚髮之有無榮悴。前人論之甚詳。故不贅。其有左右髮際起瘡如粟米。頭白。肉赤痛如錐刺者。爲髮際瘍。皆因風熱上攻之故。雖膿出無傷也。宜防風。通聖散。然婦人多患之。男子則少。髻疽者。亦名髻發。生髻髮中。初如虫咬癢疹。腫痛難見。或由肝胆二經怒火。或由三焦相火。或由風熱血虛。皆能生此症。但由三焦相火者。尤忌出膿。以是經血少氣多也。甚則發熱作渴。宜柴胡。清肝湯。腫高痛極。宜仙方活。

命。迨大勢已定。餘毒未除。以參芪歸朮爲主。佐以川芎白芷金銀花。速成其膿。膿成。仍以參芪等托而潰之。至生肌收斂。則全用補益。脾虛加四君子湯。血虛宜四物湯。小兒癩頭白禿瘡。亦生髮中。宜湯加參芪氣虛宜補血益氣湯。名髮毛瘡。宜苦棟根灰。然若中陷。四邊高。色如黃蠟者。乃是廣瘡。不可作髮毛瘡治也。

毛髮原由症治。醫說曰。髮屬心。故上生。稟火氣也。眉屬肝。故橫生。稟木氣也。鬚屬腎。故下生。稟水氣也。入門曰。胆榮于鬚。腎華于髮。精氣上升。則鬚潤而黑。六八以後。精華不能上升。秋冬令行。金剝水枯。以致鬚髮焦槁。如灰白色。養生者。宜預服補精血藥以防之。如張天師草還丹。四物坎離丸。五老還童丹之類。染掠亦非上策。

治筋病方十

酒煮木瓜粥

用酒一宿三度便差 大木瓜酒水煮爛研作膏熱熨痛處冷

五加皮散

錢酒下 五加皮 油松節 木瓜 每末二三

祛風滌熱湯

連喬 薄荷 甘草 牛蒡子 防風 荆芥

紫葳湯

筋連 紫葳 天冬 百合 杜仲 黃芩 黃連 草薢 牛膝 防風 茯苓 羌活 獨活 白芍 生地 阿膠

四物湯

筋急 熟地 生地 白芍 當歸 阿膠 麥冬 白朮 附子 生薑 白芍 白朮 茯苓

養血地黃湯

筋傷 熟地 生地 白芍 當歸 阿膠 麥冬 白朮 附子 生薑 白芍 白朮 茯苓

真武湯

筋傷 附子 生薑 白芍 白朮 茯苓

養肝丸

筋傷 川芎 當歸 白芍 熟地 防風 羌活 獨活 白朮 附子 生薑 白芍 白朮 茯苓

木瓜湯

筋傷 木瓜 四錢 吳萸二錢 茴香一錢 炙草四分 紫蘇十葉 姜三片 監一撮 烏梅一個

理中湯

人參 白朮 甘草 乾姜

治骨病方五

溫腎散

骨寒 熟地錢半 牛膝 肉蓯蓉 巴戟
麥冬 五味子 炙甘草 八分 茯苓 炒杜
仲 乾姜 各五分 水煎服或爲末酒下二錢

滋陰降火湯

骨熱 白芍錢三分 當歸錢二分 熟地
白朮 天冬 麥冬 各一錢 生地 八分 陳
皮 七分 蜜知母 蜜黃柏 炙甘草 各五分

虎潛丸

骨癢 龜板 黃柏 各四兩 知母 熟地 各
二兩 牛膝 三兩 陳皮 七錢 白芍 一兩
半 乾姜 五錢 續斷 虎骨 當歸 各一兩

虎骨散

骨痛 虎骨 二兩 白花蛇肉 天麻 白姜
蠶 牛膝 防風 酒當歸 乳香 肉桂 各
一兩 全蠍 炙甘草 各五錢 麝香 一錢 每
末二錢酒下 一方有自然銅白附子 枳殼 羌
活 白芷 川芎 各一兩 地龍 沒藥 雄黃 各五錢 治
白虎歷節風走痛如神 又製蒼朮 酒黃柏 等分姜湯下一錢

二妙散

治皮病方二十六

四物湯

皮病 川芎 當歸 白芍 地黃

菊花散

又石甘菊 防風 枳殼 羌活 旋覆花

蟬脫散

又石甘菊 蟬脫 薄荷 蔓荊子 等分每末二錢酒水調下

上清散

皮癩 元參 薄荷 荊芥 甘草 歸尾 桔梗 陳皮 黃芩 川芎 枳殼 或加製大黃亦可

導赤散

又

加減涼膈散

又薄荷 連喬二錢 甘草錢半 山梔 黃芩

瀉肺湯

又薄荷 地骨皮 桑皮各二錢 知母 貝母 山梔 桔梗 麥冬 生地 甘草各一錢

四順清涼飲

丹麥 薄荷十葉 當歸 赤芍 炙草各錢二

拔毒散

又寒水石二兩三錢 石膏一兩 黃柏

荆防敗毒散

又草荊芥 防風 羌活 獨活 柴胡 前

小柴胡湯

又柴胡 黃芩 人參 枳殼 川芎 甘草

白殭蚕散

又白芷 姜蚕 蟬退 防風 甘草 蒼耳子

身形 皮肉方

卷二十五 五十五

人參 等分 每末二錢 豆淋酒下

浮萍散

又 浮萍五錢 防風 黃芪 羌活各三錢
當歸二錢 乾葛一錢 麻黃五分 生草四分
量疾重輕分二三服 水煎

消風散

白痰

黑神散

小兒

金花散

又 鬱金 黃芩 山梔 甘草 大黃 黃
連 糯米 等分 爲末 蜜水調敷

紫癰風方

紫癰 官粉五錢 硫黃二錢 爲末 雞子白
調搽

追風丸

白麝 首烏 苦參 蒼朮 荆芥穗各四兩
共爲末 用皂角二斤去皮弦子水煎膏和丸
空心酒茶任下三五十丸

三黃散

又 雄黃 硫黃各五錢 黃丹 天南星
枯礬 密陀僧各三錢 先以姜汁擦患處再
以姜片蘸藥擦後漸黑次日再擦黑散則無矣

加何首烏散

紫白癰 首烏 石菖蒲 蔓荊子 苦參
荆芥穗 威靈仙 甘菊 杞子 等分 每末

白駁方

三錢蜜茶調下
此方兼治癰瘍風白駁一切疥癬
白駁蛇脫一條二味燒研生半夏
兩蛇脫先用巴豆一粒中截擦白處再用藥
薄塗患處先用巴豆一粒中截擦白處再用藥

烏蛇散

癰瘍風 烏蛇三兩 犀角一兩 防風 羌活 黃芩 苦參各二兩 人參 丹參 元參 沙參 肉桂 秦艽 川芎 山梔 升麻 通草 枳殼 白蒺藜 白蘇皮各一兩 每末二錢酒下

大黑神膏

烏龜 川烏 升麻 防已 黃柏 藜蘆 黃連 明礬 雄黃 雞黃 胡粉各五錢 巴豆 杏仁各十四粒 松脂 亂髮各如鷄子大一塊 右剉如豆用猪油二升同煎以髮餅爲度棉濾去渣入雄雞黃替胡粉攪勻收漿器中每用塗瘡一日三四次每用藥以熱鹽湯洗過然後塗之毋及口眼

白花蛇散

白蛇 白花蛇酒浸 晚蚕蛾去頭足翅 威靈仙 天麻 槐子 羌活 防風 枳殼 白鮮皮 蔓荊子各一兩 炙草五錢 每末二錢酒下 日二欠不拘時

苦參酒

又苦參五斤 蜂房五兩 蟬皮一具 水
三斗煮一斗去渣浸細麵五斤炊飯二斗如常
作酒溫飲一二杯

八珍湯

索澤症 人參 白茯苓 白朮 炙甘草
川芎 當歸 白芍 地黃

治肉病方四

參苓元

食餒 人參 遠志 赤苓 菖蒲 土膝酒
浸 地骨皮各一兩 蜜丸不拘時米飲下

前胡散

肉苛 前胡 白芷 細辛 官桂 白朮
川芎各三兩 吳萸 附子 當歸各二兩
川椒三錢 右剉以酒茶二升拌勻審一宿以
猪油五斤入藥微煎候白芷黃色去渣煎成膏
摩病處以熱爲度

清燥湯

肉癢 黃芪 白朮各錢半 蒼朮一錢 陳
皮 澤瀉各七分 赤苓 人參 升麻各五
分 生地 當歸 猪苓 麥冬 神曲 甘
草各三分 黃連 黃柏 柴胡各二分 五
味子九粒

谷靈丸

肉脫 黃芪 人參 牛膝 當歸各一兩
附子炮一個 熟地 茯苓各五錢 杜仲

蒼朮 白朮 肉桂 杞子各三錢 酒糊丸
參湯下百丸

治毛髮病方十

防風通聖散

髮際瘍 滑石錢七分 甘草錢二分 石膏
黃芩 桔梗各七分 防風 當歸身 川
芎 赤芍 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒
硝各四分半 白朮 荆芥 山梔各三分五
厘 姜三片

柴胡清肝湯

鬚疽 柴胡 山梔各錢半 川芎 黃芩
人參各一錢 桔梗 連翹各八分 甘草五
分 食後溫服

仙方活命飲

穿山甲 白芷 防風 赤芍 甘草
歸尾 花粉 貝母 角刺各一錢 陳皮
金銀花各三錢 沒藥 乳香各一錢二味另
研 水酒各半煎送乳沒二末
又 人參 茯苓 白朮 炙甘草

四君子湯

四物湯

又 川芎 當歸 白芍 地黃

補中益氣湯

又 人參 黃芪 當歸 白朮 升麻 柴
胡 陳皮 甘草

松脂膏

張師草還丹

四物坎離丸

五老還童丹

白禿 松脂 黃連各七錢半 黃芩 苦參 各一兩 蛇床子二錢半 大黃 枯礬各五錢 水銀兩半 胡粉五錢 合水銀入少水全研令無星爲度 共研勻 臘猪油調塗瘡上 預防 地骨皮 生地 石菖蒲 酒煮兔絲子 牛膝 遠志 等分 蜜丸空心監湯下三十丸 修合忌鐵器及女人鷄犬

又 熟地三兩 生地兩半 同酒浸打膏 當歸二兩 白芍兩半 全酒炒 知母一兩 黃柏二兩 全鹽酒浸炒 側柏葉 槐子各一兩 全妙 連喬六錢 蜜丸盛磁盒內放地上七日曬乾收之酒下五六十九丸

又 扶神 赤石脂 川椒炒出汗各一兩 硃砂水飛 乳香燈心同研各一兩 俱另爲末 用鷄子二个去清黃只將硃砂乳香各裝一壳 內紙糊七重 青絹袋盛之 令精壯女人懷肚上 常令溫暖 硃砂懷三十五日 乳香懷四十九日 取出再研前三藥亦爲末和勻 蒸棗肉和丸 空心酒下三十丸 參湯下尤妙 一月外加至四十丸 以甲子庚申夜靜處修合忌鷄犬女人見 又名返齡萬壽丹 本仙家方也

附鐵毛髮雜方

眉毛不生方

芥菜子 半夏 等分爲末姜汁調搽數次即生

治人無髮方

甜瓜葉搗汁塗之即生

病後髮落方

鮮猴姜 野葛薇嫩枝煎汁刷之

令髮長黑方

桑葉 生麻油 煎過去渣沐髮令長數尺

鬚髮黃赤方

生地一斤 生薑半斤 各洗搗汁留渣用 不
蛙皂筴十條 去皮弦熱二汁炙汁盡爲度同渣
入罈泥固煨存性研末鐵器盛之每末三錢湯

秘傳烏鬚方

調停二日臨臥刷染鬚髮即黑
五倍子半斤 研末銅鍋炒之勿令成塊如有烟
起即提下攪之從容上火慢炒色黑爲度以濕
青布包扎足踏成餅收貯聽用每用時先以皂
角水洗淨鬚髮用五倍子末二兩 酒炒紅銅
末錢六分 生礬六分 訶子肉四分 烏梅酸榴
子四分 研砂一分 共研極細 烏梅酸榴
皮煎湯調勻碗盛重湯煮四五沸待如飴狀
以眉掠刷于鬚髮上一時洗去再上包住次日
洗去以桃核油潤之半月一染甚妙

身形

毛髮方

卷五十五

巫雲散

胆礬 五倍子 百藥煎 青胡桃皮 酸石
榴皮 訶子皮 木瓜皮 諸牙皂角 何首
烏 細辛 等分 爲末 蜜和 如錢大 常放 木炭
內 培養 勿令 離炭 用時 以熱酒 化開 塗之
子 刺子 沒石子 躑躅花 訶子皮 覆盆
生地 白芷 沉香 防風 附子 零陵香
卷柏 三錢 右剉 絹袋盛 將清香油 八兩 浸入
封過 七日 取擦 頭上 日三次 巫雲散 治鬚髮
黃白 不澤 此綠雲油 能生髮

金主綠雲油

頭痛原流

沈金鰲撰

頭痛經氣逆上干過清道不得運行病也。統天氣六淫之邪入氣六賊之逆皆有之。經曰風氣循風府而上則爲腦風。新沐中風則爲首風。此蓋以太陽之脉達風府。太陽受風則腦痛而爲腦風。又以沐則腠開風傷于衛故也。經又曰頭痛數歲不已當犯大寒內至骨髓。髓以腦爲主。腦逆故頭痛齒亦痛。名曰厥逆。此蓋以大寒入腦則邪深。故數歲不已。髓者骨之充齒者骨之餘。故頭痛齒亦痛。是邪逆于上。故曰厥逆也。宜羌活附子湯經又曰頭痛巔疾下虛上寔。過在足少陰。巨陽甚則入腎。此蓋以頭痛本太陽病。太陽之脉交巔上。其直者從巔入絡腦下虛少陰腎虛也。上是太陽膀胱寔也。腎虛不能攝太陽之氣。故虛邪上行而頭痛。其脉必舉之弦按之堅。宜玉真丸經又曰頭痛耳鳴九竅不利。腸胃之所生。此蓋以腸胃爲

衝門之道路。氣之所以往來。氣虛則不能上升于巔頂。故頭痛。宜

中益氣湯。經又曰。頭痛甚。則腦痛。手足寒。至節死不治。此蓋以三陽受

邪。伏而不去。則陽氣敗絕。故手足之寒。上至于節也。統而觀之。經

之論頭痛。總不越風寒虛三者。其旨固瞭然也。雖然。各經所犯頭

痛。其爲痛處。與其現症。脉候及應用之藥。有不得不分。辨者。太陽

經痛在正巔。其症兼惡風寒。其脉必浮緊。宜川芎麻黃少陽經痛

在耳前髮際。其症兼寒熱。其脉必細而弦。宜柴胡陽明經痛在額

間。其症兼自汗發熱惡寒。其脉必浮緩長寔。宜升麻葛根或發熱

惡熱而渴。宜白虎湯太陰經頭痛。其症兼體重多痰。其脉必沉緩

宜南星半夏。或太陰痰厥亦頭痛宜柴胡黃芩少陰經頭痛。其症足

寒氣逆爲寒厥。其脉必沉細。宜麻黃附厥陰經頭痛。其症兼項痛

或吐痰涎冷厥。其脉必浮緩。宜吳萸或肝風虛動頭痛而兼目眩

宜吳萸

耳聾

宜熟地黃丸知藤散

或怒氣傷肝而亦頭痛

宜沉香

腎與膀胱經挾寒

濕而頭痛其症亦下虛上寔氣上而不能下

宜玉

心與小腸經挾

濕熱而頭痛其症兼煩心厥逆

宜清室膏加麥冬丹參

三陽經熱鬱頭痛不

敢見日光置水于頂上汗吐下三法並行必愈以上各經頭痛之

異如此而尤緊要者凡遇陰經爲患藥必用辛溫如桂附乾姜吳

萸之屬皆可至是痛虛痛尤不可混蓋六腑清陽之氣五臟精華

之血皆朝會于頭而六淫五賊之邪皆能犯上爲逆或與正氣相

宜茶

搏鬱而成熱則脉滿而痛

宜茶或邪氣留滯亦脉滿而痛

宜菊

爲寔也正氣衰微寒濕侵害雖不與搏而成熱但邪外襲則血凝

澀而脉攣縮收引小路而痛得溫則痛減

宜清是爲虛也夫虛是

宜清

之辨既明而氣血風寒暑濕痰熱之因自別其因氣虛痛者遇勞

更甚耳鳴九竅不利兩太陽穴痛甚其脉大

宜補中益氣湯如氣上不下

益氣湯

如氣上不下

厥而爲痛。名氣厥。頭痛。

宜芎藭散

因血虛痛者。善驚。眉尖後近髮際名

魚尾。自魚尾上攻頭痛。其脉孔。

宜四物湯加薄荷

因氣血俱虛痛者。兼有

二症。

宜加味調中益氣湯

因風痛者。抽掣惡風。或汗自出。

宜選奇湯

因寒痛者。絀

急惡寒。

宜大川芎丸

因暑痛者。有汗無汗。總皆惡熱。

宜香茹飲

因濕痛者。或

冒雨侵露。頭必重。天陰尤甚。

宜清空膏去黃芩黃連加蒼术茯苓

因痰飲痛者。必昏

重。憤憤欲吐。或痰厥痛。每發時。兩頰青黃。懶于言語。而兼眼黑頭

旋。惡心煩亂。此厥陰太陰合病。

宜清空膏去羌活加半夏白术天麻

因熱痛者。名熱

厥。頭痛必煩熱。雖嚴冬亦喜風寒。則痛暫止。畧見溫煖。其痛更甚。

宜先服清上瀉火湯。次服補氣湯。

因風執痛者。必兼目昏鼻塞。

宜石膏散神芎散

因風痰

痛者。吐逆目眩胸滿吐涎。

宜玉壺丸

因濕熱痛者。必兼心煩。病在膈中。

用吐法大妙。

宜清空膏

因風濕熱痛者。上壅損目。

宜清空膏

因鬱熱痛者。頭

旋眼黑。

宜川芎散安神散

審是病因。更察兼症。甯有妄治之過哉。外此更

有傷食頭痛必胸滿惡食吞酸噯腐

宜紅九子香砂枳木九加山查神曲麥芽萊菔子

有

傷酒頭痛必口渴神昏

宜葛花解醒湯

有臭毒頭痛必煩悶惡心

宜炒香附一味

煎有發散太過頭痛必神散氣怯

宜乳香落盡散

有腎虛頭痛必下元虛

弱宜硫黃一兩胡粉一錢飯丸冷水服五錢即止

有元陽虛頭痛如破必眼睛如錐刺

宜烏去皮炮全蝎糯米炒等分根汁丸每十五丸薄荷湯下

有頭痛連睛

宜牛蒡石膏等分爲末茶清調下

有年久頭痛

宜烏

頭痛宜姜蚕末熟水下二錢

有頭痛連睛

宜牛蒡石膏等分爲末茶清調下

有年久頭痛

宜烏汁調塗太陽穴

有產後頭痛

宜川芎烏藥末茶清下二錢

有因頭痛胸中痛

食少咽隘不利寒冷左寸脉弦急

宜麻黃吳萸湯

知乎此而頭痛之病更

無餘患矣乃治之之法古人多用風藥者以高巔之上惟風可到

味之薄者爲陰中之陽自地升天者也故多以風藥取效然亦只

大概言之宜照前分六經治法而加以風藥方可惟犯真頭者最

爲難治乃天門真痛上引泥丸故旦發夕死夕發旦死以腦爲髓

海真氣所聚。本不受邪。受邪則不可治也。古法進黑錫丹。灸百會穴。猛用大劑參附。可救十中之一。然天柱折。或手足青至節者。必死。固不容忽視之也。

脉法 脉訣曰。頭痛短澀。應須死。浮滑風痰。必易除。又曰。頭痛陽弦。浮風緊寒。風熱洪數。濕細而堅。氣虛頭痛。雖弦必澀。痰厥則滑。腎厥堅寔。又曰。風寒暑濕。氣鬱生涎。下虛上寔。皆暈而眩。風浮寒緊。濕細暑虛。涎弦而滑。虛脉則無。綱目曰。病若日痛。頭痛。脉急短澀者死。入門曰。肝脉溢大。必眩暈。宜預防之。正傳曰。寸口脉中短者。頭痛也。醫鑑曰。寸口緊急。或浮或短。或弦。皆主頭痛。丹溪曰。腎厥頭痛。其脉舉之則弦。按之則堅。又曰。頭痛。左手脉數熱也。脉澀有死血也。右手脉寔有痰積也。脉大是久病。

頭

內經曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣

靈樞曰真頭痛者頭痛甚腦盡痛手足寒至節並不治入門
曰傷寒頭重不能舉有二症太陽病及陰陽易並皆頭重不舉
皆危症也又曰傷寒陽脉不和則頭搖心藏絕及瘧病風盛皆
搖頭皆凶症也有裏痛而頭搖者亦重症也又曰頭沉痛入泥
九手足冷爪甲青者謂之真頭痛其連齒痛甚者屬少陰厥症
俱不治活人書曰三陽有頭痛三陰無矣惟厥陰脉與督脉
會于巔故有頭痛少陰亦有頭痛但稀少耳丹溪曰頭痛多
主于痰痛甚者火多也有可吐者亦有可下者諸經氣滯亦作
頭痛又曰頭痛連目痛此風痰上攻須白芷開之又曰頭痛必
用川芎如不愈各加引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太
陰蒼朮少陰細辛厥陰吳萸東垣曰風寒傷上部入客于經

絡令人振寒頭痛。或風寒之邪。伏留陽經。爲偏正頭風。得效曰。真頭痛者。其痛上穿風府。陷入泥丸宮。不可以藥愈。蓋頭中人之根。根氣先絕也。醫鑑曰。頭痛目痛。久視無所見者。死。卒視無所見者。亦死。

頭痛導引法。保生秘要曰。用手法百會穴。掐六十四度。擦亦如之。尋用後功。

運功。保生秘要曰。左疼。意想左乳下一大肋。扯過右乳下。右疼。則扯過左乳。每行十二度。

頭重目花導引法。保生秘要曰。觀空坐定。閉氣。以兩手心掩耳。擊天鼓。次擦湧泉穴。次以手按膝端而坐。呵氣九口。如法定神。

運功。保生秘要曰。意定元雍。舌頂上腭。俟液徐生。頻咽丹田。

復想歸肝。雙睛運轉。目無花矣。

眩暈肝風病也。內經曰。頭痛顛疾。下虛上寔。過在足少陰。巨陽甚。則入腎。又曰。狗蒙招尤。目眩耳聾。下寔上虛。過在足少陽厥陰。甚則入肝。經言下虛。腎虛也。腎虛者。頭痛。經言上虛。肝虛也。肝虛者。頭暈。夫腎厥則顛疾。肝厥則目眩。此其所以異也。故內經又曰。諸風眩掉。皆屬于肝。夫肝爲風。風陽邪也。主動。凡人金衰不能制木。則風因木旺而扇動。且木又生火。火亦屬陽而主動。風火相搏。風爲火逼。則風烈。火爲風扇。則火逸。頭目因爲旋轉而眩暈。此則眩暈之本也。若病發之故。則有由外因者。曰。傷風眩暈。必惡風自汗。或素有頭風而發。宜芎藭散曰。火熱上攻眩暈。必煩渴引飲。或暑月熱甚而發。宜大黃散曰。風痰閉壅眩暈。必胸膈痞塞。項急。肩背拘倦。神昏多睡。或心忪煩悶而發。宜天麻五錢川芎二兩蜜丸。茨子曰。風熱。

上衝眩暈必胸中不利旋運欲倒或感受時邪而發

宜川芎槐子末等分茶下

三

錢曰冒雨傷濕眩暈必鼻塞聲

宜芎有由內因者曰痰飲眩暈眩

而嘔吐頭重不舉是痰宜清暈未湯有由內因者曰痰飲眩暈眩

眩暈必七情過傷痰涎迷塞心竅眉稜骨痛眼不可開

宜清暈未湯

是飲宜茯苓曰氣鬱

衰眩暈宜滋陰或內傷氣虛宜補中或腎虛氣不歸元氣逆奔上

宜玉液湯

衰眩暈

宜滋陰

或內傷氣虛

宜補中

或腎虛氣不歸元氣逆奔上

宜十全

或脾胃虛弱

兼嘔吐洩瀉

宜歸脾湯

曰失血眩暈或吐衄太甚

或便血過多或山傷胎或由產後或由崩漏或由金瘡跌撲拔牙

往往悶絕不省人事

宜當歸五錢川芎二錢半水酒煎日再服名芎歸湯

曰老人陽虛每早

起便暈須更自定

宜黑錫丹

此則眩暈之由也然而內因外因之感發

雖殊總必由于痰盛故有風熱痰作眩者

宜玉壺丸茶調散合用

有寒濕痰

作眩者

宜導痰湯加蒼朮秦朮

有痰火兼虛作眩并遍身眩暈者

宜半夏白朮天麻

有氣血虛挾痰作眩者

氣虛宜六君子湯血虛宜二陳湯加芎歸

故曰無痰不作眩也

而又有不至于眩暈之甚但頭目不清利。宜川芎散防風散或并耳鳴耳聾。宜清神且精神不爽咽乾鼻塞者宜沃皆由風濕熱痰涎鬱于精明之府也。

眩暈原由症治 靈樞曰上虛則眩又曰上氣不足目爲之眩

此言又曰藏府筋骨血氣之精與脉并爲目系上屬於腦後宅

于項中故邪中于項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入于

腦入于腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣。此

風入而眩 河間曰眩暈則嘔吐風熱甚也 醫鑑曰眩暈者痰因

火動也蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰 丹溪曰痰在

上火在下火炎上而動其痰二陳湯加酒芩山梔黃連蒼朮羌

活可以治之。此言痰眩 入門曰眩暈或云眩冒眩言其黑暈言其

轉冒言其昏其義一也又曰眩暈皆稱爲上盛下虛蓋虛者氣

與血也。寔者痰涎風火也。正傳曰。眩暈者。中風之漸也。肥白人。四君子湯多加蜜黃芪加陳皮半夏少加川芎荊芥以清頭目。黑瘦人。二陳湯合四物湯加黃芩薄荷入竹瀝姜汁童便。又曰。凡眩暈語亂汗多下利。時時自冒者。虛極難治。回春曰。泄瀉多而眩暈。時時自冒者難治。

頭暈腦痛及痰滯導引法 保生秘要曰。單搭膝坐。二指點閉耳門。及口眼鼻七竅之處。躬身微力前努。使真氣上升。腦邪自散矣。

運功 保生秘要曰。注臍念想頭上痛處。分兩邊運至心口。開下。念臍輪幹旋通關。緊行至滯痰處。着意多運。遇流通腹。顧念臍。

神暈頭暈導引法 保生秘要曰。此症情慾所傷。氣衰血少。心

火上攻。痰飲串肺爲患。日久變成勞瘵。于肩井穴。掐九九。擦九九。兼用後功自愈。

運功 保生秘要曰。緊閉地戶。安神伏氣。按腦及耳。大量要倚坐。足掘勿交。神氣自回。得法。因津咽下。定神。

風頭旋肝風病也。肝風盛。則頭自搖動。別無疾痛。不自覺知。治法與頭風畧同。總應以平肝爲主也。

風頭旋症治 綱目曰。有一子。患七年搖頭。三年下血。百方無效。予思之。乃肝家血液盛。外有風熱乘之。肝木盛而尅脾土。脾與肺是子母。俱爲肝所勝。而血遂潰于大腸。故便血不止。遂處一方。但損肝驛風而益脾。用防風三兩。花粉蜜黃芪羌活白芍各五錢。犀角甘草各二錢半。炙蛇壳鈎鈎麻黃各一錢。素肉丸。食後薄荷湯下五七十九丸。只二服。頭搖卽止。十餘服血止而下。

白。又二服乃愈。

頭風風寒入腦髓病也。凡人素有痰火。風寒客之。則熱鬱而悶痛。

故婦人多患此者。無巾櫛故也。總之新而暴者。爲頭痛。深而久者。

爲頭風。頭風不速治。必害眼。其痛有正有偏。丹溪曰。凡偏頭風。左

爲風虛。右爲痰熱。丹溪雖分言之。其是總屬于肝。虛有痰治之者。

雖左風。必用荊防羌薄。左虛必用芎歸。右痰必用蒼夏。右熱必用

蒼膏。其是補肝豁痰之品。必當兼用。補肝宜山藥木瓜。杏仁。羚羊。角。豁痰宜南星。半夏。蒼朮。橘

紅是所宜知者也。凡患偏正頭風。有兼惡寒。頭面多汗者。宜茶調散。加生

黃。搐鼻出涎法。大妙。宜透頂散。有兼鼻流臭涕。他藥不效者。宜有頭

風冷者。宜蕎麥麵二升。作餅。更有頭風熱痛者。宜山豆根。末。油。有

頭風項強者。宜八月後。取荊芥穗。作枕鋪牀下。立春日去之。有頭風旋運。痰逆惡心。懶食

者。宜零陵香。藿香。葉。薄荷。草根等。有偏正頭風。並夾頭風。連兩太陽

分。每末二錢。茶下。日三服。

穴痛者

宜姜蚕末葱茶下七分及沈氏頭風丸

有偏正頭風氣上攻不可忍者

宜全蠲散

有偏正頭風痛不可忍者

宜龍香散

有偏正頭風不拘遠近諸藥不效

者

宜牛腦

有腦冷漏下者

宜白鷄冠子酒煎服效

有頭腦鳴響狀如虫蛀名曰

天蟻者

宜茶子末吹鼻效

有頭風多白屑作痒者

宜零陵香白芷煎汁入鵝子白攪勻傅數十次

終身各依症治之

自無不效而半邊頭痛另有仙方

宜仙方及外治

法

宜草麻子飯捲

亦俱效更有雷頭風者頭痛而成核塊頭面腫痛憎寒

壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥誅伐

宜沈氏荷葉湯

或頭中如

雷之鳴爲風邪所客故也腫核宜刺出血

宜清震湯

亦有因痰熱者痰

熱生風也

宜祛痰丸

更有夾腦風者兩太陽連腦痛是也

宜透頂散

更有大頭風者頭大如斗俗名大頭瘟天行時疫病也感天地不正之氣

甚而潰裂出膿由邪客上焦之故

宜普濟消毒飲

其相類而病輕者名發

頤腫在耳前後

宜甘桔湯加薄荷荆芥連荷黃芩牛蒡子

頭風症治 醫鑑曰頭風之症素有痰飲或櫛沐取涼或久卧

當風以致賊風入腦入項自頸以上耳目口鼻眉稜之間有麻痺不仁之處或頭重或頭暈或頭皮頑厚不自覺知或口舌不仁不知食味或耳聾或目痛或眉稜上下掣痛或鼻聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作眩冒之狀熱者消風散冷者追風散頭風發時悶痛必欲棉裹者熱鬱也二陳湯加酒芩荊芥川芎薄荷石膏細辛婦人頭風宜養血祛風湯葉天士曰有氣血皆虛新涼上受經脈不和腦後筋掣牽痛倏起倏靜者乃陽風之邪宜荷葉邊苦丁茶蔓荊子甘菊連翹有內風頭痛淚冷者宜杞子首烏茯神柏子仁菊花炭楷豆皮有痛在頭左屬後厥陰風木上觸者宜細生地白芍炒杞子柏子仁茯神甘菊有暑風濕熱混于上竅津液無以運行凝滯而成偏頭痛舌強乾潤

者宜連喬石膏滑石甘草荷梗桑葉羚羊角蔓荊子有失血過多陰氣大傷陽氣浮越頭痛筋惕脈數虛而動當用鎮攝者宜人參阿膠牡蠣生地白芍天冬炙草。

正頭風痛 靈樞曰凡手三陽從手走頭足三陽從頭走足是手足六陽脉俱上于頭面也。又曰足太陽脉上額交巔直入絡腦別下項其病衝頭痛目似脫項似拔卽正頭痛也。

偏頭風痛 靈樞曰足少陽之脉起目銳眦上抵頭角其病頭角額痛 子和曰頭風之甚者久則目昏偏頭風痛者屬少陽相火久則目縮小大便秘澀皆宜出血而大下之 入門曰偏頭痛年久大便燥目赤眩暈者此肺乘肝氣鬱血壅而然宜大承氣湯大下之外用大黃芒硝爲末井泥調貼兩太陽穴乃能愈也。

日行頭風導引法 保生秘要曰此症定宜先導引次行右法
握固搭膝而坐以手捫兩耳塞兌閉目用意躬身前努使七竅
之氣上攻邪氣自然退散矣

運動 保生秘要曰手脚屈拳閉口存想自泥丸而起漸想至
湧泉候汗出而自愈蓋從頭汗上而下出邪氣淨降矣

首風風傷于衛病也蓋沐則腠理皆開而風爲陽邪善行而易入
乘其腠之開邪遂襲而入則衛受之故成首風其症頭面多汗必
惡風宜大川芎丸或沐浴後眩暈頭痛亦首風類宜白芷丸

首風症 醫說曰不槩入頭風條例而獨立其名曰首風見此
症專由沐後而得所以別于頭風之由于六淫七情者也古人
就病定名意深哉

腦風風邪客腦病也腦者居于頭蓋骨中百會穴分卽其部也蓋

樞曰。腦爲髓之海。髓海有餘。則輕勁多力。不足。則腦轉耳鳴。脛痠眩冒。目無所見。經文此言。腦之本病也。若風邪入于風府。由風府而上入于腦。則有腦風之症。其狀項背怯寒。腦戶穴冷。宜神聖散亦有風邪但攻于上焦。而邪氣上熏。令人日夜頭痛不止者。亦爲腦風。宜太陽丹宜分別治之也。

腦風原由。內經曰。髓者。骨之充也。髓傷則腦髓消。燦體解。佻然不去也。註云。不去者。不能行去也。入門曰。腦者。髓之海。諸髓皆屬於腦。故上至腦。不至尾骶。皆精髓升降之道路。

腦疽。膀胱經積熱病也。如初起腫痛甚。煩渴引冷。脈數有力者。由濕毒上壅。如漫腫微痛。渴不飲冷。脈雖數而無力者。由陰虛火熾。濕毒宜黃連消毒。飲陰虛宜六味丸。若不成膿。不潰腐。陽氣虛也。宜四君子湯加歸芪。不生肌不收斂。脾氣虛也。宜十全大補湯然陽虛脾虛之患。凡外症皆然。不獨腦

疽已也。宜知之。又有腦燥。初起卽如木槪。上起頂門。下至大椎。發腫如火燒。色青黑。不潰。只損外皮。如犬咬去肉一般。卽潰亦不斂。皆由陰精消燥之故。此死症也。古無治方。又有腦癰。皮薄易破。此輕症。宜清熱消毒飲非如腦疽皮厚難治。急當內托也。薛立齋言凡患腫毒欲成膿腐潰。生肌收斂。並用托裏爲主。此至言也。故立齋于托裏消毒散一方。多設加減法。加減法載在前亦欲人知所以用之耳。仙方活命飲亦癰疽初起之聖藥。又有赤疽。發太陽穴。其形不拘大小。以速破見膿。旣膿速斂爲要。以額角近連太陽皆要害處。若腫滿太陽。卽成虛損。難于收拾。若旣破而傷風水。卽能殺人。瘍科書言此症七日刺不得膿。十日不穴必死。誠有見于此症之不易療也。至若太陽穴生癰疽。與目相近。不于五六日內急破之。毒氣攻眼。則眼合不開。破後更傷風水。則目睛必傷。其癰疽發于眉頭者。亦

必攻入眼目。發在眉後者。又必攻入太陽。皆要害處。不可忽者。

頭瘍症治 陳文治曰。腦疽初起。宜黃連消毒飲。腫硬作痛。繼

以仙方活命飲一二劑。蓋此病原屬虛火。按之脈數而濡。乃濕熱壅盛。故用黃連消毒飲。腫硬作痛。乃氣血凝滯。故用仙方活命飲。並以甘溫之劑。補益陽氣。托裏而潰腐之。不宜用苦寒傷其胃氣。反致不得腐化。凡瘡易消散。易腐潰。易收斂。皆氣血壯盛故也。可以類推。又曰。昔杜碧清患腦疽。自藥不愈。丹溪治之。令服防風通聖散。答曰。已數服。丹溪云。宜皆以酒製。杜悟。急服乃瘥。

治頭痛方二十七

羌活附子湯

犯腦

羌活

附子

防風

黃芩

升麻

玉真丸

下虛

羌活

附子

石膏

半夏

石各一

身形

頭痛

卷五

膏加鍾乳粉灸關元穴

補中益氣湯

人參 黃芪 歸身 白朮 升麻
陳皮 炙草 姜 棗

白虎湯

麻黃

附子

麻黃

附子

細辛

生熟地黃丸

牛膝 生地 熟地 枳壳 甘菊 防風
食前用豆淋酒送下 杏仁 金石斛 蜜丸 每三錢

鈞藤散

甘草

鈞藤鈞

陳皮

半夏

茯苓

麥冬

沉香降氣散

沉香

沉香

木香

柴胡

白芍

細辛

清室膏

黃牛

羌活

防風

柴胡

川芎

黃連

茶調散

白芷

黃芩

薄荷

川芎

細茶

三錢

菊花散

甘菊

旋覆

防風

枳壳

羌活

石

青 蔓荆子 甘草 各錢半 姜 三片

四物湯

補虛 川芎 當歸 白芍 地黃

加味調中湯

氣虛 黃芪一錢 人參 炙草 蒼朮各七
分 陳皮 當歸 川芎各五分 木香 荊
升麻 柴胡 細辛各三分

選奇湯

防風 羌活各三錢 黃芩一錢 甘
草 夏冬 炙八分 厚朴 扁豆 甘草

香茹飲

清上瀉火湯

因熱 羌活 藜蘆 防風 荊芥 人參
當歸 知母 黃柏 黃芩 黃連 黃芪
白朮 升麻 細辛 甘草 生地 紅花

芎烏散

蔓荊子 此方奇效之至 烏藥 等分 每末二錢以燒秤
氣厥 川芎 兼治產後頭痛
鍾離酒下

補氣湯

因熱 升麻 黃芪 炙草 細辛 當歸
木香 一方有麻黃對酌用之
風熱 石膏 麻黃 首烏 葛根

石膏散

神芎散

又 蔓荊子 青黛 川芎各錢二分 鬱金
芒硝各一錢 石膏一錢半 細辛一錢
薄荷二錢 紅豆一粒 爲末搗鼻

安神散

熟地 黃芪 羌活 黃柏 各一兩 防風 二錢 牛 酒 知母 炙甘草 各三錢 柴胡 升麻 各五錢 生 甘草 炙甘草 各五分 川芎 三分 尤妙 煎服

川芎散

又 薄荷 羌活 荆芥 柴胡 川芎 甘草 菊 細辛 槐子 茵陳 香附 石膏 生 甘草

香砂枳朮丸

傷食 木香 砂仁 枳殼 白朮

紅丸子

又 三稜 蓬朮 乾姜 青皮 陳皮 胡椒 醋糊丸 凡紅爲衣

葛花解醒湯

傷酒 神曲 葛花 茯苓 木香 陳皮 砂仁 乳香 落蓋散 過殼 栗壳 陳皮 甘草 桔梗 柴胡

乳香落蓋散

過殼 乳香 寒冷 麻黃 吳萸 升麻 蒼朮 羌活 藥本 柴胡 黃芩 黃連 黃柏 半夏

麻黃吳萸酒

川芎 細辛 紅花 蔓荊子

治眩暈方八

玉壺丸

風熱 南星 半夏 各一兩 天麻 五錢 白 通三兩 蜜丸 每三十九丸 洗時 冰一碗 煎服 下

藥浮卽熟輕輕撈起姜湯下

茶調散

又黃芩 川芎 細茶 白芷 荆芥 薄荷

導痰湯

寒濕 半夏 四兩 南星 枳實 赤苓 橘
紅各一兩 炙草五錢 每末四錢加姜十片
食後煎服

十全大補湯

元虛 人參 黃芪 當歸 白朮 肉桂
白芍 熟地 茯苓 川芎 炙草 姜 棗

補中益氣湯

氣虛 人參 黃芪 當歸 白朮 柴胡
升麻 甘草 陳皮 白朮 熟地

四物湯

血虛 川芎 當歸 白芍 熟地

六君子湯

挾痰 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏
陳皮

二陳湯

又 茯苓 半夏 陳皮 甘草

治頭風方十九

茶調散

偏正風 黃芩 川芎 薄荷 荆芥穗 白芷 細茶

透頂散

竊鼻 細辛 二葉 瓜蒂 七個 丁香 三粒
糯米七粒 冰片 麝香 各分半 先研藥細

芎犀散

後入水磨研勻每用豆許隨病人左右搐之良
久出涎碗許乃愈
臭涕 川芎 珠砂 石膏 片腦 人參
茯苓 炙草 細辛 犀角 山梔 麥冬
阿膠

沈氏頭風丸

雨邊痛 煨天麻 麩枳壳 酒白芍 炒黑
瓜蒌仁 干米炭各一兩 姜炒半夏曲 炒黑
蛤粉 炒焦杏仁各兩半 黃連吳茱萸五錢同
炒去萸 砂仁 甘菊 炙甘草各五錢 酒歸
身四兩 沉香屑四錢 檀香屑三錢 金石
斛三兩 黑棗肉二十枚煎湯代水泛丸空心大
棗湯下二錢 此余自製方也用之屢效

全蝎散

氣攻 全蝎廿一个 地龍六條 土狗二倍
五倍子五錢 爲末酒調難貼太陽穴上
痛極 地龍去土焙 乳香 等分爲末每以
一字作紙捲煙上燒煙以鼻喘之

龍香散

牛腦丹

頭風 白芷 川芎 各三錢爲末抹黃牛腦子
上藥器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則
其病如失甚驗

凡仙方

半邊痛 詩曰辛本羌歪荷半夏防荊芎芷附
天麻三分蘇草麻黃共水酒煎時加細茶

草麻子紙捲

又草麻子去壳五錢 大藥去核十五个
共搗如泥塗紙上用箸一隻捲之去箸納鼻中
良久取下清涕即止

沈氏解雷湯

雷頭風 落帚子三錢 升麻 川芎 製茅
木各一錢 先將鮮荷葉一張摺疊不得扯碎
水二碗半煎至二碗再入藥加生薑三片煎七
分服 此再平自製方也每用一二帖即愈
又升麻 蒼朮 荷葉各四錢 食後服

清震湯

祛痰丸

又姜製皂角 半夏各一兩 大黃酒浸紙
包煨再浸煨三次二兩 橘紅 桔梗 天麻
各五錢 片苓七錢 薄荷三錢 青礞石
白芷 甘草各一錢 蒸餅九臨臥茶下
大頭風 黃連 黃芩各八分 人參 柴胡
桔梗各五分 元參 橘紅 甘草各四分
牛蒡子 連翹 板藍根各一分 馬勃二
分 姜蚕 升麻各三分 薄荷六分 便秘
加酒大黃一錢

普濟消毒飲

甘桔湯

發願 甘草 桔梗

消風散

熱頭風 荆芥 甘草各一錢 人參 白茯苓
姜蚕 川芎 防風 藿香 羌活 蟬
身形 頭風方 首風方

追風散

脫各五分 陳皮 厚朴各三分 加細茶一

撮 每末二錢茶下 冷頭風 炮川烏 熟石膏 炒姜蚕 荆芥

穗 防風 川芎 甘草各五錢 製南星

製白附子 羌活 天麻 地龍 全蝎 白芷各二錢半 炮草烏 乳香 沒藥 雄黃

各錢二分半 每末五分 臨臥茶酒下

二陳湯

熱鬱 茯苓 陳皮 半夏 甘草

養血祛風湯

婦人 當歸 川芎 防風 生地 荆芥 羌活 細辛 藜蘆 石膏 半夏 甘草

旋覆花 蔓荊子各五分 姜三葉二

大承氣湯

偏頭風

治首風方二

大川芎丸

首風 川芎四兩 天麻一兩 蜜和每兩作

白芷丸

十九每九細嚼茶酒任下 又新白芷不拘多少剉以蘿蔔汁浸晒乾 爲末蜜丸彈子大每一丸細嚼荊芥湯下 凡 各都梁丸 凡頭風眩痛服之令人目明 凡 暴寒乍暖神思不清頭目昏暈並宜服之

治腦風方二

神金散

太陽丹

等分葛根半生半炒麻黃細辛
又石膏二兩川烏川芎白芷甘草
各一兩冰片二錢蜜同麵糊丸每兩作十
八丸東丹爲衣食後葱茶湯咽下二三丸

治腦疽方八

黃連消毒飲

腦疽酒黃連酒生地酒歸身羌活
黃芪連喬各一錢澤瀉七分酒防己
黃芩黃柏獨活防風桑本蘇木
陳皮桔梗各八分酒知母四分人參
甘草梢各五分一名黃連消毒散
此方治腦疽背疽癰腫疼痛或麻木膏梁之人
尤宜用此

六味丸

四君子湯

陰虛地黃山藥山萸丹皮茯苓
陽虛人參茯苓白朮炙甘草

十全大補湯

脾虛人參黃芪當歸白朮白芍
肉桂熟地茯苓川芎炙甘草
身形腦風方須高方
卷五

清熱消毒飲

川芎 黃連 山梔 當歸 連翹 各一錢 金

銀花二錢

此方治癰疽發十陽癰痛發熱作渴

托裏消毒散

總治 人參 監黃芪 酒當歸 炒白芍 川芎 炒白朮 茯苓 各一錢 白芷 金銀

花各七分 炙甘草 連翹 各五分

此方治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服此未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生

仙方活命飲

又 穿山甲 炒黃 白芷 防風 赤芍 甘草 貝母 角刺 歸尾 花粉 各一錢 陳

皮 金銀花 各三錢 乳香 沒藥 各一錢 二

酒製防風散

通聖散 腦疽 味另研爲末先將藥水酒各半煎好送二末

附錄湯科選粹治腦疽方二

羌活當歸湯

酒黃連 酒黃芩 連翹 各一錢 酒歸身 各二錢 羌活 黃柏 各七分 炙甘草 五分 澤瀉

獨活 桑本 各七分 山梔 防風 各五分

水三酒七煎食後服日進三帖三日乃愈

追毒針頭丸

麝香 二錢 血竭 蜈蚣 各一對 全用 水片 一錢

善慶針頭丸

蜜丸黍米大瘡頭用針挑破微有血出以藥一
粒放進挑破眼內用棉帛蓋之周圍以津唾帶
定不一時愈
此丸治一切腦背惡瘡欲死一粒可愈

身形

廣雅方

卷三十五