

類

證

治

裁

類證治裁卷之二

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝蘭校

虛損勞瘵論治

經言精氣奪則虛。凡營虛衛虛。上損下損。不外精與氣而已。精氣內奪。則積虛成損。積損成勞。甚而爲瘵。乃精與氣虛憊之極也。素問論五勞。謂久視傷血。久臥傷氣。久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。金匱論五勞。謂肺勞損氣。心勞損神。脾勞損食。肝勞損血。腎勞損精。越人謂白上損下者。一損肺。嗽。二損心。盜汗。三損胃。減。四損肝。鬱。五損腎。淋。過胃則不治。自下損上者。一損腎。遺濁。二損肝。脇痛。三損

脾○脹○四○損○心○驚悸五○損○肺○喘過○脾○則○不○治○誠○以○脾○胃○爲○精○與○氣○生○

化○之○源○也○故○治○虛○勞○以○能○食○爲○主○考○難○經○治○法○損○其○肺○者○益○其○氣○

保○元○湯○損○其○心○者○調○其○營○衛○入珍損○其○脾○者○調○其○飲○食○適○其○寒○溫○四

湯○損○其○肝○者○緩○其○中○牛膝損○其○腎○者○益○其○精○金剛丸此○固○治○損○之○

要○矣○尤○必○先○辨○其○陽○虛○陰○虛○經○曰○陽○虛○生○外○寒○陰○虛○生○內○熱○凡○怯○

寒○少○氣○自○汗○喘○乏○食○減○無○味○嘔○脹○飧○泄○皆○陽○虛○症○也○此○脾○肺○虧○損○

由○憂○思○鬱○結○營○衛○失○和○惟○四○君○保○元○建○中○養○營○歸○脾○諸○湯○宜○之○若○

怔○忡○盜○汗○欬○血○吐○衄○淋○遺○崩○漏○經○閉○骨○蒸○皆○陰○虛○症○也○此○心○肝○腎○

虧○損○由○君○相○火○炎○精○髓○枯○竭○惟○補○心○三○才○六○味○大○造○固○本○諸○湯○宜○

之○又○若○腎○中○真○陽○虛○者○右尺必○弱○宜○甘○溫○益○火○之○品○補○陽○以○配○陰○入味

或景岳

右歸飲

所謂益火之源以消陰翳也。腎中真陰虛者

左尺細數

宜純甘補水之品。滋陰以配陽。

六味丸加杞子魚鱉

或景岳

左歸飲

所謂壯

水之主以鎮陽光也。陽虛不復久則吸短偏臥脉弱陽痿

宜參朮歸耆杞

子山藥胡桃龍眼蓮棗沙苑子骨

脂人乳鹿茸鹿膠羊肉羊腎海參。陰虛不復久則咽瘡音啞色悴

肌羸

宜麥味杏貝熟地首烏茯苓燕窩烏雞阿膠淡菜秋石河車猪羊髓龜膠白蜜

而勞瘵成矣。由是火

炎於上爲嗽血

宜五汁

爲潮熱

宜清骨散

火動於下爲遺濁

宜龍齒

爲泄瀉

宜三白廣生湯

而治療難矣。夫水爲萬物之元孫。眞人所以云補脾不若

補腎。土爲萬物之母。許學士所以云補腎不若補脾。然喜燥者脾

喜涼者腎。欲補腎易傷脾。欲補脾易傷腎。不知土爲金母。金爲水

母。勞瘵至陽虛泄瀉。宜溫以補脾。然補脾須不礙肺。勞瘵至陰虛

嗽熱宜潤以滋腎然滋腎須不妨脾補脾佐以五味杞子不得偏

用辛溫以助火桂附之屬亦不得偏用苦寒以敗胃知藥之屬且虛勞以受

補爲可治不受補爲不治如用人參之甘溫則大熱可除乃陽生

陰長之理所謂血脫者益氣而葛可久治勞十方用參者七也故

曰土旺而金生勿拘拘於保肺水壯而火熄毋汲汲於清心

夫五勞者勞傷五臟乃虛損之源而六極七傷又虛損之流極勞

療之深根也如皮毛枯槁爲肺勞人參黃耆散血脉不榮爲心勞補大五

食少肌消爲脾勞橘皮煎血虛筋緩爲肝勞黑腹腫足弱爲腎勞腎氣

六極者數轉筋指甲痛爲筋極滋補養營丸牙疼踵痛不耐久

立爲骨極茸珠丸面色無華頭髮墮落爲血極補營湯膚如蟲行體肉

乾黑爲肉極。參苓丸。肌無膏澤。目無精光。羸瘦肌癢。搔則爲瘡。爲精

極。巴戟丸。胸脇逆滿。吸短難言。爲氣極。益氣丸。七傷者。一陰寒。二陰痿。

三裏急。四精漏。五精少。六精清。七溺數。併宜鎖陽丹。九龍丹。

凡虛損症。多起於脾胃。勞瘵症。多起於腎經。虛損潮熱。多起於內

傷。勞瘵陰虛火動。多起於傷風似瘡。虛損蒸蒸發熱。按至皮膚間

甚熱。不能食。不覺瘦。脉豁大。重按無力。勞瘵骨蒸。按之皮膚不熱。

按至筋骨乃熱。能食而瘦。脉弦數。虛損轉潮熱泄瀉。脉短數者。不

治。勞瘵轉陰虛火動。喉痛脉細數者。死。虛症頰赤。或唇紅。陰虛逼

陽於上也。音瘖。腎氣竭也。欬而喘急。肺虛氣不歸腎也。喉乾咽痛。

真水涸。虛火炎也。不眠恍惚。血不養心。神不能藏也。時多煩躁。陽

中無陰。柔不濟剛也。飲食不甘。肌肉漸消。脾元敗也。盜汗不止。有火則陰不能攝。無火則陽不能固也。骨痛如折。腎主骨。真陰竭也。筋急痠痛。水虧木燥。肝失養也。足心如烙。虛火燥陰。湧泉涸也。

虛損勞瘵脉候

脉大爲勞。脉虛亦爲勞。大而無力爲陽虛。數而無力爲陰虛。沈遲小爲脫氣。大而芤爲脫血。細微而小爲氣血俱虛。寸弱而軟爲上虛。尺弱而瀼爲下虛。兩關沈細爲胃虛。弦爲中虛。凡細數弱瀼弦。皆勞傷脉。但漸緩則有生意。若弦甚者。病必進。數甚者。病必危。

附方

益氣

保元湯

見一卷火

緩肝益精益益補陽補陽補陽補陰補陰補陰欬血

牛膝丸

牛膝 兔絲餅

草薢

杜仲

防風

菴藟

桂心

蒺藜

金剛丸

草薢

杜仲

菴藟

兔絲餅

猪腰子酒煮爲丸

煨腎丸

牛膝 胡盧巴

草薢 兔絲餅

杜仲 猪腰子酒煮

菴藟 桂心

故紙

右歸飲

人參 炮薑

白朮 附子

山藥 肉桂

熟地 炙草

杜仲 黃肉

炙草

右歸丸

前飲去朮草杞子

加鹿膠

兔絲餅

蜜丸

左歸飲

熟地 山藥

杞子 炙草

茯苓

山黃

左歸丸

前飲去茯苓炙草

加牛膝

兔絲餅

鹿膠

五汁膏

天冬 茯苓

麥冬 犀角

生地 薄荷

貝母 丹皮

阿膠

藕汁

蔗汁

蘿蔔汁

清骨散

秦艽 胡黃連

鱉甲

知母

青蒿

地骨皮

銀柴胡

遺濁泄瀉肺勞心勞脾勞肝勞腎勞筋脈

龍齒丸 人參 茯神 遠志 龍齒 菖蒲 知母 黃蘗

三白廣生湯 苓 朮 陳 草 芍 貝 地骨皮 棗仁

人參黃耆湯 鰾甲錢半 天冬一錢 桑皮 半夏 知母 柴胡

黃耆 赤芍 甘草各五分 人參 茯苓 桔梗各三分

大五補丸 麥冬 天冬 人參 熟地 益智子 枸杞子

橘皮煎 橘皮五兩 甘草三兩三錢 當歸 草薢 茯苓 牛膝

鹿茸 杜仲 兔絲子 乾薑各一兩 酒半升

沙鍋內入橘皮煎 再入諸藥末爲丸 酒下

黑丸 當歸 鹿茸各一兩 烏梅肉爲丸 酒下

腎氣丸 八味丸見一卷中風此再加 牛膝 車前

滋補養營丸 遠志 白芍 黃耆 白朮各兩半 熟地

人參 五味 芎 歸 山藥各二兩 陳皮

八錢 茯苓七錢 生地五錢

山黃四錢 蜜丸

酒煮木瓜粥 大木瓜 水酒煮爛研膏裏轉筋處冷卽易之

茸珠丸 鹿茸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 當歸各兩半

起石各二錢 棗仁 柏子仁 黃耆各七錢 附子 陽

酒糊丸

補營湯 參 苓 陳 草 歸 芍 二地 梔子 麥冬

參苓丸 參 苓 烏梅 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮 蜜丸

巴戟丸 五味 巴戟 茯苓 兔絲 覆盆 益智 牡蠣

益氣丸 人參 麥冬 陳皮 白朮 熟地 骨碎補 茴香蜜丸

益氣丸 人參 麥冬 陳皮 桔梗 炙草 五味 蜜丸

鎖陽丹 桑螵蛸三兩 龍骨 茯苓各一兩 糊丸

九龍丹 金櫻子 杞子 蓮鬚 熟地 芡實 茯苓

常歸 山查 酒糊丸

虛損

楊弱冠成損嗽血喘促身熱汗泄食減便澹脉弱數此上損及中補土生金自不易定法四君湯加熟地砂仁未炒山藥茯神五味白芍蓮子小麥煎湯數服血止喘熱亦定然一陽初生必交節不至加重乃得轉危爲安

胡氏女寒熱欬嗽經斷食少肌削口乾無寐脉虛數損象已具經云二陽之病發心脾有不得隱曲在女子爲不月二陽足陽明胃也胃虛則受穀少而血無由生故症見心脾心主血脾統血情志不遂日爲憂思煩擾以耗竭之故月水枯也宜滋化源倣立齋先生法朝用歸脾湯加柏子仁夕用都氣丸加杞子白芍

棗仁貝母兩月諸症悉退後經自通而病霍然

狄氏月閉勞熱醫用通經之品喘嗽氣促怔忡自汗又用寒涼退熱食減肌削乍寒乍熱診其脉弱數而促此下損及中也急用潞參茯神黃耆炙草白芍當歸五味棗仁銀柴胡四劑諸症漸減加山藥熟地炭蓮棗補心脾兼調肺腎熱嗽悉除能進食矣適月後忽腰腹痛下胎形三寸許兒頭已半損爛子深自咎臨診未審其母舌青黑與否然計其經閉後已六閱月乃知胞宮血涸胎形不長乾熱累月必反枯癢深隱通經破血藥數十劑不能令墮俟氣血通調癰腐之隔膜者乃去而不復留也况血枯經閉漫與三稜莪朮牛膝桃仁不速之斃乎誌此爲權乾汁

者鑑

李 肩挑傷力欬嗽胸痛其損在肺用黃耆潞參扶神百合貝母杏仁當歸白芍甘草紅棗二服卽應此從安肺湯加減經所謂損其肺者益其氣也

畦 肝腎陰虛損久不復冬至後痰欬粉紅嗽聲子夜特甚想虛陽失藏龍火不伏交子時陽氣一動炎灼上陵浸至嬌臟受戕身熱喘促近又食減無味午後頰紅時覺慄慄憎寒是陰傷及陽非萸地酸膩可效必用甘藥培元佐以介屬潛陽冀其封固蟄藏至立春前後地氣上騰症不加重爲幸潞參山藥百合甘草五味白芍牡蠣淡菜阿膠數服漸平

掌弟喘嗽氣急脉弦數適逢秋令予謂此火刑金象也當滋化源
以自知醫雜用梨膏止嗽予謂非法入冬寒熱間作厥氣衝逆
灰痰帶紅良由陽亢陰虧龍雷並擾冬藏不密今近立春地氣
上升內氣應之喘嗽勢必加重擬方阿膠洋山藥二錢各二錢洋參熟
地炒茯神藕節各三錢川貝母炒研甜杏仁炒研棗仁炒研五味
分數服頗效又五更服燕窩湯晚服秋石湯降虛火而喘定

堂弟肺主出氣腎主納氣今腎少攝納時交驚蟄陽氣大升兩關
尺通滑兼並氣由衝脉逆衝而上子夜陽動喘嗽汗洩必起坐
不能安卧皆真元不納之咎屢用參耆保固肺脾既屬不濟卽
用知藥名爲滋腎豈能驟安做葉氏鎮攝法青鉛三錢牡蠣煅研
錢半

扶神錢三五味八分炮薑四分遠志炒炭故紙鹽水炒三服氣平嗽止

飲食大進弦脉頓減後用峻補膏方得痊

王 勞力傷精石尺偏旺是火水未濟之象日晡寒熱嗽血神疲

大宜小心調攝否則火燃金燥吐衄嗽喘行將日甚矣五味三分

熟地山藥茯苓杞子丹皮各二錢潞參三錢白芍川貝各一錢半遠志八分

蓮子十粒十數服諸症俱平

妹 積年羸怯經當斷不斷熱從腿膝上蒸今歲厥陰風木司天

又值溫候地氣濕蒸連朝寒熱煩渴寤不成寐悸忡善驚總由

陰虧心火燔灼兼乘木火司令氣洩不主內守陽維奇脉不振

網維越人云陽維爲病苦寒熱今簪衛欲空足寒骨熱所固然

月經記載 卷之六 盧慎

已先培元氣退寒熱待津液上朝冀煩渴漸平用潞參茯神麥冬白芍丹皮龜板熟地柏子仁紅棗蔗汁三服寒熱大減煩渴漸止但覺寒起足脛原方去麥冬龜板加首烏杞子牛膝炒壯其奇脉二服不寒但熱原方又去首烏杞子柏子仁加蓮子龍眼肉數十服遂安

貢 弱冠未室勞力傷陽寒熱痰紅欬則氣促嘔沫頭眩食減色悴肌羸半載不復脉來虛數右部尤少神乃肺氣受傷脾元亦憊理陽兼泄瀉爲宜用六君湯加山藥蓮子南棗淡薑煎服四劑寒熱止瀉逆平去半夏加貝母茯神五味嗽稀而食進數脉較減又加薏米芡實黃耆歸芍煎丸兼服而瘳 後因自服地

黃滋膩丸劑食減便溏餌牛肚瀉痢不止又迫於完姻虛嗽聲
啞午餘寒熱旦夕利數行脉益虛數思食減脾損痢久腎傷陰
陽告殘廼求挽拯用藥頗難且終罔濟姑與扶肺脾以攝腎器
參茯苓炙草白芍山藥益智訶子五味蓮棗數服甚平但氣下
陷則痢迫體慄寒手足心熱寐必口乾此陽虛生寒陰虛生熱
而津不上朝也朝用補中湯去柴歸加益智茯苓晚用熟地炭
五味棗仁白芍貝母薏米麥冬俱炒蔗汁冲服寒熱輕痢如故與
桃花湯加參苓五味烏梅溫攝下焦痢仍不減由腸液滑泄已
久氣虛不受溫攝而喉痛聲嘶欬吐血沫因春分節後氣溫升
泄故也轉方仍用參苓蓮藥補脾五味白芍斂肺沙參桔梗清

咽熱地炭欬斜育陰訶子牡蠣帶下

謝氏崩帶後蒸熱頭暈齒痛食後愛腐痞惡不時便瀉始由衝任
經傷陰虛生火醫用青鉛鎮攝虛火愈炎中氣愈陷反使髮際
汗多如水下部泄氣如風不知症緣陰虧肝陽失制上則爲眩
暈下則爲蒸瀉中則爲風翔浪掀食入漾漾欲嘔治宜和陽熄
風佐以運脾否則補虛添脹滋腎礙脾勢必食減肌削延成下
損及中之咎杞子炭甘菊炭牡蠣粉白芍山梔神麴俱炒半夏鹽
炒茯神丹皮嫩桑葉浮小麥煎湯三服諸症漸平原方去梔麴加
鱉甲山藥熟地炭蒸熱漸愈

族弟嗜飲傷中濕熱內蘊發嗽潮熱腹痛嘔瀉脉沈小數左尤瀼

不戒飲則成酒勞生朮茯苓薏米橘紅茴香製半夏枳椇子砂
仁湘蓮妙數服諸症稍定乃用葛花解醒湯去青皮乾薑加製
半夏數十服全愈

沈

少年羸怯晡熱噎頭眩食減頻嘔苦酸濁沫大便忽澀忽

秘脉弦數右尺搏指出相火太強疏泄失司痰濁不降必夢泄

足心如烙先驅濕熱以熄龍雷黃蘗

酒炒六分

半夏

青鹽製錢半

茯苓薏

米各三錢

吳萸

鹽湯泡五分

遠志山梔澤瀉

各八分

橘紅

錢一

六服痰火降

遺泄止去吳萸山梔加生白朮

錢半

五味

三分

牡蠣粉

錢二

諸症俱減

調理得平

服姪誦讀神疲晡寒宵熱汗嗽食減脉虛右尺弦大此爲童損由

心脾肺兼及腎陰倣立齊先生治法朝用補中益氣湯去升柴
加茯苓棗仁小麥晚用六味湯去山萸加白芍鱉甲五味十數
劑寒熱止而精神復

勞瘵論治

凡男子之勞起於傷精。女子之勞由於經閉。小兒之勞得於母胎。無不始於陰虛。生熱然其源流宜條列施治焉。有雜病久不愈。因積損成勞者。宜調營養衛湯。有思慮太過。鬱損心脾而成勞者。宜歸脾湯。有房勞傷腎。遺淋痿弱而成勞者。宜鹿胎丸。有飢飽傷脾而成勞者。宜補中湯。有積勞疲瘦。嗜臥寒熱而成勞者。宜十四味建中湯。有負重致傷。而胡山成勞者。宜補中湯。有傷暑咯血而成勞者。清暑益氣湯。有縱酒傷脾而成勞者。宜葛花解醒湯。有童年稟賦怯弱。骨蒸黃瘦而成勞者。宜麥煎散。有婦女經閉。由血熱血枯而成勞者。宜逍遙散。補血養陰丸。有情竇初開。積想在心。真陰煎耗而成勞者。宜清離滋坎丸。其爲勞熱也。有氣虛熱。必兼少氣自

汗體倦。心煩。

入珍湯加減。

有血虛熱。必兼燥渴。睡卧不安。

聖愈湯參有人中白。

往來潮熱。必兼膝軟骨節痛。

參苓建中聚。

有骨蒸熱。必兼肌瘦頰紅。

龍甲。

散河車丸。

有五心熱。必兼體痛口乾。

逍遙散參生脉散。

有遍體熱。必兼神

困肌削。

十四味建中湯。

有病久結痰注絡。腹脇常熱。惟頭面手足於寅卯

時乍涼。

六君子湯加薑汁竹瀝。

其爲勞嗽也。或由陰傷陽浮。金燥喉癢致嗽。

宜甘潤養肺。

清安膏。

或由腎水虛涸。火燥肺金致嗽。宜壯水滋液。

六味加麥味。

或由脾土先虛。不能制水。水泛爲痰致嗽。

或喻化丸。

由元陽下虧。痰涎喘促。虛寒致嗽。

六味回陽飲理中湯。

至勞嗽失音。會

厭傷也。

猪脂和。肺痿吐膿。形肉脫也。

白鳳膏。

勞嗽兼喘。腎不納氣。

也。

都氣丸加參耆牛膝蛤蚧。

其見爲血症也。嗽血出於肺。憂悲所致也。

宜

冬二母白芨百合枯梗阿膠或潤肺膏

痰血出於脾思慮所致也

宜荳蔻地解丹陳甘萆或酸聚仁湯

吐血出於心驚恐所致也

宜丹參山藥茯神當歸地黃麥冬或養心湯

血成塊出於肝

悲怒所致也

宜柴芍丹梔生地棗仁沈香或柴胡疏肝散

咯血出於腎房慾所致也

宜犀角膠或坎離既濟丹

嘔血出於胃中氣失調火迫絡傷也

宜犀角地黃湯

凡積勞失血久病吐血

並宜獨參湯

若夫尸疰瘵症由瘵久生蟲食人

臟腑其症蒸熱噎胸悶背痛或面色晄白兩頰時紅亦有面色

不衰肌肉不損名桃花疰

宜紫金錠蘇合香丸

又有尸鬼作祟其症沈沈默

默不知所苦累月經時羸頓至死同氣連枝多遭傳染名傳尸勞

當補虛以復其元

養營湯人味丸

殺蟲以絕其根

十疰丸桃奴丸

凡診視者不宜

空腹宜飽食或佩安息香及麝香則蟲鬼不敢侵也

附方

調營養胃湯

參黃耆

朮

陳

苓

歸

芍

麥

味

二地

歸脾湯

人參

焦朮

當歸

茯神

遠志各一錢

棗仁

山黃

龍眼各二錢

炙膏

木香

甘草各五分

薑棗

水煎

鹿胎丸

鹿胎煮

熟地八兩

用人乳粉

山藥各一兩

排蒸

乳浸

杞子八兩

乳浸

製首烏六兩

黃耆五兩

酥炙

黃蒿膏丸

金石斛六兩

酒炒

巴戟五兩

酒炒

補中益氣湯

見一卷中風

十四味建中湯

參

蒼

桂

附

朮

草

歸

芍

芎

清暑益氣湯

見一卷暑

葛花解酲湯

見一卷濕

久勞 鬱勞 房勞 補中 積勞 暑勞 酒勞

童勞女勞女勞男勞男勞

麥煎散

赤苓

歸朮

地

草

柴胡

鼈甲

小麥

逍遙散

見一卷火

補血養陰丸

歸芍

丹

地

麥

味

牛膝

杞子

清離滋坎丸

六味丸

料加

二冬

生地

當歸

白芍

蓮子

欬加

枇杷葉

貝母

栝

萎

痰加

橘紅

熱加

骨

牡

皮

嗽加

五味

怔忡

加遠志

棗仁

痰加

蘇子

遺精

加龍骨

牡

久欬

加阿膠

五味

桔梗

痰喘

加蘇子

麥冬

紫苑

紫苑

紫苑

紫苑

聖愈湯

參

耆

芎

歸

二地

二地

二地

二地

二地

二地

人中白丸

歸

芍

二地

人中白

白朮

鼈甲

青蒿

青蒿

青蒿

青蒿

參苓建中湯

參

苓

歸

芍

陳

草

桂枝

半夏

半夏

半夏

參苓建中湯

參

苓

歸

芍

陳

草

桂枝

半夏

半夏

半夏

參苓建中湯

參

苓

歸

芍

陳

草

桂枝

半夏

半夏

半夏

骨蒸

鱉甲散

柴胡 地骨皮 鱉甲 知母

秦艽

當歸

烏梅

青蒿

骨蒸

河車丸

紫河車 人乳 地骨 龜甲

秋石

五味

人參

阿膠

童便

陳酒

熬膏爲丸

二仙膠

鹿膠

龜膠

人參

杞子

骨蒸

生豚散

見一卷暑

六君湯

見一卷中風

脾健

清安膏

麥冬 生地 各十兩 貝母 各二兩 龍眼

橘紅 三兩 苡仁 各八兩

桔梗

甘草

液瀦

六味丸

見一卷中風

勞嗽

禽化丸

玉露霜 柿霜 貝母 薄荷 石 甘草 桔 貝

礪砂 少許 五味子

款冬

天冬

葱白

嗽

立效方

川椒 每歲一粒 共爲末 納猪肺中 荷葉包 蒸五更食

陽虛六味回陽飲

參附草乙錢

薑各二錢

熟地五錢

當歸三錢

理中湯

見一卷中風

汗加黃耆

泄加白朮

烏梅

八味丸

見一卷中風

太平丸

二冬二母蒲黃薄荷

二地

杏

桔

歸

款冬

阿膠

白鳳膏

白鴨一隻

元稟二升

參苓平胃散一升

陳酒

淨將稟去核每瓶納參苓平胃未入鴨腹麻線紮定砂鍋內煨將酒三次添入以乾爲度其搗爲丸煎人參湯下

都氣丸

六味丸加五味子

潤肺膏

羊肺杏仁柿霜

蛤粉各一兩

真酥一兩

將四味納肺中煮食此與白鳳膏葛可久方也

酸棗仁湯

見一卷中風

養心湯

耆歸二茯

川芎

半夏各一兩

柏子仁

聚仁遠志五味人參桂心各五錢炙草

血心

脾

嗽

勞

喘

嗽

痰

肺

痰

肺

寒

虛

陽

虛

陽

虛

陽

虛

肝血腎血胃血殺蟲殺蟲補虛鬼疰殺蟲

一錢 爲散

煎服五錢

柴胡疏肝湯

香附

柴胡

陳皮

芎

芍

枳

草

坎離既濟丹

二地

二冬

二茯

歸

芍

參

味

黃

犀角地黄湯

見一卷溫

紫金錠

芙蓉

五倍

大戟

辰砂

雄黃

麝香

蘇合香丸

見一卷中風

養營湯

參

苓

朮

草

地

芍

歸

味

青

志

十疰丸

雄黃

巴霜

各一兩

人參

細辛

附子

麥冬

桃奴丸

桃奴

七個

另研

玳瑁

鎔細

一兩

安息香

黃各三錢

同熬成膏

麝香

冰片

牛黃

各二錢

桃仁

十四個

共研細和膏爲丸 芡子大封固陰乾每一丸參湯下

癆瘵

劉氏陰瘵延久暫愈臨蓐後將息失宜膚粟骨戰寒熱沈綿陰陽

二維不司統束護衛用理陽攝陰法鹿角霜補骨脂當歸

各一錢

潞參杞子遠志

各二錢

茯神

三錢

生白朮

八分

炙草

六分

小麥

半合

紅棗

五枚

十服諸症漸減但右脉沈小左寸虛原方去鹿角杞子骨脂加

補心脾之藥用山藥棗仁蓮子白芍

俱炒

數服飲食進寒熱除繼

由變生反目氣逆欬嗽失音面晦是臟真日漓神采內奪也切

忌清肺理嗽速用五味山藥茯神潞參杞子核桃肉訶子皮蓮

棗數十服嗽止音復後加調補獲痊

印氏脉細瀉營衛素虧秋冬背寒脛冷經事愆期從未孕育乃衝

任督經虛宿恙延爲勞怯重症近日欬嗽唾痰多在夜半及清晨爲劇想脾聚宿痰瘕時爲呼吸引動因喘欬不已先服平嗽煎劑再訂膏方耑理奇脉川貝甜杏仁蕁皮俱炒茯苓前胡橘紅白朮炙草潞參桑皮蜜炙薑棗煎三服嗽定去蕁皮前胡加蓮子山藥五味杞子俱炒再服數劑俟嗽愈服膏方骨脂杞子沙苑歸身杜仲兔絲餅核桃肉芡實炒牛膝酒蒸首烏製茯神玉竹同熬用鹿角膠加倍收膠日服五錢宿恙漸瘳

欬嗽論治

肺爲華蓋。職司肅清。自氣逆而爲欬。痰動而爲嗽。其症之寒熱虛實。外因內因。宜審辨也。肺寒嗽必痰稀面白。畏風多涕。當溫肺固衛。欬冬、紫苑之屬。欬冬、紫苑之屬。肺熱嗽必痰稠面紅。身熱喘滿。當降火清痰。黃
衛。加入玉屏風散。肺熱嗽必痰稠面紅。身熱喘滿。當降火清痰。黃
花粉、海石、栝蒌、竹茹。肺虛嗽必氣逆汗出。顏白飢泄。當補脾斂肺。茶。
之屬。加入清肺飲。肺虛嗽必氣逆汗出。顏白飢泄。當補脾斂肺。茶。
六君湯。加山藥。肺實嗽必頓欬抱首。面赤反食。當利膈化痰。瀉白
五味子之屬。肺實嗽必頓欬抱首。面赤反食。當利膈化痰。散。加
杏、薏、薑。外因者。六淫之邪。自表侵肺。治用辛散。則肺清而嗽止。內
橘之屬。外因者。六淫之邪。自表侵肺。治用辛散。則肺清而嗽止。內
因者。五損之病。自下及上。治在甘潤。則肺清而嗽安。治外因嗽。感
風者。辛平解之。桂枝、防感寒者。辛溫散之。紫蘇、薑感暑者。辛涼除
風之屬。感寒者。辛溫散之。杏之屬。感暑者。辛涼除
之。香薷、薄荷。感濕者。苦降淡滲之。厚樸、通草。感燥者。甘涼清潤之。
竹葉之屬。感濕者。苦降淡滲之。慈仁之屬。感燥者。甘涼清潤之。

玉竹、花粉、瓜火者、甘寒、苦辛、滌之。麥冬、石膏、桔梗、山梔、貝母之屬。濕熱痰火阻氣。

百合之屬。清降辛泄之。茯苓、沙參、杏仁、前胡、桑皮之屬。治內因嗽、肝膽氣升犯肺者、泄木降。

逆。鈎藤、梔子、枳殼、丹皮、陳皮之屬。土虛不生金者、胃用甘涼。參、麥、山藥、扁豆之屬。脾用甘溫。

西君。腎陰虛、火炎、金燥者。熱地、五味、人乳、燕窩、阿膠、胡桃之屬。滋液填精、腎陽虛。

水泛爲痰者。益智、沉香、沙苑、子、腎氣丸之屬。納氣歸腎、勞心動火者。歸脾湯、去木、香、加麥冬、五

味、熬膏、潤養心血、久嗽不已。人參、蛤蚧、散、化、如、嗽、丸。

經云、五藏六腑皆令人欬、非獨肺也。肺欬則喘息有音。千金、五味、子、湯、去、續、

斷地黃、赤小豆、加心欬則心痛、喉中如梗。涼膈散、去硝黃、肝欬則、

麥冬、玉竹、辛。枳殼、黃散、去芎、防、脾欬則右肱下。腋、下、痛引肩背。六君湯、加、

脇痛。枳殼、黃散、去芎、防、脾欬則右肱下。腋、下、痛引肩背。六君湯、加、

腎欬則腰背引痛。都氣丸、胃欬則嘔甚、長蟲出。異功散、加、膽欬則、川椒、烏梅、

嘔膽汁

小柴胡湯

大腸欬則遺矢

赤石脂湯

小腸欬則失氣

芍藥甘草湯

膀胱

欬則遺溺

茯苓甘草湯

三焦欬腹滿不欲食飲

七氣湯

加黃連枳實夫五臟久

欬乃移六腑

脾欬不已則胃受肝欬不已則膽受心欬不已則小腸受肺欬不已則大腸受腎欬不已則膀胱受六腑

久欬不已

則三焦受然終不離乎肺脾腎也蓋肺爲貯痰之器脾爲生痰之源而腎與肺實子母之臟因痰致欬者痰爲重主治在脾因欬動

痰者欬爲重主治在肺無痰乾欬者陰虛爲重主治在腎景岳謂

虛勞乾欬乃肺腎不交氣不生精精不化氣當分有火無火治之

如臟平無火止因肺虛補氣自能生精

宜五福飲之類

如臟氣微寒非辛

不潤補陽自可生陰

宜理陰煎或六君湯

如內熱有火須葆真陰壯水自能

制火

宜一陰煎或貝母散

切忌消痰開鬱使氣愈耗水愈涸也其脾肺虧損

致欬嗽喘促。畏寒嘔瀉。及脉見細弱。症見虛寒。欬久不已者。均勿

清嗽。但補元氣。嗽自止。

六味回陽飲。或理中湯。切勞散。八味地黃丸。

以四時論之。春季欬。木氣升也。治宜兼降。

前胡。杏仁。海浮石。桔。薤仁之屬。

夏季欬。

火氣炎也。治宜兼涼。

沙參。花粉。麥冬。知母。元參之屬。

秋季欬。燥氣乘金也。治宜清

潤。玉竹。貝母。杏仁。阿膠。百合。枇杷膏之屬。

冬季欬。風寒侵肺也。治宜溫散。

蘇葉。川芎。桂枝。麻黃。

之以一日計之。清晨嗽。爲氣動宿痰。

二陳湯。加貝母。枳殼。桑白皮。枇杷葉。橘紅。

上午嗽。

屬胃火。

石膏。川斛之屬。

午後嗽。屬陰虛。

四物六味等湯。

黃昏嗽。屬火浮於肺。當斂

而降之。

五味子。五倍子之屬。

夜半嗽。爲陽火升動。宜滋陰潛陽。

六味丸。加牡蠣。淡菜之屬。

肺本嬌臟。畏熱畏寒。火刑金燥。故欬。

無痰有聲。

水冷金寒。故欬。

有痰有聲。當

分新久虛實治之。感風暴嗽。鼻流清涕。

桂枝湯。加葱豉。

感寒暴嗽。肩背怯

冷華蓋散。

兼感風寒暴嗽。鼻塞聲重。

為蘇飲。

欬逆倚息不得卧。

小兒風。

溫化燥噎欬。

金匱麥門冬湯去半夏。加玉竹沙參杏仁貝母。

火熱嗽喉啞痰稠。

加減涼膈散。

感

濕致嗽。面目浮腫。

豆豉杏仁通草滑石。半夏茯苓大貝之屬。

一欬痰即出脾濕勝也。

二

湯加丸。

連欬痰不出肺燥甚也。

桔梗湯去桑皮。防已加玉竹。

客邪傷肺久嗽不

止。安嗽化

久嗽中氣虛營衛兼損。

歸耆建中湯。

肉傷嗽脉虛氣乏。

補中益氣

湯去升柴。

脾虛食減久嗽。

歸耆異功散。

胃虛噎逆作欬。

大半夏湯加砂仁茯苓。

荅橘紅。

肺胃虛寒欬沫吐食。

溫肺湯。

寒飲停胃攻肺致欬。

半夏溫上

氣喘欬脇痛肝木乘肺也。

七氣湯加白芍金橘。

思慮勞神乾嗽心火刑金也。

生脉散加茯神貝母。

腎虛肺燥喘欬。

都氣丸。

喘嗽痰多怯冷。

生料腎氣

熟地棗仁龍眼肉。

腎虛肺燥喘欬。

加麥冬。

喘嗽痰多怯冷。

生料腎氣

丸煎肺虛喘嗽吐血。

門冬清肺飲。

欬痰見血脉虛數。

六味丸料煎加阿膠秋石。

傷風

惡風自汗脉浮

加味桂枝湯

傷寒

惡寒無汗脉緊

加味麻黃湯

寒風

嗽

痰多氣逆

六安煎

寒包熱

熱鬱肺俞遇秋冬寒涼輒發欬寸脉

堅聲音窒但解其寒而熱自散

麻杏石甘湯或金沸草散

熱包寒

先傷風寒

痰嗽未止更傷炎熱噎欬聲嘶宜兩解其邪

葳蕤湯加減

風熱風

鬱化熱宜辛涼散解

薄荷梔梗杏仁蘇梗桑皮之屬

嗽

風溫風溫上侵頭脹咽

痛噎欬失音宜清輕涼解

桑葉象貝連翹薄荷杏仁沙參梔梗甘之屬

溫邪

春冬溫

邪犯肺噎欬氣窒喉痛

治同風溫

如熱鬱者加山梔豆豉鬱金

暑

暑熱蒸嗽及風

暑襲

人肺衛寸脉大喉癢口渴俱宜微辛微涼

黃皮杏仁石

暑兼

欬而痰稠氣阻溺瀉宜苦降淡滲

厚樸黃芩

青薄荷香薷濕

濕

秋燥嗽渴氣促宜甘潤

玉竹沙參麥冬梨蜜杏仁

西瓜翠衣或益元散

燥

秋燥嗽渴氣促宜甘潤

玉竹沙參麥冬梨蜜杏仁

蔗汁之屬。或復

火逆上氣。咽喉不利。金匱麥門冬湯。去半

火熱乘肺。欬唾有血。

千金麥門冬湯。去麻黃薑。

喘

欬而上氣。

蘇子

喘欬發熱自汗。

安肺湯。

欬逆上氣。喉中如水雞聲。

射干麻

肺脹喘欬。鼻扇肩擡。

越婢加半夏湯。

欬而喘急。咽燥如有物塞。

唾血者。

杏仁膏。

肺虛久嗽作喘。

補肺阿膠散。

喘促脉沈數。

五味子湯。

勞

虛勞乾欬。

瓊玉膏。或金水六君煎。

脾肺傷損。勞嗽憎寒。壯熱。

團參飲子。

心腎虛。

發熱盜汗。勞嗽無痰。

劫勞散。

欬而無痰者。

人參同蜜煎。胡桃肉細嚼。或二味煎服。名觀音

應夢

脾肺虛寒。怯冷痰嗽。

加味理中湯。

腎陰虛。脉細數。下午寒熱。乾

欬。頰紅。

晨服異功散。夜服六味丸。

腎陽虛。脉微弱。水泛爲痰。

七味地黃丸。

肺勞久

嗽。飢則胸中大痛。視上唇有白點如粉者。此蟲嚙其肺。

百部膏。加烏梅。

積下其蟲自愈。經年嗽，藥不瘥，餘無他症者，與勞嗽異。一、味百部膏。

有暴嗽，諸藥不效。服生料鹿茸丸即愈。乃腎虛也，不可以暴嗽而疑遽補

之非。

啞氣促滿悶失音。通聲煎。肺實痰壅。宜杏、桔、薑、橘、貝、枳、竹葉之屬。肺虛喉燥。宜生

加玉竹、款冬花、蜜。外感寒包熱者。細辛、半夏、蜜。內傷火刑金者。六味湯、

散。頓欬至聲不出者，痰鬱火邪。桔梗湯、加貝母、枇杷葉。久嗽失音。杏仁膏。

肺上氣喘脹，脉浮大。越婢加半夏湯。肺脹欬喘，脉浮，心下有水氣。小青龍湯、加石膏。

湯。肺脹欬，左右一偏不得卧，動則喘急，息重，此痰挾血瘀。宜當歸丹。

皮、赤芍、桃仁、枳殼、桔梗。如外邪去後。宜半夏、海石、香附、枳殼、薤仁、

半夏、甘草、竹瀝、薑汁。二陳湯加蘆根、薑汁、枇杷葉。欬

吐欬嘔并作，為肺胃俱病，先安胃氣。葉虛者六君湯加桔梗。

吐痰食俱出。

二陳湯加枳
朮杏仁細辛。

食積痰嗽。

二陳湯加栝蒌山查
萊菔子枳實麴蘖。

欬嗽脉候

欬嗽脉浮爲風。緊爲寒。洪數爲熱。濡細爲濕。寸關濇難而尺內弦緊爲房勞陰虛。右關濡大爲飲食傷脾。左關弦數爲痰極肝傷。遲濇肺寒。洪滑痰多。弦濇血少。脉出魚際爲逆氣喘急。肺脉微急欬而唾血。脉或沈或浮聲不嘶者可治。脉來洪數形瘦面赤腎氣衰而聲啞者難療。亦有肺絡痰壅聲啞者不在此例。暴嗽不得卧爲肺脹可治。久嗽左不能卧爲肝傷。右不能卧爲肺損皆難治。久嗽脉弱者生。實大數者死。欬嗽形羸脉形堅大者死。沈緊伏匿者死。浮直者可治。浮軟者易治。欬而脉虛必苦胃。以有支飲在胸中也。

附方

玉屏風散

見一卷中風

清肺飲

杏 薑三片

苓各一錢

桔 草

味

陳各五分

清肺飲

分 二母

杏 前胡

桔 桑皮

薄荷

赤茯苓

天冬

甘草各七

六君湯

見一卷中風

瀉白散

見一卷火

腎氣丸

八味丸加

牛膝

車前

歸脾湯

見本卷勞瘵

人參蛤蚧散

人參五錢

蛤蚧酥炙一對

杏仁

甘草各

茶服

人參

喻化丸

熟地

阿膠

五味

貝母

款冬

杏仁

人參

甘草

欬久

劫嗽丸

訶子

百藥煎

荊芥

蜜丸

千金五味子湯

五味

桔梗

紫菀

炙草

續斷各一錢

生地

桑皮各

錢五

錢五

涼膈散

見一卷中風

枳壳煮散

枳壳

蘇子

薑

棗

細辛

葛根

肉桂

橘

都氣丸

見一卷火

異功散

見一卷中風

小柴胡湯

見一卷溫

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧各二兩

研水煎

芍藥甘草湯

白芍

甘草各四錢

水煎

欬心 欬肝 欬腎 欬胃 欬胆 欬大腸 欬小腸 欬勝

陽壯損治陽補陽補水壯水壯陽補氣補軟三軟勝

茯苓甘草湯

茯苓二錢 水煎

炙草一錢

桂枝二錢半

薑五

七氣湯

半夏五錢 厚樸三錢

茯苓四錢 紫蘇二錢

名三因四七湯

五福飲

見一卷中風

理陰煎

熟地三錢

當歸

炮薑各二錢

炙草

肉桂各

一陰煎

熟地三錢 生地

白芍 麥冬

丹參各二錢

貝母丸

二母

二冬

二地

歸芍

甘草

六味回陽飲

見本卷勞瘵

理中湯

名參 薑 朮 草

加陳 苓

辛

夏

味

劫勞散

歸 芍 各錢半

熟地二錢

參

耆

苓

草

八味丸

見一卷中風

潤痰補血風嗽散寒疏風行水潤燥降火疏肺止咳欬

二陳湯

見一卷中風 加蘇杏桔 名加味二陳湯

四物湯

地芍歸芎 或加阿膠

桂枝湯

桂芍草薑棗

華蓋散

麻黃蘇子桑皮杏仁赤茯苓紅各一錢
甘草五分薑棗

芎蘇飲

參蘇夏苓陳草枳桔芎柴
木香葛根薑棗

小青龍湯

麻桂辛芍薑草夏味

金匱麥門冬湯

見一卷燥

加減涼膈散

麴梔芩草荷桔竹葉

桔梗湯

杏萸枳桔歸耆草貝苡仁桑
皮防已百合薑

安嗽化痰湯

杏葛枳桔半夏橘紅桑皮炙
草茯苓紫蘇前胡麻黃

營衛中補扶脾調胃溫肺清肺風嗽寒嗽瘧瘧熱

歸耆建中湯

桂芍草此加歸耆

棗

飴糖

名小建中湯

補中益氣湯

見一卷中風

歸耆異功散

即異功散加

歸耆

大半夏湯

半夏

人參

白蜜

溫肺湯

白芍桂汁炒

半夏

薑

味

辛

枳

肉桂

生脉散

見一卷暑

加味桂枝湯

即桂枝湯加

防風

杏仁

前胡

細辛

加味麻黃湯

麻桂橘紅

蘇葉

薑

名麻黃湯

此加半夏

六安煎

陳皮錢半

白芥子伍分

茯苓各二錢

炙草

杏仁各

麻杏石甘湯

麻

杏

石

草

散 金沸草散 旋覆花卽金沸草 前胡 細辛各一錢 荆芥 錢半 赤茯苓六分 半夏五分 炙草三分 薑棗

茂 蕤湯 見一卷溫

益元散 見一卷溫

復脈湯 見一卷中風

千金麥門冬湯 見一卷燥

蘇子膏 蘇子 杏仁 生地 薑汁 白蜜收膏

安肺湯 參 苓 朮 草 歸 芍 芎 麥 味 桑皮 各一錢 阿膠錢半 薑三片

射干麻黃湯 射干三錢 麻黃 五味各一錢 細辛八分 紫苑 款冬各三錢 半夏二錢 薑 棗

越婢加半夏湯 麻 石 薑 草 棗 名越婢湯 此加 半夏

杏仁膏 杏仁 阿膠 蘇子各二兩 真酥三兩 薑汁一 合 白蜜五合 收膏

久咳

補肺阿膠散

人參 阿膠各二兩 三錢 糯米各五錢 杏仁廿粒

茯苓 馬兜鈴 炙草四錢 爲末

每服三錢

五味子湯

參 杏 麥 味 陳 薑 棗

瓊玉膏

見一卷燥

金水六君煎

熟地三錢 陳皮錢半

當歸 半夏 炙草一錢

茯苓各二錢

團參飲子

人參 杏仁

紫菀 天冬

阿膠 百合 半夏 五味

細辛 款冬 桑葉 甘草

觀音應夢散

人參

白蜜

核桃肉

或煎服

七味地黃丸

見一卷中風

百部膏

百部一味熬

鹿茸丸

鹿茸

牛膝

五味各二兩

石斛

巴戟

附子

川棟

山藥

肉桂

杜仲

澤瀉

各一兩

沉香

陽補

蟲殺

泛水

痰無

肺脾

嗽勞

款乾

促喘

亞嗽火鬱

五錢
酒糊丸

通聲煎

杏仁
細辛

桔梗湯

桔梗
薄荷

五味
竹茹
梔子

木通
真酥
黃芩

菖蒲
薑汁
前胡

人參
白蜜
貝母

桂心
棗肉
知母

款冬
香附

欬嗽

楊氏秋間嗜嗽子午刻尤甚欬則傾吐晡後熱渴面赤經期錯亂此肺受燥邪不司肅降爲標金受火克不能生水爲本急則治標先於潤劑兼佐鹹降用杏仁萸仁蘇子半夏丹皮麥冬百合三服欬吐已止能納食而虛火亦退後用燕窩清補肺氣再用六味丸料加白芍五味淡萊熬膏蜜收服愈

張氏產後感風欬嗽用辛散輕劑不效改用阿膠五味當歸潞參茯苓甘草甜杏仁炒一研一啜而安可知橘桔芎蘇虛體慎用

族某乾欬無痰臥覺氣自丹田衝逆而上則連欬不已必起坐稍定是氣海失納矣診脉右尺偏大腎陽易旺廉後肺氣不敢下

交於腎延久卽喘之萌速固其根蒂爲要三才固本丸服效
按肺主氣而氣根於丹田腎部故肺腎爲子母之臟必水能制火
而後火不刑金也二冬清肺熱二地益腎水人參補元氣氣者
水之母也

毛 衰年久嗽自秋入冬憎寒食減口不知味脉虛少力爲脾肺
俱傷中氣不足之候宜扶脾陽以生肺金潞參扶神炙草山藥
黃耆炮薑五味紅棗湖蓮數服漸愈

洪 冬季乾欬夜半特甚醫用杏蓂橘薑桑皮等藥氣促不止診
其脉兩尺洪而大此陽失潛藏金畏火炎象也六味湯去黃丹
加五味百合白芍漸愈 此症若尙治肺延久不痊必成上損

須壯水以制龍火之亢逆而嗽自平

鍾

中年肝腎陰虛尺脉偏旺夜熱欬嗽醫藥數月或以欬爲肺有蓄水或以嗽爲外感寒邪浸至頭眩口乾下元乏力近又憎寒減食面色萎悴足心如烙據脉論症必由夢洩傷精漸成勞嗽無疑今慄慄怯寒食不甘味毋使陰傷及陽延成下損及中之咎六味湯熟地炒用加參味貝蓮七服熱減嗽輕又照六味湯去萸泄加石斛麥冬貝母五味潞參蓮子煎服數劑接服丸方用前藥加魚鱉淡菜等蜜丸而愈

毛 久嗽夜甚晨吐宿痰酸沫脉右虛濡左浮長已似木氣貫膈犯肺乃因臂痛服桂枝川烏等藥酒肺爲嬌臟不受燥烈猶欬

益加喘急上氣此爲治病添病當主以辛潤佐以酸收經所謂
肺苦氣上逆以酸補以辛泄也清肺飲去桔梗加白芍蘇子桑
皮蜜炙數服痰欬稀喘亦定但納穀少用培土生金法去桑皮五
味加山藥苡米俱炒潞參茯神蓮子炙草南棗粳米煎湯數服而
食進

王姓兒秋涼感風夜熱頓欬連聲臥則起坐立則曲腰喘促吐沫
汗出痰響由風邪侵入肺俞又爲新涼所束痰氣交阻法宜辛
散邪苦降逆用桔梗紫蘇杏仁前胡橘紅淡薑熱嗽減一外科
以爲症感秋燥用生地五味白芍貝母等藥子曰風邪貯肺可酸斂平痰涎
阻氣可膩潤乎卽單用薑汁一盃溫服可也頻以匙挑與而愈

李 春溫痰火壅肺腎欬上氣臥不著枕心神恍惚脈浮洪舌絳口乾渴赤治先肅清太陰兼佐除煩杏仁薏仁桔梗貝母豆豉山梔蓮翹枇杷葉蔗汁二服嗽稀得寐因遠客勞神心營耗損參用養營安神生地百合棗仁杏仁茯神貝母沙參甘草二服心神安胃陰亦復可冀加餐嗣因內人語言根觸氣鬱生涎改用溫膽湯而痊

巫氏女甥

年十四乾欬脈數頰紅夜熱無汗此虛陽升動肺金受燥若不滋化源陰日涸損根伏矣據述天癸未至白帶頻下始信真元不固乃以潞參山藥茯神扶脾元白芍丹皮瀉陰火甜杏仁百合止嗽五味訶子斂肺炙草紅棗和中調營一服嗽輕加熟

地石斛而蒸熱退卽用前藥去百合訂石斛加炙實蓮子蜜丸常服效

廉 六旬素患失血今冬溫來虛痰嗽氣阻欬則脇痛汗出熱煩

口乾脉歇止醫用消散痰嗽益劇更醫乃用炒朮半夏樸柴等

味余曰朮夏守而燥樸柴溫而升此症所忌况質本陰虧溫易

化燥宜辛潤以利肺氣則安用杏仁栝蒌貝母桑皮蜜橘皮欬

斜前胡赤苓一服安廉嗽去八九脇痛頓減脉亦和乃用燕窩

湯煎潞參茯神杏仁貝母山藥栝蒌桑皮再服更適轉側如意

矣

服姪勞倦內傷嗽用桔蘇旋覆等劑病加診脉小數右尺稍大乃

陰虛致嗽忌服表散以五味甜杏仁白芍貝母潞參杞子茯苓
蓮棗二服嗽減又三服加熟地山藥等尺脉乃斂

○冬陽不潛龍燄上擾灼肺喘嗽帶紅劇在腎分少年氣促脉

虛數懷寒夜熱損怯已成想誦讀陽升寐中必有遺泄心腎不
交精關失固且口不甘味食減於前下損及脾無清嗽治痰之
理燕窩清補希冀嗽止痰消恐初之氣已交懷寒必增安望嗽
減益脾肺交心腎調理如法寒熱可止喘嗽可平潞參山藥茯
神生黃耆皮桑皮蜜炙甜杏仁五味枇杷葉蓮子棗仁阿膠龍骨
數服嗽減寒止痰血若失去枇杷葉龍骨阿膠加炒熟地丹皮
熱漸退嗣用潞參熟地山藥茯神遠志黃耆蜜炙龍骨白芍棗仁

五味龍眼肉熬膏二料全愈

肺痿肺癰論治

肺痿者津枯葉悴因熱在上焦。欬久傷肺。始則寒熱自汗。口吐濁沫。或唾紅絲膿血。脈數而虛者是也。肺癰者咽乾吐膿。因風熱客肺。蘊毒成癰。始則惡寒毛聳。喉間燥欬。胸前隱痛。痰膿腥臭。按右脇必痛。著左卧則喘。脈滑數有力者是也。肺痿傷在無形之氣。氣傷者調其元。肺癰毒結有形之血。血結者排其毒。此治法之概也。分而論之。肺痿由津液枯燥。至肺管日窒。欬聲不揚。動卽氣喘。治在補氣血生津液。佐以止嗽消痰。宜人參玉竹五味阿膠白芍麥冬當歸熟地紫苑川貝杏仁等其肺勞成痿。虛熱嗽血者。人參固本太不時喻化。肺虛喘急自汗者。安肺湯。往來寒熱自汗煩渴者。紫苑散加銀柴胡蘆用蜜製。欬膿血發熱盜汗者。却勞散。涎

唾多心中溫溫液液者

多甘草湯

痰嗽午熱聲嘶者

紫苑散加丹皮薑黃

喘欬失

音咯血者

人參蛤蚧散

其虛寒羸瘦喘吸胸滿者

千金生薑溫中湯

凡肺痿症

欬唾咽燥欲飲水者自愈張口短氣者危肺傷咯血喉啞者不治

肺癰由熱蒸肺竅至欬吐臭痰胸脇刺痛呼吸不利治在利氣疏

痰降火排膿

宜安肺桔梗湯

初起肺受風寒喘嗽者

小青龍湯散解之

喘不得卧

胸脹者

葶藶大棗湯瀉之

肺氣不化水道不利者

葶藶湯疏利之葶藶湯犬疏肺氣使濕濁悉

從溺

欬逆上氣時時唾濁者

皂莢丸瀉之

皂莢丸欬膿腥穢者

枯梗湯

欬而短氣溺少者

參耆補肺湯調之

體倦食少脾虛者

參朮補脾湯養之

膿已潰者

排膿散或金鯉湯或薏苡根煎汁飲之

痰中帶血胸痛者

桔梗杏仁煎或肺癰神湯主之

吐膿咽痛者

甘桔湯加杏仁貝母

難久不斂者

川槿湯

如思慮勞心致動陰火

痰臭轉甚者。

六味丸加麥冬紫菀。

一症潰後宜補脾肺滋腎水不宜專攻其

瘡。凡肺癰症初起痰覺腥臭。

用陳淹芥瀟溫服。或濃煎荷葉汁加白蜜服。效。欬則微痛。痛

在胸右爲肺之長葉。坐臥如常。飲食知味者。易治。若潰後寒熱脇

痛。痛在胸左爲肺之短葉。或坐臥不安。飲食無味者。難治。若喘鳴

不休。坐不得臥。咯吐膿血。色如敗黣。飲食艱進。聲啞鼻扇者。不治。

肺癰已破入風者。

濃煎葱白香豉湯頻服。

然多不救。

肺痿肺癰脉候

脉數而虛者。肺痿數而實者。肺癰微緊而數者。未成膿。緊甚而數

者。已成膿。吐膿如米粥者。難治。嘔膿不止者。脉浮洪而大者。難治。

肺痿六脉浮濇而急。或細數無神者。死。肺癰潰後脉忌短濇。緩滑

面白者生弦急面赤者死

附方

固本丸

見一卷中風

安肺湯

見本卷欬嗽

紫菀散

人參 桔梗 茯苓各一錢 知母 貝母各錢半

阿膠 甘草 紫菀

五味子十五粒

劫勞散

見本卷欬嗽

炙甘草湯

見一卷中風

蛤蚧散

蛤蚧十對 酥炙 二母 桑皮 茯苓各二兩 人參 甘草各三兩 杏仁五錢 麻黃 爲末 每服三錢

生薑溫中湯

薑 桂 陳 草 麻黃

安肺桔梗湯

杏 薑 枳 桔 歸 耆 二母 桑皮

防已 百合 苡仁 地骨 葶藶 味 草

表邪

小青龍湯 見本卷欬

宿水

葶藶大棗湯 甜葶藶三錢炒研

大棗十枚去核

利疏

葦莖湯 蘆管取節

薏仁

桃仁

瓜瓣

甜瓜子

降濁

皂莢丸 皂莢去皮弦子酥炙研末蜜丸梧子大以棗湯服三

提開

九日三服夜一服 見本卷欬嗽疏肺

補肺

參耆補肺湯 各錢半

五味

紫苑各八分

熟地

桑皮

健脾

參朮補脾湯 各一錢

桔

麥各八分

苓

歸 陳

化膿

排膿散 參

香

芷

味 爲末每服三錢

膿排

金鯉湯 活鯉魚四兩

貝母一錢研 以鯉魚去鱗雜不見

胸痛

桔梗杏仁煎 膠

貝

枳

桔

麴

麥

草

銀花

阿

吐膿久痼陰火通用

甘桔湯

甘草 桔梗

川槿湯

川槿皮 白斂 等分水煎

六味丸

見一卷中風

肺癰神湯

桔梗 銀花 貝母 錢六分

炙甘草 白芨 各一錢 苡仁 五錢 陳皮 錢二分

甜葶炒八分 薑二片 水煎

肺癰肺痿

本 老年嗜飲熱火酒致熱毒熏肺發瘡生癰欬吐穢膿胸右痛
不利轉側脉左大初用桔梗湯去耆薑加連翹山梔四服欬稀
痛止仍宜排膿解毒用桔梗銀花各一錢貝母錢半生薏苡錢五當歸
甘草節廣皮各一錢二分白芨生耆各一錢甜葶藶炒七分數服膿稀瘡
癰皆平

韋 嗽重痰腥胸背隱痛脉數有力已成肺癰此肺受風寒蘊邪
壅熱宜疏痰導熱則呼吸自利不至脹痛喘急而腥痰漸少桔
梗湯三服兼用陳醃芥瀘汁一杯溫服愈

戴氏元氣久削痰嗽肺痿寸脉虛數少神難治之症紫菀湯三服

阿膠水煨
冲服

後去桔梗知母加山藥蓮子黃耆取補土以生金嗽
熱漸減

失音論治

肺爲音所自出。而腎爲之根。以肺通會厭。而腎脉挾舌本也。夫金空則鳴。失音一症。亦如金實則瘖。金碎則啞。必辨其虛實。而後治法可詳。其寒包內熱閉窒氣分致失音者。以麻杏湯之屬開其痺。其醉卧當風邪干肺竅。猝失音者。以蘇子湯之屬降其痰。其木火犯肺咽乾喉痺致失音者。以麥冬湯之屬潤其燥。其痰熱客肺喘急上氣致失音者。以桔干湯之屬疏其壅。其逆風叫號致傷會厭者。以養金湯之屬清其音。其暴嗽失音者。杏仁桑皮湯。久欬失音者。蛤蚧散。若由陰虛勞嗽聲啞者。相火燠金也。百合固金湯去元參。桔梗加五味。訶子或扶贏湯去秦艽。其內奪而厥爲瘖痺者。腎虛也。地黃飲子。其中風症舌瘖不

能言者。音如故。而舌不掉也。虛者六君湯加竹茹薑汁。其總治氣血虛燥喉音不清者。清音湯加減訶子湯脂蜜膏方。此失音症治大約潤肺滋腎之品爲宜也。

醫通曰失音大都不越於肺。須分暴瘖久瘖。暴瘖多是寒包熱邪。

宜辛涼和解。

消風散用薑汁沖服。

肺虛傷風喘欬聲嘶。

千金酥蜜膏。

火邪傷肺咽

痛聲啞。

生豚散各六味丸。或猪脂白蜜熬膏挑服。

久病失音氣虛挾痰宜滋肺腎之化

源。生豚散下都氣丸。

咽乾聲槁潤肺爲主。

生豚散加玉竹。

若不應。生豚散童真丸。

景岳全書因陣載秘方。

竹葉麥冬湯。

治勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服

此神效竹衣。

解者一錢。

竹茹。

三錢。

麥冬。

二錢。

竹葉。

十四片。

甘草。

五錢。

桔梗。

各一錢。

杏仁。

七粒。

竹瀝。

一錢。

煎七分。

竹瀝和勻服。

徐靈胎指南批本曰諸症失音皆有可愈之理。惟用麥冬五味熟地桂枝等藥補住肺中痰火。以致失音。則百無一生。又云久嗽失音。必由藥誤。麥冬是失音之靈丹也。服之久無不失音者。倘風寒痰火。偶爾失音。即不治亦愈。但更加以麥冬五味。則弄假成真矣。

附方

開痺 麻杏石甘湯 麻杏石草

降痰 蘇子降氣湯 蘇子橘紅半夏當歸前胡肉桂厚樸炙草薑一方有沈香無肉桂

潤燥 麥門冬湯 見一卷燥

疏壅 桔干湯 荆防翹桔牛蒡射干元參山豆根竹葉甘草

清音 養金湯 生地桑皮杏仁阿膠知母沙參白蜜麥冬水煎

暴

杏仁桑皮湯

杏仁

桑皮

五味

紫苑

通草

貝母

久

蛤蚧散

見本卷肺痿

補

百合固金湯

二地

歸

芍

桔

貝

麥

草

元參

勞

秦艽扶羸湯

柴胡二錢
骨皮各錢半

人參

秦艽

當歸

鼈甲

地

瘡

蓋棗
水煎

瘡

地黃飲子

見一卷中風

瘡

六君子湯

見一卷中風

瘡

大秦艽湯

見一卷中風

瘡

清音湯

人參
苓

歸

地

二冬

烏梅

訶子

阿膠

降

訶子湯

訶子

桔梗

童便

水煎

喉勞氣納補清補清肺潤邪散痛咽

脂蜜膏

猪脂 白蜜

消風散

參 苓 陳 草 荆 防 羌 芎 藿香

千金酥

真酥 仁 棗肉 柑皮 熬膏 薑汁 生百部汁 杏

生脉散

人參 五味 麥冬

六味丸

見一卷中風

都氣丸

六味丸加 五味

童真丸

秋石 貝母 紅棗肉爲丸 薄荷湯下

失音

某 肺受冬溫蘊而成熱脉洪搏指痰阻喉癢嗆欬失音與苦辛泄降痰火清音自出所謂金空則鳴也用杏仁桑皮薑皮川貝麥冬橘紅竹葉三服嗆嗽平惟渴赤間有寒熱前方加香豉梔皮赤苓燈心二服寒熱除膈間覺燥去桑皮香豉加白蜜三匙和服二劑音漸復

族弟怯症嗽久吐血曾用熟地黃阿膠淡秋石燕窩等藥獲愈經十數載至今秋寒熱宵嗽勞則喉痛欲裂氣急聲啞呼吸有音氣不歸源實水虧火炎金畏火灼重症古云金碎不鳴務滋腎陰俾金水相涵翼龍燄稍熄而已做大補元煎熟地黃八錢山藥

白芍百合

各三錢

牛膝

蒸

五味

焙各八分

洋參棗仁阿膠

水煨

貝母

各三錢

龜板

多

女貞子

各三錢

三十劑後精神稍復兼服人乳數月喜其

胃納頗健調理如法可望延年

族子因驚遺泄嗆嗽聲啞繼乃寒熱喉痛梗礙妨食口乾脉細數

醫與清金降火屢服不效予謂水涸於下火炎於上心腎諸脉

挾咽循喉既非肺痺梅核無清肺降痰之理宜滋填鎮攝俾龍

蟄伏潛喉痛息寒熱漸止方用熟地

四錢

山藥龍齒杞子

炭

天冬

元參女貞子

各二錢

茯神

三錢

丹皮栢子仁

各八分

五味

四分

淡萊

三錢

煎服甚適時用白蜜及猪膚湯潤喉喉痛寒熱若失若精關固
月餘不泄卽用原方去元參加牡蠣蓮子煉蜜丸竹葉湯下庶

望音復後將煎劑去淡菜加龜甲心石斛淡秋石煎丸並服漸效乃誤信喉科鐵烙喉大痛暈絕遂成不救惜夫

王氏室女久嗽失音呼吸痰響勞則發熱頰紅乾飯稍納粥入隨出肺氣既失肅降痰火升逆擾及中宮胃土運納不安然胃虛穀少脉來微數非降火滌痰所得效治以平氣降逆兼培胃氣倘痰火一清聲音可出海浮石蘇子貝母前胡茯苓山藥炙草薑汁竹瀝和服呼吸利痰嗽平再去前胡加訶子蛤粉數服哮喘而音漸復

哮喘論治

哮喘者氣爲痰阻呼吸有聲喉若拽鋸甚則喘欬不能臥息症由痰熱內鬱風寒外束初失表散邪留肺絡宿根積久隨感輒發或貪涼露臥喘嗜甜鹹膠痰與陽氣併於膈中不得洩越熱壅氣逆故聲粗爲哮須避風寒節厚味審其新久虛實而治之大率新病多實久病多虛喉如鼾聲者虛如水雞者實遇風寒而發者爲冷哮爲實傷暑熱而發者爲熱哮爲虛其鹽哮酒哮糖哮皆虛哮也冷哮有二一則中外皆寒宜溫肺以劫寒痰並溫肺湯鐘乳丸冷哮丸一則寒包熱宜散寒以解鬱熱加麻黃湯越婢如邪滯於肺欬兼喘者六安煎加華蓋散三拗湯外感寒內兼微火者黃芩半夏細辛蘇葉冬感寒邪甚者夏湯

熱哮當暑月火盛痰喘者。桑白皮湯或白虎湯。加芩、枳、栝、薑、蘇。痰壅氣急者。四磨飲。

氣湯。氣降痰自清。痰多者吐之。勿純用涼藥。須帶辛散。小青龙湯。痰吐。腎哮火急。

者勿驟用苦寒。宜溫劫之。用椒目五六錢研細。侯哮止後因痰因。

火治之。治實哮。用百部炙草各二錢。栝、梗三錢。半夏。治虛哮。用麥。

兩、桔、梗三錢。甘草。陳皮各一錢。茯苓一錢半。二服可愈。治虛哮。冬三。

二錢。一服可愈。此煎劑內。冷哮加乾薑一錢。熱哮加元參三錢。鹽哮。

加飴糖三錢。酒哮加柞木三錢。糖哮加佩蘭三錢。再用海螵蛸。大人五錢。

小兒二錢。黑砂糖拌。其遇厚味而發者。清金丹。消其食積傷鹹冷飲。

食而發者。白麵二錢。砂糖二錢。飴糖化汁。捻作餅。年幼體虛者。分。

三四次服。吐後用。異功散。脾胃陽微者。急養正。四君子湯。久發中虛者。

急補中。益氣。宿哮沈痼者。攝腎真。腎氣丸。加減。總之哮既發。主散邪哮。

急補中。益氣。宿哮沈痼者。攝腎真。腎氣丸。加減。總之哮既發。主散邪哮。

定則扶正爲主也

附方

冷哮

溫肺湯

見本卷欬嗽

溫肺

鍾乳丸

鍾乳石甘草湯煮研
炙草蜜丸

麻黃醋湯泡焙乾

杏仁

溫肺

冷哮丸

麻杏
牙皂杏

辛草星
紫菀茸款冬

夏川烏
神麴糊丸

川椒

白礬

外治

三建膏

天雄
川椒

川烏
乾薑各二兩

桂心

官桂

桂枝

細辛
麻油熬加黃丹攤貼肺俞

散邪

麻黃湯

麻桂
杏草

散寒

越婢加半夏湯

見本卷欬嗽

痰嗽

六安煎

見本卷欬嗽

利疏

華蓋散

見本卷欬嗽

疏解清熱降火降火降逆降逆降探吐厚味脾虛補中

三拗湯

麻黃不去節 杏仁 甘草 薑

黃芩半夏湯

白芍 四枚

半夏

甘草各二錢

黃芩三錢

棗

桑白皮湯

芩

連

杏

貝

梔

夏

桑皮

蘇子

薑

白虎湯

見一卷中風

四磨飲

人參

沈香

檳榔

烏藥

等分磨汁煎服

蘇子降氣湯

見本卷失音

小青龍湯

見本卷咳嗽

清金丹

蘿蔔子蒸晒一兩

牙皂燒存性三錢

薑汁爲丸

異功散

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

攝腎

腎氣丸

見本卷虛損

哮喘

包哮喘每十日一發嗽痰夜甚脉形俱屬虛寒乃用六味滋陰治不對症焉能奏效議補益中氣爲虛哮喘治法用潞參山藥茯苓半夏炙草於朮炒杏仁煨薑數服而效

一小兒冬春久哮喘屢服治風痰之劑不應診其脉知爲脾弱不能化乳濕用四君子湯加薏苡山藥穀芽俱炒製半夏數服愈

湯氏宿哮喘發欬嘔氣急暑濕爲新涼所遏宜辛平解散用橘皮半夏湯加桔梗象貝杏仁茯苓枳殼香薷生薑數服而平

王丹溪治哮喘專主痰每用吐法不用涼劑謂寒包熱也今弱冠已抱宿根長夏必發呼吸短促欬則汗洩不能平卧脉虛左尺

搏大不任探吐乃勞力所傷暫與平氣疏痰俟哮喘定當收攝
真元先服桑白皮湯去苓連梔夏用桑白皮蜜炙甜杏仁炒研茯神
竹茹貝母蘇子炒研薄橘紅數劑後服生脉散潞參五味麥冬加
海浮石海螵蛸遠志肉山藥炙草茯苓

巫婦梅夏宿哮喘屢發痰多喘欬顯係濕痰鬱熱爲寒邪所遏暫用

加減麻黃湯溫散麻黃

三分桂枝五分

杏仁二分

蘇葉半夏

製各錢半

橘紅

一錢桔梗

八分薑汁三分

二服後隨用降氣疏痰栝萐皮桑皮

俱炒錢貝

母杏仁

俱炒研各二錢

海浮石

三錢

前胡枳壳

各八分

蘇子

炒研六分

茯苓

錢二薑

汁三數服哮喘除

喘症論治

短氣

少氣

逆氣附

肺爲氣之主。腎爲氣之根。肺主出氣。腎主納氣。陰陽相交。呼吸乃和。若出納升降失常。斯喘作焉。張口擡肩。氣道奔迫。病機謂諸病喘滿。皆屬於熱。海藏以爲火鑠真氣。氣衰而喘。有由然矣。夫喘分虛實。經云。邪入六腑。則身熱不時臥上爲喘呼。又云。不得卧。卧則喘者。水氣客之。此舉喘之實也。經曰。秋脉不及。謂肺金則令人喘。呼吸少氣。又曰。勞則喘息汗出。此明喘之虛也。實喘者氣長而有餘。虛喘者息促而不足。實喘者胸滿聲粗。客邪干肺。上焦氣壅。治宜疏利。通用定喘湯。虛喘者呼長吸短。腎不納氣。孤陽無根。治宜攝固。六味丸去丹泄加牛膝。故實喘責在肺。虛喘責在腎。葉氏亦云。喘五來子。補骨脂。胡桃肉。

喘

症之因在肺爲實。在腎爲虛也。

徐靈胎指南批本云。喘在肺爲實。在腎爲虛。若虛實混治。鮮不殘生。

但疑似間。極難辨認。香嚴先生。又以出氣不

爽爲肺病。入氣有音爲腎病。更爲明確矣。

治喘者。凡肺竅壅塞。呼吸不利。氣盛脉實。滑數有力。皆實候也。如肺感風寒致喘。

三拘湯。

蓋肺熱痰火作喘。

麻杏甘膏湯。

肺寒飲邪喘逆。

桂枝加麻杏湯。

感暑喝火盛而

喘。香薷飲。

因濕邪濁逆而喘。

四苓散。加杏撲。

肺氣不降。浮腫發喘。

白虎湯。

桑皮通草葶藶。

肺氣不降。浮腫發喘。

麻黃湯。去桂枝。加桑皮。薏仁。茯苓。

肺脹水停。上氣喘欬。

脉浮。小青龍加石膏湯。水

病喘滿。腎邪犯肺。宜通陽泄濁。

真武湯。合四苓散。去白朮。

痰喘必滌其源。生涎。

溫膽湯。火動。

怒喘兼平其氣。

四七湯。

如吸音頗促。勞動則劇。氣弱脉

微。或浮大而弦。按仍如無。察其外無客邪。內無實熱。皆虛候也。如

肺虛金燥。

生脉散。

胃虛陽升。

人參五味湯。

腎陰虧而精傷。衝任經虛。

加茯苓炙甘草。

腎陰虧而精傷。衝任經虛。

丹田火熾。肺金受燥。大劑六味湯。加麥冬五味。腎陽虛而氣脫。孤陽浮越而赤。

煩躁火不歸元。七味地黃丸。加人參麥冬。腎不納氣。身動卽喘。陰陽樞紐失交。

急須鎮攝。腎氣湯。加洗香從陰引陽。都氣丸。入青鉛。從陽引陰。腎與肺胃俱虛喘。

嗽乏力。人參一錢。胡桃三枚。連皮蜜炙煎服。病後氣喘爲肺虛。生脉散。加阿膠白朮陳皮。病後

氣促嗽痰而浮足冷爲陽虛。八味丸。產後喘爲孤陽絕陰。最危。因營

氣暴竭。衛氣無依。獨聚肺中。故喘急。獨參湯灌之。若血入肺面赤喘欲

死。參蘇餘。如敗血衝心胸滿上氣。逐其敗血喘自定。血竭散。老人久病

喘嗽不得卧。杏仁丸。動卽作喘。多由虛衰。宜嵩崖脾腎丸。陰虛宜滋養。熟地黃肉。

五味阿膠杞子。陽虛宜溫養。參耆歸朮茯苓神。陰陽不交。攝納下元。

胡桃肉蛤蚧尾。海參膠淡菜膠熟地茯苓。牛膝遠志骨脂青鹽石英。以此分症施治。朗若列眉已。

短氣呼吸促而不能續似喘而無痰聲其症有二一屬支飲金匱云

短氣有微飲當從小便去之

苓桂朮甘湯主之

蓋呼氣短

用苓朮

甘以通其陽陽氣通則小便能出矣吸氣短

用腎湯

以化其陰腎

氣化則小便之關門利矣一屬氣虛東垣云肺主諸氣短氣者

五臟之氣皆不足而陽道不行也氣短小便利者

四君湯去茯苓加黃耆

如腹中氣不轉者

倍甘草

肺氣短促

倍人參加白芍

使肝膽之邪不敢犯

之若失血後陰火上乘短氣不足以息或腎虛發熱唾痰者

生脈

散加當歸黃芪生地

少氣少不足以言經云怯然少氣是水道不行形氣消索也又曰

旨而微終日及復言者此奪氣也又曰脾脉搏堅而長其色黃

當病少氣。

獨參湯。生脉散。保元湯。異功散。

逆

氣上逆不得卧。而息有音。經曰。胃者六腑之海。其氣下行。陽明

脉逆不得從其道。故不得卧。而息有音也。起居如故而息有音

者。肺之絡脉逆也。絡脉不得隨經上下。故留經而不行。絡脉之

病人也。微故起居如故而息有音也。其不得卧。卧則喘者。是水

氣之客也。水者循津液而流。腎爲水臟。主津液。主卧與喘也。治

陽明之氣逆。

四磨湯。七氣湯。

治肺絡之氣逆。

杏子湯。小青龍湯。越婢湯。蘇子降氣湯。

治腎

氣之逆。

麻黃附子細辛湯。腎氣湯。靈砂丹。

經曰。寸口脉實者。肺實也。肺必脹。上氣喘逆。咽中塞。如嘔狀。自汗。

皆肺實之候。右寸脉虛者。肺虛也。必咽乾無津。少氣不足以息。

醫通曰肺虛受寒而喘

參蘇湯

寒鬱熱邪而喘中有熱痰遇冷卽

發麻黃定喘湯

遠年欬逆上氣胸滿痞塞聲不出者

人參定喘湯

虛冷上氣

勞乏喘嗽

千金用半夏人參薑桂心甘草煎服

上氣不得卧

生薑人參橘紅紫蘇肥各一錢五味數粒

盛多痰喘不能卧元氣未衰者

干縉湯或合導痰湯

經年喘嗽遇寒更甚者

九寶湯安嗽化痰膏

喘嗽氣從臍下衝上尺脉洪數兼盜汗潮熱屬陰虛

六湯加補骨脂五味送靈砂丹

凡衰病產後喘促者均爲少氣雖素有痰火亦由氣虛

須大劑若生脉散

虛而欲脫元海根搖火從臍下逆衝而上似喘非喘吞若不及急

須峻補鎮攝丹田

大劑六味湯加五味牛膝青鉛元武甲心慈石

喘與脹二症相因皆小便不利故喘則脹脹必喘先喘後脹者治

在肺先脹後喘者治在肺經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由肺氣降下而輸化也若肺受邪則失降下之令以致水溢皮膚而生腫滿此喘爲本腫爲標治宜清金降氣爲主而行水次之如脾主肌肉惡濕克水若脾虛不能制水則水濕妄行外侵肌肉內壅滯上使肺氣不得下降而喘乃生此腫爲本喘爲標當實脾行水爲主而清金次之若肺病而用燥脾之藥則金得燥而愈喘脾病而用清金之藥則脾得寒而益脹矣

喘症脉候

喘脉宜浮遲不宜急疾喘逆上氣不得卧者死上氣面目腫肩息

脉浮大者危。上氣喘息，低昂脉滑，手足溫者生。脉濇，肢寒者死。右寸沈實而緊，爲肺感寒邪，亦有六部俱伏者，宜發散，則喘定。

附方

定喘湯

麻杏桑皮

杏

苓

夏

草

白果

款冬

蘇子

六味丸

見一卷中風

三拗湯

見本卷哮喘

華蓋散

見本卷欬嗽

麻杏石甘湯

麻杏

石

草

芍

薑

草

樸

杏

桂枝加撲杏湯

桂芍

薑

草

樸

杏

芍

薑

草

樸

香薷飲

見一卷中風

通治補攝發散解利痰火飲邪暑喝

暑 喝 利 濕 散 邪 肺 脹 水 停 水 逆 氣 痰 火 痰 怒 喘 肺 虛

白虎湯

見一卷中風

四苓散

見一卷溫

麻黃湯

麻 桂 杏 草

小青龍加石膏湯

小青龍見本卷欬嗽此加 石膏

越婢加半夏湯

見本卷欬嗽

真武湯

朮 附 苓 芍 薑

溫膽湯

見一卷溫

清膈煎

廣皮 錢半 木通 錢半

貝母 浮石 各一錢 膽星 一錢

三因四七湯

苓 夏 蘇 樸 薑 棗

生脉散

參 味 麥 冬

胃虛引火納氣產喘敗血老人衰虛支飲少氣少氣

人參五味湯

參 朮 廣皮各一錢 五味九粒 麥冬 杏仁各八分 薑三片 棗二枚

七味八味丸

見一卷中風 八味丸加 牛膝 車前名腎

都氣丸

六味丸加 五味子

參蘇飲

人參一兩 蘇木二兩

血竭散

血竭 沒藥各一錢 以陳酒 童便各半煎沸調

杏仁丸

杏仁 核桃肉 蜜丸

嵩崖脾腎丸

腎氣丸 加骨脂 益智 砂仁

苓桂朮甘湯

苓 桂 朮 草

保元湯

見一卷火

異功散

見一卷中風

氣逆

見本卷哮喘

四磨湯

參 桂 夏 草 薑

七氣湯

麻 桂 杏 芍 薑 天冬

杏子湯

見本卷失音

蘇子降氣湯

附 辛

麻黃附子細辛湯

附 辛

靈砂丹

糯米 糊 硫黃 二味炒成砂子入水火鼎煨煉爲末

參蘇溫肺湯

參 苓 薤 草 桂 夏 陳 蘇 味

麻黃定喘湯

即前定喘湯

人參定喘湯

人參 麻黃 炙草 阿膠 半夏各一錢

干縉湯

半夏七粒 桑皮各五分 粟壳二分 薑三片

痰喘嗽喘嗽喘

導痰湯

見一卷中風

九寶湯

麻皮

杏

蘇

桂

陳

荷

薑

草

桑皮

安嗽化痰膏

見本卷嗽

喘

趙

衰年喘嗽痰紅舌焦咽燥背寒耳鳴頰赤脉左弦疾右浮洪而尺搏指按脉症係冬陽不潛金爲火燥背覺寒者非真寒也以父子懸壺忽而桂附忽而知藥忽而葶藶逐水忽而款冬泄肺致嗽血益加身動卽喘坐則張口擡肩卧則體側喘劇因側卧則肺系緩而痰益壅也思桂附旣辛熱助火知藥亦苦寒化燥非水焉用葶藶泄熱何藉款冬細察吸氣頗促治宜攝納但熱蒸膩痰氣衝咽痛急則治標理先清降用川百合貝母杏仁麥冬沙參牡蠣阿膠水化燕窩湯煎一啜嗽定而痰紅止去杏仁牡蠣阿膠加生地竹茹丹皮元參羚羊角午服以清上中浮游

之火用熟地五味茯苓神秋石龜板牛膝青鉛晚服以鎮納下焦散越之氣脉症漸平

族某七旬以來冒寒奔馳欬嘔喘急脉弦滑時愛冷氣夫寒痰停腕必嘔宿痰阻氣必欬老人元海根微不任勞動勞則嗽嗽則氣升而喘必靜攝爲宜做溫肺湯用辛溫止嗽以定喘淡乾薑五味乾薑五味攝太陽而定喘古人治嗽喘必二味同用桑皮炙茯苓潞參甜杏仁橘紅製半夏款冬花紫衣胡桃數服喘嘔俱定十服全瘳

李喘由外感者治肺由內傷者治腎以肺主出氣腎主納氣也出氣阻而喘爲肺病吸氣促而喘爲腎病今上氣喘急遇煩勞則發不得臥息必起坐伏案乃定近則行步亦喘是元海不司

收納之權致膠痰易阻升降之隧急急攝固真元熟地炭牛膝
炭茯神五味萸肉補骨脂蓮子俱炒數服頗安

貢

積年痰嗽脉細形衰動則疝氣偏墜病因肝腎久損客冬心
事操勞身動卽喘痰嗽益劇肉銷骨立是五液悉化爲痰偏臥
不舒是陰陽亦乖於用所謂因虛致病積損成癆候也右脉沈
數無力左脉浮數無根良由下元真氣失納以致下引上急吸
入頗促而爲短氣若不納使歸源將下元根蒂都浮喘嗽易由
鎮靜況症本腎虛水泛爲痰必非理嗽滌飲可效奈何膽星竺
黃芥子芩蘗等無理亂投不知顧忌昨議服攝固之品痰氣較
平而脉象未改是損極難復維繫不固有暴脫之憂今酌定晨

服都氣丸加參朮遠志故紙晚服腎氣湯去萸泄丹皮桂附加
茯神五味杞子沙苑子蓮子棗仁冀其氣平而痰嗽自定

岳

少年體質陰虧兼傷煩勞脉虛促熱渴頰紅痰血喘急速進

糜粥以扶胃食頃喘定症宜清調肺衛潤補心營甜杏仁阿膠

水

沙參川貝茯神棗仁麥冬石斛萸仁黃耆

蜜炒

三服脉勻症退

繼進燕窩湯嗽喘悉止治以培土生金潞參山藥炙草玉竹五
味茯神杏仁蓮子紅棗食進丸用加減都氣而安

服姪初春脉左弦長直上直下喘嗽吐紅夢泄冬陽不潛足少陰
經與衝脉同絡陰虛火炎氣衝爲喘絡傷爲血乃元海根蒂失
固醫者不知納氣歸原泛用歸耆朮草症勢加劇寒熱欬逆血

升氣促衝脉動諸脉皆動總由肺腎失交急急收納務令陽潛

陰攝阿膠

水化牡蠣醋

龜板

酥炙龍骨

五味山藥高麗參茯苓

仁坎蒸

焙研

數服嗽平血止去坎炁加青鉛衝氣亦定

倪

年近七旬木火體質秋嗽上氣喘急痰深而黃甚則不得卧

息須防暈厥治先平氣定喘蜜桑皮蘇子杏仁川貝母茯苓

蕤百合二服後加白芍麥冬述舊服兩饑膏痰多食減今訂膠

方減用熟地

只用四兩砂仁未拌蒸晒乾

高麗參

一茯苓三兩

甜杏仁

炒研五兩

子入棗仁

一兩枇杷膏四兩燕窩

兩半橘紅

八錢貝母

兩山藥

三兩阿膠

各味熬汁阿膠收開水化服

某

腎不納氣則喘息上奔脾不輸精則痰氣凝滯今痰哮喘不利

呼吸頗促病本在脾腎而肺胃其標也由冬延春脉候若斷若
續忽神煩不寐語譫舌灰虛中挾溫治先清降杏仁栝蒌象貝
茯神潞參菖蒲汁冲服一劑嗽定得寐舌胎稍退進梗米粥喘
息仍鼈脉見虛促急用納氣歸原萸根蒂漸固高麗參五味牛
膝炭遠志茯神杞子蓮子牡蠣粉六服間用七味地黃丸而安

痰飲論治

痰飲皆津液所化。痰濁飲清。痰因於火。飲因於濕也。痰生於脾。濕勝則精微不運。從而凝結。或壅肺竅。或流經隧。飲聚於胃。寒留則水液不行。從而泛濫。或停心下。或漬腸間。此由脾胃水濕陰凝。必陽氣健運。則濁陰下降。如烈日當空。則烟雲消散。宜以理脾逐濕爲治者也。若夫腎陽虛。火不制水。水泛爲痰。爲飲。逆上攻。故清而澈。治宜通陽洩濕。忌用膩品助陰。如四物六味等湯。腎陰虛。火必燦。金火結爲痰。爲痰。火上升。故稠而濁。治宜滋陰清潤。忌用溫品助燥。如二陳六君等湯。治法所必辨也。夫清液爲飲。稠濁爲痰。飲惟停蓄腸胃。而痰則隨氣升降。遍身皆到。羅氏云。天下無逆流之水。因乎風在肺也。人身無倒上之痰。因乎氣也。

則欬在胃則嘔。在心則悸。在頭則眩。在背則冷。在胸則痞。在脇則脹。在腸則瀉。在經絡則腫。在四肢則痺。變幻百端。昔人所謂怪症。多屬痰。暴病多屬火也。然又謂見痰休治痰者。以治必探本。恐端事消滌重虛。其胃氣反滋膨脹耳。丹溪云。胃氣亦賴痰以養。攻滌則胃虛而痰愈劇。亦有但治其痰者。如風痰散之。防風丸。加南星。生薑。寒痰溫之。理中丸。暑痰豁之。消暑濕痰燥之。二朮二陳。燥痰潤之。潤肺飲。加火痰。清之。清氣化痰。食痰消之。保和丸。酒痰化之。瑞竹堂。鬱痰解之。三因湯。加鬱金。氣痰利之。咯不出。嚥不下。如敗絮。驚痰泄之。控涎丹。加菖蒲。香附。如海石。海粉。芒硝。瓦楞。三仙丸。驚痰泄之。辰砂。老痰軟之。子之類。或青礞石丸。頑痰吐之。三聖散。青綠丸。在上者涌之。桔梗蘆散。在下者導之。導痰湯。甚者在脾者黃滑而易出。或稀涎散。

二陳湯。在肺者白如米粒。澀而難出。利金湯去薑枳。加玉竹、蜜、水沖。在肝者青而

多泡。川芎丸加星枳。在心者赤結如膠粘。牛黃。在腎者黑而多鹹。

桂苓丸加留脇下者。天陰隱痛。二陳湯加滯經絡者。筋骨牽痛。刺

竹瀝薑汁行之。或入四肢者。手足疲軟。導痰湯加桂枝薑黃竹瀝。隱皮裏膜外

者。腫而麻木。二陳湯加白芥子薑汁竹瀝。或成塊流走不定。薑汁竹瀝。或成核

結聚項間。痰核丸。膈上停痰痞悶。小陷胸湯加茯苓。腕中伏痰臂

痛。指迷茯苓丸。痰滯氣逆嗽多。六安煎。寒涎沃膈不眠。溫膽湯多驚。痰挾

死血攻注。控涎丹加韭汁桃仁。痰結窠囊嘔吐。薑汁竹瀝。中風痰

迷心竅。屬寒者。瀝痰湯下牛黃。癰癩痰悶抽掣。牛黃。此皆治其標

也。如求其本。脾虛濕痰。宜健脾以運之。四君湯參朮健脾丸。肺熱火痰。宜清

肺以潤之。

清肺飲。四陰煎。

脾肺氣虛不運生痰者。

六君湯。加木香。

肺胃氣虛不化

生痰者。

六君湯。加桔梗。

脾氣滯者。

異功散。加砂仁。

中氣弱者。

補中益氣湯。

脾胃虛挾濕

者。

麻濡緩痰清稀。六君湯。加茯苓。半夏。

肝腎虛痰中見血者。

六味湯。加烏鰂魚骨。參三七。

腎陰虧火動痰升者。

五味天冬丸。百花香。

相火燥痰津涸者。

滋陰清化丸。

腎陽衰

水泛爲痰者。

薛氏八味丸。如不應。真武湯。

勞損欬白痰。

如雞蛋白。清補肺。俗名白血者。湯。

此乃

治痰之本矣。且痰飲同稱而殊治。豈可混乎。試由痰論飲。內經有

飲無痰。其論飲病。皆由濕淫土鬱。至金匱乃立痰飲。懸飲。溢飲。支

飲。留飲。伏飲。等名。皆水停爲患。如其人昔肥今瘦。水走腸間。漉漉

有聲。爲痰飲。必目眩短氣。

飲在陽則呼氣短。苓桂朮甘湯。飲在陰。則吸氣短。腎氣丸。金匱云。短氣有微

飲。當從小便利之。苓桂丸。甘湯。腎氣丸主之。

飲後水流脇下。欬唾引痛。爲懸飲。脉必沈

○弦十棗

飲水流於四肢當汗不汗身體疼重爲溢飲小青龍湯欬逆倚

息短氣不得卧。形如腫。爲支飲。葶藶瀉肺湯。水停心下。背寒冷如

葶藶瀉肺湯。
或用五苓散。

水停心下背寒冷如

掌大短氣肢節痛脇痛引缺盆脉沈爲留飢導痰膈滿喘欬嘔吐

得痰
膈滿喘欬嘔吐

寒熱腰背痛身振嘔爲伏飲倍朮加茯苓半夏痰飲不渴小半夏湯支飲眩冒

倍朮、太加、茯苓、半夏

痰飲不渴
小半夏湯
支飲眩冒

澤瀉湯心下痞膈間有水悸眩小半夏加茯苓湯茶飲過多成癖及飲酒成

小半夏加
茯苓湯。

茶飲過多成癖及飲酒成

飲癖嘔酸餽雜心懸如飢三聖丸別有非痰非飲吐清涎

沫者脾虛不能收攝也。六君湯加益胃丸。渴欲飲水。水入卽吐者。名水逆。

六君湯加
益智甚。

渴欲飲水。水入卽吐者。名水逆。

五苓散。○大○法○外○飲○治○脾○內○飲○治○腎。○治○脾○苓○桂○朮○甘○。○氣○壅○者○開○之○。○小○青○

子

道法可與身力

去麻辛。倉欬者平之。鮮枇杷葉杏仁茯苓前胡蘇子桑皮。濁逆者溫之。真武湯。陽微者和

1

[illegible]

之外臺。濕滯者五苓散。留伏者桂苓湯。逐之支結入絡者。通之。

1000

21

11

茯苓桂枝湯加參草。飲症通治。五飲仲景云治痰飲當以溫藥和之。此可謂一言提要者矣。

仲景曰飲而兼欬者但治飲不必治欬。

繆仲淳曰生痰之源不一治各不同。由陰虛火炎上迫乎肺。凝結爲痰。是謂陰虛痰火。痰在肺而本於腎。治宜降氣清熱。益陰滋水。忌辛溫燥由脾胃寒濕生痰。或飲啖過度致脾氣壅滯爲痰。此病熱補氣藥。忌辛溫燥在脾胃無關肺腎。治宜燥脾利氣。忌滯膩寒由風寒鬱熱生痰。病亦在肺。治宜豁痰清利。中佐以辛溫。苦濕潤藥以散外寒。忌溫補藥無格拒之患。夫痰質稠粘。飲惟清水。或青綠苦酸。多因過飲茶酒。或情抱抑鬱。中寒濕阻。治宜燥濕利水。溫通陽氣以行之。二陳五苓

真武之屬。

張路玉曰。痰飲變生諸症。必以治飲爲先。諸症自愈。如頭風。肩稜。骨痛。屢用風藥不效。投以痰劑。收功。患眼赤羞明而痛。與涼藥弗瘳。界以痰劑。獲效。凡此之類。不一而足。在審症圖機耳。如太陰痰喘治風亦此意也。

痰飲脈候

脈沈者留飲。雙弦者寒也。偏弦者飲也。肺飲不弦。但苦喘滿短氣。支飲亦喘不得卧。短氣。其脈平。沈而弦者懸飲。肝脈軟而散。色澤者溢飲。提綱曰。痰脈弦滑。三四日飲脈皆沈細弦滑。病人一臂不遂。時復移在一臂。其脈沈細。非風也。必有飲在上。焦痰得瀉。脈必費調理。以痰膠固。

脉道阻塞也。左右關脉實大而浮。膈上有稠痰也。宜吐之。病人百藥不效。關上脉伏而滑者。痰也。眼胞上下如黑煤者。亦痰也。回春曰。眼黑而行步呻吟。舉動艱難。入骨痰也。非草薢苦參不除。其偏體骨節痛。審氣血加化痰藥入門。曰痰厥者。因內虛受寒。痰氣阻塞。手足厥冷。麻痺暈倒。脉沈細也。

用藥

濕痰。主半夏佐風痰。主南星佐燥痰。主貝母佐火痰。主竹瀝佐寒痰。伏苓。薤白。佐食痰。用神麴。山酒痰。用花粉。白朮。神驚痰。用天竺黃。牛黃。膽星。半。夏。蘇。子。食。痰。查。麥。萊。酒。痰。麴。或。四。苓。散。神。驚。痰。用。天。竺。黃。牛。黃。膽。星。老。痰。枯。蕒。川。貝。氣。痰。殼。鬱。金。沽。膠。痰。仁。荆。瀝。杏。痰。核。桔。枳。星。夏。枯。草。痰。結。海。藻。蘆。花。痰。在。四。肢。非。瀝。不。達。痰。在。脇。下。非。白。芥。不。除。痰。

在皮裏膜外非

薑汁竹瀝白芥子

不到痰在經絡非

薑汁竹瀝

不行痰中帶血

宜

悲汁阿膠痰迷癲癇宜控涎

丹

氣實痰盛宜

三子養親湯

實熱老痰

礞石滾痰丸

風寒痰湧及小兒驚風

青州白朮

痰血塞心竅癲狂

白金

實痰積飲宜

小胃

降痰氣宜

蘇子降氣湯潤下

海粉熱痰能清濕痰能燥堅痰能軟頑

痰能消

石膏墮痰火極效

黃芩青黛

治熱痰假其下行也

枳實治痰有推牆

倒壁之功

五倍子

治老痰

元明粉

治熱痰以其能降火軟堅也

硝石大

能降火消痰結研細和白糖舌飴服效

效

附方

風痰

防風丸

防風川芎荆芥湯下

天麻

甘草

蜜丸

硃砂爲衣

痰寒痰寒痰暑痰濕痰濕痰燥痰火痰食痰食痰酒

青州白子丸

生白附子

生南星

生半夏

川烏

糯米

理中化痰丸

參朮

薑草

加苓夏

消暑丸

見一卷暑

二朮二陳湯

二朮

苓夏

陳草

白朮丸

星夏

朮

爲丸薑湯下

潤肺飲

二母

陳

苓

麥

桔

花粉

生地

草

薑

清氣化痰丸

杏糊太

蕪

枳

夏

星

陳

苓

苓

薑汁

保和丸

查肉二兩

半夏

神翅

橘紅

麥芽

五錢

水丸

栝蔞丸

蔞仁

半夏

山查

神翅

糊丸

瑞竹堂化痰丸

星

夏

青

陳

杏

葛

蘇

子

薑汁

痰

七氣湯

見本卷欬嗽

氣

三仙丸

南星麴 半夏麴各四兩 香附二兩 糊丸

驚

控涎丹

甘遂 大戟 白芥子 糊丸薑湯下 一名妙應丸

老

青礞石丸

礞石打碎用焰硝二兩同入瓦罐內泥封煅石色如金爲度水丸 一名奪命丹

痰

三聖散

半夏 陳皮 黃連 麴糊丸 薑湯下

頑

青綠丸

石青一兩 石綠五錢 研飛麴糊丸萊豆大每服十丸吐痰不損人

吐

參蘆散

參蘆二錢 或加竹瀝和服取吐虛人最宜

痰

桔梗蘆散

桔梗蘆一二錢 研服探吐

滿

稀涎散

見一卷中風

下

導痰湯

見一卷中風

伏痰痰嗽虛痰迷痰癰痰熱痰健脾補脾潤燥

指迷茯苓丸

半夏炮二兩 硝二錢半

茯苓一兩 薑汁糊丸

枳壳五錢 薑湯下

風化

六安煎

見本卷欬嗽

溫膽湯

見一卷溫

滌痰湯

見一卷中風

牛黃丸

膽星 礞石

全蠍 防風

蟬蛻各二錢半 天麻各錢半

麝香五分

白附子 煑棗肉

水銀 爲丸

二丹丸

丹參 熟地

各一兩 丹砂

天冬各兩半 人參 菖蒲

麥冬 茯神

甘草 遠志各五錢 蜜丸

四君六君湯

見一卷中風

參朮健脾丸

參 苓 歸 芍

朮 草 薑 棗

陳名異功散

此再加

清肺飲

見本卷欬嗽

滋陰清化丸
補肺
補中益氣湯
六味丸
五味天冬丸
百花膏
真武湯
補肺湯
苓桂朮甘湯
腎氣丸

四陰煎

生地

麥冬

白芍

百合

沙參

貝母

阿膠

各二錢

茯苓

花粉

各錢半

生甘草

五錢

補中益氣湯

見一卷中風

六味丸八味丸

見一卷中風

薛氏八味丸以茯苓爲君

五味天冬丸

天冬

五味

搗丸

百花膏

百合

款冬

蜜丸

加紫苑

百部

烏梅

名

滋陰清化丸

二冬

二地

二母

苓

味

草

花粉

真武湯

朮

附

苓

芍

薑

補肺湯

參

耆

五味

紫苑

苓桂朮甘湯

苓

桂

朮

草

腎氣丸

卽八味丸加

牛膝

車前

懸飲

十棗湯

芫花

甘遂

大戟

大棗

溢飲

小青龍湯

見本卷欬嗽

支飲

葶藶瀉肺湯

葶藶

大棗

泄濕

五苓散

見一卷溫

伏飲

倍朮丸

白朮

桂心

乾薑

蜜丸

痰飲

小半夏湯

半夏

生薑

支飲

澤瀉湯

澤瀉

白朮

悸眩

小半夏加茯苓湯

夏

苓

薑

飲癖

薑桂丸

南星

半夏

肉桂

飲癖

三聖丸

即前三聖散

嘔酸

蒼朮丸

蒼朮 藟爲丸

外臺茯苓飲

見一卷中風

桂苓湯

茯苓四錢

桂枝

白朮各三錢

甘草一錢

茯苓桂枝湯

苓

桂

芍

草

薑 棗

五飲湯

參朮

橘

枳

夏

樸

桂

芍

澤

草

三子養親湯

蘇子

白芥子

蘿蔔子

白金丸

白礬三兩

鬱金七兩

薄荷糊丸

小胃丹

芫花

甘遂

大戟

大黃

黃蘗

以白朮膏丸

蘇子降氣湯

見本卷失音

潤下丸

半夏二兩

南星

炙草

黃連

黃芩各一兩

橘紅半觔鹽水製

蒸餅爲丸

痰熱

降痰

水逐

血痰

逆痰

治通

絡通

飲留

陽和

酸嘔

痰飲

朱 氣逆濁飲上升甚則中夜起坐醫用二陳兼旋覆代赭湯不應診脉乃陽微濁逆用外臺茯苓飲加乾薑沈香汁愈

姪 脉沈弦爲停飲由脾陽不運輸水濕留胃故食後清稀宿水傾吐而出按仲景論飲邪當以溫藥和之金匱治痰飲胸脇支滿苓桂朮甘湯主之今倣其法而更其製以茯苓泄水桂枝通陽白朮燥濕甘草和中加砂仁半夏枳殼蘇子運脾以降濁研末服薑湯下積飲遂除

賁 飲症吐青綠苦沫乃膽氣所溢用溫膽湯加吳萸乾薑蒼朮逐濕滌飲吐止嗣用蒼半苓陳散加益智仁焦朮粳米共爲末

薑湯調服溫理脾陽而安

丁 積年痰飲脉虛右尺大宿病因勞力中虛而發用六君子湯加薏苡煨薑椒目服效

賁 痰飲久嗽清晨濁沫上干必傾欬吐出膈上乃寬此由宿食化痰起胃虛隨氣上升故也然細參症脉必腎中陽虛仲景所謂腎虛水泛爲痰以腎氣丸補而逐之向服崔氏八味丸雖未速效猶是對症主治惟客歲自用倒倉法洗滌停痰宿飲乃爲間道出奇王節齋明醫雜著云腸胃爲倉倉中有陳腐敗穀須倒出之腸胃中有痰血積滯須蕩滌之若病不屬腸胃不可輕用据此宜乎用之無益

王

脉沈弦始則頭痛悶嘔舌白惡食繼則氣阻脘痛攻注腰膈
隨觸輒嘔背寒心悸下利溺少孔晝夜不能著枕固是濕阻氣
痺但醫者混治謬託消和不知飲邪入絡上千爲頭痛下滲爲
瀉利漬入太陽爲背寒停於心下爲悸動金匱云口乾不欲飲
水者爲飲邪未去故也今飲入支絡不用辛溫通逐痛嘔焉止
倣小半夏湯加茯苓川椒目枳壳吳萸桂枝沈香磨汁日再服痛
緩得卧糜粥得下背寒心悸俱却惟臍腹痞結時嘔時痛乃支
絡濁滯未淨改用通絡導滯歸鬚小茴香生查肉橘核青鹽并炒山
梔薑汁炒茯苓枳壳降香末痛嘔悉平改用和中運濕製半夏砂
仁茯苓炙草穀芽大豆黃卷薏苡陳皮全膠

血症總論

稟水穀之精華出於中焦以調和五臟。瀝陳六腑者血也。生化於脾。宣布於肺。統於心。藏於肝。化精於腎。灌輸百脉。其清而純者爲守臟之血。清中之濁者爲腑絡之血。清中之清者爲營經之血。皆有氣以護之。膜以隔之。絡以通之。原不至上溢而下脫也。一有偏傷。或怒勞迫而上升。或陰陽虛而失守。則爲吐。爲衄。爲嘔。爲咯。爲欬。血唾血經。所謂陽絡傷則血外溢也。或陰虛陽搏。或陽衰陰脫。或濕熱下陷。則爲崩中。爲漏下。爲溺血。爲便血。爲腸風血痢。經所謂陰絡傷則血內溢也。更有瘀血在裏。漱水不欲嚥。小腹滿身黃便黑。在上則喜忘。在下則如狂。傷寒論所謂三焦畜血證也。夫血

行清道出於鼻。行濁道出於口。吐血出於胃。衄血欬血出於肺。嘔血出於肝。咯血出於心。痰涎之血出於脾。唾血出於腎。鼻血爲衄。口鼻俱出爲腦。耳血爲耳。齒血爲牙。舌血爲舌。九竅俱出爲大衄。胸前一孔出血爲心漏。臍間出爲胃血。膚血爲紅汗。爲肌。上出如泉湧爲血溢。衝任不攝爲崩漏。由精竅出。溺孔痛爲血淋。由膀胱出不痛爲溺血。色稠紅爲結陰。便血清而色鮮四射如濺爲腸風。濁而色暗爲臟毒。膿血雜痢爲腸澼。射血如線爲痔血。凡血色鮮濃者屬火。紫黑者火極。晦淡無光者陽衰。不能攝陰。粉紅者肺血。赤如硃漆光者心胞血。鮮稠濃紫者脾肝血。痰唾雜紅點紅絲者腎血。血雖少。吐多成碗成盆者胃血。胃多氣多。治最難。

欲知何臟之血吐在水碗中。浮者肺血。沈者肝血。半沈半浮者。心血。各隨所見。以羊肺、羊肝、羊心。煮熟。蘸白芨末。日食之。吐血服藥而血不止。乃肺上有竅也。用白芨末。以猪肺煮熟。蘸食之。日服三四次。使竅爲芨末填滿。其血自止。方名獨勝散。下注之血。血淋多。因房勞腎虛。溺血多。因氣化移熱。便後血爲遠。血由腸胃來。便前血爲近。血由肛門出。濺射者風淫。點滴者濕著。血下行爲順。其治易。上行爲逆。其治難。得寒則凝。得溫則行。見黑則止。常隨氣行。氣和則血循經。氣逆則血越絡。上溢之血。火乘之。實氣逆之也。故治血宜調氣。不宜降火。猛進苦寒。以寒能凝。瀉且易傷脾。若脾傷。則愈不能統攝諸血。以歸經矣。入手須辨陰陽。陽症吐衄。血色鮮紅。陰症。血色紫暗。如猪肝。陽症脈洪滑。口渴面紅。喘煩溺。

赤火載血升。宜清降涼劑。陰症脈虛數。口乾頰赤。煩躁足冷。乃真陽失守。無根之火上炎。宜引火歸元。切忌寒涼降火。治血前後調理。須按三經用藥。宜歸脾湯。蓋心主血。肝藏血。脾統血。此方乃三經主劑也。遠志補肝以生心火。茯神龍眼補心以生脾土。參耆補脾以固肺金。香木香先入脾。總欲使血歸於脾。故名歸脾湯。有鬱怒傷肝。思慮傷脾者。尤宜如火旺加黑梔。火衰加桂。再以入味地黃丸。培先天根本。治得其要矣。

凡血症見咳嗽喘滿。及膈左右脹痛者。病在肺也。宜清降。不宜升浮。如膈中一絲牽痛。或懊惱錯雜者。病在心胞也。宜養營。不宜耗散。如腹膨不飢。食不知味。吐涎沫者。病在脾也。宜溫中。不宜酸寒。

如脇肋牽痛躁擾不安。往來寒熱者。病在肝也。宜甘緩。宜疏利。不宜秘滯。如氣短似喘。咽痛聲啞。骨蒸盜汗者。病在腎也。宜滋陰壯水。不宜香燥。如嘔吐煩渴。大熱不得臥者。病在胃也。補瀉當察兼症。勿謂陽明盡可攻也。至用藥有君臣。或需用兼用。當知其類。如治血虛。甘溫爲主。宜人乳鹿膠阿膠熟地。杞子炙草龍眼紅棗。甘酸爲佐。山藥茯苓薏仁山黃五味牛膝白芍。又如天真丸海參膠烏骨雞丸河車膏燕窩飲。皆血肉有情補法。血虛熱當涼潤。生地麥冬小麥沙參玉竹。血虛寒宜辛熱。桂心炮薑杜仲沈香。氣逆血升。藕汁茅根童便。血虛寒必火不歸元者用之。宜苦降。山梔丹皮赤芍枳殼。血熱妄行宜鹹寒苦寒。犀角元參三母青黛。知母。血虛而滯宜辛甘以和之。桂枝當歸橘皮丹參。澤蘭益母側柏葉。血滯而痛。宜辛溫以行之。韭汁當歸紫延胡鬱金。便香附五靈脂降香末。血陷下宜辛苦香以舉。

之。白芷川芎升麻

血滑脫宜酸澀以收之。

花蕊石續斷白芨蓮房地榆百草霜烏梅蒲黃灰棕灰髮灰。

氣虛血脫宜溫補以攝之。

人參黃耆白朮炙草。

血枯經閉宜鹹溫以通之。烏

魚骨蘆茹牛膝肉苁蓉。

血瘀而結宜苦瀉之酸泄之。

大黃桃仁三稜蘇木紅麴紅花茜根山查琥珀。

血積而堅宜鹹寒以軟之。

元明粉牡蠣青鹽旋覆花秋石鯁鯁。

血燥宜甘潤以滑

之。乳酪蜂蜜黃明膠核桃肉。

其風淫襲血散之。

防風炒荆芥溫邪。

柏子仁雞蛋黃麻仁芝麻。

暑喝嗽血涼之。

杏仁扁豆沙參竹葉麥冬薄荷百合。

熱迫血瀉之。

石膏花柳連翹犀角龍膽草。

此用藥類例也。

凡口鼻出血皆陽盛陰衰有升無降血隨氣上越出上竅法當補

陰抑陽氣降血自歸經矣然有陽氣本虛復爲寒涼所傷致脉沈

而不浮尺小於寸右弱於左色天而血黥宜

生脉散加肉桂熟附炙草。繼以中

湯。八。間。服。若。果。受。寒。氣。食。冷。物。血。得。寒。則。凝。不。歸。經。絡。色。必。黑。黯。味。丸。必。沈。遲。身。必。清。涼。若。此。者。不。用。薑。桂。而。用。涼。血。之。劑。殆。矣。

吐血論治

嗽血 咯血 唾血 嘔血附

吐血陽亢陰虛症也。症有三因。外因係火風暑燥之邪。內因係肝腎心脾之損。不內外因係墜跌努力烟酒之傷。外因者火灼風溫之嗆血。暑療燥欬之傷血。邪在肺衛。心營理肺。衛宜甘涼肅降。如參麥冬貝母花柳玉竹石斛。治心營宜輕清滋養。如生地元參丹參。連翹竹葉茯神。以此二法爲宗。隨症加減。火灼則加入苦寒。如山梔黃芩。風溫則參以甘涼。如蔗汁蘆根。暑療入營則兼清潤。如杏仁銀花。燥欬在氣則佐純。如羊角桑葉。鮮地黃犀角。燥欬在氣則佐純。如天冬梨。別有內熱外寒吐血者。宜麻黃參。此治客感吐血大。甘。爽。阿。膠。

暑也。內因者怒動肝火。宜苦辛降氣。如蘇子、鬱金、降香、丹鬱損肝

陽。宜六鬱損肝陰。宜甘酸熄風。如阿膠、雞蛋黃、思傷心脾。宜甘溫

益營。如保元湯、房勞傷腎。其陰虛失納者。宜壯水鎮陽。青鉛六味

牛膝。陽虛不攝者。宜導火歸窟。肉桂七味奪精亡血者。急固真元。

大填精血。如人參、海參、熟地、河車此治內損吐血大畧也。不內外

因者墜跌血瘀上泛。先須導下。復元活血湯代抵當再用通補元

四物湯。或當歸鬱金牛膝白芍三七若努力傷血。調補忌用凝滯。宜和營通絡。理虛

當歸建中湯。旋覆花湯。若烟酒傷肺。烟辛泄肺。酒熱戕改定

或六味飲。加牛膝杜仲。若烟酒傷肺。胃皆能助火動血。紫苑

茸湯去尤加芍飲多傷胃失血。六君湯加此治不內外因大畧也。川指南

序 凡血來如潮湧喘息未定。飲還元吐血乍止。用燕窩冰糖各

四錢煎服七日

可不復發。血出汪洋。不卽凝者。煩勞動胃火也。犀角地黃湯加桃仁藕汁童便。

出散漫不聚者。煩勞傷肺氣也。補中益氣湯去柴胡。加麥味茯苓山藥。脇痛吐血者。

肝氣逆也。化肝煎。神勞吐血者。心氣損也。天冬。龍燄升則吐衄。驟加。

宜潛陰火。海參淡菜龜甲心茯苓熟地五味子熬膏秋石湯下。元海空則行動喘促。速固根。

帶。人參核桃坎無杞子牛膝。胃納少則中宮乏鎮。須扶胃陽。切勿。

清嗽。人參建中湯。胃絡虛則厥陽易犯。急調胃陰。可免升逆。生脈散。

白扁豆沙參玉竹石斛茯苓神或。仁齋所謂血症經久。多以胃藥收。

功也。若夫肺痿吐血。人參固本膏。勞怯吐血。四陰煎。血虛發熱。當歸補血湯。

虛發瘰。十全大補湯。脾肺氣虛。養營湯。絡脉不和。當歸髮雞血藤膏。牛血。

色鮮紫。吐後神疲。懶言以補氣藥攝之。獨參湯。血色晦淡。息微脉緩。

爲血寒不得歸經以辛甘溫攝之

大劑理中湯

尺脉虛弦

大劑生料六味丸加肉桂

其勞心動火口津乾能食脉洪數

元霜紫雪膏

數吐血兩口不渴不發

熱數月又發胸中刺痛

小烏沈湯送黑神散

吐後胸滿痛脉洪大有力

用當歸丹

皮酒大黃元明粉桃仁延胡

從大便導之不可驟用止瀉不可尚行膩補不可

輕用苦寒不可妄事攻伐審症切脉以調之勿拘成法可耳

繆仲淳曰吐血有三訣宜行血不宜止血血不循經絡者氣逆上

壅也行血令循經絡不止自止止之則血凝血凝必發熱胸脇痛

病日痼矣宜補肝不宜伐肝經云五臟者藏精氣而不瀉者也肝

主藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平而血有所歸伐肝則

肝虛不能藏血愈不止矣宜降氣不宜降火氣有餘便是火氣降

則火降。火降則氣不上升。血隨氣行。無溢。出上竅之患。且降火必寒涼之劑。反傷胃氣。胃氣傷則脾不能統血。血愈不能歸經矣。

欬因欬見血。係火乘肺金。乾欬絡傷而血滲出也。治同嗽血。

嗽因嗽時氣急喘促。痰雜血絲。血點亦火傷血膜而血隨痰出也。

諸家以欬嗽血。山於肺。景岳謂欬嗽咯唾諸血。皆源於腎。以腎脉貫膈入肺。循喉。肺腎相聯。因腎水虧則火炎燥。金肺燥絡損。

液涸成痰。病之標在肺。其本固由腎也。治主壯水清金。宜六味

冬五兼潤肺止嗽。宜阿膠貝母血止後胃虛食少。氣息不續。勞

散去半夏加紫苑其先嗽痰後見紅者。爲積痰生熱。宜降痰火。

其及瘦玉存等以括葉貝母山梔橘。先見紅後嗽痰者。爲陰虛火動。宜滋化源。

六味阿膠飲。陰虛久嗽。痰中血。星如珠。生料六味丸。加茜。久嗽。痰帶根。烏。鰓。骨。和。童。便。

血絲如縷。

六味丸。加。蛤。粉。阿。膠。童。便。臨。臥。服。

嗽血潮熱。

八。珍。湯。加。貝。母。五。味。

嗽血成勞。肌

削神疲。五心煩熱。咽乾。頰赤。盜汗。減食。

人。參。飲。子。或。四。君。湯。加。黃。耆。龍。甲。麥。冬。五。味。

天士先生曰。凡欬血之脉。右堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。

宜薄味調養胃陰。

如。生。扁。豆。茯。苓。北。沙。參。薏。苡。仁。石。斛。等。

左堅者。乃肝腎陰傷所

致。宜。地。黃。阿。膠。杞。子。五。味。等。

脉弦脇痛者。

宜。蘇。子。桃。仁。降。香。鬱。金。等。

成盆盈枕者。

葛。可。久。花。蕊。石。

散。仲。景。大。黃。黃。連。瀉。心。湯。

一症而縷析條分。從此再加分別。則臨症有據矣。

石頑老人曰。欬血之脉。微弱平緩易治。弦數急實。氣促聲嘶咽

痛者不治。

咯

不嗽而喉中咯出小血塊。或血點是也。症最重。由房勞傷腎火

載血升咯血成塊。不比欬嗽痰中帶出也。亦有兼痰咯出者。係

腎虛痰泛初起用

白芍丹皮茯苓藜仁山藥山梔麥冬童便

以清手足少陽厥陰諸

經遊火。若膈熱頰紅。咽喉不清。

清咽太

後必滋補腎陰以安其

血。六味飲加牛

膝麥冬五味。景岳以爲心不主血。

宜養

嘉言以爲陰氣上奔。

宜四君湯黃耆

山藥亦可加入。脾中陽氣旺而龍雷之火潛伏也。

血唾

鮮血隨唾而出。或涎中有血。纏如絲。散如點者。多源於腎。右尺

虛者。

都氣丸

右尺大者。

清唾

其有兼心胃者。由脾虛不能攝也。

兼心則

加桂心

兼胃則

七珍

食少痰清者。

異功散

加批

血者。

黃耆

肺痿唾血者。

人參平

血嘔

血從脘脇嘔出。係木火乘胃所致。良由暴怒火逆。胸滿脇痛。傷

肝動血

柴胡疏肝散

或負重努力傷胃動血

是齋白朮散

或飲酒火熱上

升嘔血

葛黃散

或房勞竭力傷腎嘔血

症必面紅足冷煩躁口渴生脉散合加減八味丸

或虛勞火升嘔血不止

花蕊石散

血症脉候

失血脉數大爲陽盛。濇細爲血少。細數爲陰火鬱於血中。芤爲失血。弦緊脇痛爲瘀結。寸大尺微爲肺中伏火。尺盛而寸虛爲腎虛。陰火尺滑而疾爲血虛有熱。右脉虛大爲脾胃火。左脉數盛爲肝膽火。失血脉微弱細小和緩者易治。洪數實大弦急或雖小按之如循芤及芤血身熱脉至而搏嘔血胸滿引背脉小而疾皆不治。欬出白血似肉似肺淺紅色者死。喘欬失血氣逆脉見弦緊細數。

有熱不得卧者死。吐衄血脈細弱者生。實大者死。

附方

歸脾湯 見本卷勞瘵

生豚散 參 麥 五味

理中湯 參 朮 薑 草

六味七味八味丸 俱見一卷中風 六味丸加五味名都氣丸

麻黃人參芍藥湯 麻 桂 參 耆 歸 芍 麥 味 草

保元湯 見一卷火

青鉛六味飲 六味湯加青鉛

復元活血湯 柴胡 當歸 花粉 甲片 紅花 桃仁 大黃 甘草

心脾益肺虛寒補腎熱寒補氣壯水導下

攻代抵當湯大黃 歸尾 生地 甲片 元明粉 桂

通元戎四物湯地 芍 歸 芎 加桃仁 紅花

和當歸建中湯見一卷傷風 加人參名人參建中湯

營旋覆花湯見本卷痰飲

煙紫菀茸湯紫菀茸 白朮 澤泄 丹皮 麥冬 犀角

胃犀角地黄湯見一卷溫

火補中益氣湯見一卷中風

傷肝化肝煎青 陳 芍 貝各二錢 丹 梔 澤各錢半

逆心天冬湯參 耆 歸 芍 地 草 二冬 遠志 阿膠

氣胃歸耆異功散參 苓 朮 草 陳 歸 耆

胃陰肺痿勞怯血虛血虛氣虛津潤

金匱麥門冬湯

見一卷燥

人參固本丸

見一卷中風

四陰煎

見本卷痰飲

當歸補血湯

者一兩

歸二錢

十全大補湯

見一卷中風

養營湯

見本卷勞瘵

元霜紫雪膏

雪梨六十枚
冬汁五杯

藕汁十杯
萊菔汁五杯

生地汁十杯
茅根汁十杯

合麥

煎去渣入煉蜜一觔

再蒸服

飴糖八兩

柿霜八兩

小烏沈湯

童便製香附三錢
沈香五分磨汁

烏藥錢半
加入鹽一字

炙草一錢

黑神散

熟地歸尾
黑豆炒去皮

赤芍
童便

蒲黃
酒各半煎

桂心
炮薑

甘草

虛勞乾咳降痰陰虛潮熱嗽勞止血逐瘀咽火補心

劫勞散

見本卷咳嗽

瓊玉膏

見一卷燥

天門冬丸

天冬二兩
蜜丸

阿膠
茯苓

杏仁

貝母各五錢

六味阿膠飲

六味丸加

阿膠

八珍湯

見一卷中風

人參飲子

人參二錢
錢半

甘草一錢
五味二拾粒

耆
麥

歸

芍客

花蕊石散

花蕊石煅研細
酒一半

女用醋一半和

以童便煎溫調下

男用

大黃黃連瀉心湯

大黃
黃連

清咽太平丸

薄荷十兩
草各二兩

川芎
防風

犀角

柿霜

甘

養心湯

見本卷勞瘵

唾血 胃虛 勞唾 肺痿 怒嘔 胃傷 酒傷

清唾湯

二母

桔梗

元參

黃蘗

熟地

天冬

遠志

七珍散

參

苓

朮

草

耆

山藥

粟米

黃耆散

炙耆

糯米炒

阿膠

等分爲末米湯下三錢

人參平肺散

見一卷火

柴胡疏肝散

見本卷勞瘵

是齋白朮散

參

朮

耆

苓

各一錢

山藥

百合各八

葛黃散

黃連四兩
或爲末服

溫湯下

葛花三兩

用大黃末水熬成膏爲丸

類書

卷之二

目錄

四

吐血

族弟陰虛發熱吐衄脈洪虛疾左關尺爲甚思積損幾及三年龍
雷不伏直至真陰內燥肺絡受傷陰益虧陽益熾矣不從鹹降
諒難猝止用秋石阿膠熟地五味山藥百合貝母丹皮白芍淡
萊熬膏藕湯下衄止而損漸愈

毛 勞怯失血尺寸脈俱洪數乃肺腎虧損用三才湯加丹皮白
芍麥冬鮮藕數服血止惟晡熱欬嗽用六味丸去萸泄加五味
白芍龜板炙阿膠蜜丸服二料全痊

丁 痰中血點洩後遺濁五更不夢自洩此腎陰虛相火強也六
味去山萸加魚鱉炒連翹兔絲餅稍佐黃蘗鹽水蜜丸鹽湯

下漸愈

韋氏晡熱嘔欬痰血此上損候也用阿膠

蛤粉炒

百合茯神鮮藕三

錢

潞參山藥白芍丹皮

各二錢

貝母

一錢

五味

四分

紅棗

五枚

二劑紅止

熱漸退去丹皮阿膠鮮藕加桔萸仁二服痰嗽亦除

睡

初夏吐紅深秋未止或主燥火刑金或主龍雷亢逆診脉右

寸短瀦左關沈弦應主鬱慮不舒由氣分傷及血絡自述每午
後喉間氣窒不利則嗽作血腥夫陽主開陰主閉午後屬陽中
之陰主斂而氣隧阻閉非鬱慮內因不至此用桔梗貝母木香
桔萸茯神當歸白芍降香末服二劑脘舒血止去木香降香加
鬱金熟地二服脉平又服歸脾湯去耆朮加熟地貝母白芍蓮

子愈

錢 失血三次皆由食頃今吐紅又適當飯時自係食入氣阻胃
管滯血故咽津時腕間若噎也診脉各部俱弦宜調其逆氣兼
彌其滲絡用栝蠆貝母當歸玉竹阿膠紅棗服愈後頻服牛乳
永不發

黎 立冬後陽伏地中龍潛海底今值冬至陽始生而龍已不藏
致五夜陽升灰痰帶血右尺不平此知藥八味丸症也又夙有
肝氣左脇刺痛則龍雷交熾矣初服壯水潛陽痰血已減繼服
加減歸脾湯左脇痛止灰痰亦少血絲淡而若無脉症將愈兆
也昨診惟肝脉稍弦左尺強於右是水尙能制火從此平心靜

攝戒怒節慾明春木火不至偏旺則痊平可冀熟地水丹皮酒

澤瀉鹽水

茯苓

乳蒸

山藥

炒

遠志

甘草汁炒

白芍

炒

女貞子

藕粉

淡菜

炒

牡蠣

煨研

煉蜜丸服

蔣氏小產後痰嗽帶血晡寒宵熱食減肌削脉小弱此病損已久胞系不固胎墮後營衛益傷宜倣立齋先生治法以甘溫補陽則寒熱可減近人事事否貝希冀嗽止恐寒涼損脾反致不救用潞參山藥茯苓神炙草阿膠白芍五味杞子蓮棗數服頗安再加黃耆鹿角霜數服諸症漸止飲食漸加又丸方調理得痊荆氏高年食後觸怒氣升血湧洞瀉稀水身熱背寒心煩頭眩經云怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故令氣上症由肝陽鬱勃震傷

血絡疏泄太甚，木必侮土，胃中水穀不化，更兼暑濕，司令地氣
泛潮，故下迫暴注，氣上故中脘失寬。主以降逆佐以除滿，則血
歸經而胃自和。用厚樸製、山梔炒、鬱金磨、蘇梗、茯苓、砂仁、
降香、枳壳一啜，微汗前症若失。

戴氏情志內損，火迫絡傷，嗽血、晡寒、宵熱、脉右虛左數，營損衛怯。
先以膩潤彌絡育陰和陽，待夏至陰生，陽不加灼，復元可望。阿
膠水化、生地炒、麥冬各一錢、茯神三錢、杞子、山藥、甜杏仁俱炒、丹皮、石
斛各錢半、五味焙五分、六服諸症向安，惟胸右微痛，加白芍二錢、萸皮二錢。
八分痛止。

王 淋症愈後遂發漏瘍，必固澀藥用，早瘍醫用線藥，膿管未拔。

忽咯血塊左脉虛右尺搏指此龍火不潛上爲咯紅下爲漏膿
勞則淋遺溺痛非壯水制陽漏厠何已勢將由下損上爲勞嗽
爲吐衄肛漏安可平也暫服煎劑倣虎潛丸加減熟地水龜膠
淡菜白芍當歸五味杞子知母黃蘗俱酒炒六服脉症平後用煉
蜜爲丸加茯苓山藥丹皮牛膝鹽湯下漏瘍亦愈

史氏胸痛嘔血色兼紅紫頭眩腕悶脉扎微此憂思損營宜斂補
心神兼舒脾結凡離絡之血色變紫非必積瘀使然潞參茯神
白芍五味棗仁炙草當歸醋炒合歡花鬱金木香俱磨汁冲三服已安
調理尋起

衄血論治

口鼻衄 九竅衄

耳衄 血溢

眼衄 心漏

齒衄 脾血附

舌衄

肌衄

血從清道出於鼻爲衄。症多火迫血逆。亦有因陽虛致衄者。火亢

則治宜清降。

生地黃飲 子茜根散

陽虛則治宜溫攝。

理中湯 黑神散

既於脉之洪滑

弦細別之。暴衄則治須涼瀉。

犀角地黃湯 七汁飲

久衄則治須滋養。

止衄散 生脉散

更以血色之鮮濃暗淡辨之。且火迫致衄有六淫之火。有五志之

火。如風寒壅盛於經。迫而妄行。表症仍在。脉浮

緊。用麻黃湯。成氏

桂枝湯。

謂此非治衄。仍以散邪。仲景固言衄不可汗也。若感溫熱風暑而

衄者。宜辛潤清涼。

如杏仁、丹皮、山梔、茅花、丹參、鮮地黃、連翹、石斛、犀角、麥冬、阿膠、蔗汁、藕汁。

因火邪亢

極而衄者。宜苦寒鹹寒。

如黃連、黃芩、山梔、枳殼、梔葉、元參、犀角、童便。

此治衄外因也。其

思傷心脾驚悸不眠。

歸脾

勞傷元氣。欬嗽發熱。

補中益氣湯。去白朮加麥冬、五味。或

當歸補血湯。怒傷肝陰。火冒頭暈。生地丹皮白芍山梔。慾傷腎精。

陰虛失納。上喘下遺。都氣丸加杞。若火不歸源。喘促煩躁。脉微肢

厥。八味地黃太鎮陰煎。陰虛陽浮。六味飲加秋石龜甲白芍五味。衛虛營損。氣短色枯。養營湯。

氣衰血脫。神疲昏憤。獨參湯。胃火血升。犀角地黃湯加茅花。此治衄內因也。其

酒升血沸。面赤汗多。四生大。努力負重。傷中損絡。保元湯加阿膠。此治衄不

內外因也。若衄多服涼劑不止。係內虛寒。而外假熱。千金當歸湯。衄久

不止。熱在下焦血分。六味飲加五味童便。衄久成勞。照虛損治病後小勞。屢

衄。石膏牡蠣湯。衄後屢發。或洗面卽衄。並以茅花煎湯調止衄散服。衄血未淨。停瘀

入胃。致面黃尿黑。加味犀角地黃湯。大衄而頭痛口渴。煎玉女。大衄不止。面

目浮腫。蘇子降氣湯。使血隨氣下。得力全在肉。凡久衄。須加氣藥。如木香黑

香附 所以引血歸經耳。

口鼻 血出口鼻屬肺脾二經。積勞傷脾。補中益氣湯倍耆歸。如不應歸脾湯加藕節童便。

耳 血出耳竅屬肝腎二經。暴聾腫痛左關弦數。多肝經風火沸騰。

柴胡清肝散。若常有點血不腫痛。尺中沈數。多腎經陰虛火升。生料六味

丸加五味元參外用。龍骨煨研吹入卽止。

眼 血出目眥屬肝火迫絡損系。若猝視無覩。滋陰地黃丸去柴胡。常流血淚。

駐景丸外以炒黑槐花末研敷眼角。

齒 血出齒縫牙齦屬胃腎二經。陽明入下齒。少陰入上齒。陽明火盛必口臭。牙

齦腐腫。甘露飲。或血湧齒不搖。必酒食炙煇積熱。清胃散外敷冰玉散。甚則

衄不止。大便秘。調胃承氣湯。陽明風壅。齒齦微腫。或牽引作痛。消風散加

犀角連翹外擦少陰虛口不臭齒浮動不痛牙縫中血點滴而

青鹽藥本末

出係腎陰不固虛火偶動大味飲加若隱隱作痛係陽虛於下

火炎於上

七味地黃丸或鹽湯下安腎丸外擦青鹽炒香附末

齧底成塊血出鹽湯下六味丸

舌

血出舌上如線或有針孔多屬心包火

先以蒲黃煎湯漱之內次以槐花炒研搽之

服黃耆六一散

若舌出血如泉

塗舌丹或川文蛤研末搽

舌脹大出血不止

乾薑灰生蒲黃爲末搽

肌

血出膚孔屬衛氣不固血乘陽分脉洪

當歸六黃湯脉弱湯保元脉數

當歸補血湯

脉浮黃耆建中湯

有紅汗色紅染衣

黃耆建中湯兼用妙香散小麥煎湯調下

九

諸般齊血總治

犀角湯

有中者

飲生

顛撲傷者

灌熱煩勞

傷者補中益氣湯倍參者

若五臟內崩者不治有偏體無故血出

五花湯

血從上出。隨火妄行。原病式以爲心火銷燬。用黃連瀉心湯。或偶觸破

傷血湧不止。內服十全大補湯。外用百草霜摻之。

心胸前一孔出血。水名心漏。用嫩鹿茸去毛酥炙。附子炮去皮臍。和鹽花共研末。以棗肉杵丸。酒下。臍血出臍中。胃受火逼不得運輪。宜熟地當歸白芍丹皮甘草白芷側柏葉茅根汁藕汁之屬。

衄血脉候

衄而不止。脉大者逆。靈脉至而搏。血衄身熱者死。素問病若吐衄脉

當沈細反浮大而牢者死。難經脉得諸瀼濡弱爲亡血。脉浮大數

爲邪伏於經。宜發汗大而虛爲脾虛不能統血。宜補氣小而數爲

陰虛火乘。宜滋腎。弦瀼爲痰積。宜行滯。凡衄血之脉。數實堅勁。或

急疾不調。皆難治。久衄脉虛大。頭額痛。鼻流淡黃水者死。

附方

生地黃飲子

生地

熟地

杞子

阿膠

白芍

天冬

側柏葉

地骨皮

黃芩

各等分水煎

茜根散

茜根

阿膠

黃芩

側柏葉

生地各一兩

甘

理中湯

見一卷中風

黑神散

見本卷血

犀角地黃湯

見一卷溫

七汁飲

韭汁

藕汁

鮮荷葉汁

京墨汁

側柏葉汁

止衄散

黃耆六錢

當歸

赤苓

白芍

生地

阿膠各

生豚散

三錢

爲末

麥冬湯調服

五味

麻黃湯

麻

杏

桂

草

清降清降溫攝溫攝溫攝溫攝溫涼瀉涼瀉涼瀉滋養益肺風寒

風寒傷脾氣虛氣血喘逆補火補火陰虛調營酒沸

桂枝湯

桂 芍 草 薑 棗

歸脾湯

見本卷勞瘵

補中益氣湯

見一卷中風

當歸補血湯

炙者一兩 當歸二錢

都氣丸

見一卷火

八味丸

見一卷中風

鎮陰煎

熟地一兩 牛膝二錢 澤泄一錢五分 炙草
桂心各一錢 製附子七分 水煎冷服

六味丸

見一卷中風

養營湯

見本卷勞瘵

四生丸

生艾葉 生荷葉 生側柏葉 生地黃 搗丸如
雞子大 水煎去渣服

傷中

保元湯

見一卷火

千金當歸湯

當歸一錢
各一錢半

炮薑五分

白芍

阿膠

黃芩

石膏牡蠣湯

石膏五錢

牡蠣一兩

研末酒服日三次

加味犀角地黃湯

地陳草

芍丹犀角
紅花藕汁

再加歸桔

玉女煎

見一卷溫

蘇子降氣湯

見本卷失音

治外氣降火降痰停後病寒虛中傷

單方

以大蒜頭搗如泥作餅如錢大貼足心左鯁貼右右鯁貼左兩孔俱鯁左右俱貼即止

單方

用線紫中指中節左孔鯁紫左中指右孔鯁紫右中指兩孔俱鯁兩指俱紫

單方

黑山梔煅牡蠣煅龍骨京墨百草霜血餘

單方

灰等分爲末用茅花水煎藥末入鼻孔立止
用濕紙搭額上立止

虛陽虛腎腫風秘便敷外鰵齒鰵齒鰵眼鰵眼鰵耳

柴胡清肝散

小柴胡湯去半夏棗薑

加梔子

川芎

滋陰地黃丸

二地

芩連

參草

歸

味

柴

枳

駐景丸

杞子

天冬

地骨皮

蜜丸茶下

熟地五兩

兔絲子八兩

蜜丸酒下

甘露飲

二地

二冬

石斛

茵陳

黃芩

枳壳

枇杷

清胃散

生地四錢

升麻錢半

丹皮五錢

當歸

川連

各三錢

爲末分三服

冰片五分

冰玉散

冰片五分

硼砂

元明粉各五錢

辰砂六分

調胃承氣湯

大黃

芒硝

炙草

消風散

見本卷失音

七味丸

六味加桂心

安腎丸

便製香附二兩

炮川烏

川椒各二兩

川楝子三錢

青鹽炒

酒糊丸

熟地四兩

酒糊丸

溢血

十全大補湯

見一卷中風

衄血

族子勞力傷陰口乾鼻衄頰赤神疲是冬陽不潛當春脉洪晡熱
係引動溫邪先治溫後治勞黑山梔生地白芍丹皮麥冬沙參
元參蔗汁三服脉洪已退鼻衄亦止而右尺不靜龍燄未熄宜
滋陰潛陽六味丸料去澤泄加龜板淡菜五味白芍煎服十劑
效

蕭 去秋陰瘧病延今夏三日兩發熱重寒輕鼻衄左孔膝脛熱
蒸乃腎陰下虧膽火上冒仍用柴防升動致汗多渴眩鼽衄不
已皆誤藥貽咎生地丹皮山梔知母酒炒牛膝酒蒸白芍烏梅桑葉
三四服病已嗣此多服六味丸以滋下元

呂氏暑熱煩勞下崩上衄屢次暈絕肢冷胸溫甦醒後脇滿心中
驚汗不寐脉虛芤此心肝血失所統而氣隨血脫也急須固氣
以攝血乃陰從陽長之理用洋參五錢扶神三錢棗仁各二錢龍骨二錢
甘草錢半龍眼五枚小麥二合五味八分三劑神安熟寐逾日血仍至復
暈而甦用理中湯加荊芥醋炒數服得止

王 春初鼻衄口乾惡熱由努力傷絡血凝氣聚臍左板硬如掌
腕痞不容側卧脉左大右小肝乘絡傷應地氣上騰直犯清道
先進緩肝降逆俟衄止再商理痰黑山梔鬱金萸仁白芍阿膠
水化當歸醋炒麥冬丹皮炙草一服甚適三服衄止脉左斂原方去
芍膠歸草加牡蠣降香牛膝歸鬚桃仁二服便下瘀黑腕腹俱

寬蓋血以下行爲順上行爲逆故降逆佐甘緩理於佐軟堅

宗

面蒼赤體質陰虛病後微熱牙齦血衄成塊隨咽下不痛不

腫治用滋腎以潛龍火熟地

水

煮黃蘗

酒炒

茯苓丹皮牛膝

蒸

煎湯

冲真藕粉二服外用青鹽青黛石膏研細敷齒齦不日而衄止

王

當春大衄由情志拂逆膽火上迫致血直犯清道昏眩不時

速用清降以遏少陽升逆之威羚羊角黑山梔丹皮阿膠生地

鮮桑葉二服衄止脉來小瀉糲糊胸際隱痛晡時足腫由傭作

傷陽元氣不振懼其過勞輒發法宜和補脾陽潞參白朮炙草

茯神白芍當歸

醋炒

鬱金

汁

數服愈

汗症論治

汗爲心液。腎主五液。故汗出皆由心腎虛致之。有自汗。有盜汗。自汗屬陽虛。盜汗屬陰虛。自汗者。不因勞動。不因發散。漚然自出。由陽虛不能衛外而固密也。盜汗者。寐中竊出。醒後倏收。由陰虛不能內營而斂藏也。陽虛自汗。治宜補氣以衛外。陰虛盜汗。治宜補陰以營內。固衛則表氣實而腠理不疏。填營則裏真固而陰液不洩。條其治法。表虛自汗。失斂。補陽湯裏虛盜汗。有熱。益陰湯表裏不固。汗出。黃耆湯氣虛而陽弱者。必自汗。耆附湯凡陰虛而火蒸者。多盜汗。當歸地黃湯陽虛者。陰必乘。多發厥。自汗。黃耆建中湯陰虛者。陽必湊。多發熱。盜汗。當歸六黃湯陽蒸陰分。則此從乎表裏陰血熱。血熱則液泄爲盜汗。

陽爲治也。然自汗有屬腑臟者。經云飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪。

精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。搖體勞苦。

汗出於脾。如胃熱。食則汗出如洗。二甘湯或吐白散。飲酒瀟風。汗出如浴。

白朮。肺虛。痿易疏泄。玉屏風散。心虛。神不安。謚。硃砂安神丸。腎虛。元府。

不閉。六味丸。肝脾虛。精血久耗。三陰煎。土材亦云。肺虛者。固其皮毛。

黃耆。六心虛者。益其血脈。當歸六黃湯。腎虛者。助其封藏。五味子湯。脾虛者。

壯其中氣。補中益氣湯。肝虛者。禁其疏泄。白芍湯。此從乎腑臟爲治也。其。

盜汗。乃睡中自泄。參苓散。水火不交。心腎陰陽偏勝湯。虛損。心惕。

柏子仁湯。至如病後氣血俱虛。自汗。十全大補湯。產後血脫。孤陽無依。

牡蠣散。大補元煎。痰盛者。汗自流。理中

大。汗不止。獨參湯。凡津脫者。汗大泄。去杜仲。

湯。發汗過劑，血虛成痙。防風當歸湯。汗多亡陽，身冷拘急。桂枝加附子湯。若失

風濕相搏，時自汗出。防已黃耆湯。惡風自汗。桂枝湯。傷寒陽明少陽症盜

汗。柴胡湯葛根湯。溫熱症三陽合病，目合則汗。白虎湯。額汗濕熱上蒸，或

血畜胃口，迫其津液致之畜血，頭汗劑頸而還。犀角地黃湯。頭汗小便

不利，渴而不飲，此血瘀膀胱也。桃仁承氣湯。胃熱上蒸，額汗發黃，小水

不利者。五苓散。加茵陳甚傷寒脇痛耳聾寒熱口苦，頭汗劑頸而

還，屬少陽。小柴胡湯。加桂枝。少陽挾熱。或為盜汗，或腋汗脇汗，須

知從陰陽交互時及陰陽交互處發泄者，皆陰陽不和，半表半裏

症。小柴胡湯。皆合劑也。外有頭汗。頭者，諸陽之會，邪搏諸齊頸而

還，屬血症。四物湯。濕邪搏陽，亦汗出頭額。參用勝濕湯。水結胸無大熱。

亦汗出頭額

小半夏加茯苓湯

陽明胃實亦汗出頭額

調胃承氣湯

胃腑熱蒸

手足自汗亦陽明病當下

大柴胡湯

心液盜汗久不止

參歸腰子

當心一片

津津自汗名心汗

補心丹

陰囊汗爲腎虛有濕

安腎丸

主之兩腋汗腳

心肝爲濕熱流注

杜若丹

主之有血汗因膽經熱血妄行與少陰氣

併奪命散

產後血汗

獐皮湯

有黃汗因汗出浴水濕熱內鬱

黃陳湯

汗出不止外治法

紅粉散

惟珠汗不流汗出如油額汗如雨喘促肢

冷皆陽脫不治

經曰陽有餘爲身熱無汗陰有餘爲多汗身寒又曰血與汗異名

而同類故奪血者無汗奪汗者無血註云奪者迫之使出也又曰

腎病者寢汗憎風寢汗卽盜汗也

東垣曰凡內傷自汗

補中益氣湯稍加附子麻黃根浮小麥

其效如神但

升少用兼

蜜炙以抑其升發暴悍之性又欲其引參耆等味達肌表也

凡服止汗固表藥不應愈斂愈出者只理心血以汗乃心液心不

攝血故溢爲汗

大補黃耆湯加棗仁

微熱者加

石

當心汗爲思慮傷脾

補心丹

凡久病不愈必氣血兩虛自汗熱不退

補中益氣湯加川附或用歸脾湯

如便燥

自汗熱不退屬陰血

六味地黃湯加生脉散

如病陽虛熱極自汗而解汗後

又熱汗出如水此陽被汗散發泄在外而不歸元

保元湯加浮麥牡蠣或炒焦棉

子煎

如心神不安者

加安神丸

凡虛陽上攻必求下達

保元湯加木匠使陽氣回元

凡汗症有陰陽陽汗者熱汗也陰汗者冷汗也汗之冷者以其陽

氣內虛陰中無陽而汗隨氣泄凡大驚恐及病後產後失血後多

有汗出是皆陽氣消耗真元失守候也。故經曰：陰勝則身寒，汗出又曰：極寒反汗出身必冷如冰，是皆陰汗之謂。治必扶其正氣，其汗乃止。若虛甚者，非速救真元不可。薑桂附子之屬，必所當用。

凡病不當汗而誤汗，或當汗而汗之過劑者，皆汗多亡陽之症。是

亦陰症之屬。當察其虛之或微或甚。微虛者，三陰煎或五陰煎，獨參湯之類。虛甚

者，非用大補元煎六味回陽飲之類。不可。凡衛虛不固，腠理不密而易汗者，是

亦陰症之屬。宜黃芪六一湯或者附湯。

醫通曰：病後氣血俱虛而汗服諸止汗藥，不應用十全大補湯半

劑加熟棗仁五錢。若胸臆煩悶，不能勝陰藥者，生脉散加黃耆二

錢，當歸六分，熟棗仁三錢，一服即驗。夏月汗止，半身由氣血不

充內挾寒飲偏枯及天之兆也。用大劑十全大補湯人參養營湯大建中湯。加行經命湯。一劑以開發其表。或防已黃耆湯加四物以散其濕。此症雖屬血虛不可用陰藥。以其閉滯經絡故也。丹溪曰。自汗大忌生薑。以其開腠理也。凡有汗一切辛辣之味。五辛之屬均忌之。

汗症脉候

寸微尺緊虛損多汗。肺脉爽而散者。病瀦汗。平人脉虛微細者。盜汗。出自汗在寸。盜汗在尺。脉盛汗出。病不衰者。死。汗出而脉脫者。不治。

附方

表虛 裏虛 表裏 陽虛 陰虛 自汗 盜汗 胃汗 胃汗 酒風

補陽湯

參

耆

朮

草

五味

虛加

附子

益陰湯

黃

地

丹

芍

麥

味

山藥

澤瀉

燈草

黃耆湯

耆

地

茯苓

天冬

麻黃根

肉桂

龍骨

各

七分

耆附湯

耆

附

各

二錢

薑

十片

當歸地黃湯

歸

芍

苓

朮

知母

浮麥

陳

草

人參

黃耆建中湯

見

本

卷

歸血

當歸六黃湯

見

本

卷

歸血

二甘湯

生

甘草

炙

甘草

五味

烏梅

薑

棗

牡白散

煅

牡蠣

白朮

防風

各

二錢

白朮散

白

朮

一

兩

二

錢

五

分

防風

一

兩

五

錢

牡蠣

三

錢

衛虛心汗心火腎汗補腎肝脾肺汗腎汗脾汗肝汗

玉屏風散

見一卷中風

硃砂安神丸

黃連五錢 錢半

炙草 硃砂一錢半

生地各三錢半

當歸二

天王補心丹

見一卷火

六味丸

見一卷中風

還少丹

見一卷中風

三陰煎

歸

地參

耆芍

味草

棗仁

黃耆六一湯

耆六錢

草一兩

煎服

五味子湯

五味

山黃

龍骨

牡蠣

何首烏

遠志

補中益氣湯

見一卷中風

白芍湯

白芍

棗仁

烏梅

盜汗 參苓散 參 苓 棗仁

心腎丸 參 耆 歸 地 苓 味 牛膝 菟絲 子 山藥 鹿茸 附子 龍骨 遠志

心 柏子仁湯 柏子仁 半夏 麴各二兩 牡蠣 人參 白朮 麻黃根 五味各一兩 麥麴半兩 棗肉爲丸

斂汗 牡蠣散 黃耆 麻黃根 牡蠣 小麥

病後 十全大補湯 見一卷中風

津脫 大補元煎 見一卷中風

痰汗 理中降痰湯 參 朮 薑 草名理中湯 此加苓 夏 蘇子

汗 防風當歸湯 芍 歸 防 地

亡陽 桂枝加附子湯 桂 芍 草 薑 棗 名桂枝湯 此加 附子

風濕 防已黃耆湯 見一卷濕

少陽 小柴胡湯 見一卷溫

陽 葛根湯 葛根 麻黃 薑 桂 芍 草 棗

三陽 白虎湯 見一卷中風

陽 犀角地黄湯 見一卷溫

血 桃仁承氣湯 見一卷疫

血 五苓散 見一卷溫

胃 茵陳蒿湯 見一卷濕

熱 逍遙湯 見一卷火

發 勝濕湯 茅朮 厚樸 半夏 藿香 陳皮 甘草 薑

陰 調衛湯 麻黃根 黃耆 羌 麥 地 歸 草 苓 夏

濕 猪苓 蘇木 紅花 五味子

結胸 胃實 陽明 心汗 腎虛 外治 血汗 產血 黃汗 外治

小半夏加茯苓湯 見本卷痰飲

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草

大柴胡湯 見一卷溫

參歸腰子 人參 當歸各五錢 豬腰一個 黃 再蒸

安腎丸 蘆巴 補骨脂 川棟子 茴香 續斷各一兩半 杏仁 桃仁 山藥 茯苓各一兩

牡礬丹 牡蠣粉 黃丹各二兩 枯礬四兩 研擦

奪命散 硃砂 寒水石 麝香 等分 每服五分 又名定命散

猬皮湯 猬皮燒灰 米飲下 猬肉煮食更妙

耆陳湯 石膏 耆 芍 麥 豉 草 茵陳 薑

紅粉散 麻黃根 煨牡蠣各一兩 赤石脂 龍骨各五錢 絹包擦之

補虛

大補黃耆湯

參耆 北

草 芎 歸 茯苓一兩半

熟地 黃 味 桂 心 茯苓各

三兩

薑 棗

生脉散

見一卷暑

保元湯

見一卷火

六味回陽飲

見本卷欬嗽

人參養營湯

見本卷勞瘵

大建中湯

蜀椒

乾薑

人參

飴糖

小續命湯

見一卷中風

陰血培元補虛偏枯寒飲發表

脫症論治

生命以陰陽爲樞紐。陰在內。陽在外。陽之守。陽在外。陰之使。陰陽互根相抱。不脫。素問所謂陰平陽秘。精神乃治也。若夫元海根微。精關直泄。上引下竭。陰陽脫離。命立傾矣。靈樞云。精脫者耳聾。氣脫者目不明。津脫者腠理開。汗大泄。液脫者骨屬屈伸不利。色天。腦髓消。脛痠耳數鳴。血脫者色白。天然不澤。其脉空虛。難經云。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。嘉言喻氏又分上脫下脫。上下俱脫。今詳斯症總由陰陽樞紐不固。如上脫者喘促不續。汗多亡陽。神氣亂。魂魄離。卽脫陽也。下脫者血崩不止。大下亡陰。交合頻精大泄。卽脫陰也。上下俱脫者。類中眩仆。鼻聲鼾絕。汗出遺尿失禁。卽陰陽俱脫也。

更有內閉外脫者。痙厥神昏。產後血暈等症是也。治法在未脫之

先審其元陽欲絕者。於回陽劑中兼引陰。參附湯用真陰欲絕者。

於攝陰劑中兼固陽。固陰其心神浮越起臥不安者。招集潰散之

陽。龍蟠救逆湯去桂薑。蜀脉微垂絕氣短汗出者。收拾虛耗之金。

生脉散或血脫者益氣。吐血不止。獨參湯。精脫者填營。縱慾走陽。

人參飲子。血脫者益氣。加參三七。童便。精脫者填營。救脫湯。

魂離者鎮肝。身外有身。崩中者固下。血漏暴注。津脫者實衛。大汗。

收汗。液脫者滋陰。血枯成痿。加喘促而吸入短者。資化源。續都氣。

丹。類中而神昏冒者。息風。心火暴甚。河間地黃。至於內閉外脫。

如痙厥神識不醒。暫用豁痰。鮮菖蒲根汁。產後血暈未甦。急爲開。

竅。外燒鐵器淬醋熏鼻。或燒蘇合香嗅氣。凡諸暴脫或孤陽無根。

內瀯清魂散。若血悶用獨聖散。參蘇飲。

而陰失所繫。或精血驟去而神失所依。洵有如喻氏所見壯歲無病一笑而逝。少年交合一注而傾者。不早尋解漏而臧固之。其能拯危於一綫也哉。

附方

參附湯

參

附 薑

回陽攝陰

固陰煎

參

地 黃

味

山藥

蓮蕊

炙草

兔絲餅

救逆

龍螭救逆湯

龍骨四兩 二枚

桂枝

牡蠣五兩

炙草二兩 蜀漆各三兩

大棗十

生脈散

見一卷暑

氣短

人參飲子

見本卷血

精脫

救脫湯

人參三兩 各一兩

附子一錢

錢

黃耆三兩

熟地

麥冬

魂

定魂丹

參 苓 白芥子

歸 朮 龍齒

柏子仁

棗仁

遠志

暴

安崩湯

參 朮

青各一兩

三七根末五錢水煮

津

收汗丹

參 耆 當歸五錢

麥 地各一兩 甘草一錢

棗仁五錢

五味三錢

液

加減四斤丸

熟地 鹿茸

五味 菴蓉

牛膝

木瓜

天麻

喘

都氣丸

見一卷火

虛

地黃飲子

見一卷中風

中

至寶丹

見一卷中風

厥

清魂散

人參

甘草

川芎

澤蘭

荆芥

產

獨聖散

五靈脂半炒半生水煎服

血

參蘇飲

人參

蘇木

血

脫

堂弟心力經營煩勞動火消穀善飢坐則手足俱顫寐則手足如
墮夢則體析爲二神志恍惚呵欠氣洩右脉小弱左虛軟不受
按因操勞疲神元氣不司鎮攝若轉失氣須防暴脫食下煩餽
稍定足知中宮底柱乏權急攝陽以交陰潞參茯神山藥五味
杞子白芍龍骨牡蠣俱煨研棗仁炒研三服神魂安帖諸症俱減惟
巔痛唾涎原方加嫩桑葉炒甘菊以熄肝膽風熱如益智半夏
青鹽炒以攝脾涎又數服間服膏方而安 此症因其胃旺能納
耑受滋填川海參煨鴨及火腿雞蛋等皆血肉有情之品故未
及兩旬已瘥

類證治裁卷之二終