

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷六十四

詳校官太醫院醫官 姜鳳

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄錄監生臣林紹龍

欽定四庫全書

景岳全書卷六十四

明 張介賓 撰

外科

仙方活命飲一治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者潰此止痛消毒之聖藥也

穿山甲

蛤粉炒黃

白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

陳皮

各三錢

皂刺

甘草

各二錢

金銀花

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散

二錢

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰

散服之未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若

腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為

主屬血虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯

為主並忌寒涼消毒之劑

人參

隨證增減

黃芪

鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥

炒

白术

炒

茯苓

各一錢

金銀花

白芷

各七分

甘草

連翹

各五錢

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡
秘方托裏散(三) 治一切瘡毒始終常服不至內陷

瓜萎

大者一個

當歸

酒拌

黃芪

鹽水炒

白芍藥

甘草

各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺

炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈。立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣不問陰陽腫潰屢用屢效真仙方也常治發背腦疽勢盛者更用隔蒜灸之若脉沈實大小便秘者先用疎通而後用此其功甚捷若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不斂及膿清者用峻補

神功托裏散

四

一名金銀花散

治癰疽發背腸癰

乳癰及一切腫毒或欬痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草等分

右用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃再服一劑粗敷患處不問老少虛實皆可服若為末酒調服尤妙

參芪托裏散

五

治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰

不能收斂及惡寒發熱者

人參

氣虛多用之

黃芪

炒

白朮

炒

當歸

熟地

芍藥

酒炒

茯苓

陳皮

各一錢

右水煎服

參芪內托散

六

方在痘疹七

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯

七

治療癰疽流注及一切癰疽不足之證

不作膿或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食

不思睡卧不寧盜汗不止

人參

黃芪

當歸

酒拌

川芎

芍藥

炒

白朮

一錢炒各

熟地

二錢

五味子

研

麥冬

甘草

各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯八 治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪

蜜炒六錢

甘草

天花粉

各一錢

水二鍾煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養

營湯

內補黃芪湯 九 治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛

迭見

黃芪 炙

麥冬 各一
兩

人參

熟地

茯苓

甘草 炙各
七分

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂

各五
分

右每服一兩薑棗水煎服

托裏當歸湯 十 治潰瘍氣血俱虛或晡熱內熱寒熱

往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等
證但瘡癆氣血虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂

瘡口

人參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥錢各一

柴胡

甘草分各五

右水煎服

托裏健中湯十一 治瘡癆元氣素虛或因涼藥傷胃

飲食少思或作嘔瀉等證

人參 白术

茯苓各二
半夏

炮薑各一
錢

黃芪一錢

半

炙甘草五分

肉桂三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯

十二

治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因魁伐

胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憒此寒變內

陷緩則不治

附子

炮去皮
臍二錢

乾薑

炒三
錢

益志

丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮各一錢
炙甘草二錢

右薑水煎服

托裏益中湯十三
治中氣虛弱飲食少思或瘡不消
散或潰而不斂

人參

白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏

各一錢

木香

炙草

各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯十四

治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得

伸越熱伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛煥甚仍宜砭之

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼术

錢各一

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡
托裏益黃湯十五 治脾土虛寒水反侮土以致飲食

少思或嘔吐泄瀉等證

人參

白术

茯苓

陳皮

半夏

錢各一

炮薑

丁香

甘草

錢各五

右薑棗水煎服

托裏清中湯

十六治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思

等證

人參

白术

茯苓

陳皮

錢各一

半夏

八分

桔梗

七分

甘草

五分

右薑棗水煎服

托裏抑清湯十六 治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食

少思或胸膈不利等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

各一錢

芍藥

柴胡

甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏營衛湯十八 治瘡瘍外無欬腫內便調和乃邪

在經絡也宜用此藥

人參

黃芪

當歸

甘草

炙

紅花

柴胡

連翹

蒼术

米泔
浸炒

羌活

防風

黃芩

錢各一

桂枝

七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯

十九

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思

等證

人參

白术

錢各二

陳皮

半夏

各一錢

山梔

川芎

香附

蒼术

各七分

炙甘草

五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散

二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼

去蒂炒二錢

當歸

酒拌

白芍藥

炒

川芎

各一錢半

乳香

沒藥

肉桂

各一錢

右薑棗水煎服

內托復煎散

二一

治瘡瘍焮腫在外其脉多浮邪勝必侵於內宜用此托之

人參

白朮

炒

當歸

黃芪

炒鹽水

芍藥 炒 茯苓 甘草 炙

地骨皮

肉桂 防已 酒炒 黃芩 各一
錢 防風 二錢

右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升
終日飲之

內托羌活湯 二二 治臂癰堅硬腫痛兩尺脉緊無力

羌活 黃柏 各一
錢 防風 當歸尾

藁本 肉桂 各一
錢 連翹 蒼朮 米泔
浸炒

陳皮 各五
分 黃芪
鹽水炒
一錢半

右水酒各一鍾煎八分食前服

內塞散

二三

治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不斂或

風寒襲於患處血氣不能運行久不能愈遂成漏證

附子

童便
浸炮
炒

肉桂去皮赤小豆

炙甘草

黃芪

鹽水
當歸
酒拌
炒

茯苓

白芷

桔梗

炒

川芎人參遠志

去骨

厚樸

制各
一兩
防風
四錢

右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或

煉蜜為丸亦可

冲和湯

二四

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫

此因元氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮

各二錢

黃芪

白朮

當歸

白芷

各一錢半

茯苓

川芎

皂角刺

炒

乳香

沒藥

金銀花

甘草節

各一錢

右水酒各半煎服

神效酒煎散

二五

治一切瘡瘍能托毒散毒其效如

神

人參

沒藥

另研當歸尾各兩

甘草

三錢

括薑

一個半生半炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以為末酒糊丸桐子大每服五十丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯

二六

治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參

白术

蒼术

麥冬

陳皮

當歸

升麻

各五錢

黃芪一錢

黃柏

炒分四

右水煎服

黃芪人參湯

二七

治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所

觸作痛

黃芪

鹽水炒二錢

人參

白术

蒼朮米泔炒

當歸

酒拌

麥門冬

五味子

炒敲各一錢

甘草炙

升麻

神曲炒

陳皮

各五錢

黃柏酒炒三分

水二鍾薑三片棗一枚煎服

黃芪建中湯二八 內托癰疽諸毒

黃芪蜜炙各三兩 肉桂各二兩 甘草炙二兩 白芍藥六兩

右每服一兩薑棗水煎服

參术補脾湯二九 治肺疽脾氣虧損久欬吐膿或中

滿不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參 白术各二錢 黃芪二錢半 茯苓

當歸 陳皮各一錢 麥冬七分 北五味四分

桔梗六分 炙甘草五分

右薑棗水煎服

參芪補肺湯三十 治肺證欬喘短氣或腎水不足虛

火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澁

人參

黃芪

白朮

當歸

陳皮

茯苓

各一錢

山藥

山茱萸

各二錢

五味子

炙甘草

各五分

熟地黃

一錢半

麥門冬

牡丹皮

各八錢

右薑棗水煎服

益氣養營湯

三一

治恆抱抑鬱或氣血損傷四肢頸

項等處患腫不問軟硬赤白腫痛或日晡發熱或潰

而不斂

人參

黃芪

鹽水炒

當歸

川芎

熟地

芍藥

炒

貝母

香附

茯苓

陳皮

各一錢

白术

二錢

柴胡

六分

甘草

桔梗

各五分

右薑水煎服 口乾加五味子麥門冬、往來寒熱加

軟柴胡地骨皮膿清加人參黃芪膿多加川芎當歸

膿不止加人參黃芪當歸肌肉遲生加白芍官桂

補陰八珍湯三二 治療癰等瘡足三陰虛者

人參 白朮 茯苓 甘草

當歸 川芎 熟地 芍藥

黃柏酒炒 知母酒炒各七分

右水煎服

參术薑附湯

三三

治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或
膿血出多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短

頭暈泄瀉

人參

附子

炮去皮臍各一兩

乾薑

炮

白朮

各五錢

右作二劑水煎服

附子理中湯

三四

治瘡瘍脾胃虛寒或誤打攻伐手

足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

白茯苓

白芍藥

各三錢

白术 四錢

右水煎服

六物附子湯 三五

治四氣流注於足太陰經骨節煩
疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子制

防已

桂枝 各四錢

炙甘草 二錢

白术

茯苓 各三錢

右作二劑水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

附子八物湯 三八

治瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉

厥逆

附子 炮

乾薑 炮

芍藥 炒

人參

炙甘草

茯苓 各一錢

肉桂 一錢

白朮 二錢

右水煎食遠服

四物湯

三七

治脾腎虛寒、瘡屬純陰或藥損元氣不

腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆及陽氣脫陷等

證

人參

白朮

黃芪

各三錢

乾薑 炮

附子

炮

甘草

炙

陳皮

當歸

各二錢

柴胡

升麻

各五錢

右酒水煎服如不應倍加薑附

薛氏加減八味丸

三八

治療瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚

或舌上生黃或未患先渴此皆腎水枯渴不能上潤
以致心火上炎水火不能相濟故煩躁作渴小便頻
數或白濁陰痿飲食不多肌膚漸消或腿腫腳先瘦
服此以降心火滋腎水則諸證頓止及治口舌生瘡

不絕

熟地

八兩蒸酒搗膏

山茱萸

酒浸杵膏

山藥

各四兩蒸焙

澤瀉

白茯苓

牡丹皮

各三兩

桂心

一兩蒸焙

北五味

四兩半炒

右為細末入二膏加煉密少許丸桐子大每服六七

十九五更初言語前或空心用鹽湯送下○此即陳

氏加減八味丸也 方在補脾一二三

加味地黃丸

三九

治肝腎陰虛瘡毒或耳內痒痛出

水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等證

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓

澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味各為末等分

右將地黃搗碎酒拌濕蒸爛杵膏入諸藥和勻加煉
蜜為丸桐子大每服百丸空心白湯送下如不應用
加減八味丸

當歸川芎散四十 治手足少陽經血虛瘡證或風熱
耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女
經水不調胸膈不利腸腹痞痛

當歸

川芎

柴胡

白朮

芍藥

各一錢

山梔

炒一錢二分

牡丹皮

茯苓八分

蔓荆子

甘草

各五分

右水煎服

加味敗毒散

四一

治足二陽經熱毒流於脚根焮赤

腫痛寒熱如瘡自汗短氣大小便不利或無汗惡寒

表裏邪實者宜之

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

大黃

蒼朮各一錢

水二鍾薑三片煎服

九味羌活湯

四二

方在散陣四

治瘡瘍風熱鬱遏焮腫作痛或遍身作痛或拘急不利及頭痛惡寒脊強脈浮緊

加味羌活湯

四三

即前湯加金銀花連翹用解瘡毒

白芷胃風湯 四四 治手足陽明經氣虛風熱面目麻

木或牙關緊急眼目瞤動

白芷

升麻

各二錢

葛根

蒼朮

米泔炒各八分

炙甘草

當歸

各一錢半

草豆蔻

黃柏

炒

柴胡

藁本

羌活

麻黃

去節各四分

蔓荆子

殭蠶

各三分

右水煎服

葛根牛蒡湯

四五

治時毒腫痛而便利調和者

葛根

管仲

甘草

豆豉

牛蒡子

半生半炒各二錢

右水煎服

犀角地黃湯

四六

治胃火血熱妄行吐衄或大便下

血

犀角

鎊為末

生地

牡丹皮

芍藥

黃芩

炒

升麻

各一錢

右水煎熟入犀角末服

犀角升麻湯

四七

治時毒或風熱頭面瘡痛或咽喉

不利或鬚疽痄腮等證

犀角

錢

升麻

防風

羌活

各錢

白芷

白附子

黃芩

各一錢

甘草

六分

右水煎服入犀角末服

玄參升麻湯

四八

治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重

舌或連頰兩邊腫痛或咽痛發斑並治之

元參

升麻

赤芍藥

犀角

錢末

桔梗

炒

管仲

黃芩

各一錢

甘草

五分

水二鍾煎八分入犀角末食後服

升麻黃連湯

四九

治胃經熱毒腮腫作痛或發寒熱

升麻

川芎

當歸

各一錢半

連翹

黃連

牛蒡子

白芷

右水煎服 若腫連太陽加羌活連耳後加山梔柴

胡

秘連翹湯

五十

治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹

升麻

樸硝

各一
兩
玄參

芍藥

白薇

防風

射干

各三
錢

大黃

一兩
二錢

甘草

炙五
錢

杏仁

八十個去皮尖
同炒黃另研

右每服五七錢水煎服下惡物後服內托之類

五香連翹湯

五一

治腦疽癰疽時毒邪氣鬱滯不行

者

乳香

木香

沉香

丁香

香附

黃芪

射干

連翹

升麻 木通 獨活

桑寄生

甘草

錢各一

右水煎服

復元通氣散

五二

治乳癰便毒腫痛及一切氣滯腫

毒或打撲損傷閃跌作痛及疝氣尤效

木香

船上茴香炒

青皮

陳皮

白芷

甘草

貝母去心

穿山甲炙

漏蘆

等分

一方有玄胡索白牽牛炒用

無白芷漏

蘆

右為末每服二三錢溫酒調下

當歸散五三 通經絡行血滯

當歸

川山甲灰炒各半兩 蒲黃炒各半兩 辰砂一錢

麝香

少許

右為末每服三錢熱酒調下如不飲酒薄荷醋湯亦可

可

方脉流氣飲五四

治療癰流注鬱結腫塊或走注疼

痛或心胸痞悶咽塞不利脇腹膨脹嘔吐不食上氣
喘急欬嗽痰盛面目四肢浮腫大小便秘

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓

黃芪

炙草

紫蘇

青皮

烏藥

半夏製

桔梗炒

枳實麸炒

防風

陳皮各一錢

木香

大腹皮

枳殼

麸炒

檳榔各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

瘡科流氣飲

五五

治流注及一切恚怒氣結腫痛或

胸膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡致成腫塊肉色不

變或漫腫木悶無頭

人參

當歸
酒拌
黃芪
鹽水炒藥

官桂

厚朴
制

甘草

防風

紫蘇

枳殼

烏藥

桔梗

炒各七分

檳榔

木香

川芎

白芷

各五分

右水煎服

陳氏獨聖散 五六

凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑

蓋香能行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之

香附子 薑汁浸一宿焙乾研末

右無時以白湯調服二錢○潰後以局方小烏沉湯

為尤妙

乳香定痛散 五七

治瘡毒損傷血凝氣滯壅腫拘攣

筋骨疼痛

乳香

沒藥

各另研

羌活

五靈脂

獨活

各三錢

川芎

當歸

真綠豆粉

肉桂

白芷

白膠香

各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或

酒送下手足損痛不能舉動加草烏五錢鹽湯送下

消毒散

五八

治乳癰吹乳並便毒如憎寒壯熱或頭

痛者宜先服人參敗毒二劑方可服此藥如無前證

即服此藥三二劑或腫不消宜服托裏散

金銀花

青皮

天花粉

柴胡

殭蠶炒

貝母

當歸

酒拌

白芷

各二錢

水二鍾煎一鍾食遠服如治便毒加大黃一二錢煨

用空心服

清熱消毒散

五九

治一切癰疽陽證腫痛發熱作渴

黃連

炒

山梔

炒

連翹

當歸

甘草

各一錢

川芎

芍藥

生地

各一錢半

金銀花

二錢

右水煎服

黃連消毒散

六十

治腦疽背疽焮腫疼痛或麻木

黃連

炒

羌活

各一

黃芩

黃柏

桔梗

藁本

防已

各五

歸尾

連翹

防風

獨活

知母

炒

生地

各四
分

人參

甘草

各三
分

黃芪

蘇木

陳皮

澤瀉

各二
分

右水煎服

連翹消毒散

六一

治癰疽實熱諸證○亦名清涼飲

亦即局方涼膈散

連翹一兩 梔子

大黃

薄荷葉

黃芩

各五錢

甘草

一兩半

朴硝

二錢半

右每服一兩水煎溫服

加味解毒湯

六二

治癰疽實熱大痛不止

黃芩

鹽水炒

黃連

炒

黃芩

炒

黃柏

炒

連翹

當歸

酒拌各七分

甘草

炙

白芍藥

梔子

炒各一錢

水二鍾煎服痛即止

解毒防風湯 六三 治斑疹或痒或痛

防風一錢 黃芪 芍藥 地骨皮

枳殼 炒 荆芥 各二錢

水煎徐徐服

陳氏解毒防風湯 六四 方在痘疹五六

治痘疹毒氣熾盛

散腫潰堅湯 六五 治瘰癧堅硬氣血無虧宜用之

柴胡 黃芩 各四分 白芍藥 炒 升麻

連翹 黃柏 酒炒 蓬木 三稜 酒拌

乾葛 歸尾 各三分 知母 酒炒 龍膽草 酒炒

天花粉 桔梗 昆布 各五分 炙甘草 二分

右水煎服

瓜萎托裏散 六六 治瘡瘍毒盛者未成則易消已成

則易潰既潰則生肌

黃瓜萎 一個
籽碎 忽冬藤 乳香 各一
兩 蘇木 五錢

沒藥 三錢 甘草 二錢

右用酒三碗煎二碗空心日午臨睡分三服○或以此為末酒糊丸彈子大硃砂為衣細嚼用當歸酒送下治打撲損傷尤妙

萬金散

六七

一名內托散

治癰疽已潰未潰者有

消毒破血之功

括蔥

一個
杵碎

沒藥

一錢
研

大甘草節

二錢

右用酒二碗煎一碗去粗後入沒藥服

製甘草湯六八 治懸癰不拘腫潰亦治癰疽

用大甘草一兩切三寸長用澗水一碗浸透以慢火
灸乾仍投前水浸透再灸至水乾為度却挫細用無
灰酒二鍾煎七分空心服嘗有人患此已破服兩劑
瘡即合○一國老膏方用大甘草二斤以河水浸取
漿汁去粗用銀石器熬成膏磁罐收貯每服一二匙
酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一方治癰疽用
生甘草為末酒調服二錢連進數服自消

梅花飲子 六九 癰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎 乾葛 天花粉 黃芪

烏梅 甘草 蘇木各一
兩 忍冬藤四兩

右作四劑水煎服

牛膠散七十 治癰疽使毒不內攻不轉惡證有益無

損

牛皮膠

廣中明
者四兩

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者加白

湯

明膠飲子

七

治一切癰疽癰毒

明廣膠

蛤珠粉

粉甘草各一兩

橘紅五錢

右作三劑水煎服

護心散

七

解金石砒研發疽之毒

綠豆末一兩

明乳香

半兩研細

右以生甘草煎湯調時時與呷務使藥氣常在膈間

清心內固金粉散

七

一名金花散

解毒清心流

行氣血散滯清火凡焮腫熱痛飲食如常大者宜用之

綠豆

四兩研末

硃砂

另研人參

甘草

白茯苓

各三錢

朴硝

另研白豆蔻

各五分

麝香

另研

雄黃

各一錢

冰片

五分

右為末每服一二錢蜜湯調下

蠟礬丸七四 一名黃礬丸 治金石發疽一切癰疽

托裏止疼痛護臟腑神妙不問老少皆可服之

黃蠟 一兩黃色佳者溶開離火入礬末○一方
止用七錢

白礬 一兩明亮淨者研末

右二味和勻衆手急丸桐子大每服二三十丸漸加
至四五十丸熟水或鹽湯送下日進二三服服至三
四兩之上愈見其功矣○如服金石發疽別用白礬
末二兩作三五服溫酒調下尤效○有人遍身生瘡
狀如蛇頭名曰蛇頭瘡尤宜服之○治蛇蝎毒蟲咬

傷熔化熱塗傷處痛止毒出仍服兩許○此方不惟
止痛生肌而已其護膜止瀉消毒化膿及內癰排膿
托裏之功甚大

千金化毒丸

七五

治諸惡毒

用白礬三錢糊丸以葱頭七莖煎湯送下則腫痛俱
退再用仙方活命飲二劑以去其餘毒此本方原用
礬末以葱湯調服因湯難服故易為丸○一方止治
瘡疽不問腫潰先用此藥二三服後用消毒藥甚效

常治芻蕘之人用此即退不用托裏藥亦愈若金石
毒藥發疽者尤效蓋礬能解金石之毒也○一方用
礬末五錢硃砂五分熟酒下亦效此藥托裏固內止
瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易
得其功甚大偏僻之處不可不知此方或虫蛇所傷
溶化熱塗患處更以熱酒調末服皆效

五福化毒丹七六 治咽喉牙口瘡毒腫痛並小兒一
切熱毒瘡癧驚惕煩躁口舌生瘡夜臥不寧等證

玄參

桔梗

各二兩半

茯苓

三兩半

人參

牙硝

青黛

各一兩半

甘草

七錢半

麝香

少許

金箔

二十片

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯化下○若痘毒上攻口齒生瘡以生黃汁化服及用雞翎掃付患處

奪命丹

七七

治療瘡發背等證或麻木或嘔吐重者

昏憒此藥服之不起者即起不痛者即痛痛甚者即

止昏憞者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰有奪命之功乃惡證中之至寶也

蟾酥

酒化

輕粉

麝香

各五分

枯礬

寒水石

煅

銅綠

乳香

沒藥

各一錢

硃砂

三錢

蝸牛

二十個另研無亦可

右為末用蝸牛或酒糊搗丸綠豆大每服二三丸溫酒葱湯下或用葱白三四寸病者自嚼爛吐於手心包藥在內用熱酒和葱送下如人行五七里汗出為

效重者再服一二丸或外用一丸入瘡口內以膏藥貼之

飛龍奪命丹七八 治一切疔瘡毒瘡出汗則愈神效

乾蟾酥二錢

乳化

沒藥

硼砂

寒水石

煅

雄黃各三錢

乳香

硃砂

血竭

嚼成餅者真

枯礬

各一錢

輕粉

冰片

各五分

蜈蚣

一條去頭酒浸焙乾

蝸牛

四十九個研為膏或無亦可

右各研為細末取蝸牛蟾酥研勻入諸末熟杵丸綠

豆大硃砂為衣每服四五丸嚼葱白一口吐在手心
將藥包葱內用溫酒吞下須臾汗出或少吐瀉毒即
解

立齋曰前回生丹乃慄悍攻毒之劑也蓋無經不至
無氣不動者後奪命丹尚緩若食一切禽畜毒物及
瘡脉浮緊細數毒畜在內並惡毒證凡宜汗吐者當
用前丹有神效若老弱之人或瘡毒稍輕者宜用後
丹或更以隔蒜灸之為良

回生丹七九 李願顏先生口授非泛常之藥萬寶之秘專治一切疔毒並有神效

金脚信

明硝砂

明乳香

半夏

上紅丹

各五分

巴豆肉

不去油

明雄黃

大南星

南硼砂

各一錢

大斑貓

十五個去頭足翅

右為細末旋取蟾酥和丸麻子大硃砂為衣每服十五丸好酒下看瘡生上下食前後服能飲者至醉為佳凡腫毒失治毒氣入腹用此藥能起死回生服藥

後吐瀉俱作乃甦

通氣散八十

治時毒瘡甚咽喉不利取嚏以泄其毒

玄參半

一錢

牙皂

川芎各一錢

藜蘆五分

一
方無此

羊躡躅花半

二錢

右為末用紙撫熊少許入鼻內取嚏為度○按此方止用皂角川芎北細辛三味即可亦不必藜蘆躡躅之毒品也總不若通關散為妙方在因陣九十八

梔子仁湯八一

方在寒陣十九

治發熱狂躁咽喉腫痛

六味梔子仁湯八二 治時毒腫痛大便秘結脉沉數

山梔

炒

枳殼

大黃

煨

升麻

牛蒡子

炒

鬱金

等分

右水煎服或為細末每服三錢蜜水調下

清肝益營湯八三

治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結

核或耳項胸乳脇肋作痛並一切肝火之證

山梔

當歸

木瓜

不犯鐵

茯苓

各一錢

柴胡

芍藥

川芎

各七分

龍膽草

八分

白术

二錢

熟地

一錢半

炙甘草

五分

右薑水煎服

清心湯

八四

治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧

右方即防風通聖散每料加黃連五錢每劑用一

兩水煎服方在攻陣十六

濟陰湯

八五

治瘍毒純陽腫痛發熱

連翹

二錢

山梔

炒

黃芩

炒

黃連

炒

甘草各一錢半 茄藥一錢半 牡丹皮一錢二分 金銀花三錢

水煎服 大便若秘量加大黃

地骨皮散八六錢半 治瘡瘍氣虛內熱煩渴不寧

人參 黃芪 生地黃 地骨皮

柴胡各一錢半 白茯苓 石膏煅 知母各一錢

水薑煎服

一味苦參丸八七 治一切癰疽毒瘡焮腫作痛或煩

躁

苦參 不拘多少為末

右用水糊丸桐子大每服二三錢溫酒下

陳氏 苦參丸 八八 治便身搔痒癬疥瘡瘍

苦參四兩 玄參

黃連

大黃

獨活

枳殼

防風

各二兩

黃芩

梔子

菊花

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大食後茶酒任下三四十九日

三服

五利大黃湯 八九 治時毒熾腫赤痛煩渴便秘脉實而數

大黃 煉 黃芩 升麻 芒硝

梔子

錢各一

升麻

錢各二

芒硝

水一鍾半煎六分空心熱服

清涼飲 九十 治癰瘍熱毒熾盛大便秘結○此即前

連翹消毒散

連翹

一兩

大黃

山梔子

薄荷

黃芩

各五錢

甘草

一兩半

朴硝

二錢半

右每服一兩水煎服

宣毒散

九一

治一切癰毒其功不可盡述

大黃

煨

白芷

各五錢

水二鍾煎一鍾食前服

立齋曰此方乃宣通攻毒之劑若脉沉實便秘者毒在臟也宜服之其功甚大若臟腑調和脉不實者不可用醫林集要方用大黃一斤白芷六兩為末每服

三錢熟酒調下更用茶清調搽患處名曰萬金散蓋因其功而珍之也或用水跌為丸以便於服亦可吳江申僉憲兄患背疽堅硬脉沉實乃毒在內用一服大小便下汚物再服而消恐患者忽此二藥故以此嘗驗者告之

拔毒散九二 治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香 沒藥 當歸 穿山甲炮

木鱉子 連翹各一錢 甘草炙五分 瓜蔞仁八分

牙皂

炒

貝母

各七分

忍東藤

二錢

大黃

生熟各一錢半

右水酒各一鍾煎一鍾食前服○此方攻毒止痛化

膿之良劑也屢用屢驗若膿成或已潰者大黃可不

用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖

潰脉仍洪數或沈實喜冷者火邪尚在又所宜用

內疎黃連湯

九三

治瘍瘍發熱而嘔大便秘結脉洪

而實

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香 黃芩 桔子 薄荷

桔梗 甘草各一錢 連翹 大黃各一錢半

薑水煎仍量虛實治之

桃仁湯九四 逐瘀血

桃仁 蘇木各一兩 生地黃五錢 蟲蟲去足炒

水蛭炒各三 十個

右每服三錢水一盞煎六分空心服

漏蘆湯九五 治腦疽癰疽毒盛實者

漏蘆

黃芪

甘草

連翹

沉香

錢各五

大黃

一兩微炒

右每服四五錢薑棗水煎服

千金漏蘆湯
九六治癰疽發背丹疹時行熱毒赤腫

癩痛

漏蘆

黃芩

白薇

連翹

枳殼

炒

升麻

粉草

麻黃

去節

大黃

濕紙裹煨

朴硝

各一內

右每服五六錢薑水煎去粗空心服下惡物為妙

漏蘆升麻湯

九七

治時毒頭面紅腫咽嗌堵塞水藥

不下若臟腑素有積熱發為腫毒疙瘩一切紅腫惡

毒

漏蘆

二錢

升麻

一錢

黃芩

酒洗

生甘草

玄參

牛蒡子

研炒

苦梗

連翹

各一錢

藍葉

如無用
青黛

大黃

酒浸量輕

重用之

水煎服大利之結者加芒硝

潤腸丸 九八 治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸通之若結在直腸宜用猪膽汁導之蓋腎立五液開竅於二陰若津液滋潤則大便通調若津液不足脾氣虧損必當培補乃忌此藥

桃仁去皮尖兩 麻子仁各一錢 羌活各一錢 歸尾

大黃煨 驛刺各一錢 秦艽各五錢

右各另研為末煉蜜或猪膽汁九桐子大每服三四十九白湯下若用猪膽汁導而糞不結燥者須急補

元氣

沒藥丸 九九善逐滯血

當歸一兩桂心

芍藥各半去皮
桃仁去皮
大研

沒藥

錢各三
蟲去足
翅膀
水蛭
炒各三
十個

右為末醋糊丸桐子大每服三五丸空心醋湯下

當歸丸 百行血利水通大便

當歸

半兩

大黃

桂心

錢各三

赤芍藥

芎藭

錢各二

人參

甘遂

麪裹煨

半錢

煉蜜丸如彈子大空心米飲化下一丸

破棺丹

百一

治瘡瘍熱極汗多大渴便秘譫語發狂

大黃

二斤半半
生半熟

芒硝

甘草

各二
兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸童便酒化下白湯

亦可

忍冬酒

百二

解諸癰毒

忍冬藤 鮮者四五兩若乾者止用一兩搗

大甘草節 一兩生用

二味入砂鍋內以水二鍾煎至一鍾再入無灰酒一
鍾又煎數沸去粗分三服病重者晝夜兩劑至大小
便通利為度另用忍冬藤研爛入酒少許罨患處

金銀花酒

百三

治一切癰疽發背疔瘡喉痺等證

用金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚
者不過三五服可保無虞

槐花酒

百四

治癰瘍熱毒最妙

用槐花四五兩炒微黃乘熱入酒二鍾煎十餘滾去

粗熟服未成者二三服已成者一二服但察其有熱
毒未清者皆可用槐花治濕熱之功最為神速惟胃
寒者不宜服大抵腫毒非用蒜灸及槐花酒先去其
勢雖用托裏諸藥其效未必能速

蒲公英酒百五 治乳癰吹乳不問已成未成皆可用
用蒲公英一握搗爛入酒半鍾取酒溫服粗貼患處
甚者不過三五服即愈

遠志酒百六 能托散諸毒治女人乳癰尤效

遠志 不拘多少用米泔浸洗槌去心

右為末每服三錢用好酒一鍾調遲少頃澄清飲之

以滓敷患處

牛膝酒

百七

治楊梅風毒腰痛

牛膝

川芎

羌活

五加皮

杜仲

甘草

地骨皮

薏仁各一
兩

生地黃

十
兩

海桐皮

二
兩

右咬咀用帛裹入無灰酒浸二七日夏月三五日每

服一盃日三五次

消癰酒

百八

昆布

三錢

海藻

五錢

沉香

雄黃

各一錢研末

海螵蛸

二錢

右為咀用好酒一升湯煮任意每服一二鍾或浸十
餘日亦可飲

桑枝煎

百九

大治口渴

取嫩桑枝細切一升炒以水三升煎一升日服三五

劑更多尤妙抱樸子云療風痺乾燥臂痛脚氣四肢拘攣上氣眩暈久服補肺消食利小便輕身耳目聰明令人光澤其功不能盡述

神仙截法百十 治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

真麻油 一斤銀器內熬十數沸候冷

右用酒兩碗入油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之○吳安世云吾家三世用之無有不效又聞

獵者云凡中藥箭急飲麻油藥毒即消屢用甚驗○

按右方凡大便秘結而毒蓄於內者最宜用之以疏通其毒若陰毒及大便不實者乃非所宜

砭法百一

治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器
擊碎取有鋒鎚者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用
線縛定兩手指輕撮筋尾令磁鎚正對患處約七寸
許再另用筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出毒自

減退若毒氣入腹膨脹者難治

刺少商穴百十二 治咽喉急痛

穴在手大指內側去爪甲角如韭葉刺入二分許以手自臂勒至刺處出血即消若重而膿成者必須針患處否則難治

洪丞相蜞鍼法百十三 凡癰瘍勢焮毒盛血凝不散

者宜用此法以殺其勢

治癰初作先以筆管一箇入大鷁蝗一條以管口對

瘡頭使蜞吮惡血得去其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴蜞必死矣屢試屢效若血不止以藕節上泥塗之即止若瘡頭未明以井邊泥塗之先乾處即是

騎竹馬灸法

百十四

治一切瘡無有不愈

其法令病人以手肘凭几而坐男左女右將手臂豎起要直乃用竹篾一條自臂腕中曲處橫紋間量起貼肉直上至中指尖盡處截斷為則不量指甲另用

竹杠一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人扛起
令病者脚不着地仍使人扶定勿令偃仆却將前量
臂箋從竹杠上尾骶骨坐處直貼脊背量至箋盡處
記之此取中之處非灸穴也又用薄箋量男左女右
手中指節兩橫紋處截為同身寸法將此寸箋即安
前脊中點記處兩邊各開一寸盡處即是灸穴各灸
五七壯疽發於左則灸右疽發於右則灸左兩邊俱
甚則左右皆灸蓋此穴乃心脉所過之處凡癰疽皆

心火之留滯灸此則心火流通而毒自散矣有起死回生之功屢試屢驗

神仙隔蒜灸法

百十五

治一切癰疽瘡毒大痛或不

痛或麻木及治痘疔毒氣熾成使諸痘不能起發已
起發者不能貫膿已貫膿者不能收齷等證如痛者
灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散此攻散鬱
毒從治之法也大有回生之功其法用大蒜頭去皮
切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之五壯換蒜

復灸或三五十壯或一二百壯愈多愈妙未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換或陰毒紫白色不起發不痛不作膿者尤宜多灸仍服托裏之劑如灸後仍不痛或不作膿不起發者不治此氣血虛極也

附子餅百十六 治潰瘍氣血俱虛不能收斂或風寒襲之以致血氣不能運行皆令不斂用炮附子去皮臍研末以唾津和為餅置瘍口上將艾壯於餅上灸

之每日灸數壯但令微熱勿令痛如餅乾再用唾津
調和務以瘡口活潤為度

豆豉餅

百十七

治瘡癆腫毒硬而不潰及潰而不斂

並一切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅為末唾津和作餅
子如錢大厚如三文錢置患處以艾壯於餅上灸之
乾則再易如灸背瘡用漱口水調餅覆患處以艾鋪
餅上灸之如未成者即消已成者亦殺其大毒如有
子效必氣血虛敗也

木香餅

百十八

治一切氣滯結腫或痛或閃肭及風

寒所傷作痛並效

水香

五錢

生地黃

一兩

右以木香為末生地黃杵膏和勻量患處大小作餅置腫處以熱熨斗熨之

香附餅

百十九

治療癰瘍流注腫塊或風寒襲於經絡

結腫或痛

用香附為末酒和量瘡毒大小作餅覆患處以熱熨

斗熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用
薑汁作餅

神效桑枝灸

百二十

治發背不起或瘻肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃着
吹熄其焰用火灸患處片時日三五次以助腫潰若
腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘻癰流注膿
瘡惡瘡久不愈者亦宜用之大抵此法未潰則解熱
毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉若

陽證腫痛甚或重如負石初起用此法出毒水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜患者不知有此治者亦不肯用此也

神效葱熨法

一二一

治流注結核骨癰鶴膝肢體腫

塊或痛或不痛或風寒襲於經絡流注肢體筋攣骨痛或跌撲損傷止痛散血消腫之良法或先用隔蒜灸法而餘腫未消最宜用熨以助氣血而行壅滯其功甚大用葱頭細切杵爛炒熱敷患處冷即易之再

或熟熨數次腫痛即止其效如神○或用葱煎湯薰洗傷處亦妙○或用葱一大把束其數節切為薄餅置患處用熱物熨之或鋪艾灸之亦可必易餅多熨為妙

神仙薰照方 一二二

雄黃 珠砂 血竭真者沒藥各一錢

麝二分

右五味研細末用綿紙捲為粗撫約長尺許每撫中

入藥三分裏定以真麻油潤透點灼瘡上須離瘡半寸許自紅暈外圈周圍徐徐照之以漸將撫收入瘡口上所謂自外而內也更須將撫猛向外提以引毒氣此是手法此藥氣從火頭上出內透瘡中則毒隨氣出自不內侵臟腑初用三條漸加至五七條瘡勢漸消可漸減之薰罷隨用後敷藥

廣陵李杜云背瘡所患惟內攻與外潰耳證屬火毒醞釀斯成不能外散勢必內攻不能中出勢必傍潰

醫者往往以涼藥圍解多罹此二患又陰瘡不起發者止有隔蒜灸一法然亦未見鑿鑿取效此方初用藥撚薰照以火引火毒氣外散後用藥敷圍追膿止痛毒從孔竅及瘡頂中出可免傍潰矣陰瘡一照即起紅暈狀如蒸餅變為陽證可保無虞此其奇中大畧也照法日每一次初次用撚三根或四根次日用四根或五根再次漸至六七根止大率看瘡輕重酌撚多寡重者不過六七日腐肉盡化為膿從瘡口中

陸續湧出新肉如石榴子纍纍而生此時不必再照圍藥始終如一隨瘡勢大小漸漸收入照圍後不可聽醫用膏藥貼蓋以致毒氣怫鬱止剖葱葉量瘡口貼之凡照時先須用猪蹄煎湯澄清洗去圍藥如法薰照待瘡勢大愈肉生將蒲始可用生肌散或護以太乙膏平復後膏藥猶不可離此其始末細微也內服者大要不出十宣散護心散等方最忌寒涼恐傷胃氣此瘡由惱怒鬱結厚味所致受病以年計愈久

則愈甚也調攝之法非懲忿窒慾清散托裏治以前
方即盧扁復生有望而走耳又前方初止治背疽其
後一切腫毒無不收功蓋法無定則醫貴變通神而
明之存乎其人耳余不佞善病故留心方術然未經
累驗不輕授人此一方初驗於化南再驗於陳大叅
景山及范中翰舍初其他證亦曾用以推廣皆應手
取效輒贅其詳於此其傳則道人孫氏今大播廣陵
余先慈賴以保安者廿年云

池陽來陽伯云王孝廉良甫為余言廣陵人有善神燈照者療渠發背神良已求得其禁方矣余識之已酉歲余客廣陵偶桁腫比于股招所謂善療者照之不膿得愈又館友胡舍素患發背大如覆盂神情懵憒矣延瘍醫至束手待肉腐糜方可用膏徐長肌肉問其術曰至此問其候曰百日果如其說則舍素將成烏有矣遂急同弟輩求得前方刻本按法治之一日痛止二三日神清如脫桎梏釋重負肉腫如盂者

日縮而小並未嘗腐糜也不月餘膿盡爽然起矣奇
矣哉不表而汗不針而潰不灸而陷舉不補而實不
下而毒盡凡醫人之針刺不必用也至理歸於易簡
大道本在目前所謂不可思議者也古今道術入
妙者皆如此類茲重刻之故為此叙

曲梁聶雲翰云戊戌春暮余病疽京邸疽據背中前
與心對初發微若黍粒搔之痛痒關心寒熱交作甫
十日大若升再十日大若斗食逆便結匝月日不一

瞬醫方所載諸死候業已十犯八九兩絕復甦自分無生手條後事偶從楊楚璞得李肖衡所傳異人指授仙方如法薰敷越二日毒漸解迺有起色不易方而竟就痊距初發浹廿旬歸家出以試人輕僅踰月重亦不出百日靡不起者蓋余所感毒極重勢極大又治極遲即二三内外科名家皆束手失色以為從所未聞未見及試人則取驗更捷蓋感有輕重治有遲蚤也顧念非此異方不能起余心死異證非余起

死回生不能白此方之神異余以此方活安忍天下人以此證危因慮此方莫獲廣沛於天下又慮天下忽視此方而不加篤信或亂於耻功不已出之醫口疑似轉盼間致悞大事而悔無及也因贅數語以為此方之引

咸林王維英云丙午端陽日余左臂患疽其大如拳用騎竹馬法灸之百十壯疮起如銅錢四圍腫覺退笥中蓄此仙方命製藥料欲俟破後薰之不識其初

亦可薰也客有備言可薰者因於當日即薰十條瘡
頂高收四圍色白夜間毒肉從邊化為稠膿徐徐內
漬粘同膠鰻每日如法薰照洗貼五六日中尖毒肉
脫落一條共有十三孔瘡外一指許傍串三孔且痛
且痒即極力照之初出黃水次出稠膿後流清漿瞬
息口收並未再串其原載敷藥長安中若不產希薰
五龍二草止用金銀花三色敷之乾則覺痛即去之
不敷並未用生肌散惟護以太乙膏月餘盡痊當此

瘡將愈左臂又患一疽正對無二即照撲十條敷以
麸炒醋調文蛤膏一日數更次日五條三日頂破膿
出不痛不痒其毒盡散同時有患別瘡者余付此藥
薰之隨薰即散並未成形迺知是方也真仙方哉真
仙方哉持此療瘡天下無瘡矣余恐世人但知瘡破
後可照不識照初發者尤易散又恐因敷藥不全並
棄前方不識敷藥不用亦可也故備述終始以神此
方之用

洗藥神效散一二三 洗陰濕諸瘡

蛇床子二兩 朴硝一兩

右每用一兩水二碗煎數沸洗瘡拭乾摻生肌藥
雄黃解毒散一二四 治一切癰腫潰爛毒勢甚者先
用此藥二三次以後用猪蹄湯

雄黃一兩 白礬四兩 寒水石煅一
兩半

右俱為末用滾湯二三碗乘熱入藥末一兩洗患處
以太乙膏或神異膏貼之

猪蹄湯一二五

治一切癰疽杖瘡潰爛去惡肉潤瘡

口止痛

白芷

黃芩

當歸

赤芍藥

獨活

生甘草

露蜂房

連子者佳
各五錢

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油粗取清湯入前藥
一兩許煎十數沸去粗溫洗惡肉隨洗而下隨用
膏藥貼之○按此湯不必用黃芩或以白礬易之更

佳

集香散 一二六 洗癰疽潰爛

白芷

藿香

茅香

香附

防風

錢各三

木香

甘草

錢各一

右用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

立齋曰此乃馨香之劑也血氣間香則行得臭則逆也凡瘡毒將盡末盡宜用之若有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後用此方洗後湏即用膏藥貼護勿使風入肌肉易生直至收口為度最忌用生肌之藥

敷藥方 一二七

車前草 蒿蕎草 金銀花 五爪龍草

右四味鮮草一處搗爛加多年陳米粉即常用繖衣者初起時仍加飛鹽少許共調為稠糊敷瘡上中留一項拔膿出若冬時無鮮者用乾葉為末陳醋調敷亦可或五龍草一時難得即單用三味亦能奏功不必拘執也○陽伯曰瘡毒初起毒盛者須內服敗毒藥數劑其有氣血薄弱者亦須用托裏藥數劑則萬

全之計耳

秘傳圍藥鐵井欄 一二八 敷一切惡毒即收斂消腫

神效

牛糞灰 晒乾燒灰用新磁礮盛之乾處加倍用

鐵線草 草烏 文蛤 白芨

白芨

貝母心

陳小粉

炒極黃色各等分

右為末用高醋熬熱調藥如糊敷瘡四圍中留錢孔
以出毒氣乾則易之瘡勢惡甚者用飛龍奪命丹等

藥出汗無不效

大黃揭毒散

一二八

敷熱壅腫毒

大黃

一兩半

白芨

一兩

朴硝

二兩

右為末井水調搽乾則潤之

草烏揭毒散

百三十

治一切癰疽腫毒

草烏

貝母

天花粉

南星

芙蓉葉

等分

右為末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾用醋潤之

全
卷之二
三
抑陰散 一三一 治瘡瘍元氣虛寒，焮腫不消或不潰，
歛或筋攣骨痛一切冷證

草烏 二兩 南星 煙 赤芍藥 炒 白芷 各一

肉桂 五錢

右為末，葱湯調塗，熱酒亦可

抑陽散 一三二 一名洪寶丹 治瘡屬純陽，腫痛發熱

熱

天花粉 三兩 薑黃 白芷 赤芍藥 各一

右為末茶湯調搽患處

陰陽散

一三三

治瘡屬半陰半陽

紫荆皮

炒五
兩

獨活

去節炒
一兩

赤芍藥

炒白芷
一兩

石菖蒲

各二
兩

右為末葱酒調搽

神功散

一三四

諸發背癰疽及諸瘡不問腫潰皆效

黃柏

炒

草烏

炒各
一兩

右為末用漱口水調入香油少許搽患處如乾仍用

水潤之

清涼救苦散 一三五 治大頭瘟腫甚者以此藥敷之

芙蓉葉 霜桑葉 白斂 白芨

大黃 黃連 黃芩 黃柏

白芷 雄黃 芒硝 山茨菰

赤小豆 南星 金線重樓

右等分為末蜜水調敷腫處以翎頻掃之

二黃膏 一三六 敷一切腫毒熱浮在外或時氣熱壅

者

黃柏

大黃各等分

右為末用醋調傅如乾用水潤之

迴陽玉龍膏

一三七

治陰疽發背寒邪流注風濕冷

痺諸脚氣冷痛無紅赤者及跌撲所傷為敷涼藥或人元氣虛寒腫不消散或不潰斂及壅腫堅硬肉色不變久而不潰潰而不斂或鼓雄風筋攣骨痛一切陰寒冷證第一藥也

草烏

肉桂

各五錢

薑黃

炒南星

白芷

赤芍藥

炒各二兩

右為末葱湯或熱酒調塗

沖和膏一三八 治一切瘡腫不甚煥熱積日不消

紫荆皮

炒五兩

獨活

去節炒三兩

赤芍藥

炒二兩

白芷

菖蒲

各二兩

右為末葱頭煎湯調搽

麥飯石膏

一三九

治瘡疽初起先以麥飯石膏塗之

俟瘡根漸收即敷神異膏斂之但麥飯石膏難於脩
合用神異膏亦效

白麥飯石 炭火煅醋淬數次研極細二兩〇據
本草所載凡石如飯團粒粒粘結成塊者即是
皆可用也

鹿角 生取帶腦骨者斷之用炭火燒烟盡研極
細四兩

右用米醋調和入砂器煎以竹片不住手攪熬成膏

先用猪蹄湯洗患處以鵝翎拂塗四圍乾則以醋潤之若腐爛者用布帛攤貼之○李氏曰麥飯石膏治發背癰疽神妙惜世罕知有患癰不潰而危者全用此膏一夕頓潰凡疽得膿其毒始解或有不潰者須用此膏故錄之俾精擇修合以取十全之功也嘗見世間醫者每有妙方秘而不傳或更改以惑人誠可惡也余思西華麥飯石膏守死不傳其立心私刻君子鄙之矣

黑末子

百四十

治癧毒

用羊角連內骨燒存性為末酒調三錢分上下服之
瘡可散○立齋曰此方未嘗用蓋秘方也嘗治面上
或身卒得赤斑或痒或癩毒此而不治亦可殺人以
殺羊角燒存性研為極細末以雞子清調塗之甚效
本草亦云然

乳香定痛散

一四一

治瘡瘍潰爛疼痛不可忍諸藥

不效者

乳香 没藥各二錢 寒水石 煅滑石各四錢

冰片一分

為細末搽敷患處痛即止此方乳沒性溫佐以寒劑制之故寒熱之痛皆妙

烏金膏一四二

治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起腫痛用點數處則解毒頓消若癰肉腐黑塗之即潰若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙

撫熙維其內有等發背因元氣虛弱或因耗伐元氣
虧損毒氣散漫中點外赤不腐不潰須服大補之劑
中塗三四寸許至五六日間赤點之界自有裂紋如
刀劃之狀中央漸潰漸脫內用純陽之藥以接其元
氣庶能收斂若妄用刀鍼去肉出血則陽隨陰散元
氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益
適以害之矣○其方用巴豆去殼炒黑研為膏點腫
處或塗瘻肉上則自消化或加乳香少許亦可如塗

瘡內或加香油少許調稀可用若餘毒不斂者以此
紓之不致成痛

透骨丹

一四三

此潰膿藥外科不可缺

蟬酥

硼砂

輕粉

巴豆

各五錢

蝸牛

二箇

麝香一分

右先將巴豆研如泥次入蝸牛麝香再研後入各藥
研極細以小磁瓶收藏每用少許以乳汁化開先用
鐵輕輕撥破毒頭挑藥米粒許納於瘡口外用清涼

膏貼之

鐵頭散一四四

治一切頑瘡內有膿管瘀肉或瘰癧

結核不化瘍口不合宜此藥追蝕腐之

赤石脂

五錢

輕粉

麝香

各五分

乳香

白丁香

各三錢

生砒

黃丹

各一錢

蜈蚣

一條乾

右為末搽瘍肉上其肉自化若瘍口小或痔瘡用糯米糊和作細條陰乾綃入外以膏藥貼之凡瘍口久不合者內有膿管必須用此腐之內服托裏之藥

代鍼膏一四五 治瘡瘍膿熟不潰

乳香二分 白丁香真者是一分 巴豆炒焦一分 碱各五分

右為末熱水調點瘡頭上常以碱水潤之勿令其乾
替鍼丸一四六 治膿成不潰者

白丁香 硖砂另研一分 真沒藥 乳香各一匙

糯米 四十粒先以礦灰拳大一塊置磁碗內量
入井水待熱氣將息以米排入灰中良久候米如
水晶狀取出用之如米未就再用灰製

右各另為末然後和勻收貯用時以飯丸麥粒大每
用一粒水濕粘瘡頭上其膿自出○凡瘡癆血氣壯
實膿成不潰者宜用此藥以洩其毒則肌肉易生瘡
口易斂若氣血虧損者須用甘溫之劑以培根本否
則不惟不潰且難收斂若附骨疽及繫要之地當及
時針砭出之為善

三合散一四七 治癰疽不肯作膿

新巴豆肉 明矾 班貓等分

右為細末納瘡內惡肉自化

立齋曰此方藥性大毒果有惡毒之證宜用腐之取其以毒攻毒也若以陽氣虛不能腐化成膿者宜用大補之劑及桑木灸之丹溪云氣血壯實膿自湧出大抵瘡之潰斂遲速總由血氣之盛衰使然也

藜蘆膏一四八

治一切瘡疽胬肉突出不問大小長短用藜蘆一味為末以生豬脂和研如膏塗患處周日易之

生肌散一四九 治瘡口不合

木香

輕粉各二錢

黃丹

枯礬各五錢

右為細末用猪膽汁拌勻晒乾再研細摻患處

立齋曰此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增腐爛耳若此方誠有見也

收口粉藥

百五十

李氏云龍遊有患背疽者大潰五臟僅隔膜耳自謂必死用鯽魚去腸實以羯羊糞燥為末乾糝之瘡口自收此出洪氏方屢用有效故附於此須候膿少欲生肌肉時用之

桔梗湯一五一 治欬嗽吐膿痰中有血胸膈兩脇作痛煩悶作渴或出臭濁已成肺癰證

桔梗炒 貝母 當歸酒浸 瓜萎仁

枳殼麸炒 薏仁 桑白皮炒 百合蒸各一錢五分

五味子

炒

知母

炒

地骨皮

甜葶苈

炒

甘草節

防已

黃茂

杏仁

各五分

水二鍾煎服

濟生桔梗湯一五二

治肺癰欬嗽膿血咽乾多渴大小便赤澁方如前但少五味草藥知母地骨皮四味○

用水二鍾薑五片煎八分食遠服大便秘者加大黃

人參五味子湯一五三

治氣血勞傷欬嗽咯血寒熱

往来夜出盜汗羸瘦困乏一切虛損肺痿之證並治

人參 五味子 熟地黃 當歸 酒炒

白术 炒 白茯苓 灸甘草 陳皮

桔梗 炒 前胡各一 黃茂 灸 地骨皮

桑白皮 炒 枳殼 炒 柴胡 錢各七

水一鍾半生薑三片煎八分食後服

四順散 一五四 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

貝母去心 紫苑去苗 桔梗 炒各一 甘草 七分
錢半

水一鍾半煎七分食遠服如欬嗽加杏仁亦可為末

白湯調服

合歡飲

一五五

治肺癰久不斂口

用合歡皮 白斂 二味同煎服 合歡皮即槿樹
皮也亦名夜合

紫苑茸湯

一五六

治飲食過度或煎燙傷肺欬嗽咽

乾吐痰唾血喘急脇痛不得安臥肺痿等證

紫苑茸

去苗

桑葉 級霜者

款冬花

百合

蒸焙

杏仁

去皮尖

阿膠

蛤粉炒

貝母

去心

半夏

製

蒲黃

炒各一錢

人參

犀角

鎊末各一錢

甘草

炙各五分

水一鍾半生薑三片煎七分入犀末食後服

升麻湯

一五七

治肺癰胸乳間皆痛吐膿腥臭

川升麻

桔梗

炒薏苡仁

地榆

黃芩

炒

赤芍藥

牡丹皮

生甘草各一錢

水二鍾煎八分食遠服

如金解毒散

一五八

治肺癰

桔梗

一錢半

甘草

一錢半

黃蓮

炒

黃芩

炒

黃柏 炒
山梔 炒各
七分

水二鍾煎八分徐徐陸續飲之不可急服○按此方乃降火解毒之劑也凡發熱煩渴脉洪大者用之即效若脉數欬痰腥臭或唾膿瘀者宜用桔梗湯

如聖柘黃丸一五九 治肺癰欬而腥臭或唾膿瘀不問膿之成否並效肺家之病雖有方惟此方功效甚捷不可忽之

柘黃一兩
為末 百齒霜即梳垢
二錢

用糊為丸如桐子大每服三五十丸米飲下○柘黃乃柘樹所生者其色黃狀如靈芝江南最多北方鮮有

葶藶散

百六十

治過食煎燙或飲酒過度致肺壅喘

不能臥及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶

桔梗

炒

瓜萎仁

川升麻

薏苡仁

桑白皮

炒葛根各一錢

甘草

炙五分

水一鍾半生薑三片煎八分食後服

知母茯苓湯一六一

治肺痿喘嗽不已往來寒熱自

汗

知母

炒

茯苓

炙甘草

人參

白术

五味子

炒

麥門冬

半夏

製

薄荷

桔梗

柴胡

款冬花

各一錢

阿膠

蛤粉炒

黃芩

炒各二錢

川芎

五分

水二鍾薑三片煎一鍾食遠服

四味排膿散一六三 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬

嗽

嫩黃芪

鹽水炒

白芷

五味子

研炒

人參等分

右為細末每服三錢食後蜜湯調下

八味排膿散一六三
治腸癰小腹脹痛裏急後重脉
滑數或時時下膿

黃芪

炒

當歸

酒拌

金銀花

穿山甲

蛤粉炒

白芷

防風

連翹

瓜萎

各三錢炒

水二鍾煎八分食前服或為末每服三錢食後蜜湯

調下如膿將盡去川山甲連翹倍當歸加川芎

薏苡仁湯一六四

一名瓜子仁湯

治腸癰腹中疔

痛或脹滿不食小便短澁婦人產後多有此證縱非
癰服之尤效

薏苡仁炒五錢 瓜萎仁三錢 牡丹皮 桃仁去皮尖各二錢

右水煎空心服

牡丹皮散一六五 治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮 人參 黃芪 炒 白茯苓

天麻 白芷 桃仁去皮 薏苡仁

當歸 川芎各一錢 官桂 甘草各五分

木香三分

右水煎服

梅仁湯一六六 治腸癰壅痛大便秘滯

梅仁九個去皮尖 大黃炒 牡丹皮 芒硝

犀角鋸各一錢 冬瓜仁三錢研

右水煎入犀角末服

大黃湯一六七

一名牡丹皮湯

專治腸癰小腹堅

腫而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數
汗出憎寒其脉沉緊膿未成者急服之

牡丹皮

瓜萎仁

各三錢

桃仁

去皮尖

大黃

煨

芒硝

各二錢

水二鍾煎一鍾食前服○本方去瓜萎即名大黃壯
丹湯○立齋曰此方乃行血破血之劑也如發熱自
汗惡寒小腹作痛小便如淋脉未數者有效丹溪曰

小腹腫痞按之痛小便如淋或自調發熱身無汗復惡寒其脉遲緊者膿未成宜下之當有血此結熱所成也故金匱用大黃利之即此方也若無前證恐不宜用其有脉滑數腹內脹痛或時時後重而膿已下宜用八味排膿散蠟礬丸及托裏之藥

射干湯一六八 治胃脘癰吐膿血

射干去毛山梔仁 赤茯苓 升麻各一錢

白术 五分 赤芍藥一錢半

右水煎服

槐花散一六九 治腸風臘毒下血

槐花 炒 熟地黃 青皮 白朮 炒

荆芥穗 當歸身酒拌升麻各一川芎錢四分

右為末每服三錢空心米飲調下水煎服亦可

除濕和血湯百七十 方在和陣二一九

治陽明虛陷濕熱便血腹痛

夏枯草湯一七一 治療癰馬刀已潰未潰或日久漏

者

夏枯草 六兩

水二鍾煎七分去粗食遠服○此生血治療癰之聖藥虛甚者當煎濃膏服並塗患處多服益善兼十全大補湯加香附貝母遠志尤善

必效散

一七二

治瘰癧氣血尚無虧損癰核不愈內

服此藥外以鍼頭散腐之若氣血虛者先服益氣養營湯數劑後服此藥服後癒毒盡下再服前湯數劑

南硼砂二錢輕粉一錢麝香五分巴豆

半個二錢去膜

白欖榔一個斑貓

四十個去頭翅同糯米炒

右同為極細末取鷄子二個去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯甑蒸熟取出曝乾研末虛者每服半錢實者一錢用炒生薑酒或滾湯於五更調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從小便出胎婦勿餌瘡毒去後多服益氣養營湯瘡口自合○此藥斑貓巴豆似為峻利然巴豆能解斑貓之毒用

者勿畏予於京師遇一富商項有癰痕一片頗大詢其由彼云因怒而致困苦二年百法不應忽有方士與藥一服即退二三再服頓退四服而平旬日而痊以重禮求之乃是必效散因修合濟人無有不效丹溪亦云必效散與神效瓦萋散相兼服之自有神效常以二劑兼補劑用之甚效故錄之但此藥雖云峻利然癰毒之深者非此不能解故宜用之惟血氣虛者不可用恐其有誤也○又一道人治此證用鷄子

七個每個入斑蝥一枚飯上蒸熟每日空心食一個
求者甚多考之各書瘰癧門及本草亦有之然氣血
虛者恐不能治也

射干連翹散

一七三

治寒熱瘰癧

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻

前胡

梔子仁

當歸

甘草

各一錢

大黃

二錢

水煎食後服

如神散一七四 治癰癧已潰瘍肉不去瘡口不合

松香末一兩白礬三錢

右為末麻油調搽乾滲亦可

遇仙無比丸一七五

治癰癧未成膿其人氣體如常

宜服此丸形氣覺虛者宜先服益氣養營湯待血氣
少充方服此丸核消後仍服前湯如潰後有瘍肉者
宜用針頭散更不斂亦宜服此丸斂後再服前湯

白术

炒

檳榔

防風

黑丑

半生半炒
取頭末

蜜陀僧 郁李仁

炮去皮

斑猫

去足翅同炒去未不用

米

甘草

各五錢

右為細末水糊丸梧子大每服二十九早晚煎甘草
檳榔湯下服至月許覺腹中微痛自小便中取下癰
毒如魚目狀已破者自合未膿者自消

肘後治癰方一七六

凡項下卒結囊欲成癰者用海藻一斤洗去鹹浸酒
飲之不可間斷須要時時飲二三盃有酒氣方妙

神效開結散一七七 消癰塊甚效

橘紅四兩

沉香

木香

各二錢

珍珠

四十九粒入砂罐內以鹽

泥封固煅亦取
出去火毒用

豬獻肉子

四十九枚

用豚豬生頂間如棗子者

右為末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小者三五
服大者一劑可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除
日於靜室修合

生地黃丸一七八 治師尼寡婦室女乍寒乍熱而患
瘡瘍及頸間結核肝脉弦長而出魚際外無寒邪內

多鬱火者宜此治之

生地

一兩
拌
膏

秦艽

黃芩

硬柴胡

各半
兩

赤芍藥

一兩

右為末入地黃膏加煉蜜為丸桐子大每服三五十

丸烏梅湯日進二服

外
臺
昆布丸一七九 治項下結囊欲成瘻者

昆布

酒洗海藻

酒洗各等分

右為末煉蜜丸彈子大含化嚥之

濟生玉壺散 百八十

治三種毒癰

海藻

海帶

昆布

雷丸

廣茂

青鹽

各半
兩

右為細末老米飲為丸桐子大不拘時噙化四五丸
神效瓜萎散一八一 治乳癰及一切癰疽初起腫痛
即消膿成即潰膿出即愈治癰之方甚多獨此方神
效療癰瘍尤效凡一切癰疽餘毒皆宜用之

瓜萎

一個
爛研當歸酒洗

生粉草

各半
兩

乳香

沒藥各一錢

右用酒煎服良久再服如不能飲以酒水各半煎之
如數劑不效宜以補氣血之藥兼服之○若肝經血
虛結核不消佐以四物柴胡升麻白朮茯苓○若肝
脾氣血虛弱佐以四君芎歸柴胡升麻○若憂鬱傷
脾氣血虧損佐以歸脾湯

海藻散堅丸一八二 治肝經癰瘤

海藻

昆布

龍膽草

酒拌炒焦各二兩

小麥
醋煮炒
乾四兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九臨臥白湯送下或噙化噙之尤好凡患癩癧服調治之藥末應宜佐以此上二方○一方有柴胡二兩

連翹飲子一八三 治乳內結核服數劑如不消宜兼服八珍湯初起有證者宜先解散

連翹 川芎 瓜蔞仁
研皂刺 炒

橘葉 青皮 甘草節 桃仁
各一錢半

右水煎食遠服

清肝解鬱湯一八四 治肝經血虛風熱或鬪火傷血
乳內結核或為腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之病
皆宜用此藥

人參

熟地黃

芍藥炒

茯苓

山梔炒

貝母各一

柴胡

牡丹皮

川芎

陳皮各五

當歸

白朮各錢

甘草

五分

右水煎服

羌活自芷散 一八五

治風熱血燥手掌破裂或頭面

生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

羌活

白芷

荆芥

軟柴胡

蔓荆子

防風

甘草

牙皂

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各
一錢

右水煎服

胡麻散

一八六

治風熱癰瘍搔痒

胡麻子

一兩
二錢

苦參

荆芥穗

何首烏

各八
錢

威靈仙

防風

石菖蒲

牛蒡子

炒

甘菊花

蔓荊子

白蒺藜

炒
炙甘草

各六
錢

右為末每服二錢食後薄荷湯調服茶清亦可

四生散一八七 治臙腿瘡溼不愈或眼目昏花名腎

臙風並治風癬疥癩血風瘡證

黃芩

獨活

白附子

真者

白蒺藜

等分

右為末每服二錢用豬腰子一枚批開入藥濕紙包

裹煨熟空心連腰子細嚼鹽湯送下

檳蘇散一八八 治風濕流注脚脛酸痛或嘔吐不食

檳榔

木瓜

陳皮

炙甘草

各一錢

香附

紫蘇各五分

水一鍾半生薑三片葱白三莖煎一鍾空心服

升麻和氣飲一八九 治風癬瘡疥熱結大便不通

當歸

陳皮

錢各一枳殼

炒芍藥

酒炒

半夏

製

桔梗

炒

白芷

蒼朮

米泔
浸炒

乾葛

白茯苓

甘草

炙各一錢

乾薑

炒

大黃

各五分

升麻

三分

右水煎服

當歸飲

百九十

治風濕血熱癰瘍疹痒痛膿水淋漓瘡

疥發熱等證

當歸

川芎

生地黃

白芍藥

白蒺藜

炒黃芪

何首烏

不見鐵
各錢半

防風

荆芥

甘草

錢各一

右水煎服

羌活當歸散 一九一 治風毒血熱頭面生瘡或赤腫

或成塊或癰疹搔痒膿水淋漓

羌活

當歸

川芎

升麻

防風

白芷

荆芥

鼠粘子

蒸

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

連翹

甘草

右用酒拌晒乾酒煎服

一掃散

一九二

治癬疥

防風 荆芥 苦參 地骨皮

薄荷 等分 甘草減半

右為末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜丸桐子大每服五十九食遠茶清送下

烏金散一九三 敷腎囊破爛一疳等證

麩炭 紫蘇葉

右等分為末香油調搽用紫蘇葉包裏之

蛇床子散一九四 治一切風癬疥癩搔癢膿水淋漓

蛇床子

獨活

苦參

防風

荆芥

各三錢

枯礬

銅綠

味另為末各一兩二

右為末麻油調搽

金黃散

一九五

敷天泡濕熱等瘡

滑石

粉甘草

此當半用為是

右等分為末搽敷 此方或加綠豆末以治濕熱肥瘡更妙○嘗以此方加枯礬少半用治肥瘡大效

白粉散

一九六

治諸瘡瘍

海螵蛸三分 白芨一分 輕粉一分

右為末先用漿水洗拭乾傅

滑石散一九七 治小兒天泡瘡

好滑石 黃柏

右共為末傅之○仍內服荆防敗毒散或金銀花散
熱甚者宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青靛調
前二味如泥用皂刺挑破泡水次敷藥神效

秘方仙遺糧湯一九八 治一切楊梅瘡不拘始終虛

實皆可取效

土茯苓 即名仙遺根用鮮者二兩洗淨以木石
柏搗碎用水三碗煎二碗去粗入後藥煎服

當歸

生地

防風

木通

薏仁

各八兩

金銀花

黃連

連翹

各一錢

白术

白蘚皮

各七分

皂刺

六分

甘草

四分

加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

上草薢湯一九九 治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏
潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙

用土萆薢即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不
拘時徐徐服之。若患久或服攻擊之劑致傷脾
胃氣血等證以此一味為主外加對證之藥無不
神效

五加皮飲二百 治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒
以治結毒

當歸 木瓜 生地黃 熟地黃

羌活

薏仁

各一錢

防風

荆芥

赤芍

苦參

大楓藤

各七分

五加皮

二錢

甘草

殭蠶

各五分

右每服入土茯苓四兩豬肉四兩用水二大碗煎一
碗食前溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙氣牛
肉茶酒醋所用土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此
藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散 二百一 一名草薢湯 治時瘡不拘初

起潰爛

土茯苓

五錢或一二兩

當歸

白芷

皂刺

薏仁

各一錢半

木瓜

不犯鐵器

白蘚皮

木通

各一錢

甘草

五分

金銀花

一錢

右水煎服○甚者土茯苓用至四五兩更妙

蠲癬消毒散 二百二 治時瘡肢節筋攣

姜黃

土茯苓

獨活

各五錢

白朮

當歸各一錢半芍藥一錢白芷五分

右水煎服

七貼方二百三 治楊梅綿花瘡

防風 忍冬 皂刺 蟬退去足頭

連翹 白蘚皮 五加皮 荆芥

穿山甲炒各一錢生地 木瓜去心忌鐵殼蟲炒各一錢半

皂子七個薏仁三錢土茯苓四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二次服之。○忌牛羊茶

酒醋房事

茯苓膏二百

治楊瘡並治瘋毒

當歸

白蒺藜 羌活

生地

熟地

甘草去皮 連翹

木通各三錢

土茯苓

半斤

右為粗末用五碗水熬將半用絹濾去滓再熬成膏涼冷每服一大酒鍾日三服輕者五六料重者十料全愈熬藥須用砂鍋○忌房事鷄魚牛肉椒醋等

發物

五寶丹 二百五

治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀

透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠

炒過三分半 一方用豆腐包蒸

硃砂

透明者三分半

鍾乳石

用木香甘草各一錢同煮乾用三分半

飛羅麵

炒過三分半

冰片

半分臨時加

右俱為極細末磁罐收貯聽用○服法每日用土茯苓成塊者一斤洗淨用石敲碎先入水二升煮取汁四碗收磁器內將前粗再入水四五碗煮汁二碗並入前汁內為一日之用○若病在上者加木香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓同煎病者不得另飲茶湯但將土茯苓湯時時飲之若飲湯半鍾加五寶丹二釐飲一鍾加四釐體厚者加六七釐一日內服盡此湯為度在上飽服在下饑服忌茶酒並一切

發風動氣之物其毒貼清涼膏或加摻藥收口若舊有輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也大忌房事輕者十服重者二七服全愈

楊梅癰漏方 二百六 不問年深淺並效

土茯苓 五兩 金銀花 一兩 皂刺 花椒

牛蒡

鬚金

當歸 各五分

黑鉛 三兩 鎔化入水銀五錢乘熱擂為粉分五分

聽臨後另入煎藥用

右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去粗
再入鉛粉一分煎至八分食遠服

右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積
毒而成此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從類
而出也○此藥每以五貼為一料初服一貼要取微
汗取汗法先以金銀花一兩或忍冬藤葉尤妙防風
荆芥花椒各半兩煎湯二斗於不透風處先薰後洗
自然汗出即患二三十年者只用此四料四汗之無

不全愈忌牛肉燒酒真妙也世人珍秘不傳徐春甫
得之用以治人一一獲效故詳載之以濟人也

會膿散

二百七

治惡毒便毒初起之妙方也

白芷

殼蠶炒

川山甲

煨各二兩

乳香

沒藥錢各五

右為末以當歸四錢用酒水各一鍾煎一鍾去粗量
人強弱或全用或一半調服之○此藥嫌太多則以
咬咀為飲大黃生加煎服之尤妙

牡蠣散 二百八 治便毒亦名血癌

當歸 酒拌 甘草節 滑石 蝦各一
牡蠣二錢

大黃 三錢 木鱉子 五個 桔非有大熱者此味
不可用 當去之亦不必用

水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服無論
已未潰膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑
若久曠房室大小便秘發熱煩痛或交感時強固精
氣以致交錯壅滯而結為腫痛便秘者不宜輕用

牛黃雙解散 二百九 治便癰內蘊熱毒外挾風邪或

交感強忍精氣以致淫精交錯壅結瘡痛或大小便
閉先用此藥通解更用調補之劑

肉桂

大黃炒

芍藥

牽牛杵炒

澤瀉

桃仁

去皮尖炒各二錢半

炙甘草

乾薑

錢各一

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯二百十 治臂癰腫痛兩尺脉緊按之無

力者

羌活

黃柏

各二錢

黃芪

鹽水炒

防風

當歸尾

藁本

肉桂

連翹

各錢

右水酒煎服

炙甘草

蒼朮

陳皮

各半錢

加味瀉肝湯

二一

治肝經濕熱不利陰囊腫痛或

潰爛皮脫畢丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆

治之

龍膽草

炒當歸梢

車前子

炒生地黃

芍藥炒

澤鴻

黃蓮

黃柏酒炒

知母酒炒

防風錢各一

甘草稍五分

水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

加味托裏散

二一二

治懸癰不消不潰

人參

黃芪

鹽水

當歸

川芎

麥門冬

芍藥炒

黃柏酒炒

知母酒炒

金銀花

製甘草

柴胡錢各一

水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯

二十三

治懸癰潰而不斂或發熱

飲食少思

人參

黃芪

鹽水

白朮

炒

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

炒

茯苓

錢各一

甘草

炙

肉桂

五味子

搗

麥門冬

各五分

水二鍾煎一鍾食前服○莖腫加青皮○小便赤加

酒炒黃柏知母○小便澀加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散

二一四

治婦人陰中突出一物長五六

寸名陰挺

當歸

黃芩

各二兩

牡蠣

煅一兩半

蝦皮

炙一兩半

赤芍藥

五錢

石為末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應
須以補中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又方用
當歸川山甲炒蒲黃炒各半兩辰砂一錢麝香少許
俱為末每服三錢酒調下尤效

婦人陰瘡

二一五

治婦人陰戶生瘡作痒

杏仁炒 雄黃 白礬各五錢 麝麝香二分

右為末敷入患處

塌腫湯二一六 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草 乾漆錢各三 生地黃 當歸

黃芩 川芎錢各二 鱉甲錢五

右用水數碗煎數沸去相當洗患處

白芷升麻湯二一七 治婦人陰內膿水淋漓或痒或痛

白芷 升麻 黃蓮 木通

當歸 川芎 白朮 茯苓

右水煎服○更用搗腫湯浴洗之

痔漏腸紅方 二一八 其效無比

黃連 去蘆毛淨一兩好酒浸一宿撈起陰乾為

末

百草霜 用草茅燒者松柴者不用一兩研細

烏梅肉 一兩蒸軟即用前浸黃連酒蒸爛

右以三味同搗一處為丸桐子大如太乾仍如前酒

搗丸之每空心用酒送下四五十丸三日見效十日

全愈

地榆散

二一九

治血痔

右用地榆為細末每服二錢七食前米飲調下日三

服

臭樗皮散

二百二十

治痔漏下血及膿不止

臭樗皮

微炒

酸石榴皮

黃連

去鬚

地榆

阿膠

炒珠各一兩

艾葉

微炒三錢

右為細每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯 二二一 治痔漏結燥大便作痛

秦艽 防風 當歸 酒拌白朮

黃柏 陳皮 柴胡 大黃 炙

澤瀉各一錢 桃仁去皮尖 紅花 升麻

甘草 分各五

右水煎空心服

豬臘丸 二二二 治大便痔漏下血

猪大臘一條控乾以槐花炒為末填入臘內兩頭札定

瓦器內米醋煮爛

右搗和再加糕糊為丸桐子大每服五七十丸食前
米飲或當歸酒下○此方用黃連豬臘二味亦名豬
臘丸尤效○一方先用海螵蛸炙黃去殼為末以木
賊草煎湯調下三日即效或後服黃連豬臘丸

痔瘡方二二三

雄黃五分五靈脂燒斷烟五棓子炒過一錢

沒藥三錢半
明者 白礬半生半熟
三錢

右為極細末用紙托貼瘡口上

三品錠子二二四

上品去十八種痔

白明礬二兩
明者 白砒一兩
五分 零乳香零
錢各三

牛黃三錢

中品去五漏及翻花瘤氣核

白明礬二兩
明者 白砒一兩
三錢 乳香

沒藥各三
錢半

牛黃二錢

下品 治癰癧氣核疔瘡發背腦疽諸惡證

白明礬

二兩

白砒

一兩半

乳香

沒藥

各二錢半

牛黃三分

右將砒末入紫泥罐內次用礬末蓋之以炭火煅令
烟盡取出並各藥俱研極細末用糯米糊和為挺子
狀如線香陰乾維瘡內三四次年深者五六次其根
自腐如瘡露在外更用蜜水調搽乾上亦可○嘗有

一老嫗用此治瘰癧索重價始肯為治其方法乃是
中品錠子紝瘡內以膏藥貼之其根自腐未盡再用
去盡更搽生肌藥數日即愈人多異之凡見其治氣
血不虛者果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此
與必效散相為表裏皆攻毒去邪之藥也

羊膽膏二二五 治痔漏下瘡瘍

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處掛乾用時
以涼水化開頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝湯

若得熊膽更佳如眼痛者點之尤效

水銀棗子膏

二二六

治蟲痔痒不止

水銀

一兩
棗肉二兩

右和研水銀不見星捻如棗核狀薄綿裹內肛門中
明日蟲出若痛加韶粉三分丸內之

熊膽膏

二二七

治痔痛極效

熊膽

五分
冰片一分

右研細用井花水調鷄翎掃痔上

蝸牛膏二二七 治痔痛極效

蝸牛一枚負殼
有角者 水片 射香各少許

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

芫花線二二九 繫痔漏瘤核

用芫花一握洗淨入木柏搗爛加少水绞汁於石器中熳火煎成膏將絲線於膏內度過晾乾以線繫痔當微痛候痔乾落以紙擦蘸膏納竅內去根當永除根也。一方只搗汁浸線一夜用不得使水。

枯痔水澄膏

二百三十

治痔護肉

麝金

白芨

各一兩

一方加黃連

右二味為細末如患內痔候登廁時番出在外用溫湯洗淨側臥於床其痔即出用蜜水調藥得中以篦箋塗穀道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久然後用後枯藥搽痔上仍用筆醮溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散

好白礬

四兩

生信石

二錢半

硃砂

一錢極細

研

右各研為細末先將砒入紫泥罐底次將礬末蓋之用火煅令烟盡其砒盡從烟去止借砒氣於礬內耳將礬為極細末看痔頭大小置礬末於掌中乃入硃砂少許以唾調稀用箋箋塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑為效至夜有黃水出切勿他疑水盡為妙至中夜上藥一過來夜依然上藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更上新藥仍用護肉藥間用荆芥湯洗之三兩日之後黃水

出將盡可於藥中增硃砂減白礬則藥力即緩三兩
日即可增減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傳
藥厚薄方是活法此藥只是借砒信之氣又有硃砂
能以解之一方士將此二方在京治人多效致富一
富商以百金求得之錄於予予雖未用傳人無不言
效但枯藥趙宜真煉師已刊於青囊雜纂如神千金
方則未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方也其
有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內庶不有失

如神千金方 二三一 治痔無有不效

好信石

黃明者三錢
打如豆粒

明白礬

一兩
為末

好黃丹

飛砂
五錢

鷄稍

七個洗淨瓦
上焙乾為末

草烏

光實者去皮
生研五錢

有用紫泥罐先將炭火煅紅放冷拭靜先下明礬燒令沸次下信入礬內拌勻文武火煅候沸再攪勻次看罐通紅烟起為度將罐掇下待冷取研為末方入黃丹草烏鷄稍三味再同研極細以磁罐收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗淨患處然後用生麻

油調前藥以鶩毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可取盡日近者俱化為黃水連根去淨更搽生肌之藥凡五痔皆可去之此乃臨安曹五方為高宗取痔得效後封曹官至察使

秘傳正骨丹二三二 治跌打損傷骨折血瘀而傷之

重者用此可續筋骨

降真香 乳香 没藥 蘇木

松節

自然銅

七次

川烏炮

真血竭

各一
兩

地龍

去土酒
浸烘乾

生龍骨

各一
錢

土狗

十個
內充烘乾
浸油

右十二味共重八兩八錢同為末每服五錢隨病上

下酒調服覺藥自頂門而至遍身搜至病所則颯颯

有聲而筋骨漸愈病人自知之○服藥後仍服人參

白朮黃芪當歸川芎肉桂甘草白芷厚朴以調補元

氣

本事接骨方

二三三

治打折損傷

接骨木 半兩 乳香 半兩

當歸

赤芍藥

川芎 自然銅 各一兩
炒醋淬

右為末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻衆手丸龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開乘熱飲之痛即止

沒藥降聖丹 二三四 治跌打損傷接續筋骨

當歸 酒炒白芍藥 川芎 生地黃

蘇木 川烏頭 膽去骨碎補 炙 乳香 另研

沒藥

另研自然銅
火煅醋淬十次
為末各一兩

右為末生薑汁共蜜和丸每一兩作四丸每服一丸
用米酒各半盞煎至八分空心熱服○立齋曰脾主
肉肝主筋若肝脾氣血虧損或血虛有熱而不愈者
當求其本而治之

十味沒藥丸

二三五

治打撲損傷筋骨疼痛或氣逆

血暈或瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥

乳香

川芎

川椒

當歸

芍藥

紅花

桃仁

血竭

各一兩

自然銅

四錢

火煅七次

醋淬

右為末同黃蠟四兩溶化入前末搗勻衆手丸彈子大每服一丸酒化下○立齋曰按接骨散沒藥丸惟元氣無虧者宜用若腎氣素怯或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本為善

花蕊石散

二三六

治打撲損傷腹中瘀血脹痛欲死

服之血化為水其功不能盡述

硫黃明者
四兩花蕊石一兩

右為末和勻先用紙筋和鹽泥固劑瓦罐一箇候乾入藥再用泥封口安在磚上虛書八卦方位用炭三十斤煅之候罐冷取出每服一錢童便調下○立齋曰前方若被傷已甚元氣虧損內有瘀血不勝疎導者用前藥一服其血內化又不動臟腑甚妙甚妙

黑丸子二三七 一名和血定痛散 治跌打損傷筋骨疼痛或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛或手足

緩弱行步不前若流注膝風初結服之自消若潰後
氣虛發熱與補藥兼服自歟

百草霜

白芍藥

各一錢

川烏

炮

南星

各三錢

赤小豆

兩半

白斂

一兩六錢

白芨

骨碎補

當歸

各八錢

牛膝

六錢

右各另為末酒糊丸桐子大每服三四十九鹽湯溫

酒任下孕婦忌服

封口藥

二三八

凡損傷皮肉破裂者以此封之

牡鴟

赤石脂

生研

紅丹

上好者等分

右為細末香油調塗瘡口○若欲消腫散血合口加
血竭乾摻之

當歸導滯散

二三九

治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或

大便不通或喘咳吐血

大黃

當歸

等分

右為末每服三錢溫酒下陽氣虛者須加肉桂

復元活血湯

二百四十

治跌打損傷瘀血流於脇下

作痛或小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡

一錢半

天花粉

穿山甲

炒各一錢

當歸

酒拌各二十去皮研

大黃

酒炒各一錢

紅花

甘草

各七分

桃仁

二十去皮尖研

右水一鍾半加酒鍾煎八分食前服之以利為度

金瘡方

二四一

凡金瘡出血不止用牛膽石灰摻之即止其方以臘月牛膽入風化石灰懸當風候乾用一方單用三七月擣爛敷之神效又方金瘡出血不止以五倍子生為

末乾貼之如不止而血熱者宜用犀角地黃湯之類
○大凡金瘡出血不止若素本怯弱者當補其氣若
陰虛或有熱者當補其血若因怒者當平肝若煩熱
作渴脊潰者當補脾氣若筋攣搐搦者當養肝血不
應用地黃丸以滋腎水

金瘡降真散 二四二

降真香佳用節 松香 文蛤

三味等分為末無論諸傷血出斷折摻破處夾綿定

神效

金瘡灰蛋散

二四三

治金瘡出血不止及久年惡瘡

石灰

細研

雞蛋清

以和灰成餅為度

右將灰蛋餅子煅過候冷研細遇金瘡摻之若多年
惡瘡以薑汁調敷○一方單以石灰摻傷處裹定亦
血止而愈

龍骨散

二四四

治金瘡

龍骨

赤石脂

五棓子

黃丹

海螵蛸各等分

右各研入麝香少許共研勻摻上如乾先以鹽水洗
挹乾摻之

桃花散二四五 治金瘡並一切惡瘡

黃丹 軟石膏煅過等分

和研勻如桃花色摻傷處甚妙

刀傷跌打經驗方二四六

凡刀傷磕損跌撲腫痛或出血用葱白細切杵爛炒

熱敷患處葱冷再易神效○一方以三七擣爛罨之
神效

立齋曰醫學綱目稱前方有神效余嘗以治前證青
腫不散死肉不潰佐以健脾胃之藥其功尤捷此內
外所以合一也

損傷敷夾法 二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分
為末以生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

捲跌閃腫痛

二四八

用生薑葱白同搗爛和麵炒熱罨之○如熱服而痛者用梔子加麵炒熱罨之

洗損傷方

二四九

凡傷重者用此淋洗然後傅藥

荆芥

土當歸

生葱

切斷一方
用生薑

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

箭鏃竹木刺方

二百五十

百一方治竹刺在肉以鱗蠍研敷立效

衍義方治竹木刺入肉嚼牛膝根罨之即出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒同蟻蟎研勻塗

傷處俟痒極拔出之

孫真人治箭鏃針刺杵蠅敷塗患處自出

罨跌打夾棍傷二五一

生薑 陳酒糟各一斤

同搗爛炒熟罨傷處

治櫻傷二五二

凡櫻傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾
將手薰洗良久即血活疼止不致潰爛熬水忌銅鐵
器其洗手水過夜即臭惡不可聞

杖瘡四方二五三

用川大黃一兩加上好冰片二分另研俱為末和勻
涼水調如糊攤杖處即時止痛一日後換膏藥貼之

又方加甘草一兩

又方攤藥

大黃

白芷

生半夏

各七錢

右為末以鮮薑汁調敷乾即再敷以黑處血紅為度

即換貼膏藥神效

又方

生半夏

松香

各一兩

右研一處蜜水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個即愈

諸骨諸物鰓

二五四

一治諸骨鯁用苧麻根杵爛丸彈子大將所鯁物煎湯化下

一治魚骨鯁用細茶五倍子等分為末吹入咽喉立愈

一治稻芒糠穀鯁喉將鵝弔一足取涎徐徐嚥之即消

一治吞釘鐵金銀銅錢等物但多食肥羊脂及諸般肥肉等味必隨大便而下

一治吞髮繞喉不出者取自己亂髮燒灰白湯調服
一錢

破傷風敷藥

二五三

治撲打損傷風腫痛者

南星

半夏

地龍

等分

右為末用生薑薄荷汁調搽患處

蒜薑酒

二五六

治破傷風外邪初人或風入於臟者

神效

凡頭面身體因破損傷風者頃刻發脹遲則不救速

用蓀蕪草一二兩酒水各半煎服被蓋暖臥少頃即可消散能飲者純用酒煎尤妙

防風湯 二五七 治破傷風表證未傳入裏急服此

防風

羌活

獨活

川芎等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服方在後二六四

白术防風湯 二五八 治破傷風服表藥過多自汗者

白术

黃芪

各一兩

防風 二兩

右每服五七錢水煎服臟腑已和而自汗出者可服

此藥若臟腑秘小便赤而自汗者急以後大芎黃湯
下之

羌活湯二五九 治破傷風在半裏半表間宜和解之
急服此湯稍緩則邪入於裏不可用矣

羌活 麻黃 菊花 川芎
防風 細辛 前胡 蔓荆子

黃芩錢各一 薄荷 白芷各五分

右每服五錢薑水煎日二三服

羌活防風湯

二百六十

治破傷風初傳在表脉浮緊

羌活

○

羌活

防風

藁本

當歸

芍藥

甘草

各四錢

地榆

細辛

各二錢

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎八分熱服量繁慢

加減用之○熟盛加黃芩各二錢○大便秘加大黃

二錢○自汗加防風白朮各五分

大芎黃湯

二六一

治破傷風邪傳於裏舌強口噤項

背反張筋惕搐搦痰涎壅盛宜疎導者急服之

川芎 羌活 黄芩 大黃

各一
兩

右每服五七錢水煎服

本事
玉真散 二六二

一名定風散 亦名奪命丹○治

打撲金刃破傷風重者牙關緊急腰背反張並蛇犬
所傷

天南星

湯泡七次如急
用以濕紙裹煨

防風 等分

右為末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張
者每服三錢用童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏

死心腹尚溫者速進二服亦可保全若破傷瘡口及
風犬咬傷須用漱口水或熱童便洗淨隨用生南星
為末擦之或以水調塗之出水為妙

養血當歸地黃湯

二六三

治破傷風氣血俱虛發熱

頭痛服此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸

酒拌熟地各二錢

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

北細辛

各一錢

水二鍾煎一鍾食遠服甚者加酒助之

蜈蚣散 二六四

蜈蚣一隻 一對 鯉膠三錢

右為末用防風白朮煎湯調下

破傷風灸法 二六五

治跌打損傷或蟲獸傷破皮膚以致風邪入內牙關緊急腰背反張或遍體麻木甚者不知人事急用蒜搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸為善仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風犬咬傷先刺患處去

毒血如前法治之

海藏
愈風丹二六六

治癩病手足麻木屑毛脫落遍身

生瘡及癩風癰瘍皮膚瘙痒搔破成瘡並皆治之

皂角碗接成汁去渣用砂罐文武火熬熱

苦參

一斤取
末四兩

烏梢蛇

白花蛇

土花蛇

各一條去腸陰乾酒
浸取淨肉晒乾為末

右為末入前二味和丸桐子大每服六七十九空心
煎通聖散送下乾物壓之日三服間日浴之汗出為

度

二聖散

二六七

疎風和血去癘毒

皂角刺

燒存性
為末

大黃

半兩

右用大黃半兩煎湯調下皂刺末二錢早服

槿皮散

局方槿皮散

二六八

治肺壅風毒遍身癰瘍癩痒

槿皮

枳殼

去穰各四兩
俱燒存性

荆芥穗一兩

炙甘草

半兩

杏仁

二兩

去皮尖用一
碗水一碗煮

令減半取出
晾乾研

為末

右共為末磁器收貯每服二錢食後溫酒調服

升麻湯二六九 治諸風熱癩肌肉極熱身如蟲行或

唇反綻裂

升麻三分人參一枝神 防風

羌活

犀角鎊

羚羊角

鎊各一錢

肉桂五分

水二鍾薑三片入竹瀝少煎八分不拘時服○或用

下瀉青丸

寶鑑醉仙丹二百七十

治癘風遍身麻本

胡麻子 炒牛蒡子 炒枸杞子 蔓荆子 炒各一兩

白蒺藜 苦參 天花粉 防風 各半兩

右為細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢
茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令
人如醉或下服血病根乃去仍量人輕重虛實以用
之病重者須先以再造散下之後元氣將復方用此
藥忌一切鹽醋炙燙厚味止可食淡粥時菜及諸蛇
肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力

子浮萍散

二七一

治風癬疥癩

浮萍

四錢

荆芥

川芎

麻黃

去節

當歸

赤芍藥

甘草

各二錢

水二鐘葱二莖豆豉一撮煎服汗出為度

寶鑑換肌散

二七二

治癩風久不愈或眉毛脫落鼻梁

崩壞其效如神

白花蛇

黑花蛇

各三酒浸

兩地龍

去土

當歸

川芎

赤芍藥

天門冬

去心

甘草

何首烏

鐵不犯

沙參

胡麻子

炒

天麻

紫參

苦參

白蒺藜

炒

細辛

白芷

蔓荆子

威靈仙

荆芥穗

菊花

木賊草

不灰木

石菖蒲

定風草

即草烏莖

草烏

炮皮去脂

蒼朮

木鱉

各一兩

右各另為末和勻每服四五錢食後溫酒調服加飲
數杯尤妙

通天再造散

二七三

治大風實熱內壅宜此攻之

鬱金 半兩 大黃 炮

皂刺 炒各一兩

白丑 頭末半生

半炒六錢

右為細末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下
晚利下黑頭小蟲病輕者只利臭穢之物○忌葷醒
厚味半年犯則再作不可救此藥服三五次即愈

白花蛇丸 二七四 治癘風 丹陽荆上舍得癘疾一

僧治而愈以數百金求方秘不肯傳館客袁生窺知
藏衲衣領中因醉之而竊錄焉用者多效

白花蛇 一條去頭尾 連骨生用 烏梢蛇 一條去頭尾生用 蟬蛻 去土

防風

去苗

金銀花

去葉

枸杞子

槐花

苦參

生地

各二兩

全蝎

醋浸一日去鹽味

黃芩

黃連

梔子

黃柏

烏藥

牛膝

川芎

牛蒡子

何首烏
鐵不犯

連翹

天花粉

白蒺藜

威靈仙

荆芥穗

細辛

蔓荆子

金毛狗脊

胡麻子

炒各一兩

漏蘆

半斤洗淨去
苗取四兩

右為末米糊丸桐子大每服五六十丸茶清送下空

卷之十四
心午前臨臥各一服

白花蛇膏二七五 治諸風癩疾遍身生瘡

白花蛇肉四兩酒浸 天麻七錢 荆芥薄荷各三錢

右為細末用好酒二升蜜四兩以銀磁器熬成膏每溫服一酒杯日三次煎餅壓下於煖處發汗效

防風天麻丸二七六 治癘風癩病此方應是仙傳一

年中常療數人初服藥有嘔吐者不可疑服而得愈其效如神

防風去蘆天麻

升麻

白附子炮

定風草

細辛去苗川芎

人參去蘆

丹參去蘆苦參

玄參去蘆紫參去蘆

蔓荆子威靈仙穿山甲

炒何首烏另搗各二兩

蜈蚣二條

右為細末同何首烏末拌勻外用胡麻一斤淘淨晒乾炒香熟另研為細末乃入前藥末二兩又拌勻煉蜜和為丸十九每服一丸細嚼溫漿水送下不拘時

候日三服宜食淡白粥一百二十日大忌房勞並將
息慎口

行藥方二十七 治癘毒

大黃

白牽牛

檳榔各一兩

甘草三兩

輕粉

五錢

右共為細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙五更
時調服病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕
者一月一次或二十日一次以三五遍為度

皂角散 二七八 治大風

皂角刺燒存性一錢 大黃一錢 輕粉五分

右為末空心酒調服取下惡物○服藥數日齒縫出血甚臭

雷丸散 二七九 取大風蟲

雷丸 貫仲二味先另研各二錢 阿魏各二錢 膏香一分

水銀 硫黃 雄黃各二錢半用乳鉢

右為細末每服一錢天明溫酒送下

墨虎丹 二百八十 治大風諸癩惡瘡毒蟲內蝕形骸

變壞

天靈蓋

三兩

人中白

桃仁

炮去皮尖各二兩

老皂刺

燒存輕粉

二錢

穿山甲

炒各半兩

麝香

五分

乾蝦蟆

二個去頭足燒存性

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九月首五更米飲連日服取虫盡即愈○殺勞蟲通用

苦參酒 二八一 治癩風及瘡疹疥癬最多者

苦參五片

右以好酒三斗浸三十日量飲一合日服不絕覺痺即瘥

硫黃酒二八二 殺癘風諸蟲

明硫黃研極細

右用酒浸空心飲清汁明日添硫黃研入酒如前飲之

七珍湯二八三 浴洗大風

青蒿 艾葉 忽冬藤 蒼耳子

桑條

槐條

柳條

三條俱
搗碎用

右煎水一桶入炒鹽半斤間日一洗浴密室中以簾席圍之洗出汗為妙不過十次愈

烏頭湯二八四 治大風瘡癩

草烏

麻黃根

艾葉

地骨皮

朴硝

各一兩

右為粗末用水一桶椒一合葱三十根同煎湯入醋

一鍾於密室中自用毛巾圍搭四肢候湯可浴令汗透務使面上如珠徐起或臥片時汗乾着衣避風五日再浴如此三五次每浴後更服換肌丹等藥

敷癩方 二八五

雄黃 硫黃 白礬 草烏

蛇床子

燒存性等分

右為末用香油或濃蜜水調敷患處

直指洗癩方 二八六 浴洗大風瘡

苦參 荆芥 防風 白芷

羌活

獨活

藁本

各一兩

洛陽花

四兩火酒噴過一宿

右作三次煎水洗令出汗

梅花白癩

二八七

用香油二碗入鷄蛋黃三枚熬將焦去粗熬油至一
碗許。外用雄黃一錢。白礬三分。花椒五分。
上共為細末入油內再熬熟收貯候用。每用猪毛
湯熱洗瘡垢搽油三五次即愈。愚按此方於蛋焦

去粗之後入水銀五錢微火漸熱之然後再加硃砂
細末二錢並雄黃白礬等末攪熬勻熟收用必妙

臘梨瘻 二八八

用杏仁百枚炒為炭入葱白蜂蜜共搗爛先用花椒
煎湯洗淨然後用此藥搽之新舊瘻瘍皆可用但勿
見風方好

瘻瘍二方 二八九

大楓子仁 木鱉仁 蛇床子各半 水銀三錢研
兩 散於內

右先以刀刮去瘡痂花椒湯洗淨外用麻油熬成珠
調藥傅之八日即愈

又方 用猪骨髓和輕粉搗爛罨之過夜即愈

頭面黃水肥瘡

二百九十一

治小兒頭面患瘡濃汁作

痒痂厚者名曰粘瘡當用此方或止用礬丹二味亦
可○若作痒出水水到即潰者名曰黃水瘡當用後

一方

松香

枯礬

官粉

飛丹

右等分為末麻油調傅或加香烟垢更效於香爐蓋
上刮取用之。一方用菉豆松香等分為末麻油調
傅極效或內服荆防敗毒散等藥。又有用益元散
加枯礬少半以麻油調敷大妙大妙

諸癬疥頑瘡二九一

油核桃 大楓子 樟腦 水銀

右四色研勻擦之此治有蟲者大效。一凡無蟲而
忽爾生瘡腫痛或濕爛者但以柏油搽之即可愈

白虎丹

二九二

發則頭面四肢眼目俱腫而惟額上

指尖兩耳不腫及不見赤色者方是其證

先將馬桶洗淨用沸湯傾入蓋少頃傾出盆內浴之
數次即退○再用車前草九里香馬蹄香枸杞苗即
雁稜菜同搗爛和麻油遍身自上而下擦之○大忌
雞魚生冷炙燉日色火光燈烟湯氣極須謹慎

又方 用生香附末冷茶調服一二錢即愈

又方 捣綠荳水去渣飲一二碗妙

紫白癥風歌

二九三

紫癥白癥一般風
附子硫黃最有功
薑汁調勻茄蒂擦
若經三度永無踪

又歌

紫癥白癥兩般風
水銀輕粉最成功
搗取生薑自然汁
只須一擦便無踪

又方 治紫白癰汗班等風

雄黃

硫黃

黃丹

蜜陀僧

南星

右為末先用葱擦患處次用薑蘸藥末擦之擦後漸黑次日再擦黑散則愈矣

又四神散

雄黃

雌黃

硫黃

明礬

各等分先浴令通身微汗以薑蘸擦之再以熱湯淋洗當日色淡五日除根

汗斑四方 二九四

大黃二錢
枯礬
椒紅各五分

右用豬脂沙糖同搗爛俟浴起以細麻布包擦至痛而止數日即愈○或止用硫黃少入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數次即愈

又方

蜜陀僧 硫黃各三錢
輕粉二錢
雄黃一錢

人言 五分

右為末薑汁調用茄蒂蘸察三日內不沐妙

又方

雌黃 雄黃各一錢 硫黃五分 膜半分

浴後薑醮擦二三日勿洗

又方

硫黃一兩用醋煮半日海螵蛸三個共為末浴後
以生薑醮擦患處須避風少時數度即愈

漆瘡方二九五

用香油調鐵銹塗之○胃氣實者內服黃連解毒湯

胃氣弱者以漆毒侵犯中氣致虛多有作嘔不能飲食者宜用六君加砂仁藿香酒炒芍藥之類○

又解漆毒法見因陣二三五

手足甲疽

二九六

凡手足間或因修甲傷肉或因損足成瘡潰爛上脚用綠礬置鐵板上煅沸色赤如熔金色者為真沸定取起研末以鹽湯洗搽

坐板瘡

二九七

腫痛多膿者

竇陀僧 生礬 大黃

右等分為極細末敷之

神效膏 二九八 治臘瘡脚瘡

先看瘡形大小用綿紙裁成四方塊十二張四角用小撲釘住聽用○外以好香油二兩用銅杓以文武火熬之先下花椒四十九粒煎黑取起○次下槐枝長一寸者四十九節煎黑又取起○再次下黃占一兩輕粉二分枯礬一分溶清却入前紙浸油內令透

不可令焦取起聽用凡貼瘡時先將槐枝葱椒煎湯洗滌令透拭乾乃以此膏貼上外面再以油單紙蓋護乃用軟帛縛定一日取下揭去一層復用湯藥洗淨又貼之盡十二張無有不愈者

隔紙膏二九九 治臙瘡神效

黃芪末五錢輕粉 乳香 没藥各一錢

銀硃一錢 血竭五分 銅綠二分

右為細末真香油調成膏攤油紙上再用油單紙一

層以鍼刺孔數十掩膏藥上貼之一日一易其膏

二味隔紙膏

三百

治臘瘡濕毒瘡

石膏

煅

枯礬

等分

右為末用銅油調成膏作隔紙膏貼之更服荆防敗

毒散如數劑不愈再服黃芪人參湯

爛腿瘡久不愈方

三百一

用米糖即膠餠也以碗盛於飯鍋內蒸化先用花椒
荆芥防風等藥煎湯洗瘡淨乃將膠胎薄攤瘡上外

以軟竹箸蓋定用絹縛之數日即愈神效

凍瘡方 三百二

憑青末 黃蠟各一兩 麻油一兩

右三味溶化搽患處

湯火六方 三百三

凡初被湯火所傷速用冷竈柴草灰一二升入鹽少許以涼水調如稀糊嘗味微鹹為度用以厚攤傷處覺熱則易之連易數次則火毒皆拔於灰中必腫痛

隨散結痂而愈誠神妙方也

又方 治潰爛腫痛者○用生桐油調人中白敷之
即愈亦妙方也

又方 用皂礬研細和以冷水澆傷處其疼立止其
腫即消

又方 用大黃芒硝等分為末鷄子清調貼之神效
又方 用石膏末香油調敷即愈

又赤石脂散○治湯火傷肉爛赤痛

赤石脂 寒水石 大黃 等分

右為末新汲水調塗

湯火至聖膏

三百四

治湯火傷瘡用雞子黃置銀石器內熬油調胡粉敷之○錦衣楊永興厨下夜間回祿凡睡此房已死將死者灌以生蘿蔔汁良久悉愈凡遇此患者以此治之其應如響

湯火止痛散

三百五

止痛生肌

大黃末微炒當歸末等分

右用麻油調搽或乾擦亦可

小兒丹毒三百六

此毒多生頭面四肢色赤或腫遊走不定甚者宜用
前磁鋒砭法使毒血遇刺皆出更以神功散傳之內
服荆防敗毒散或五福化毒丹若使毒氣入腹則不
治或愈而復發皆因母食辛辣炙燭以致內熱宜於
母藥中加漏蘆煎○或令自服亦愈

小兒鵝口 三百七

凡小兒口內白屑滿口者為鵝口瘡則不能飲乳用
髮或軟絹纏指蘸井水拭舌上使淨如屑不能脫濃
煮粟米湯以綿纏筋頭拭洗却用飛過黃丹搽之
加味太乙膏 三百八 一切瘡瘍並宜貼之先用隔蒜
灸更服活命飲以收全功

當歸 生地黃 芍藥 玄參

大黃各二 加甘草四

兩

用麻油二斤煎丹收

景岳會通膏

三百九

凡諸癰毒痞塊風氣骨節疼痛

無所不治

大黃

木蠻仁

當歸

川芎

芍藥

生地

麻黃

細辛

白芷

防風

荆芥

蒼朮

羌活

川烏

甘草

烏藥

南星

半夏

香附

官桂

蒼耳

骨碎補

草烏

艾葉

皂角

枳殼

三稜

蓬术

蘿蔔子

水紅花子

巴豆

五倍

獨活

桃仁

蘇木

紅花

續斷

連翹

梔子

苦參

槐花

皂刺

乾薑

草麻子

透骨草

晒

穿山甲

全蝎

殭蠶

蜂房

各一兩

蛇退

一條

蜈蚣

十隻

根

蝦蟆

三隻

血餘一團 獨蒜四頭

右五十四味用麻油五斤浸三日先煎血餘草麻木
別桃仁巴豆蝦蟆獨蒜待半枯然後入餘藥煎黑去
滓丹收後下細藥十味

阿魏二兩 乳香制 没藥製各一兩 木香

丁香 雄黃 砥砂 血竭

兒茶各一錢 膜香不拘一
二錢

右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法凡

熬成熟油一斤下飛淨好紅丹八兩若欲微嫩則止
下七兩五錢

神異膏三百十 治癰疽瘡毒及收口甚效此瘡瘍中
第一方也

麻油二斤黃丹十二兩黃芪 杏仁

玄參各二兩蛇蛻半兩男髮如雞子蜂房子多者佳一兩

右先以黃芪杏仁玄參入油煎至將黑乃入蛇蛻蜂
房亂髮再煎至黑去粗徐徐下丹慢火煎收黃丹不

必拘數但以得中為度凡膏藥用久必至老硬煎時
預留嫩膏少許如硬量和之

清涼膏三一 治一切瘡瘍潰後宜用之

當歸二兩 白芷 白芨 木鱉子

黃柏 白芨 乳香 白膠香

各五錢

黃丹

淨五兩 麻油十二兩

乳香等二味

右用油煎前六味以槐柳枝順攪油熟丹收然後下

阿魏膏 三一二 治一切痞塊更服胡連丸

羌活 獨活 玄參 官桂

赤芍藥 穿山甲 生地黃 兩頭尖

大黃 白芷 天麻 紅花 各半
兩

木鱉十枚去殼亂髮一團槐柳桃枝各半
兩

右用麻油二斤四兩煎藥黑去粗人髮再煎髮化仍
去粗入上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細藥即
成膏矣

阿魏

芒硝

蘇合油

乳香

沒藥

各五錢

麝香三錢

右凡貼膏藥須先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨之

硃砂膏三一三 治一切頑瘡破瘡杖瘡癰疽發背破

傷者最妙最佳

麻油一斤

飛母六兩

水銀一兩

硃砂一兩

佳者一兩半飛

好黃蠟 四兩

先下油煎數沸下雞子一枚敲開連殼投之熬焦攪
去子退火俟油定下水銀五錢再加微火攬熬飯頃
即入丹漸收成膏後下黃占再攬候大溫下極細好
硃砂二兩五錢攬勻磁罐收貯

神效當歸膏 三一四 治一切發背瘡瘍湯火疼痛等

證去腐肉生新肉其效如神凡洗拭換膏必須預備
即貼之新肉畏風故也如用白蠟尤好此藥生肌止

痛補血續筋故與新肉相宜

當歸

生地黃

黃蠟

各二兩白蠟當減半

麻油六兩

右先將當歸地黃各一兩入油煎黑去粗又將二味各入一兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攬勻即成膏矣用塗患處以紙蓋之如有死肉須用利刀剪去則生肌尤速

攻堅敗毒膏三一五

亦名乾坤一炁膏專攻痞塊

諸瘡毒痔漏

當歸 熟地 生地 白芍藥

赤芍藥 南星 半夏 三稜

蓬术 木鱉 兩頭尖 穿山甲

巴豆仁 肉桂 五靈脂 桃仁

續斷 玄參 玄胡索 草麻子仁

白芷 羌活 獨活 大黃

紅花 川烏 草烏 蘇木

川芎 防風 杏仁各一
兩

右用麻油四十兩浸諸藥三日桑柴火煎成丹收後

下細藥

乳香製

沒藥製各

一兩真阿魏

一兩

麝香

三錢

右方於細藥中加蘆薈木香各一兩蟬酥三錢即名
消痞大成膏

消痞膏三一六

三稜

蓬朮

山甲

木鱉仁

杏仁

水紅花子

蘿蔔子

透骨草

晒乾

大黃各一兩 獨頭蒜四個

右用香油一斤入前藥十味煎油成以飛丹收之後

下細藥

真阿魏乳香 沒藥各一兩 膜麝香三錢

右先下乳沒阿魏三味後下麝香攪勻待冷傾水中
浸數日用磁瓶收貯勿使洩氣用時以白布或堅白
紙攤貼八九日一換或見大便去膿血勿以為異亦
有不去膿血而自愈者若治鴻瘞可貼臍腹忌房事

生冷○凡貼癥積痞塊先用蕎麥麵和作一團圍住患處四邊其塊上放皮硝二三兩蓋厚紙以熨斗熨令熱氣內達然後去硝用膏藥貼之○右原方用白花菜同透骨草另煎膏二兩攬入膏內收用但白花菜惟西北方間有之求覓不易故余用獨蒜蘿蔔子代之其功亦不減也

琥珀膏三一七 治頸項瘰癧及腋下初結小核漸加連珠不消不潰或潰而濃水不絕經久不瘥或成漏

證

琥珀

白芷

防風

當歸

木鱉子

木通各一兩

丁香

桂心

硃砂

木香

松香各半兩

麻油二斤

右先將琥珀等六味為末其餘藥入油煎黑濾去粗
徐入黃丹再煎軟硬得中入前藥成膏貼之

貼瘡琥珀膏三一八 貼癰積瘡塊

大黃朴硝各一兩為末以大蒜同搗膏貼之

卷之二十一
三六十四

水紅花膏 三一九 貼瘡塊

用水紅花或子每一碗以水三碗用桑柴文武火熬成膏量瘡大小用紙攢貼以無方為度仍將膏用酒調服忌暉腥油膩不飲酒者白湯下

火龍膏三百二十 治風寒濕毒所襲筋骨攀痛及濕痰流注經絡壅痛不能行步並治歷節風鶴膝風其效如神

生薑

八兩取汁
乳香 為末
五錢 沒藥 為末
麝香 一錢

真牛皮廣膠 二兩

右先將薑汁並膠熔化方下乳香沒藥調勻待少溫
下麝香即成膏矣攢貼患處更服五積散如鶴膝風
須服大防風湯

趙府膏 三二一 專貼疼痛腫毒

乾蝦蟆 三個 全蝎 一隻
殼蠶各兩 蟠蛇四條

斑蝥 四十個 商陸根 一兩
六錢 花椒 一錢 童子髮 六分

雞內金 二個 槐枝 三寸長者
四十根

細藥

兒茶 乳香 没藥 血竭

龍骨 黃占 白占各五錢 麝香一錢

右用麻油二斤煎飛丹收

蜜陀膏三二二 此膏治臙濕諸瘡瘋痛等證神效凡

治疼痛先以葱薑擦患處然後貼之

先用密陀僧一二斤打碎將童便煮之覺其濁性去而童便氣清乃可止矣用便煮過則貼瘡不痛晾乾

研細如麵候用

用桐油不拘幾斤熬至將黑為度每熟油一斤用陀僧六兩收之於將成膏之頃取起離火候稍涼諒膏多少入冷水數碗徐攪之恐其泛出俟少定即逼去其水再上火熬化復入水數碗攪逼如前或三次更妙然後熬淨其水每油一斤再入官粉二兩熬收其色方黑凡熬此者銅鍋須大方可用

八仙紅玉膏 三二三

治諸瘡

龍骨 赤石脂 兒茶 血竭

沒藥 乳香錢各一輕粉五分或一錢冰片一分

右用麻油二兩入當歸五錢煎枯去滓入龍石茶竭四味再煎一二沸次入乳沒畧煎勻後入黃占五錢溶化冷定入輕冰攤貼

碧油膏三二四 止痛排膿炙後宜用之

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝各二兩

乳香另研血竭錢各五黃丹四兩淨

右用麻油十兩煎膏成後下乳香血竭

長肉膏三二五

人參

黃芪

當歸

夜合樹皮

玄參各一兩

血餘三兩

老鼠一個

細藥

血竭

龍骨

赤石脂

白臘各五錢

右用麻油一斤煎丹收

保養元氣膏

三二六

此膏助元陽補精髓通血脉鎮

玉池養龜存精百戰百勝待婦人經淨之時去膏而
泄則可成孕並治腰膝疼痛五勞七傷諸虛百損半
身不遂膀胱疝氣帶濁淫淋陰痿不舉無不效者此
邵真人方也

麻油一斤四兩入甘草二兩先熬六七滾然後下
諸藥

生地黃

熟地黃

俱酒洗

麥門冬

肉蓯蓉

酒洗

遠志肉

蛇床子

酒浸

鬼絲子

酒浸

牛膝

酒洗

鹿茸

川續斷

虎骨

紫稍花

木鱉仁

谷精草

大附子

肉桂

各五錢

右熬成以煮過松香四兩飛丹半斤收之次下細藥

次下龍骨

倭硫黃 赤石脂

又次下乳香

沉香

丁香

木香

各一錢

又次下陽起石

三錢

麝香

五分

蟬酥

鴉片

各一錢

又次下黃占五兩

右煎成入井中浸三四日每用膏七八錢紅絹攤貼
臍上或腰眼間每貼五六十日再換

煮松香法 三二七 凡用松香收膏藥者必用水多煮
一二遍去其澀燥之性方可貼瘡不痛○若用貼癰
痞血塊則當加藥如後法煮過用之方妙

大都松香三斤 用皮硝一碗 水紅花四兩

大黃 當歸 生地各二兩 三稜

蓬术各一兩

右藥七味用水一桶先熬汁去滓淨用煮松香徐徐添入以汁完為度收用之極佳○一收油之法凡煮過松香一斤入熬熟藥油五兩即成膏矣

以下通用方

四君子湯三二八 方在補陣一

治瘡瘍脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰歎不能宜用此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒則七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大傷

不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之症宜於此湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起

六君子湯

三二九

方在補陣五

治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣則諸證自愈

四物湯

三三十

方在補陣八

治瘡瘍血虛發熱或因失血或因耗伐或因潰後致
暑熱內熱煩燥不安皆宜服之蓋血生於脾脾虛不

能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以補脾

八珍湯 三三二 方在補陣十九

治瘡瘍脾胃損傷惡寒發熱煩躁作渴或瘡瘍潰後
氣血虧損膿水清稀久不能愈

十全大補湯 三三三 方在補陣二十

治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或潰瘍膿清寒熱自汗

盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀者

補中益氣湯 三三四 方在補陣三一

治瘡瘍元氣虧損惡寒發熱或因耗伐肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脈洪大弦虛或微細軟弱

歸脾湯 三三五 方在補陣三十三

治瘡瘍憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛

自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調
晡熱內熱或唇瘡流注及不能消散潰斂等症

獨參湯

三三六

方在補陣三十六

治瘡瘍一切失血或膿水出多氣血俱虛惡寒發熱
作渴煩躁蓋血生於氣故血脫者宜補氣陽生陰長
之理也用人參一兩棗十枚薑十片水煎徐徐服

加味四君子湯

三三一

治痔漏下血面色痿黃凡諸氣虛脾虛不能攝血等

證

人參養營湯 三三七 方在補陣二十一

治瘡瘍脾胃虧損發熱惡寒血氣俱虛四體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣食少作渴凡大病後最宜用此

五味異功散 三三八 方在補陣四

治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

生脉散 三三九 方在補陣五七

治瘡瘍胃氣虧損陰火上衝口乾喘促或肢體倦怠
肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣汗出不止食少作渴
或濃水出多氣血俱虛煩躁不安睡臥不寧或濕熱
大行火土合病脾胃虛弱身重氣短或金為火制絕
寒水生化之源肢體痿軟脚欹眼黑等症

當歸補血湯三百四十 方在補陣四五

治瘡瘍脾胃虛損或服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴
引飲目赤而紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無

此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯必死

黃芪六一湯 三四一 方在補陣五十

治瘡瘍陰陽俱虛盜汗不止

參术膏三四二 方在補陣四十

治瘡瘍中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

東垣聖愈湯 三四三 方在補陣九一

治脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不安眠睡

不寧五心煩熱飲食少思

錢氏
七味白朮湯 三四四

方在小兒七

治瘡瘍胃氣虛弱或因冠伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

陳氏
五味子湯 三四五 方在補陣五九

治瘡瘍腎水枯涸口燥咽乾喘促虛煩作渴

參附湯 三四六 方在補陣三十八

治瘡瘍失血過多或膿瘍大泄或寒涼汗下真陽脫

陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暉等證急服此湯以
救元氣緩則不治

人參理中湯三四七 方在熱陣一

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或
痛或胸膈虛痞飲食不入

六味丸三四八 方在補陣百二一

此壯水之劑夫人之生以腎為主凡病皆由腎虛而
致此液乃天一生水之劑無有不可用者若腎虛發

熱作渴小便淋秘痰氣壅盛欬嗽吐血頭目眩暉小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足等症尤多用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘡此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也

八味丸 三四九 方在補陣百二二

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍

腹疼痛夜多漩溺

陳加減八味丸三百五十 方在古補百二三

治腎水不足處火上炎發熱作渴咽喉疼痛口舌生瘡寢汗憔悴等證

還少丹三五一 方在補陣一三七

治足三陰經虛損致患鶴膝風等證又補脾胃進飲食之良劑也

大防風湯三五二 方在補陣九九

治足三陰虧損外邪乘虛內患鶴膝風或附骨疽腫
痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更全用
調補之劑

十宣散 三五三 方在痘疹十四

治瘡瘍脉緩澁體倦惡寒或脉浮緊細用之以散風
助陽也

薛氏 四神丸 三五四 方在熱陣一五二

治瘡瘍脾胃虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛

或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

五積散 三五五 方在散陣三九

治風寒濕毒容於經絡致筋攣骨痛或腰脚痠疼或拘急或身重並皆治之

二陳湯 三五六 方在和陣一

治癰癧中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

小柴胡湯 三五七 方在散陣十九

治肝膽經風熱瘰癧結核或腫痛色赤或寒熱往來
或日晡發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口
苦耳聾欬嗽皆用此藥

小青龍湯 三五八 方在散陣八

治肝肺受寒欬嗽喘急宜服此發散表邪

人參敗毒散 三五九 方在散陣三六

治瘡瘍外有表邪焮痛寒熱或拘急頭痛脉緊有力

不換金正氣散 三百六十 方在和陣二二

治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱服此以正脾氣則痰氣自消寒熱不作

加味逍遙散三六一 方在補陣九四

治瘡瘍肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便不利

防風通聖散三六二 方在攻陣十六

治時毒熱毒便秘熱燥邪實等症若非大満大實者不可輕用此藥

消風散

三六三

方在散陣四七四九

治風熱癰瘍瘻瘍及婦人血風癰瘍或頭皮腫痒或諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻出清水噴嚏聲重耳作蟬鳴

犀角散

三六四

方在痘疹六三

治時毒癰瘍熱盛煩躁多渴赤斑等症

黃連解毒湯 三六五

方在寒陣一

治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

普濟消毒飲 三六六

方在寒陣十三

治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑餓之後患此者最宜用之仍當兼固胃氣

梔子清肝散 三六七

方在寒陣六十

治三焦足少陽風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡清肝散 三六八 方在寒陣九五

治鬚疽及肝膽三焦風熱怒火之症或項胸作痛或瘡毒發熱

加味龍膽瀉肝湯 三六九 方在寒陣六四

治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰欣腫作痛或潰爛不愈或舉丸懸掛小涎滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺痔漏腫痛或出膿水

清心蓮子飲 三百七十 方在寒陣三二

治膀胱陰虛濕熱玉莖腫痛或莖竅澁滯口苦咽乾
小便色赤或白濁夜安靜而晝發熱

黃芩清肺飲 三七一 方在寒陣三八

治瘡瘍肺經陰虛火燥而小便不通

垣清胃散 三七二 方在寒陣五四

治膏梁積熱唇口腫痛齒齦潰爛焮痛上連頭面或
惡寒發熱

竹葉石膏湯 三七三 方在寒陣五

治癰疽胃火盛腫痛作渴

竹葉黃芪湯 三七四 方在寒陣七

治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

滋腎丸 三七五 方在寒陣一六三

治瘡瘍腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等證凡
不渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無
陰則陽無以化若脾肺燥熱所移此當清其化源

瀉青丸 三七六 方在寒陣百五一

治肝經實熱瘰癧腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

大蘆薈丸

三七七

方在小兒百十五

治肝火下疳潰爛或焮腫作痛或治小兒疳膨食積

口鼻生瘡牙齦蝕爛等瘡並蟲蝕肛門痒痛

五苓散

三七八

方在和陣一八二

治瘡毒下部濕熱小便短少

五淋散

三七九

方在寒陣百十七

治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如砂石或如

膏油或熱沸便血

八正散

三百八十

方在寒陣百十五

治下疳便毒小便淋漓脉證俱實者

清肺飲

三八一

方在和陣三五一

治瘡瘍渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水生化之源宜用此藥以清化源其水自生而便自利

益元散

三八二

方在寒陣百十二

治瘡瘍小水不利內生煩熱作渴

四順清涼飲 三八三 方在攻陣二五

治瘡瘍煩躁飲冷燉痛脉實大便秘結小便赤澁

玉燭散 三八四

治便癰初起腫痛發熱大小便秘宜用此行散之若邪實毒甚者宜桃仁承氣湯

人參平肺散 三八五 方在寒陣三七

治火尅肺金傳為疽瘻咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

葶藶大棗瀉肝湯 三八六

方在和陣百四十

治肺證胸膈脹痛上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲重

枳殼散 三八七

方在寒陣百一

治煩熱便血

失笑散

三八八

方在婦人百四

治跌撲產後心腹絞痛或不知人事或經行瘀血作

痛或癱

槐角丸

三八九

方在寒陣一七五

治痔漏腫痛便血脫肛

紫金錠

三百九十

方在因陣二百二

治癰疽諸毒

良通闊散

三九一

方在古因九八

搐鼻開牙闊

景岳全書卷六十四